

lipsă pg. 401-409

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

GEOGRAFIA ROMÂNIEI

B.C.U.- IASI 593833



IV

REGIUNILE PERICARPATICE:
DEALURILE ȘI CÎMPIA BANATULUI ȘI CRIȘANEI,
PODIȘUL MEHEDINȚII, SUBCARPAȚII,
PIEMONTUL GETIC, PODIȘUL MOLDOVEI

Comitetul de redacție al volumului:

dr. LUCIAN BADEA, dr. DRAGOȘ BUGĂ (coordonatori);
[dr. VASILE BĂCĂUANU], dr. IGNATIE BERINDEI,
ADRIAN CIOACĂ, dr. GEORGE ERDELI, dr. GHEORGHE
NEAMU, dr. MARIA SANDU, dr. SORINA VLAD, dr. ION
ZĂVOIANU (membri).

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

1992

GEOGRAPHY OF ROMANIA, vol. IV, The PERICARPATHIAN REGIONS:
The hills and the plain of Banat and Crișana, The Mehedinți plateau,
The Subcarpathians, The Getic piedmont, The Moldavian plateau.

GÉOGRAPHIE DE LA ROUMANIE, vol. IV, LES RÉGIONS
PÉRICARPATIQUES:
Les collines et la plaine du Banat et de Crișana, Le plateau de Mehedinți,
Les Subcarpates, Le piémont Gétique, Le plateau de Moldavie.

ГЕОГРАФИЯ РУМЫНИИ, том IV, ПЕРИКАРПАТСКИЕ РАЙОНЫ:
Холмистые и равнинные районы Баната и Кришаны, Мехединтское плато,
Подкарпаты, Гетский пьемонт, Молдавское плато.

Redactarea cartografică: dr. GHEORGHE NICULESCU

Ilustrația cartografică a fost executată în Institutul de Geografie de:
SIMONA CANTACUZINO, EUGENIA CORLĂȚEANU, RODICA DAN,
CORNELIA MANEA, VIORICA TICULESCU, EUGEN VIȘU — cartografi principali
STAN PAȘOL — xerografist.

ISBN 973-27-0181-1

ISBN 973-27-0180-3

Redactor: dr. FLORINA GRECU

Tehnoredactor: ELENA MATEESCU

Coperta de : EUGEN STOIAN

*Bun de tipar 11. XI. 1992. Format 8/54×84. Coli
de tipar 72,50, 1 pliant h. lucrării.*

C.Z. pentru biblioteci mari: $\begin{cases} 91(498) (021)=59 \\ 551.4(498) (021)=59 \end{cases}$

C.Z. pentru biblioteci mici: 91(498)

c. 674 S. C. „Universul” S. A.
Str. Brezoianu nr. 23-25
București

CUPRINS

PREFAȚĂ

1	CARPAȚII ȘI REGIUNILE PERICARPATICE	
	(<i>Lucian Bădea</i>)	13

2	DEALURILE ȘI CÎMPIA BANATULUI ȘI CRIȘANEI	
	(coordonatori: <i>Lucian Bădea, Ignatie Berindei</i>)	17

2.1.	Unitatea și varietatea geografică a regiunilor pericarpatice vestice (<i>Ignatie Berindei, Valer Belozero, Grigor Pop, Petru Tudoran</i>)	17
2.2.	Dealurile Banatului și Crișanei	21
2.2.1.	Caracterele generale (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozero, Petru Tudoran</i>)	21
2.2.2.	Dealurile Silvano-Someșene	25
2.2.2.1.	Caracterele generale (<i>Ion Mac</i>)	25
2.2.2.2.	Dealurile Chioarului și Depresiunea Baia Mare (<i>Gheorghe Iacob</i>)	27
2.2.2.3.	Dealurile și depresiunile Silvaniei (<i>Ion Mac, Petre Dan Idu</i>)	39
2.2.3.	Dealurile Crișanei	49
2.2.3.1.	Caracterele generale (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozero</i>)	49
2.2.3.2.	Dealurile Plopișului (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	52
2.2.3.3.	Culoarul Oradea — Borod (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Petre Dan Idu</i>)	53
2.2.3.4.	Dealurile Pădurii Craiului (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	56
2.2.3.5.	Culoarul Crișului Negru (Țara Beiușului) (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	58
2.2.3.6.	Dealurile și depresiunile Crișului Alb (<i>Melinda Cădea</i>)	63
2.2.4.	Dealurile Banatului (trăsăturile fizico-geografice, <u>Vasile Sencu</u> ; populația, așezările, activitățile economice, <i>Floarea Bordan</i>)	71
2.2.4.1.	Caracterele generale	71
2.2.4.2.	Dealurile Lipovei	78
2.2.4.3.	Dealurile Lăpușului și Lugojului	81
2.2.4.4.	Dealurile Pogănișului	84
2.2.4.5.	Dealurile Dognecei	6
2.2.4.6.	Dealurile Oraviței	87
2.3.	Cîmpia Banatului și Crișanei	90
2.3.1.	Caracterele generale (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozero, Gheorghe Măhăra, Petru Tudoran</i>)	90
2.3.2.	Cîmpia Someșului	99

2.3.2.1. Caracterere generale (Gheorghe Iacob, <u>Alexandru Savu</u>)	99
2.3.2.2. Cîmpia Înaltă a Someșului (Gheorghe Iacob)	105
2.3.2.3. Cîmpia Joasă a Someșului (Gheorghe Iacob)	107
2.3.2.4. Cîmpia Careilor (Carei — Valea lui Mihai) (Gheorghe Iacob)	112
2.3.2.5. Cîmpia Ierului (Gheorghe Iacob)	116
2.3.3. Cîmpia Crișurilor (Ignatie Berindei, Grigor Pop, Gheorghe Măhăra)	117
2.3.3.1. Caracterere generale	117
2.3.3.2. Diviziunile regionale	127
2.3.4. Cîmpia Banatului (trăsăturile fizico-geografice, <u>Vasile Sencu</u> ; populația, așezările, activitățile economice, Ioan Ianoș)	133
2.3.4.1. Caracterere generale	133
2.3.4.2. Cîmpia Nureșului	137
2.3.4.3. Cîmpia Vingăi	146
2.3.4.4. Cîmpia Timișului	147
2.3.4.5. Cîmpia Lugojului	154
2.3.4.6. Cîmpia Bîrzavei	157

③

PODIȘUL MEHEDINȚII

(coordonator: *Lucian Badea*) 159

3.1. Constituția geologică și caracterere reliefului (Nicolae Muică)	159
3.2. Relieful carstic (Nicolae Muică)	165
3.3. Clima și apele (Nicolae Muică, Ana Popova-Cucu)	166
3.4. Solurile, învelișul vegetal și fauna (Nicolae Muică, Ana Popova-Cucu)	167
3.5. Rezervațiile naturale (Ana Popova-Cucu)	171
3.6. Populația și așezările (George Erdeli)	172
3.7. Activitățile economice	176

4

SUBCARPAȚII

(coordonatori: *Lucian Badea, Dragoș Bugă, Ion Zăvoianu*) 179

4.1. Caracterere generale	179
4.1.1. Poziția și limitele (<u>Alexandru Roșu</u>)	179
4.1.2. Alcătuirea geologică, geneza și evoluția reliefului (<u>Alexandru Roșu</u>)	181
4.1.3. Aspectele orografice și diviziunile regionale (Lucian Badea, <u>Alexandru Roșu</u>)	185
4.1.4. Clima (Gheorghe Neamu)	190
4.1.5. Rețeaua hidrografică (Ion Zăvoianu)	193
4.1.6. Vegetația (Cristina Muică)	199
4.1.7. Fauna (Constantin Drăgescu)	203
4.1.8. Solurile (Nicolae Muică)	206
4.1.9. Populația și așezările (Dragoș Bugă, Constanța Ruscescu)	209
4.1.10. Agricultură (Ioana Ștefănescu)	217
4.1.11. Industria (Petre Deică)	222
4.1.12. Căile de comunicație (Alexandra Glenovici)	227
4.1.13. Potențialul turistic (Dragoș Bugă)	229
4.2. Unitățile regionale	231
4.2.1. Subcarpații Getici	231
4.2.1.1. Caracterere generale (Lucian Badea)	231
4.2.1.2. Subcarpații Gorjului (Nicolina Baranovsky, Dragoș Bugă)	234
4.2.1.3. Subcarpații Vâlcei (Lucian Badea, Mihaela Dinu, Constanța Ruscescu)	250
4.2.1.4. Muscelele Argeșului (Maria Sandu, Petre Deică)	265
4.2.2. Subcarpații de la Curbură	274
4.2.2.1. Caracterere generale (Lucian Badea)	274
4.2.2.2. Subcarpații Prahovei (Dragoș Bugă, Nicolina Baranovsky, Nicolae Muică)	276

4.2.2.3.	Subcarpații Buzăului (<i>Dan Bălțeanu, Ioana Ștefănescu</i>)	292
★ 4.2.2.4.	Subcarpații Vrancei (<i>Adrian Cioacă, Ioana Ștefănescu</i>)	302
★ 4.2.3.	Subcarpații Moldovei	316
4.2.3.1.	Caracterele generale (<i>Ioan Donisă, Alexandru Ungureanu</i>)	316
4.2.3.2.	Subcarpații Troțușului (<i>Ioan Donisă, Constantin Brânduș</i>)	324
4.2.3.3.	Subcarpații Neamțului (<i>Ioan Donisă, Alexandru Ungureanu</i>)	332

5

PIEMONTUL GETIC

	(coordonator: <i>Dragoș Bugă</i>)	345
5.1.	Relieful. Geneza și trăsăturile generale (<i>Lucian Badea</i>)	345
5.2.	Clima (<i>Gheorghe Neamu</i>)	351
5.3.	Rețeaua hidrografică (<i>Ion Zăvoianu</i>)	356
5.4.	Vegetația și fauna (<i>Cristina Muică, Constantin Drăgescu</i>)	361
5.5.	Solurile (<i>Nicolae Muică</i>)	365
5.6.	Populația și așezările (Considerații de geografie istorică, populație, <i>Melinda Căndea</i> ; așezările rurale, <i>Dragoș Bugă, Valeria Alexandrescu</i> ; așezările urbane, <i>Dragoș Bugă</i>)	367
5.7.	Industria (<i>Ion Velcea</i>)	377
5.8.	Agricultura (<i>Sorina Vlad</i>)	379
5.9.	Căile de comunicație (<i>Dragoș Bugă</i>)	381
5.10.	Potențialul turistic (<i>Dragoș Bugă</i>)	383
5.11.	Unitățile regionale	384
5.11.1.	Piemontul Motrului (<i>George Erdeli</i>)	384
5.11.2.	Piemontul Bălăciței (<i>Dragoș Bugă</i>)	392
5.11.3.	Gruirile Jiului (<i>Dragoș Bugă</i>)	396
5.11.4.	Culoarul Jiului (<i>Dragoș Bugă</i>)	397
5.11.5.	Piemontul Oltețului (<i>Vasilina Urucu</i>)	400
5.11.6.	Culoarul Oltului (<i>Vasilina Urucu</i>)	405
5.11.7.	Piemontul Cotmenei (<i>Ion Velcea</i>)	409
5.11.8.	Gruirile Argeșului (<i>Ion Iordan</i>)	414
5.11.9.	Piemontul Cindești (<i>Ion Iordan</i>)	416

6

PODIȘUL MOLDOVEI

	(coordonatori: <i>Lucian Badea, Vasile Băcăuanu</i>)	421
6.1.	Caracterele geografice generale	421
6.1.1.	Poziția și limitele (<i>Vasile Băcăuanu</i>)	421
6.1.2.	Alcătuirea geologică și etapele formării unității (<i>Liviu Ionesi</i>)	421
6.1.3.	Relieful (<i>Vasile Băcăuanu</i>)	426
6.1.4.	Clima (<i>Elena Erhan</i>)	428
6.1.5.	Rețeaua hidrografică (<i>Maria Pantazică</i>)	432
6.1.6.	Vegetația și fauna (<i>Nicolae Barbu</i>)	435
6.1.7.	Solurile (<i>Nicolae Barbu</i>)	439
6.1.8.	Populația (<i>Veronica Giosu</i>)	441
6.1.9.	Așezările (<i>Alexandru Ungureanu, Dumitru Chiriac</i>)	443
6.1.10.	Agricultura (<i>Mihai Apăvăloaie</i>)	448
6.1.11.	Industria (<i>Alexandru Ungureanu</i>)	451
6.1.12.	Căile de comunicație și transporturile (<i>Vasile Nimigeanu</i>)	455
6.1.13.	Calitatea mediului. Măsuri de protecție (<i>Irina Ungureanu</i>)	457
6.2.	Unitățile regionale	459
6.2.1.	Podișul Sucevei (<i>Eugen Gheorghiu, Nicolae Lupu-Brătiloveanu</i>)	459
6.2.1.1.	Caracterele fizico-geografice	459

6.2.1.2. Așezările și populația	462
6.2.1.3. Activitățile economice	464
6.2.1.4. Podișul piemontan dintre râurile Suceava și Moldova	467
6.2.1.5. Podișul Dragomirnei	474
6.2.1.6. Podișul Fălțicenilor	478
6.2.1.7. Culmea Siretului	487
6.2.2. Cimpia Moldovei (<i>Vasile Băcăuanu</i> , <i>Vasile Nimigeanu</i>)	490
6.2.2.1. Caracterele fizico-geografice	490
6.2.2.2. Populația și așezările	500
6.2.2.3. Activitățile economice	502
6.2.2.4. Cimpia Jijiei superioare și a Bașeului	510
6.2.2.5. Cimpia Jijiei Inferioare și a Băhluiului	514
6.2.3. Podișul Birladului (<i>Ion Stănescu</i> , <i>Pompiliu Poghițe</i>)	520
6.2.3.1. Caracterele fizico-geografice	520
6.2.3.2. Populația și așezările	524
6.2.3.3. Activitățile economice	527
6.2.3.4. Podișul Central Moldovenesc	531
6.2.3.5. Colinele Tutovei	536
6.2.3.6. Dealurile Fălciului și Depresiunea Elanului	540
6.2.3.7. Podișul Covurluiului	542
6.2.3.8. Culoarul Birladului	545
6.2.4. Culoarul Siretului (<i>Dimitrie Oancea</i> , <i>Eugen Gheorghiu</i> , <i>Nicolae Lupu-Bratilovcanu</i>)	548

BIBLIOGRAFIE	559
--------------	-----

CONTENTS	573
----------	-----

СОДЕРЖАНИЕ	577
------------	-----

PREFAȚĂ

Al patrulea volum din Geografia României este, în același timp, cel de-al doilea din partea destinată caracterizării regionale a teritoriului României, și anume a celor șase unități pericarpatiche legate — chiar nemijlocit — de lanțul carpatic: Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei, Podișul Mehedinți, Subcarpații, Piemontul Getic și Podișul Moldovei. Aceste șase mari regiuni pericarpatiche, ocupînd peste 34% din suprafața țării, se adaugă Carpaților spre a defini clar sistemul geografic carpatic românesc, precizîndu-i dimensiunile și complexitatea trăsăturilor. Prezentarea lor în această succesiune și în ansamblul legăturilor cu Carpații (nu numai din punctul de vedere al genezei, evoluției și vecinătății actuale, ci și al influențelor complexe permanente și reciproc manifestate, pentru anumite trăsături chiar hotărîtoare) se înscrie întru totul ideii aflate la baza structurii și modului de tratare a părții regionale din această lucrare: existența și individualitatea sistemului geografic carpatic românesc, unitar structurat în trepte concentrice.

Ca urmare, volumul al patrulea continuă caracterizarea regională a Carpaților (din volumul anterior) și face legătura cu următorul volum — destinat unităților sudice —, cel care încheie tratarea regională a teritoriului României, prima de aceste proporții din istoria geografiei românești. Ca toate celelalte volume, este rodul unei colaborări largi, elaborarea fiind încredințată cercetătorilor din Institutul de Geografie și cadrelor didactice de la catedrele de geografie ale universităților din București, Cluj Napoca și Iași, în funcție de preocupările anterioare de cercetare a unităților regionale.

Volumul începe printr-un capitol de legătură cu cel destinat Carpaților și Depresiunii Transilvaniei, în care accentul se pune pe definirea conținutului termenului de regiune pericarpatică prin prisma legăturii acesteia cu Carpații sau ca efect al funcțiilor lanțului carpatic în ansamblul sistemului geografic pe care l-a generat.

Fiecare din regiunile cuprinse în acest volum are caractere care o deosebesc de celelalte și o definesc ca individualitate de prim ordin, chiar dacă împreună formează treapta pericarpatică a dealurilor și podișurilor, ale cărei trăsături generale se înscriu în anumite limite — suficient de clar definite — ale fenomenelor fizice și umane, ale utilizării spațiului geografic. Sînt, însă, limite care înglobează o foarte mare varietate de aspecte, mai accentuată decît cea constatată la unitățile cuprinse în celelalte două volume destinate caracterizărilor regionale. Aceasta pentru că se referă, în măsură egală, la diversitatea aspectelor fizico-geografice, umane și economice, la gradul de modificare a peisajului natural, mult diferit de la o unitate la alta.

Toate cele cinci regiuni reprezintă o parte a teritoriului țării de străveche și intensă locuire, mai intens locuită decît alte regiuni, în care se constată cea mai mare densitate a așezărilor. În cuprinsul lor au avut loc primele și cele mai importante cristalizări ale organizării statale românești. Ca în toate regiunile de contact, aici se întîlnește cea mai accentuată diversitate a activităților umane, mult amplificate în ultimele decenii. Pentru a se scoate în evidență specificul regional, ținînd seama de mărimea și de complexitatea fiecărei unități, tratarea nu are aceeași structură la toate unitățile. Caracterizările au urmărit o adaptare la particularitățile fiecărei diviziuni regionale.


dar, pe cît posibil, înscriindu-se într-o schemă generală : după o caracterizare generală fizică, umană și economică a întregii regiuni (cu aspect mai mult sau mai puțin monografic) au fost puse în evidență diviziunile principale și subdiviziunile acestora printr-o prezentare succintă a celor mai de seamă trăsături geografice. Dacă la caracterizările generale s-a căutat menținerea unui echilibru între prezentarea aspectelor fizico-geografice și a celor umane și economice, la caracterizarea diviziunilor s-a accentuat asupra aspectelor umane și economice, în general asupra gradului de umanizare a fiecăreia, mai ales că toate, fără excepție, au suferit în ultimele decenii transformări radicale ale peisajului. Chiar dacă în structura generală a volumului diviziunile regionale se află pe aceeași treaptă taxonomică, ele n-au fost considerate în același fel. Diferențierile s-au bazat pe complexitatea caracterelor și mai ales pe particularitățile funcționale în ansamblul regional. Ca urmare, arile depresionare și mai ales văile sau culoarele create de râurile principale, în general cu caracter radier în ansamblul sistemului geografic carpatic (și care traversează regiunile pericarpătice) — cum sînt culoarele Crișurilor, Jiului, Olteului, Siretului, Birladului — , au fost privite ca axe de convergență a activităților și subliniate ca atare.

O atenție aparte s-a acordat, de asemenea, centrelor urbane integrate regiunii în care au apărut și dezvoltat, fiind considerate alături de aglomerări umane cu funcții multiple, cît și ca centre de organizare a activităților pe o suprafață mult mai întinsă decît vatra și aria periurbană imediată.

Populația orașelor este consemnată după datele recensămîntului populației din 1992. Spațiul acordat fiecărei unități este proporțional cu complexitatea acesteia, cu varietatea peisajului și cu gradul de transformare antropică. Studiile și cercetările efectuate în ultimii ani au dat posibilitatea ca tratarea fiecărei diviziuni geografice să se situeze aproximativ la același nivel de cunoaștere, indiferent de gradul de cercetare și cunoaștere anterior începerii elaborării acestui volum.

Excepțînd Podișul Mehedinți, pentru care — ținînd seama de dimensiuni și de omogenitatea condițiilor fizice și umane — s-a rămas la o caracterizare de ansamblu (cu menționarea, bineînțeles, a unor diviziuni locale impuse de particularitățile reliefului), la celelalte unități s-a pus accentul pe caracterizarea subunităților de gradul doi (la Piemontul Getic) sau trei (pentru Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei, Subcarpații și Podișul Moldovei).

Fiecare subunitate a fost reprezentată prin două schițe de hartă (elaborate de regulă la scara 1 : 200 000, iar unele la 1 : 400 000 sub condiționarea dimensiunilor) destinate : una, reprezentării modului de distribuire a așezărilor după mărime și funcții pe fondul formelor de relief principale, a doua, reprezentării resurselor și a modului de utilizare a terenului. S-au ales aceste aspecte considerate ca dominante și reflectînd particularitățile geografice locale, spre a se crea o imagine cît mai sintetică și a se da posibilitatea privirilor comparative între subdiviziunile regiunilor pericarpătice.



REGIUNILE PERICARPATICE

REGIONUL PERICARPATICE



BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

CARPAȚII ȘI REGIUNILE PERICARPATICE

Structura orografică a teritoriului României prezintă acea trăsătură de bază — etajarea concentrică a treptelor (sau unităților) principale de relief, de la cele înalte, muntoase, din partea centrală, către cîmpiile periferice (etajare concordantă în linii generale și cu vîrsta din ce în ce mai tînără, cu etapele și fazele de formare a reliefului, implicit de apariție, evoluție și succesiune a peisajelor) —, pe care n-o mai întîlnim sub această formă la nici un alt sistem orografic al Europei. Iar treapta înaltă din partea centrală nu reprezintă o masă muntoasă compactă, ci un lanț de munți sub formă de arc (aproape un cerc) care închide o mare depresiune, Depresiunea Transilvaniei. Este, deci, o trăsătură proprie numai sistemului orografic carpatic românesc, care, prin dezvoltarea sa azonală, specifică, și prin etajare, influențează hotărîtor modul de manifestare a celorlalți factori geografici și, prin aceasta, structura, succesiunea și particularitățile regiunilor geografice din jur și nu mai puțin condițiile (sau limitele) de utilizare optimă a acestora. Aceste caractere (esențiale prin implicațiile de prim ordin în viața și istoria milenară a poporului român) au fost puse în evidență în numeroase caracterizări generale ale teritoriului României, fără să lipsească sublinierea funcțiilor lui geoistorice (G. Vâlsan, 1924; S. Mehedinți, 1927; C. Brătescu și colab., 1943; I. Conea, 1944).

Carpații reprezintă un lanț muntos (aparținînd sistemului orogenic și orografic alpino-carpatic), dar în același timp, prin evoluție și configurație, reprezintă partea centrală sau nucleul unui domeniu geografic mai întins; ale cărui trăsături principale au fost determinate de etapele de evoluție și de confi-

gurația lanțului carpatic, de poziția sa și de raporturile ariei orogenice carpatice cu unitățile structurale vecine. Și acestea nu sînt și nu rămîn considerente numai de ordin geomorfologic pentru că numai în funcție de evoluția și definitivarea treptelor generale, ca și de varietatea regională și locală a reliefului, s-a ajuns la structura actuală și varietatea de distribuție a peisajelor naturale, diferit implicate în activitatea omului și modificate (antropizate) ca atare. Trebuie să înțelegem așadar, că *domeniul carpatic* nu se reduce la un simplu ansamblu orografic muntos, ci reprezintă un sistem geografic foarte complex, cu o evoluție bine precizată, cu o ordonare proprie în trepte concentrice, dar înglobînd o foarte accentuată varietate regională și locală. Iar limitele lui se află acolo pînă unde s-au manifestat hotărîtor (în raport cu regiunile vecine) influențele carpatice pentru formarea caracterelor de bază ale regiunilor geografice periferice legate sub diferite forme de partea centrală sau de nucleul carpatic propriu-zis.

Munții Carpați — osatura sistemului carpatic — sînt, deci, cei care au asigurat, prin evoluția lor, formarea unităților din jur și, în egală măsură, au influențat sau au condiționat dobîndirea caracterelor actuale, cele care determină apartinerea și integrarea lor în domeniul carpatic. Fără îndoială că totalitatea caracterelor geografice, deși înglobează o foarte accentuată varietate a teritoriului îi asigură, totuși, acea unitate definită ca armonios alcătuită și cu specificitate carpatică, rezultată din alăturarea și prin legăturile funcționale dintre partea muntoasă și cea nemuntoasă din jur, dintre lanțul

carpatice și regiunile pericarpatiche (S. Mehedinti, 1927; V. Mihăilescu, 1944).

Numirea unităților geografice din jurul Carpaților ca *pericarpatiche* aduce în primul rând o precizare a poziției acestora față de lanțul carpatice, dar nu se limitează la ideea vecinătății periferice imediate. Pericarpatic înseamnă mai mult decât o simplă alăturare spațială și definește un anumit conținut determinat de constituția teritoriului, de legăturile multiple și complexe dintre marile trepte și regiuni geografice ale teritoriului României, de însăși unitatea carpatică a acesteia. Iar această unitate este determinată de tot ansamblul de legături genetice, structurale și de evoluție, de influență și de condiționare, de complementarism geoistoric și actual social-economic, legături manifestate între lanțul carpatice și regiunile geografice de la periferia lui.

Caracterizarea și individualizarea sistemului carpatice pornește de la o definire morfostructurală — lanțul carpatice împreună cu toate unitățile depresionare de la periferia și și din interiorul său aflate pe un fundament orogenic carpatice —, dar întreg sistemul sau domeniul geografic carpatice (de complexitate maximă), generat și influențat de Carpați în toate componentele lui, cu limite care, prin evoluția din etapa cuaternară, depășese pe cele strict morfostructurale.

În conformitate cu acest conținut (pornind de la dimensiunile și complexitatea sistemului geografic carpatice), sub termenul de *regiuni pericarpatiche* sînt cuprinse nu numai unitățile geografice din imediata vecinătate a lanțului carpatice, cele lipite de acesta și dominate de marginea lui exterioară, ca Subcarpații, Podișul Sucevei și Dealurile Banatului și Crișanei. Pericarpatiche sînt toate unitățile formate în fazele de evoluție posttectonică a Carpaților (din cretacicul superior pînă în holocen), care au rămas legate de aceștia și se mențin sub influența acestora, cu relații devenite evident mai complexe în etapa istorică și pe măsura intensificării procesului de modificare antropică a peisajelor.

Toate treptele de relief, în succesiunea lor morfostructurală, cronologică și altitudinală de la centru spre periferie, inclusiv depresiunile inter- și intracarpatiche, sînt de origine carpatică. Ele s-au format din sedimente provenite din Carpați, pe un fundament în cea mai mare parte de orogen carpatice (dar și pe platformele din vorland afundate către

contactul cu unitatea de orogen și acoperite, de asemenea, cu sedimente tinere de origine carpatică), iar caracterele lor actuale, ca trepte de relief, sînt determinate de însăși evoluția Carpaților, de manifestările tectonice ale blocului carpatice și ale fundamentului scufundat. Marile cuverturi piemontane periferice, indiferent de vîrstă, extensiune și starea lor actuală modificată (ajunse în stadiul de podișuri colinare, de cîmpii înalte fragmentate, de cîmpii piemontane joase sau cîmpii de terase, cu întregul complex de trăsături fizice și de utilizare) sînt consecințe directe ale ultimei etape de evoluție a Carpaților, cînd s-a completat și definitivat întregul eșafodaj al sistemului carpatice.

Cele trei ramuri (și fațade) ale arcului carpatice au poziții cu totul diferite față de circulația maselor de aer, iar modificările pe care le provoacă se răsfrîng în nuanțele climatice foarte variate ale regiunilor de la periferia lor. Lanțul carpatice impune, așadar, o evidentă modelare pericarpatică a maselor anticlonale (N. I. Bordei, 1988), într-un anumit fel opunîndu-se acestora (diminuîndu-le și orientîndu-le deplasarea) și în egală măsură modifică deplasarea ciclonilor mediteraneeni (Ecaterina Ion Bordei, 1983), ceea ce determină diferențieri puternice în manifestarea elementelor climatice și a stărilor de timp (mai ales din spațiul intercarpatice și cel pericarpatic). Nu este, deci, vorba numai de adăpostul (de atîtea ori invocat) pe care îl oferă relieful carpatice pentru partea vestică a regiunilor pericarpatiche, în special pentru depresiunile subcarpatice mai ales în timpul invaziei maselor de aer din nord-est sau pentru cele de sub fațada sudică în timpul circulației de nord-vest. Rolul de barieră și efectele de foclu de pe clina externă a Carpaților se resimt chiar pînă la Cîmpia Dunării și, în general, se poate vorbi de influențe ale Carpaților prin modificarea regională a manifestării fenomenelor climatice pînă la apariția unor trăsături ale climei într-un specific carpatice, resimțite pe o arie mult mai largă decât cea muntoasă. Întrucît cea mai mare cantitate de precipitații cade în Carpați, aici se formează trăsăturile de bază ale regimului hidrologice care imprimă specificul alimentării și scurgerii, variația debitelor și nivelurilor. Particularitățile carpatice ale râurilor nu rămîn circumscrise numai munților, ci se continuă (cu modificări evidente, dar nu totale) pînă la Dunăre. Manifestările ex-

treme ale râurilor — inundații catastrofale, debite minime — își au originea în munți, iar în regiunile periferice pot fi amplificate sau diminuate.

Etajarea biopedoclimatică de ansamblu este consecința etajării în trepte aproape concentrice a întregului sistem orografic carpatic, iar activitățile umane dependente de aceste condiții generale și adaptate la acestea au o distribuire conformă aceleiași etajări și repartiții regionale a condițiilor mediului.

dițiilor geografice și din modul de adaptare a activității umane la acestea pentru o utilizare continuă și adecvată) au asigurat permanența unității funcționale geoistorice a domeniului carpatic (sau carpato-danubiano-pontic). Pentru că în esență, niciodată Carpații — inclusiv Depresiunea intercarpatică a Transilvaniei — (priviți ca spațiu utilizat și oicumenic) nu au fost despărțiți de regiunile pericarpatiche. Pajiștile carpatice de înălțime au fost utilizate permanent dinspre ambele fațade ale munților, drumurile trans-




Fig. 1. Unitățile carpatice și pericarpatiche. I, Carpații; II, Depresiunea Transilvaniei; III, unitățile pericarpatiche de deal și podiș (1, Dealurile Banatului și Crișanei; 2, Podișul Mehedinți; 3, Subcarpații; 4, Piemontul Getic; 5, Podișul Moldovei; 6, Podișul Dobrogei); IV, unitățile pericarpatiche de cîmpie (7, Cîmpia Banatului și Crișanei; 8, Cîmpia Română; 9, Delta Dunării și cîmpia litorală); a, depresiuni.


Între regiunea de munte și regiunile din jur există raporturi puternice de complementaritate manifestate nu parțial, pe anumite fișii sau în anumite arii locale, ci în general, în tot spațiul pericarpatic, dar în variante regionale determinate de caracterele geografice (generale și de detaliu) ale unităților aflate în vecinătate, de favorabilitatea legăturilor, de tradițiile activității umane perpetuate de milenii. Iar caracterele acestor raporturi (izvorite din particularitățile favorabile ale con-

carpatice (de culme și din lungul văilor principale) s-au continuat pînă în cîmpiile periferice și au asigurat permanența legăturilor economice dintre toate regiunile (nu numai ca drumuri pastorale) și a schimburilor de populație. Sistemul actual al căilor de comunicație și al legăturilor economice păstrează același caracter radier (impus de configurația dominantă a rețelei văilor principale) și concentric (prin existența inelelor principale de circulație de la interiorul și exteriorul Carpaților) spre a asigura legătura și integrarea

tuturor părților domeniului carpatic într-un sistem unic. Dar aceasta nu înseamnă și uniformitatea geografică a acestuia. După cum fiecare din ramurile lanțului carpatic prezintă trăsături regionale proprii, în mod asemănător regiunile pericarpatice se diferențiază spre a da varietatea binecunoscută a spațiului pericarpatic, concretizată la nivelul cel mai înalt în existența unităților geografice de pe cele trei fațade ale Carpaților (fig. 1) în vest, *Dealurile Banatului și Crișanei*, continuate și întrepătrunse cu *Cîmpia Banatului și Crișanei*, formînd aproape o singură unitate; în est, *Podișul Moldovei* — o fostă unitate sarmatică tabulară —, diferențiat în subunități de podiș deluros și

cîmpie colinară; în sud, *Podișul Mehedinți*, unitate deluroasă cu structură carpatică, și *Subcarpații*, prelungiți (ca ultimul val orogenic carpatic) și pe latura estică, pînă în valea Moldovei; apoi, tot în latura sudică, *Piemontul Getic*, cel mai întins piemont relict care se continuă spre sud (între Jiu și Argeș aproape fără diferențiere) cu *Cîmpia Română* într-un mod ce-i conferă un evident caracter piemontan. La această succesiune a regiunilor pericarpatice trebuie adăugat și *Podișul Dobrogei* care, prin atributele sale geografice (și nu numai geografice), nu este în afara ansamblului regiunilor pericarpatice (V. Mihăilescu, 1944) (fig. 1).

DEALURILE ȘI CÎMPIA BANATULUI ȘI CRIȘANEI



2.1. Unitatea și varietatea geografică a regiunilor pericarpătice vestice

Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei se desfășoară de la nord la sud, în vestul Munților Oaș—Gutii, al munceilor „jugului intracarpatic” (în viziunea lui V. Mihăilescu, 1966) și al Carpaților Occidentali, pînă la frontiera de vest a României. Constituirea ei ca unitate geografică ce înglobează dealurile și cîmpia a fost determinată de legăturile strînse, chiar de întrepătrunderile de caractere geografice generale ale celor două trepte de relief între care nu există o delimitare tranșantă, urmare a înaintării cîmpiei între dealuri și a lipsei unei denivelări tranșante. Conturarea unității geografice a fost impusă de evoluția paleogeografică, de procesele tectonice — în mod deosebit de cele disjunctive — și, pe alocuri, de manifestarea magmatismului, de poziția geografică și de desfășurarea ei în lungul laturei vestice a Carpaților, nu în ultimul rînd, de acțiunea antropică.

Mișcările din neogen s-au manifestat printr-o activitate disjunctivă intensă, în contextul a două direcții — una carpatică (nord-vest — sud-est) și alta panonică (nord-est — sud-vest), precum și printr-o inegală ridicare sau coborîre a unor blocuri pe verticală, ceea ce a determinat formarea unei structuri sub formă de „tablă de șah” (M. Paucă, 1954), cu compartimente diferite înălțate sau coborîte. În acest sens, se remarcă festonarea puternică a unității muntoase printr-o serie de golfuri suprapuse grabenelor, cărora le corespunde relieful de dealuri, precum și inegală coborîre sau ridicare a unor com-

partimente din cîmpie, răsfrînte în mod corespunzător în desfășurarea subunităților de relief. Tot ca o particularitate a acestei unități, în strînsă legătură cu manifestările tectonice, este prezența în cadrul molasei neogene a unor formațiuni de fundament (roci cristalofiliene, calcare), a unor intruziuni magmatice neogene modelate sub formă de măguri, cu un vădit rol de diferențiere regională, precum și a apelor de adîncime termale sau intens mineralizate.

În timpul neogenului și cuaternarului, pe acest fond structural s-a format un relief piemontan, modelat, apoi într-unul deluros, precum și un relief de cîmpie situat în prelungirea acestuia spre vest, pe alocuri foarte greu de delimitat. În formarea acestora, un rol deosebit l-a jucat și activitatea neotectonică din regiunile subsidente situate pe teritoriul țărilor vecine (Bodrog, Sártréh, Mako, Timișul inferior) spre care sînt atrase arterele hidrografice alohtone principale (Someș, Crișuri, Mureș, Timiș) și care, prin direcția și acțiunea lor de fragmentare transversală, se încadrează întru totul trăsăturii de bază exprimată de fragmentarea radiară a teritoriului României (fig. 2).

Drept urmare, la periferia vestică a munților apare o fișie de dealuri care pătrunde adînc în interiorul munților formînd acele depresiuni-golf, considerate din această cauză și ca depresiuni intramontane, trăsătură unică în ansamblul dealurilor pericarpătice. Văile, în general foarte largi, la nivelul teraselor se inseriu sub forma unor culoare intracolinare sau chiar depresiuni intracolinare, cu un aspect tentacular ca urmare a prelungirii lor pe văile secundare. Dealurile trec spre vest




Fig. 2. Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei. 1, Dealuri piemontane; 2, depresiuni intradeluroase; 3, cîmpie piemontană; 4, cîmpie taburală; 5, cîmpie joasă de divagare.

într-o succesiune de trepte de glaciș în prelungirea teraselor care participă la alcătuirea părților înalte și intermediare ale cîmpiei (100 — 200 m), la care se adaugă cîmpia de dune și cîmpiile tabulare formate pe depozite de loess. Partea joasă a cîmpiei, a cărei altitudine este în general sub 100 m, este alcătuită din cîmpii de divagare, precum și unele cîmpii tabulare joase formate pe depozite

de loess sau cîmpii pe mlaștini desecate (Ecedea, Ier).

Spre deosebire de celelalte unități pericarpice, poziția geografică a Dealurilor și Cîmpiei Banatului și Crișanei, larg deschisă spre vest, favorabilă advecției maselor de aer umede din cadrul circulației vestice și unei activități mai intense impulsionată de mișcarea ascendentă a lor pe cîlna vestică a Carpaților, condiționează manifestarea clima-

tului continental moderat, cu ierni blinde și veri mai puțin excesive. Activizarea orografică a maselor de aer explică frecvența și intensitatea mai mare de manifestare a fenomenelor hidrometeorologice (600 — 1 000 mm precipitații medii multianuale), comparativ cu celelalte regiuni deluroase și de câmpie din țară. Absența caracterului torențial al ploilor se reflectă în intensitatea mai puțin accentuată a proceselor de versant.

Tot ca un unicat în ansamblul unităților pericarpatiche se înscrie și faptul că, datorită extinderii mari pe latitudine, în distribuția elementelor climatice se remarcă o anumită zonalitate de la sud la nord, determinată deopotrivă de valoarea diferită a potențialului radiativ-caloric și a proceselor ce caracterizează dinamica generală a atmosferei, la care se adaugă etajarea de la vest la est, cu diferențieri valorice mai mult sau mai puțin tranșante, între câmpie și dealuri.

Frecvența relativ ridicată a ciclonilor mediteraneeni, apariția în apropierea suprafeței active din Depresiunea Panonică a unor perturbatii de circulație impuse de relief în contextul dominantei vestice, precum și devierea curenților de aer la contactul cu munții, impun un regim eolian ce se caracterizează printr-o frecvență mai ridicată în stratele inferioare din sectoarele sudic și sud-estic, care se modifică, apoi, cu altitudinea, tinzând spre dominantă vestică.

Pe lângă ape cu caracter freatic, cu sau fără presiune hidrostatică, apar ape suprafreatiche, cu un caracter predominant oscilator sezonier, legate de existența în sol a unui orizont B compact și impermeabil și care sînt responsabile de formarea solurilor sărăturate (cîmpiile Ierului, Crișurilor, Timișului).

Regimul hidrologic al rîurilor se încadrează tipului pericarpatic vestic, cu variante nivo-pluviale în câmpie și pluvionivale în dealuri, caracterizate printr-o scurgere și debite maxime la sfîrșitul verii și toamna. Pe fondul influențelor climatice submediteraneene se remarcă o creștere, de la nord la sud, a scurgerii sezoniere din timpul iernii și al primăverii (I. Ujvári, 1972).

Tot un caz particular îl prezintă bilanțul hidrologic al cîmpiei, datorită imposibilității de evacuare pe cale naturală a apelor formate local, cărora li se adaugă și cele de proveniență alohtonă în timpul viiturilor. Drept urmare, apar ape interioare stagnante, din care numai o parte pot fi evacuate prin pompări,

restul participînd la ridicarea nivelelor apelor freatice din zona de aerare (0,5—2,0 m adîncime), precum și la umezirea accentuată a solurilor și formarea lăcoviștilor pe suprafețe mari (circa 9% din suprafața agricolă a teritoriului).

La fel ca celelalte elemente ale cadrului natural, învelișul biopedogeografic contribuie la conturarea unității pericarpatiche vestice, printr-o serie de însușiri legate, în primul rînd, de influențele climatice oceanice și submediteraneene ale climatului. Astfel, în funcție de regimul de umiditate (precipitații medii multianuale între 600 și 1 000 mm), procentual, cel mai bine reprezentate sînt mezofitele (50%), urmate în ordine descrescîndă de mezoxerofile, xerofile, hidrofile și indiferente. Prezența destul de ridicată a mezoxerofilelor și xerofilelor reflectă particularitățile topoclimatice de pe versanții înșoriți, unde se realizează un bilanț caloric ridicat. În cîmpia joasă, pe interfluviile plane ale dealurilor piemontane și în luncile acestora, frecvent afectate de exces de apă abundă mezohidrofilele și hidrofilele.

Gradul ridicat de folosință agricolă a teritoriului a determinat restrîngerea vegetației naturale la mici suprafețe, ea menținîndu-se, mai ales în cîmpie, pe terenurile improprie agriculturii, unde acoperă numai circa 1,5% din suprafață. În schimb, în dealurile piemontane, biocenozele naturale ocupă suprafețe compacte mergînd pînă la 18—27%.

Predominarea suprafețelor plane sau ușor înclinate în dealurile piemontane și mai cu seamă prezența argilelor și luturilor ca material parental, cu drenaj slab, precum și apariția temporară a excesului de apă, condiționează largă răspîndire a luvisolurilor albice, pseudogleizate și pseudogleice. Pe versanții mai înclinați ai dealurilor apar soluri eu-mezobazice și soluri brune luvice, mai rar roșcate. Cantitatea mai redusă de precipitații și drenajul bun favorizat de prezența unor materiale loessoide din cîmpiile tabulare conferă solurilor proprietăți molice. La rîndul lor, luncile și cîmpiile joase, cu apă freatică la mică adîncime, se caracterizează prin predominarea solurilor aluviale gleizate, gleice, înmlăștinite, uneori și prin intercalații cu soluri halohidromorfe, în diferite stadii de sărăturare.

Descoperirile arheologice, care au pus în evidență numeroase vestigii de civilizație, la care se adaugă documentele vremii atestă o

vechime mare, continuă și de intensă populație a unității. Aceste aspecte au fost mult favorizate de prezența unor condiții optime oferite de cadrul natural pentru popularea regiunii, închegarea așezărilor și practicarea agriculturii. Printre acestea merită a fi semnalate înscrierea dealurilor piemontane sub forma unei prispe, ce înclină ușor dinspre munți spre cîmpie sau spre axul depresiunilor-golf, alcătuite din culmi netede și domoale, la care se adaugă șesurile întinse ale cîmpiei cu soluri în bună parte fertile, precum și prezența unor condiții climatice favorabile. Trebuie, apoi, subliniat faptul că, în toate cazurile, depresiunile-golf nu se infundă între munți, ci se prelungește fie în lungul unor văi, fie în culoare de înălțime, ceea ce a condiționat legături directe și facile cu Depresiunea Transilvaniei.

La toate acestea trebuie adăugat caracterul văilor alohtone de evidente axe geografice (de convergență, de circulație), care, pe lângă favorizarea legăturilor menționate, prin văile secundare, au facilitat pătrunderea adîncă în interiorul munților, fapt ce a contribuit la atragerea în sfera de influență economică a dealurilor piemontane și a masivelor muntoase învecinate. Totodată, un rol deosebit l-a jucat dezvoltarea puternică a unor așezări vechi — astăzi municipii —, cu funcție de convergență economică — Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara — situate pe marile riuri alohtone și în imediata vecinătate a contactului dintre cîmpie și dealurile piemontane. Lor li s-au adăugat, apoi, alte centre de convergență economică, cum ar fi Baia Mare, Carei, Aleșd, Beiuș, Salonta, Ineu, Sebiș, Lugoj, Oravița ș.a.

În funcție de aceste premise, cărora li se adaugă și cele istorice, sub raport geodemografic, această regiune are un anumit caracter de particularitate față de celelalte unități pericarpice. Dacă populația geto-dacă din compartimentul sudic a intrat la începutul primului mileniu al erei noastre sub stăpînire romană, cea din compartimentele central și nordic a rămas în provinciile libere. Descoperirile arheologice au atestat continuitatea acestora pînă la organizarea voievodatei românești — Glad în Banat, Menumorut în Crișana, Gelu pe Someș —, tot de atunci fiind cunoscută și Țara Zarandului. Ulterior, fondul populației românești a suferit anumite modificări, odată cu venirea ungurilor în Depresiunea Panonică, de unde

încep să pătrundă în părțile centrale și nordice ale unităților pericarpice, unde se fixează mai cu seamă în secolele XVIII — XIX. În schimb, în compartimentul sudic este adusă, populație de origine germană. Chiar în aceste condiții, populația românească a continuat să rămînă majoritară peste tot, iar în dealuri menținîndu-se chiar compactă.

Dezvoltarea vieții economice și sociale a avut loc în conformitate cu modul de desfășurare a evenimentelor istorice și sociale și a prezenței unor resurse de materii prime locale sau în imediata apropiere. Poate fi semnalat faptul că practicarea unor meșteșuguri este cunoscută încă din secolul XII dar care au fost într-un declin evident în secolele XVI — XVII. O nouă dezvoltare a preocupărilor meșteșugărești este specifică secolului XVIII, iar în secolul următor vor constitui nucleele primelor întreprinderi industriale. Primele unități industriale s-au bazat pe produsele obținute din cultivarea teritoriului cu cereale și din creșterea animalelor. În prezent, industria are un caracter complex, fiind dezvoltate aproape toate ramurile industriale.

Urmînd aceeași cale de dezvoltare, agricultura se caracterizează la rîndul său printr-o mare complexitate, ca urmare a varietății orografice, fiind prezente pe spații întinse culturile de cereale, nutreț, cinepă și în, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și soia, legume și pomi fructiferi. Culturile de cereale și plante de nutreț au favorizat dezvoltarea unui sector de creștere a animalelor cu rezultate foarte bune, mai ales în numeroase și bine dotate complexe zootehnice.

Toate aceste aspecte au determinat un grad ridicat de umanizare a teritoriului, încît astăzi, ceea ce conturează imaginea geografică a întregii unități este alternanța suprafețelor cultivate cu cele de pășuni și fînețe, realizate în urma despăduririlor, prezența numeroaselor așezări legate prin căi de comunicații.

Procesul de antropizare se resimte mult mai puternic în cazul cîmpiei, unde, pe lângă cele menționate, s-au efectuat numeroase lucrări hidrotehnice (regularizări de cursuri de apă, desecări, îndiguiuri), astfel că, în situația actuală, numai pe alocuri mai păstrează aspecte naturale. Deși la o primă vedere aceste acțiuni au avut un caracter pozitiv, deoarece s-a căutat și s-a reușit darea în

folosință agricolă a unor suprafețe întinse suse inundațiilor și cu permanent exces de apă, neluarea în seamă a repercusiunilor pe termen mai îndelungat — condiționate, în mod special de despăduriri intense în dealuri, activitatea tectonică disjunctivă ce se manifestă și astăzi prin ridicări, dar mai ales coborâri de compartimente cu 1 până la 2 mm pe an — au determinat apariția unor situații care creează probleme activității agricole (sărăturări, exces de apă, colmatări puternice ale albiilor ș.a.).

Cu toate că în unitatea pericarpatică vestică se individualizează două subunități majore — Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei —, interferențele geografice puternice dintre cele două subunități dovedesc pe de o parte unitatea de ansamblu a fațadei vestice a teritoriului, dar pe de altă parte creează dificultăți în ceea ce privește separarea și trasarea unor limite clare între ele. Dacă în dreptul dealurilor piemontane, o ușoară denivelare față de glacisurile cîmpiei (subliniată și de alte elemente geografice — topoclimat, grad de împădurire, tipuri diferite de așezări, moduri deosebite de folosință agricolă a teritoriilor) ușurează stabilirea unei limite, dificultățile sînt foarte mari la contactul depresiunilor golf cu cîmpia, unde aceasta se confundă cu luncile din dealuri. Un singur criteriu se poate aplica în acest caz, ca limita să se traseze pe acolo unde apare necesitatea îndiguirii cursurilor de apă alohtone, deoarece avale se desfășoară procese de divagare specifice cîmpiei, iar amunte, lunca manifestă vădite tendințe de conturare ca terasă.

2.2. Dealurile Banatului și Crișanei

2.2.1. Caracterele generale

Dealurile Banatului și Crișanei formează o treaptă de relief intermediară, dar nu continuă, între munții de la est și cîmpie. Cunoscute în literatura geografică și sub numele de Dealurile Vestice, reprezintă în ansamblu o regiune de dealuri piemontane joase, un peisaj colinar dominant agricol supus influențelor climatului oceanic și parțial ale celui submediteranean, cu petice de păduri de evercinee, cu luvisoluri albece, pseudogleizate, eu-mezobazice și brune luvice și un grad ridicat de populare.

În desfășurarea unității cu acele pătrunderi adînci în interiorul munților, un rol însemnat l-au jucat procesele tectonice, în mod deosebit cele disjunctive de direcție carpatică (NV — SE), răspunzătoare de formarea unor grabene umplute mai ales cu molasa argilino-sipoasă pliocenă, care pe alocuri cuprind și insule de depozite mai vechi permo-mezozoice și miocene. Această situație ce a dus la o anumită interferență munte—cîmpie a condițiilor geografice determină anumite dificultăți în stabilirea limitelor, în mod deosebit a celei dinspre cîmpie. Astfel, contactul cu munții și „Jugul intercarpatic Someșan” oscilează între altitudinile de 400 și 600 m, fiind pus în evidență de o denivelare care corespunde unui contact litologic dintre umplutura grabenelor și formațiunile dominant preterțiare ale munților. La acest contact temperaturile medii înregistrează scăderi cu 1 — 2° C, media precipitațiilor crește cu 150 — 200 mm, fagul devine elementul dominant al pădurilor care ocupă suprafețe mai mari, iar folosința teritoriului devine mai ales pastorală și silvică. Precizarea limitei spre cîmpie este mai dificil de stabilit, mai ales în cazul depresiunilor, unde ea se confundă cu luncile întinse ale riurilor alohtone. Astfel, ea se materializează printr-o denivelare între dealuri și glacisurile cîmpiei și prin contactul dintre formațiunile pliocene și cele pleistocene proprii cîmpiei. În dreptul depresiunilor limita poate fi fixată, cu aproximație, acolo unde apare necesitatea îndiguirii cursurilor de apă, adică acolo unde acestea capătă un caracter divagant, deoarece amunte, prin adîncire, determină transformarea luncilor în terase, forme de relief proprii dealurilor. Contactul morfologic dintre dealuri și cîmpie este subliniat și de creșterea precipitațiilor în dealuri cu aproximativ 150 mm, de scăderea temperaturilor medii anuale cu cel puțin 1° C și de întinderea pădurilor de evercinee. Acest contact se realizează cu aproximație pe alinamentul localităților Seini, Ardud, Tășnad, Oradea, Tinca, Beliu, Pincota, Ghioroc, Seceani, Tipari, Lugoj, Buzias, Lățunaș.

Fișa de dealuri are o lățime ce variază între 5 și 30 km și prezintă întreruperi în dreptul Munților Zarandului și Munților Locvei. Altitudinea lor medie este de 400 m, oscilînd între 600 și 500 m la contactul cu muntele și între 250 și 150 m la trecerea spre cîmpie. Relieful, colinar este rezultatul unui proces de eroziune desfășurat asupra unui piemont de acumulare construit în pliocenul superior,

la poalele munților, proces manifestat sub influența mișcărilor de ridicare din munți și de scufundare din ariile de subsidență ale Depresiunii Panonice. Mișcările rhodanice dintre dacian și romanian au încheiat umplerea grabenelor și au impulsionat formarea unei cîmpii litoral-piemontane și ulterior, în romanian, suprapunerea unor piemonturi de acumulare (I. Berindei, 1977). Ridicările valahice (sfîrșitul romanianului — începutul cuaternarului) au stimulat acțiunea rețelei hidrografice cu caracter piemontan, în condiții de climat mediteranean, astfel că suprafața inițială a piemontului, supusă eroziunii laterale și retragerii versanților, a fost distrusă și a ajuns în stadiul de suprafață nivelată dar, păstrînd, în general, tiparele vechi și petice din cuvertura piemontană. Ulterior, în timpul formării teraselor, regiunea a fost puternic fragmentată prin văi largi și redusă la o succesiune de dealuri, larg bombate sau sub forma unor poduri, cu sau fără resturi ale depozitului piemontan. La rîndul lor, văile sînt largi și cuprind de obicei 6 nivele de terase, a căror altitudine relativă variază în următoarele limite: $t_1 = 6 - 10$ m; $t_2 = 15 - 20$ m; $t_3 = 30 - 40$ m; $t_4 = 55 - 60$ m; $t_5 = 70 - 80$ m; $t_6 = 90 - 110$ m. Este de remarcat că terasele t_1 și t_2 la contactul cu cîmpia se pierd pe nesimțite în suprafața acesteia. Atît orientarea interfluviilor cît și a văilor păstrează tiparele vechi piemontane, respectiv situațiile alternante de convergență și divergență și apare aproape ca o regulă generală dezvoltarea asimetrică față de colectorul principal din depresiuni. În procesul de modelare au fost scoase în evidență, pe alocuri, formațiuni mai rezistente miocene și permo-mezozoice (calcare, gresii, roci cristalofiliene și vulcanice), care se înscriu în relief ca martori de eroziune (cum este cazul martorilor eruptivi din Depresiunea Oașului, măgurilor cristaline Șimleu, Chilioara și Culmea Codrului din Dealurile Silvano-Someșene, măguriilor Forău din calcare mezozoice în Depresiunea Beiușului, culmii eruptive Pleșa din Depresiunea Zarandului). Poziția dealurilor în fața advecției maselor de aer oceanice impune unele diferențieri climatice între dealurile situate la extremitatea vestică a spațiului montan și cele dintre masivele muntoase din așa-numitele depresiuni-golf. De aici, obligația de a separa dealuri externe și dealuri interne.

Gradul accentuat de umanizare (despădurire intensă și extindere mai ales a pășunilor) și prezența unui substrat litologic friabil, au

favorizat declanșarea proceselor de versant (deplasări în masă, eroziune în suprafață și torențială), dar mult mai puțin intense decît în celelalte regiuni deluroase.

Aflată sub influența dominantă a maselor de aer de origine oceanică, regiunea are un climat continental moderat, cu ierni relativ moderate, veri mai răcoroase și precipitații mai abundente decît în regiunile deluroase de pe laturile de sud și est ale Carpaților.

Umezeala și instabilitatea ridicată a aerului advectionat duc la creșterea nebulozității și a proceselor hidrometeorologice, fenomenele fiind amplificate și de ascensiunea forțată a maselor de aer la contactul cu spațiul carpatic. Poziția între munte și cîmpie, extinderea relativ redusă și caracterul domol și prelung al culmilor dau climatului o notă de tranziție. Altitudinea relativ redusă a dealurilor și mai ales faptul că sînt supuse aceluiași procese de ordin dinamic fac ca diferențele climatice față de cîmpie să fie relativ mici, dar suficiente pentru a le da o notă proprie. Regimul temperaturii aerului se caracterizează prin valori medii anuale cuprinse între 8 și 9°C în sectorul Silvaniei, 9–10°C în sectorul Crișurilor și 10–11°C în sectorul bănățean. Scăderea temperaturii pe verticală se face după un gradient termic de 0,3–0,4°, sau chiar după un gradient de sens negativ, cum este cazul mai ales în Dealurile Banatului, consecință directă a fenomenului de inversiune termică, mai frecvent și mai intens în sezonul rece al anului. În acest fel, dealurile se situează în așa-zisa zonă caldă a fațadei vestice cu un potențial termic și caloric ridicat. Diferențele de temperatură de la vară la iarnă sînt mici, cu amplitudini termice medii anuale de 20–21°C, luna ianuarie are o medie ce variază între –3 și –25°C în sectorul nordic, –2...–1,5° în sectorul central și –0,5...–0,3°C în cel sudic. Datele scot în evidență, pe de o parte nota generală a regiunii de scădere a temperaturii de la sud la nord, iar pe de altă parte nota particulară de creștere a temperaturii în altitudine pînă la un nivel mediu în jur de 300–400 m (fig. 3). În culoarele depresionare temperaturile se mențin la valori relativ scăzute, datorită acumulării aerului rece mai ales în regim baric preponderent anticiclonal (Baia Mare – 2,4°C, Zalău – 2,1°C, Beiuș – 1,1°C, Lugoj – 1,0°C).

Luna iulie are medii în jur de 19–20°C. Sînt cazuri în care sub influența aerului cald din sud, antrenat în circulația ciclonică,




Fig. 3. Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei. Temperatura aerului.

iarna temperaturile maxime să crească pînă la 19°C, iar vara, sub influența aerului rece de origine polară sau arctic-maritim, să scadă pînă la 5°C.

Umezeala relativă este cuprinsă între 70 și 80 %, cu valoarea cea mai ridicată în luna decembrie de 88 %, iar nebulozitatea între 5,5 și 6 zecimi. Și în cazul distribuirii precipitațiilor anuale se conturează trei sectoare distincte: sectorul Depresiunii Baja Mare — Dealurile Chioarului cu cantități cuprinse între 950 și 1 100 mm, sectorul Crișurilor cu 650 — 850 mm și sectorul bănățean cu 700 — 900 mm (fig. 4). În toate cazurile, cantitatea maximă se înregistrează în semestrul cald al anului, cu media lunară cea mai ridicată în iunie (Baja Mare 111 mm, Șimleu Silvaniei 81 mm, Tășad 113 mm, Aleșd 97 mm, Caransebeș 92 mm). În întreaga regiune apare un maxim secundar în octombrie. Cantitatea cea mai mică se înregistrează în luna februarie, cu valori în jur de 60 mm în sectorul nordic, cu 35 — 45 mm în sectorul central și cu 45 — 50 mm în cel sudic. Numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 25 — 30 zile/an, zăpada menținindu-se la sol între 60 — 80 zile

în nord și 40 — 60 zile în sud. În apropierea solului vînturile dominante sînt din direcțiile sud-vestice și sud-estice, dar pe măsură ce altitudinea crește predomină direcția vestică.

Apele de suprafață sînt reprezentate printr-o rețea bogată de riuri autohtone (Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș, Pogăniș, Caraș etc.), cu obirșia în munți și care au caracteristicile hidrologice stabilite în regiunea de alimentare. Regimul de alimentare a rîurilor autohtone este pluvionival, cu scurgere și debite maxime primăvara și la începutul verii, datorită topirii zăpezilor și ploilor de durată. Se observă o creștere a scurgerii din timpul iernii și începutul primăverii, de la nord spre sud, datorită accentuării influențelor submediteraneene.

Dealurile Banatului și Crișanei au cunoscut din timpuri vechi un intens proces de populare, care a determinat îndepărtarea vegetației naturale pentru folosirea terenurilor în scop agricol. Drept urmare, dealurile care se încadrează zonei forestiere, subzonei stejarului, au astăzi numai resturi de păduri de gorun, păduri de stejar pedunculat și de cer și gîrniță.




Fig. 4. Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei. Precipitațiile atmosferice.

Există multe mărturii despre popularea dealurilor încă din secolele II — III atît prin descoperirile de tezaurе și monede (Homorodu de Sus, Giriș, Uileacu de Munte, Gurani, Chișindia), cît și prin vestigii ale dacilor liberi (Ripa, Cociuba Mare, Taut, Covășinț, Cuvin, Șiria etc.). De asemenea, în dealurile de la sud de Mureș, care au făcut parte din Dacia Superior, s-au descoperit urme ale unor așezări daco-romane (Recaș, Crișiova) sau de castre. În perioada următoare, populația a continuat să viețuiască cu deosebire concentrată în adevărate vetre de populație românească: Țara Zarandului, Țara Beiușului, Țara Codrului etc.

În prezent, populația prezintă aproximativ aceleași caracteristici ca și ale altor regiuni de dealuri. Densitățile sînt în deplină concordanță cu caracterul activităților desfășurate, mai mari, în general 100 loc./km² sau mai mult, în cazul localităților cu populație ocupată în industrie, scăzînd chiar pînă la valori de 25 — 50 loc./km², mai ales în Dealurile Banatului.

Această unitate dispune de unele resurse ale subsolului, ca lignitul, exploatat sau cu perspective de a fi valorificat în bazinele Crasnei (Sărmășag și Chieșd), Barcăului (Ip, Vărzari, Voivozi, Cuzap etc.), Crișului Repede (Borozel, Hidișel), petrol în regiunea Suplacu de Barcău, bentonită la Valea Chioarului, calcare la Buciumi (județul Maramureș) și Lalașinț (județul Arad), nisip cuarțos la Curtuiuş Mare, bazalt la Lucareț și Somoșița (Podișul Lipovei), nisipuri bituminose la Derna și Tătăruși (județul Bihor) etc.

Activitățile economice s-au dezvoltat într-o anumită măsură pe seama materiilor prime proprii, dar o contribuție esențială au avut-o cele provenite din imediata apropiere, respectiv din regiunea montană. Acestei situații îi corespunde, de exemplu, industria orașului Baia Mare, care prelucurează minereurile de metale neferoase exploatate în regiunea apropiată sau industria Depresiunii Oradea — Borod, unde s-au dezvoltat, pe seama calcarilor din Munții Pădurea Craiului, unul dintre cele mai mari combinate de materiale de construcții (de la Chistag) și unitatea de cărămizi refractare de la Aștileu, care prelucurează argila refractară din sectorul Șuncuiș — Brateca. Alături de unitățile de la Baia Mare (utilaj minier, mașini unelte, materiale de construcții, prelucrarea laptelui fructelor și legumelor, textile etc.) industria mai are o seamă de unități prezente în Dea-

lurile Sălăjene (siderurgie, construcții de mașini, prelucrarea cauciucului și industria materialelor de construcții, prelucrarea lemnului și industria textilă la Zalău, industria lemnului, materialelor de construcții și alimentară la Șimleu Silvaniei, industria sticlei la Poiana Codrului, prelucrarea lemnului și a maselor plastice la Cehu Silvaniei, rafinarea petrolului la Suplacu de Barcău, construcțiile de mașini, prelucrarea lemnului și industria alimentară la Tășnad etc.), în Dealurile Crișanei (prelucrarea lemnului la Tileagd, Ioaniș, Beiuș, Ștei, Bocsig, Ineu, construcții de mașini la Beiuș, Ștei, Ineu etc.) și în Dealurile Banatului (prelucrarea lemnului la Mănăștiur, distilarea lemnului la Margina, construcțiile de mașini la Oravița etc.).

Agricultura dispune de o bază corespunzătoare de dezvoltare. Terenurile arabile prezintă suprafețe întinse, în multe cazuri înscrind-se cu 60 — 70% sau chiar mai mult din totalul suprafețelor agricole. Cea mai mare parte este destinată cerealelor (grîului și porumbului), la care se adăugă, pe suprafețe mai restrînse, orz, secară și ovăz.

Alături de cereale, apar culturi de sfeclă de zahăr, de in pentru fuior și de unele plante furajere, îndeosebi trifoiul, care dă rezultate dintre cele mai bune atît în ceea ce privește realizarea unor cantități apreciabile de nutreț, cît și în pregătirea terenurilor pentru practicarea altor culturi.

Pomicultura și viticultura prezintă o anumită situație de specificitate, care constă în faptul că în dealurile din imediata apropiere a cîmpiei există condiții dintre cele mai favorabile pentru practicarea culturii viței de vie și a pomilor fructiferi cu cerințe mai mari de căldură, cum sînt piersicul, caisul, vișinul, cireșul etc., iar pe măsură ce ne apropiem de munte se face prezent mărul, părul etc. Dovada evidentă o reprezintă podgoriile Giarmata — Recaș și Buziaș, din județul Timiș, podgoria Aradului, podgoria Oradea — Valea lui Mihai etc., precum și viile din regiunile Șimleu Silvaniei, Ardud, Viile Satu Mare etc. Pomicultura reprezintă o ocupație de seamă a populației. Sînt situații în care livezile ocupă între 5 și 10% și chiar peste 10% din suprafața agricolă, așa cum este cazul în unele porțiuni din Dealurile Silagiului și ale Lipovei, din depresiunile Zarandului, Beiușului, Oradea — Borod, Șimleului, Băii Mari. În gospodăriile populației s-a păstrat vechea structură a pomiculturii cu predominarea prunului,

dar în unitățile agricole de stat și cooperative au fost create livezi întinse de măr și păr (Baia Mare, Aleșd, Lipova etc.), de piersic (Germata, Oradea, Diosig), de cais, (Oradea, Șimleu Silvaniei), de vișin și cireș etc.

Pe baza pășunilor și a finetelor naturale, destul de extinse în suprafață, la care se adaugă culturile de plante furajere, s-a dezvoltat sectorul creșterii animalelor. Se cresc mai ales bovine, porcine și ovine, a căror densitate la unitatea de suprafață este, în general, redusă, însă și destul de variată de la un loc la altul. La bovine, de exemplu, se înregistrează o densitate mai mică decât media pe țară (42 capete/100 ha teren agricol în anul 1987), în multe locuri valorile coborând chiar sub 30 capete/100 ha teren agricol). Aproximativ aceeași situație apare și în cazul creșterii porcinelor, dar la ovine sînt multe comune cu densitatea mai mare decât media pe țară (176 capete/100 ha teren agricol, în anul 1987).

Bogăția relativ mare de plante melifere atît în finetele și pășunile naturale, cît și în păduri, la care se adaugă unele plante cultivate, a contribuit la creșterea unui număr însemnat de familii de albine. Din acest punct de vedere se remarcă multe localități din Dealurile Lipovei, din depresiunile Zarandului și Oradea—Borod, din Dealurile Silvaniei, unde se practică o apicultură dintre cele mai moderne.

Sub raportul căilor de comunicație și legăturilor economice, Dealurile Banatului și Crișanei se înscriu în ansamblul oferit de cele două unități vecine — Cîmpia Banatului și Crișanei și munții de la est — astfel că întreaga rețea de căi rutiere și feroviare are caracter transversal. Trebuie remarcat, în primul rînd, că cele mai multe dintre căile de legătură traversează în întregime dealurile, inclusiv munții de la est, făcînd legătura dintre Cîmpia Banatului și Crișanei cu Depresiunea Transilvaniei (așa cum este cazul rețelei rutiere și feroviare de pe Someș, Crișul Repede, Mureș), sau cu partea sud-vestică a țării (prin Culoarul Timiș — Cerna) etc. Pe de altă parte, o seamă de șosele și căi ferate traversează dealurile din cîmpie pînă în spațiul muntos, toate acestea servind în bune condiții necesitățile de dezvoltare economico-socială a regiunii.

Turismul s-a dezvoltat pe baza importanțelor resurse de apă termală și minerală care au condiționat, în primul caz, apariția stațiunilor balneoclimaterice de la Felix și

1 Mai (din apropierea orașului Oradea), Boghiș (Depresiunea Șimleului), Tășnad și Marghita, iar în al doilea caz, cele de la Zăuan-Băi, Tinea, Lipova, Buziaș etc. În același timp, Dealurile Banatului și Crișanei oferă locuri de atracție pentru turismul de sfîrșit de săptămînă, pentru locuitorii din marile centre urbane apropiate.

2.2.2. Dealurile Silvano—Someșene

2.2.2.1. Caracterelor generale

Privite pe toată întinderea lor, Dealurile Banatului și Crișanei se înfățișează ca o adevărată prispă ce urmărește îndeaproape marginea de vest, foarte festonată, a Munților Banatului și Munților Apuseni. Partea lor dintre Munții Plopișului și latura sudică a Munților Ignișului și Gutliului nu se înscrie în acest caracter general pentru că Munții Meșesului și măgurile cristaline pe care parțial se sprijină latura estică a acestor dealuri (Prisaca 659 m; Preluca 794 m) nu constituie o margine de munte spre a închide dinspre est acest întins ținut de dealuri cuprinse sub numele de Dealurile Silvano—Someșene. Ocupînd o suprafață de 5 050 km² (aproape două treimi din Dealurile Banatului și Crișanei), nu mai reprezintă, astfel, o fișie îngustă la marginea munților ci o regiune de legătură între Podișul Someșan și Cîmpia Someșului și mai puțin între Munții Apuseni și Munții Maramureșului, cu toate că măgurile cristaline suportînd, pe alocuri, roci eocene (calcaroase, conglomerate, gresii) sînt considerate puncte de legătură între Munții Apuseni și Munții Rodnei, formînd un adevărat „jug intracarpatic” (V. Mihăilescu, 1936).

Dealurile Silvano—Someșene reprezintă nu numai subunitatea cea mai întinsă din unitatea deluroasă de pe latura vestică a Carpaților, ci și cea mai complexă, văzută în egală măsură sub raport structural, ca geneză și evoluție, ca înfățișare și funcții actuale. Numai în mică măsură au făcut obiectul unor cercetări de detaliu și probabil tocmai de aceea asupra lor au fost exprimate opinii diferite, chiar controversate, privind definirea și delimitarea ca individualitate cu particularități geografice distincte față de unitățile din jur, mai ales față de Podișul Someșan (cu care deseori au fost asociate).

Poziția și raporturile cu unitățile alăturate, ca și prezența resturilor din vechea catenă muntoasă sfărâmată, au determinant judecarea și caracterizarea lor fie ca sector de legătură între Munții Apuseni și Carpații Orientali, fie ca latură externă și mai tinără a Podișului Someșan (cu aspectul de prelungire și coborire a acestuia spre Cimpia Someșului), fie ca diviziune bine individualizată a dealurilor de la periferia vestică a Munților Banatului și Munților Apuseni.

Aspectul structural-genetic (bazat pe prezența insulelor cristaline — horst, cele din marginea de est, ca și cele vestice — Măgura Șimleului, Măgura Chilioarei, Culmea Codrului și de depresiunile Șimleului, Zalăului, Sălajului și Băii Mari) a fost hotărîtor pentru considerarea celei mai mari părți a acestor dealuri ca subunitate montană, legată de Munții Apuseni (P. Cotet, C. Martiniuc, 1960). V. Mihăilescu (1966), deși admite „jugul intracarpatic” ca o realitate geografică, privește, totuși, cu rezervă rolul său de „barieră” naturală între regiunile de la est și cele de la vest, precum și funcția de subunitate montană.

Prin porțile joase ale Moigradului și Chioarului, larg deschise (peste 30 km) între Meseș și Preluca dinspre Podișul Someșan spre Dealurile Sălajului, se continuă aceleași elemente structurale și morfologice, exprimate fără diferențieri în trăsăturile peisajului, în modul de utilizare. Pornind de la aceste aspecte s-a extins așa-numita „Platformă Someșană” (ca o singură unitate geografică) de la Culoarul Someșului Mic și Someșului Mare pînă în Cimpia Someșană, deși în alcătuirea acestei mari regiuni geografice intră unități de relief diferite genetic (V. Mihăilescu, 1966) și care, în egală măsură, ca reflectare a condițiilor de geneză și alcătuire diferită, se deosebesc ca înfățișare și ca posibilități de utilizare.

Structural, prin cele două alinamente de măguri (horsturi) cristaline, împreună cu depresiunea intercalată lor, Dealurile Silvano-Someșene ar aparține la Munții Apuseni; Podișul Someșan din estul „jugului intracarpatic” pare să se continue mai ales în partea de nord-est către Depresiunea Băii Mari, Țara Lăpușului și Țara Chioarului, iar Dealurile Sălajului, din afara horsturilor insulare, par a se integra piemonturilor pericarpate din latura vestică a Carpaților. Dar toate aceste aspecte se îmbină în așa

fel încît întregul spațiu dintre Munții Plopișului la sud, Culmea îngustă Meseș — Prisnel — Preluca — Șatra la est, munții vulcanici la nord constituie, sub toate aspectele, o regiune geografică bine individualizată.

Ea este grefată pe un fundament cristalin, puternic tectonizat și scufundat în trepte către vest. Această vastă depresiune tectonică, cu reflexe neuniforme în relief, a fost puternic sedimentată în mio-pliocen. Părțile mai sălitate ale fundamentului se răsfrîng în relief ca bombări locale (Ardud, Zalnoc, Almașu Mare), ies în evidență ca măguri și formează bordura sudică și cea estică.

Sectoarelor coborîte li se suprapun depresiuni joase (ale Șimleului, Zalăului, Sălajului, Băii Mari) și văi largi, strînse în mănunchiuri pe locul subsidențelor locale (Nușfalău pe Barcău, Sărmășag pe Crasna, Sălsig, Ardușat pe Someș) sau dimpotrivă, cu aspect de chei epigenetice (Marca, Șimleu Silvaniei, Bocșa etc.).

De prezența formațiunilor terțiare se leagă zăcămintele de cărbuni (bazinul Barcăului, bazinul Sărmășag), cele de petrol și gaze (Suplacu de Brăcu, Marghita etc.) și varietatea materialelor de construcții (calcare, nisipuri, marne, argile, tufuri vulcanice), toate contribuind la dezvoltarea industrială a regiunii.

Relieful de coline domoale, cu aplecare ușoară spre vest (de la 400 la 150 m), cu energia redusă (60 — 100 m), se prelungește din vecinătatea „jugului intracarpatic”, prin porțile largi (15 — 20 km) dintre horsturile cristaline, pînă la marginea cîmpiei, deasupra căreia se termină printr-o denivelare abia schițată.

Interfluviile largi mai păstrează local păduri, locul lor fiind luat de pomi și viță de vie, culturi cerealiere și plante tehnice, iar văile largi, unele cu exces de umiditate din cauza drenajului slab, sînt folosite ca finețe și pentru cultura legumelor.

La contactul dintre dealuri și culmile muntoase marginale șesurile piemontane vechi, aparținînd suprafeței inițiale tardidaciene și glacisurile tinere atenuează contrastele morfologice, iar prin alcătuirea din pietrișuri și nisipuri, funcționează ca adevărate rezervoare naturale de apă, necesară industriei în plină dezvoltare (Baia Mare, Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou etc.).

Pe suprafețele răsfrînte ale interfluviilor piemontane se întind livezi de pomi, în

special mărul (bazinele Șimleului, Băii Mari, Șomețului fac parte din a treia zonă pomicolă a țării), iar pe alocuri castanul dulce (Baia Mare). Viile ocupă areale cu topoclimat însoțit (Șimleu Silvaniei, Borla, Șamșud) sau fișia piemontană externă, unde temperaturile sînt mult mai ridicate, iar precipitațiile mai scăzute (Marghita, Ardud).

Înlocuirea treptată a pădurilor din vechea „Silvanie” cu terenuri arabile (cultivate cu grâu, porumb, secară, în și cîneapă, sfeclă de zahăr etc.), cu livezi de pomi și viță de vie, cu pajiști stepizate, s-a bazat și pe o premisă de ordin climatic. Influențele puternice dinspre vest și relativa adăpostire favorizează clima mai blîndă a acestor locuri. Temperatura medie anuală ridicată (9°C), verile călduroase, iernile calme, precipitațiile destul de bogate (600 — 700 mm/an) ilustrează afinitatea geografică cu toate dealurile din latura vestică a țării. Asemănările cu acestea izvorăsc totodată din existența și funcția acelor golfuri depresionare (de pe Barcău, Crasna, Zalău și mai cu seamă a celui de la Baia Mare), din drenajul total vestic (Barcău, Someș), din dominarea aceluiași soluri de pădure puternic podzolite și din predominarea așezărilor, rurale, cu sate mici și răsfirate la poala munților, dar cu tendință de creștere și adunare către interiorul regiunii.

Valea largă a Someșului a reprezentat de veacuri nu numai o axă de drenaj pentru un spațiu vast, dar și una de atracție economică, socială și de habitat. După cucerirea Daciei de către romani, pe teritoriul de la extremitatea estică a ținutului Sălajului și a Țării Chioarului trecea granița dintre Dacia romană și regiunea dacilor liberi de dincolo de Someș.

În timp ce „jugul” compus din resturile catenei hercinice au îndeplinit din vremuri geologice funcția de punte între Carpații Apuseni și Carpații Orientali (Bihor — Rodna), Porțile Sălăjene și ale Chioarului au înlesnit, nu numai pătrunderea căilor de comunicație spre aceste ținuturi din vestul țării, dar și un schimb larg de valori materiale și spirituale între locuitorii Transilvaniei, Maramureșului și Crișanei, contribuind la păstrarea ființei lor naționale.

Complexitatea Dealurilor Silvano—Someșene este pusă în evidență chiar numai de modul de divizare a acestora în subunități, mult diferențiate unele de altele ca geneză, evoluție, înfățișare, funcții și grad de uma-

nizare a peisajului. În partea de est, între culoarul Someșului și munții vulcanici sînt foarte clar individualizate Dealurile Chioarului și Depresiunea Baia Mare, iar la vest-sud-vest de acestea, pînă în Munții Meseșului și Munții Plopișului se desfășoară Dealurile Silvaniei, în cuprinsul cărora apar cîteva lărgiri locale, pe alocuri greu de delimitat de dealurile joase din jur, dar care joacă un rol de foarte mare importanță geoeconomică.

2.2.2.2. Dealurile Chioarului și Depresiunea Baia Mare

Dealurile Chioarului. Sub numele de Dealurile Chioarului sînt cuprinse înălțimile deluroase care închid spre sud și sud-est Depresiunea Baia Mare, desfășurate din marginea sud-vestică a Munților Gutiiului și Munților Lăpușului pînă în Defileul Someșului din dreptul Măgurii Prisaca (sau Măgurii Țicăului). Spre sud, printr-o denivelare relativ bine marcată în relief, intră în contact cu Podișul Boiului, parte a Podișului Someșan. Ca urmare a constituției geologice foarte variate și a evoluției reliefului cu diferențieri locale accentuate, în Dealurile Chioarului se disting două părți: în vest, o parte deluroasă mai înaltă cuprinzînd masivele Preluca și Prisaca, între care se află dealurile mai joase ale Birsăului, iar în est, făcînd pe de o parte, legătura cu munții de la est, iar pe de altă parte, trecerea dintre Depresiunea Baia Mare și Depresiunea Lăpușului, dealurile joase ale Copalnicului, considerate (în raport cu Masivul Preluca și cu munții de la est) ca reprezentînd o arie depresionară cu aspect deluros. Este, în adevăr, o unitate foarte bine populată care funcționează ca arie depresionară și ca atare a fost consemnată și cunoscută sub numele de Depresiunea Copalnicului (fig. 5).

Masivul Preluca. Din șirul de înălțimi deluroase care închid spre sud Depresiunea Baia Mare se detașează masivul cristalin cu aspect insular Preluca, asimetric, veritabil horst, cu altitudini ce variază între 600 și 800 m (Virful Florii, 810 m altitudine absolută maximă). Este extins între defileul Lăpușului în sud și falia Copalnic — Cufoaia în nord, care corespunde cu abruptul prin care domină cu 200 — 400 m Depresiunea Copalnicului. Relieful reprezintă un rest dintr-o veche suprafață de eroziune fragmentată de numeroase văi înguste și adînci orientate către riul

Lăpuș. În masa cristalină există însemnate resurse de minereuri feroase, substanțe nemetalifere și roci utile: minereuri feromanganose — rodocrozit, siderit, piroxmangit etc. — în sisturile mezometamorfice de la vest de Răzoare, pegmatite cu mică la Aspra și Cufoaia, calcare dolomitice pe flancul nordic, la Măgureni, roci caolinoase la Groape și

parte pentru creșterea animalelor, activitate tradițională care definește funcția actuală economică a celor șapte așezări (Preluca Veche și Preluca Nouă, Întreniuri, Codru Butesii, Aspra, Dealu Corbului și Groape). Caracterul pregnant silvo-pastoral al Masivului Preluca este reflectat și de structura modului de folosință a terenului: peste 85% (din




Fig. 5. Dealurile Chioarului. 1, Limita regiunii; 2, limita subunităților; 3, subunitățile (I, Masivul Preluca; II, Dealurile Bîrsăului; III, Masivul Prisaca; IV, Depresiunea Copalnicului); 4, defileu; 5, teren arabil; 6, livezi; 7, pășuni și fînețe naturale; 8, păduri; 9, așezări; 10, așezări pomicol-zootehnice; 11, zootehnic-pomicole; 12, zootehnice; 13, pomicol-zootehnice cu activități industriale; 14, zootehnic-pomicole cu activități miniere; 15, calcar; 16, calcar cristalin; 17, marmură; 18, bentonită; 19, izvoare minerale; 20, centru industrial; 21, ruine de cetăți feudale; 22, monument istoric; 23, muzeu; 24, drumuri; 25, cale ferată.

Răzoare și bentonită, exploatată sistematic cu o producție anuală de peste 30 000 tone.

Datorită intervenției antropice cu scopul extinderii domeniului agricol, haina vegetală a suferit modificări puternice. Platoul înalt, exceptînd extremitățile de sud-est (Poiana Mare — Cufoaia) și nord-est, este astăzi practic despădurit și utilizat în cea mai mare

suprafață totală care este de 107 km². Însușește pădurile (făgete și evercinee), pășunile și fînețele naturale, favorizate de climatul umed și răcoros ca și solurile brune acide luvice. Condițiile climatice limitează culturile agricole reduse la câteva plante mai rezistente — ovăz, porumb, cartofi și trifoi —, a căror cultură se practică cu precădere pe podurile

nalte, mai puțin fragmentat și însoțite în mici loturi intercalate cu finețele naturale și în vatra așezărilor.

Masivul Preluca se deosebește net de regiunile din jur prin caracterul dominant al satului risipit extins pe podurile culmilor prelungi, cu gospodăriile fie pe o singură linie (Preluca Veche, Aspra), fie dispuse neregulat (Groape, Preluca Nouă). Regiunea fiind lipsită de drumuri corespunzătoare și întrucâtva izolată, populația marchează o sensibilă scădere (între ultimele două recensăminte, din 1966 și 1977, cu peste 9%, de la 2 078 de locuitori la 1 897 de locuitori).

Punerea în valoare a resurselor naturale miniere și dezvoltarea creșterii animalelor (rasa Brună de Maramureș) poate contribui la reducerea atît a fenomenului de depopulare, cît și a deplasărilor sezoniere care se mențin într-o proporție ridicată (peste 20% din populația activă). Cursul Lăpușului în impresionantul defileu săpat în șisturi cristaline, lung de circa 30 km (între Răzoare și Remetea Chioarului) și cu o cădere de peste 100 m, are un apreciabil potențial hidroenergetic. Amenajările ar spori și gradul de atractivitate turistică a defileului cu un pitoresc aparte, dominat odinioară de puternica cetate medievală a Chioarului (secolul XIV).

Dealurile Birsăului. La vest de Masivul Preluca și de valea Lăpușului se desfășoară ținutul deluros al Birsăului, terminat în măgura cristalină Prisaca, în care Someșul, avale de Benesat, și-a adîncit albia epigenetic, formînd un defileu îngust. Dealurile Birsăului (numite și ale Chioarului după străvechiul ținut istoric al Cetății Chioarului) se suprapun în cea mai mare parte cu bazinul superior și mijlociu al Birsăului, principalul colector al rețelei hidrografice de-a lungul căreia s-au dezvoltat numeroase așezări omenești.

Dealurile Birsăului sînt alcătuite dintr-o succesiune de coline domolite treptat către nord și nord-vest, dezvoltate pe formațiuni eocene calcaroase, în sud și tortonian-sarmatiene, în nord, pe care se înscriu alinamente de cueste. Este un relief puternic fragmentat de văi înguste, dominate de măguri de peste 500 m (Cornu Pleșii, 557 m; Chicera Mare, 569 m; Virful Măgurii, 558 m). La contactul dintre cristalinul din Măgura Prisaca din vest și calcarele eocene s-au format mici largiri locale — Fericea, Stejera, străvechi vetre de locuire.

Resursele principale ale subsolului sînt reprezentate de calcarele de la Buciumi, mar-

mura de la Buteasa (punctul de extracție Valea Ursului) și bentonita de la Valea Chioarului, ultima fiind una dintre cele mai bine echipate exploatări (în subteran) de acest gen. Regiunea dispune de rezerve apreciable de calcare (Mesteacăn), de roci calcaroase (Stejera) și de nisipuri silicioase (Valca Chioarului, Buciumi, Curtuișu Mare etc.).

Baza economică a regiunii o formează, însă, fondul funciar în suprafața de circa 175 km² cu o structură predominant silvopastorală, pădurile, pășunile și finețele naturale deținînd 2/3 din suprafața totală. Pădurile au fost supuse unor defrișări puternice (în secolele XVIII și XIX) cu consecințe evidente în accentuarea proceselor de eroziune și alunecare (Curtuișu Mare, Fericea, Hovrila), iar în prezent au un regim restrictiv de exploatare. Pășunile și finețele (inclusiv culturile furajere) formează suportul ramurii de bază a economiei regiunii — creșterea animalelor. Capacitatea sporită de furajare a pașistilor (prin lucrări de întreținere pe mai mult de 7 500 ha, de regenerare pe 600 ha și fertilizare pe circa 1 400 ha în 1988), precum și extinderea plantelor de nutreț (trifoliene, rădăcinoase), dau posibilitatea sporirii șeptelului actual (8 200 bovine, peste 13 000 ovine) și producției de lapte, carne și lînă. La Remetea Chioarului, ființează o fermă de stat pentru creșterea oilor merinos.

Pomicultura, cea de-a doua ramură agricolă, favorizată de condițiile optime de climă și sol (dovadă prezența castanului comestibil), s-a impus tot mai mult în structura economiei regiunii prin creșterea și extinderea plantațiilor în masiv și cu caracter intensiv (aproape 1 300 ha) în arii cu tradiție: Somecuta Mare, Remetea Chioarului, Buciumi și Valea Chioarului. Prin producția și calitatea soiurilor (Jonathan) bazinul Somecuta Mare — Berchez se înscrie printre cele mai renumite bazine pomicole ale țării. La Somecuta Mare s-a construit o întreprindere de mare capacitate pentru valorificarea fructelor.

Magistrala națională ce o traversează și apropierea de calea ferată — Satulung, la nord și Răstoci (pe Someș), la sud — avantajează regiunea din toate punctele de vedere. Sînt și cîteva așezări mai îndepărtate (Buteasa, Hovrila, Vărai, Fericea, Stejera etc.) care înregistrează o vădită tendință de depopulare, dar pe ansamblul regiunii populația marchează o creștere ușoară, ajunsă în prezent la 14 000 de locuitori. Dintre așezări Somecuta Mare (peste 3 900 de locui-

tori în 1989) este principalul centru polarizator, în curs de echipare industrială și modernizare.

Un alt aspect demografic specific acestei regiuni aflată în vecinătatea regiunii miniere băimărene este acela al unei pregnante mișcări navetiste (peste 3 500 de persoane) din aproape toate așezările ținutului Birsăului, către Baia Mare și exploatările miniere Săsar, Herja, Baia Sprie, Șuior și Căvnic. Acțiunea de valorificare complexă a potențialului funciar, axată pe creșterea animalelor și pomicultură, va reuși să reducă sensibil fenomenul de depopulare și mișcare navetistă. Regiunea este renumită și prin vocația etnografică-folclorică și atractivitatea turistică a peisajelor și pitorescul așezărilor cu vestigii și monumente istorice (Cetatea Chioarului, Remeștea Chioarului, Valea Chioarului, Buciumi, Vălenii Șomeței, Vărai etc.).

Masivul Prisaca. Cu o suprafață în jur de 37 km², Masivul Prisaca este subunitatea cea mai puțin întinsă din Dealurile Chioarului, dar cu masivitatea cea mai pregnantă, un tipic horst cristalin, net detașat de unitățile din jur, care domină Dealurile Birsăului și defileul Someșului dintre Benesat și Țicău (adânc sculptat în șisturile cristaline), prin înălțimi ce depășesc 600 m (Dealul Mare 660 m; Prisaca 626 m).

Masivitatea acestui compartiment este diminuată pe latura estică de adâncimea afluenților Iadărei, unica vale ce facilitează accesul în Codrii Prisacii, element dominant al peisajului. Puternic împădurit cu fâgete și gorunete, Masivul Prisaca dispune de un volum apreciabil de masă lemnoasă (aproximativ 400 000 m³), care asigură exploatarea unei cantități de circa 6 500 m³ anual. Gradul ridicat de acoperire cu vegetație arborească face ca să nu se manifeste procese de degradare a versanților.

Depresiunea Copalnicului. Între Masivul Preluca și flancul sudic al Gutiiului depresiunea înaltă și vălurită a Copalnicului reprezintă o arie de tranziție între depresiunile Băii Mari și Lăpușului, întinsă pe o suprafață de circa 200 km². Este un ansamblu de culmi teșite (cu altitudini între 300 și 500 m), despărțite de văile largi ale Copalnicului, Bloajei și Berinței, care converg către culoarul Copalnic-Mănăstur, limitat la sud de abruptul nordic al Prelucii.

Exceptând micile petice de formațiuni vulcanice neogene din sectorul Dănești — Cetățele, Depresiunea Copalnicului este consti-

tuită din formațiuni sedimentare friabile oligocene și mio-pliocene care au favorizat eroziunea și formarea unor mici depresiuni și largiri adăpostite — Trestia — Ciocotiș pe Bloaja, Șurdești — Plopiș pe Copalnic (Căvnic), Cărpiniș pe Valea Mare etc. —, care au constituit vetre de străveche și permanentă locuire. De asemenea, văile largi pe alocuri cu fragmente de terase au favorizat înghețarea de așezări statornice. Numeroasele vestigii arheologice descoperite la Cetățele, Șurdești, Copalnic — Mănăstur, Vad și Cănești indică prezența omului din neolitic, dar mai cu seamă din epoca bronzului. În întreaga regiune populația autohtonă a continuat să formeze o masă compactă și după venirea ungarilor. Atestarea documentară din secolele XV și XVI a acelorași 25 de așezări care sînt și în prezent este o dovadă a continuității și stabilității elementului autohton, grupat în așezări cu structură adunată în cea mai mare parte fixate pe văile Copalnicului (Plopiș, Făurești, Vad, Copalnic — Mănăstur), Bloajei (Izvoarele, Trestia, Ciocotiș, Finațe, Cănești, Rușor) și Văii Mari (Cărpiniș, Berința). Sînt și cîteva sate răsfirate în bazinul Rus — Șişești și pe treua piemontană din nord-estul regiunii (Șişești, Dănești, Bontăeni), cărora li se adaugă unica așezare de culme, de tip risipit, Cetățele. Populația actuală numără peste 17 000 locuitori, ceea ce reprezintă o densitate de 86 loc./km². Datele recensămîntului din 1977, față de cele ale recensămîntului efectuat în 1956 arată o creștere medie de 5,0‰, datorită sporului natural care se menține superior celui migrator. Deși centrul industrial Baia Mare și exploatarea miniere Săsar, Herja, Baia Sprie, Șuior și Căvnic generează o mișcare navetistă care cuprinde peste 1/5 din populația activă, totuși, prin legăturile eficiente create, populația nu-și părăsește satele. Dimpotrivă, le sporește sensibil gradul de dotare și confort. Pe măsura dezvoltării așezărilor, vechile păduri de foioase și-au restrîns suprafața pînă la numai 3 400 ha (17% din suprafața regiunii), făcînd loc finetelor naturale și pășunilor (peste 12 000 ha, reprezentînd 60% din întinderea regiunii), pe seama cărora s-a dezvoltat creșterea animalelor (în primul rînd bovinele), ca și livezilor care, prin extinderea plantațiilor sistematice, au depășit 1 100 ha. Cantitatea de furaje asigură din abundență hrana întregului șeptel alcătuit din peste 14 000 de bovine, 18 800 ovine și 7 500

de porcine (potrivit recensământului din anul 1988). În această privință o contribuție de seamă are ferma de producție Copalnic — Mănăstur a întreprinderii de întreținerea și exploatarea pajiștilor Maramureș, care, anual, execută lucrări complexe de ameliorare a acestui important fond funciar pastoral.

Depresiunea Copalnicului cu o producție anuală de 2 000 — 2500 t fructe de calitate superioară (favorizată de climatul blând al regiunii) se înscrie printre bazinele pomicole de frunte ale Maramureșului, cu o substanțială participare la export. Prin extinderea sistemului de livezi înierbate, amenajările pomicole au un dublu avantaj: obținerea unor importante cantități de nutrețuri și stăvilirea acțiunii de eroziune a solurilor, mai ales că aceste plantații valorifică terenurile în pantă.

Peste 3/5 din suprafața cultivată o dețin cerealele, dar productivitatea este scăzută sub influența climatului mai răcoros și naturii podzolic-acide a solurilor. Aceasta ar impune o restrângere a culturii cerealelor din dealuri, în favoarea extinderii culturilor furajere și de plante tehnice (cânepa, inul pentru fuio).

Modernizarea principalelor două trasee rutiere care străbat depresiunea — Baia Sprie — Caynic și Baia Mare — Copalnic — Mănăstur — Tîrgu Lăpuș (trasee conectate prin bretea Șurdești — Lăschia — Vad, de pe râul Copalnic) — asigură o fluentă sporită a traficului de mărfuri și călători, îndeosebi a deplasărilor zilnice ale minerilor și muncitorilor metalurgiști către Baia Mare și exploatarea miniere din regiunea montană.

Gradul ridicat de viabilitate contribuie totodată la valorificarea patrimoniului turistic: izvoarele minerale de la Dănești și Cărbunari, complexul muzeal de la Șişești și bisericile de lemn de la Șurdești, Plopiș și Lăschia, adevărate capodopere de arhitectură populară.

Depresiunea Baia Mare. Situată în spațiul dintre lanțul eruptiv Igniș — Gutii și înălțimile insulare cristaline, Codru — Prisaca — Preluca, Depresiunea Baia Mare, cu o suprafață de circa 600 km², are forma unei pilni deschise către Dealurile Chioarului și Depresiunea Copalnicului și accentuat îngustată, spre nord-vest (Ardusat — Cicirlău), pe unde face legătura cu Cîmpia Someșului. Reprezintă un relief colinar și de cîmpie format prin modelarea formațiunilor neozoice peste un fundament cristalin secfundat, cu înfîșeșe cuverturi cuaternare etajate.

Este un relief variat în care se disting trei trepte sau subunități morfologice: glacisul piemontan îngust Seini — Baia Mare — Baia Sprie sub flancul sudic al Munților Igniș — Gutii, cîmpia înaltă de terase ce corespund interfluvioilor dintre Săsar, Lăpuș, Bîrsău și Someș și cîmpia joasă (sub 200 m) cu lunci și terase, ce corespund ariei de convergență hidrografică Bușag — Arieșu de Cîmp. Din ansamblul depresiunii se detașează aliniamentele celor două interfluvii joase și ușor nivelate — Culmea Groșilor și Colinele Curtuișului ce domină lunca largă și asimetrică a Lăpușului.

La adăpostul munților și sub influența maselor de aer umed oceanic din vest, depresiunea are un climat temperat continental moderat, cu ierni relativ blinde, în care temperatura medie a lunii ianuarie variază între -1 și -3°C, și primăveri și veri calme cu temperaturi atenuate (media lunii iulie nedepășind 20°C) și bogate în precipitații (700 — 900 mm anual). Numărul mare al zilelor fără îngheț (160 — 180) și frecvența redusă a brumelor timpurii și a inversiunilor de temperatură (exceptînd partea cea mai joasă) favorizează dezvoltarea culturii pomilor fructiferi.

Aceleași condiții permit prezența la latitudinea de aproape 48° a viței de vie și a castanului comestibil, excelent adaptat, și favorizează dezvoltarea optimă nu numai a speciilor silvice, ci și a unei game variate de culturi agricole și pajiști naturale.

Depresiunea Baia Mare reprezintă o arie tipică de convergență hidrografică drenată de Someș. Atît Someșul, cît și Lăpușul, scăpate din strînsura defileelor din amunte, prezintă văi largi cu albiile meandrate, în care viteza de scurgere este redusă, iar acumularea de aluviuni produce o înălțare a patului văii. Someșul, cu un debit de 180 m³/s și Lăpușul (18 m³/s) au un regim hidrologic cu ape mari primăvara și cu frecvente viituri în timpul verii, fapt care, anual, provoacă revărsări (exceptînd Lăpușul, al cărui curs inferior a fost îndiguit), producînd însemnate pagube culturilor, căilor de comunicație și așezărilor. În timpul viiturilor din mai 1970 de proporții catastrofale, Someșul, la Ulmeni, a ajuns la 3 115 m³/s, iar Lăpușul aproape de vărsare la 780 m³/s. Scurgerile solide ating valori mari datorate influenței deversărilor de la flotațiile și uzinele metalurgico-chimice în apele Săsarului, Băiței și Lăpușului. Apele reziduale de la instalațiile de

prelucrare a minereurilor conțin cantități mari de impurități minerale, reactivi de flotare, metale neferoase, fenoli și cianuri care au distrus ihtiofauna Săsarului.

În ultimii ani poluarea a fost atenuată prin crearea a trei iazuri de decantare de mare capacitate la Tăuții de Sus, Baia Mare și la confluența Săsarului cu Lăpușul.

La contactul cu eruptivul Ignișului apar numeroase izvoare minerale — bicarbonatate, carbogazoase, feruginoase, clorosodice și calcice la: Valea Borcutului, Baia Sprie, Ferneziu și Apa Sărată. La Cărbunari, pe ramura sudică a depresiunii, este pusă în evidență o importantă sursă de ape minerale sulfuroase, bicarbonatate și clorosodice, valorificate prin instalații balneare de interes local.

Suprafața depresiunii este acoperită cu o mare varietate de soluri formate predominant sub pădurea de evercinee. Solurile luvice argiloiluviale situate în condiții de drenaj slab au fost supuse unui proces de înmlăștinire (Satulung, Hideaga, Recea etc.); cu instalarea unei vegetații higrofile (juncus, caricete etc.). Având un grad redus de fertilitate, s-a trecut la măsuri de ameliorare prin amendamente calcaroase și fertilizări cu îngrășăminte organice și chimice. Solurile brune podzolite din aria cîmpiei piemontane pe pantele ușor înclinate și pe terasele inferioare ale riului Lăpuș au o fertilitate naturală mijlocie și sînt favorabile pomilor fructiferi și finețelor. În lunci sînt soluri aluviale și gleice. Cele gleice deși au o fertilitate bună sînt cultivate numai parțial, din cauza excesului de umiditate din lunile de primăvară. În schimb, solurile aluviale prin natura și modul lor de comportare sînt propice culturilor agricole.

Caracterul moderat continental al climatului au favorizat aclimatizarea și răspîndirea castanului comestibil (*Castanea sativa*) în întreaga fișie piemontană dintre Baia Sprie și Tăuții Măgherauș, atît sub formă de pîlcuri sau în asociație cu gorun, tei, paltin, cîț și în cîstănișuri pure, ocupînd în prezent peste 500 ha. Pădurile de stejar (*Quercus robur*), deși reduse sensibil ca suprafață, se întîlnesc, totuși, în areale mai însemnate, atît pe terasele Someșului (pădurea Bavna 2 000 ha), cît și în treapta piemontană și colinară estică și sud-estică (Dumbrăvița — Cărbunari). Peste 80 % din suprafața totală ocupată de pădure, aproximativ 4 500, ha sînt formate

din stejerete pure¹ sau diseminate cu ulm, frasin, paltin etc., iar la limita superioară cu gorun și fag. Din stratul ierbos reține atenția în mod special lăleaua pestriță (*Fritillaria meleagris*, răspîndită în pădurea Bavna (Fersig), ocrotită pentru raritatea ei. O largă răspîndire au asociațiile de finețe pe terenurile cu exces de umiditate înmlăștinite („mociro”) de la Tăuții Măgherauș, Recea, Hideaga.

Depresiunea Baia Mare a constituit unul din cele mai prielnice ținuturi de locuire. Numeroase vestigii arheologice atestă aici prezența omului încă din paleolitic (Bușag, Lăpușel) și neolitic (Dumbrăvița, Ilba, Tăuții de Sus etc.), dar mai ales din epocile bronzului și fierului (Baia Mare, Lăpuș, Finteușu Mic, Coruia, Remeți, Buzești etc.), din care se remarcă tezaurul dacic de la Mireșu Mare din secolul III î. Chr. Deși regiunea depresiunară băimăreană nu a făcut parte din Dacia Porolissensis, locuitorii ei au întreținut permanente legături cu populația romanizată. În veacurile ce au urmat populația autohtonă, primind puternica infuzie romană, s-a organizat în mici formațiuni politice (obști, uniuni de obști și, ulterior, în cnezate și voievodate), opunînd o rezistență dîră presiunii popoarelor migratoare. În momentul luării în stăpînire de către regii unguri, regiunea era intens locuită de români, fapt dovedit de documentele emise de cancelaria acestora: 8 așezări statornice sînt pomenite încă din prima jumătate a secolului XIII (Finteușu Mare, Finteușu Mic, Ardușat, Arieșu de Cîmp, Dumbrăvița, Săcălășeni etc.), iar 11 în secolul XIV.

Colonizările ulterioare (secolele XIV — XV) cu mici grupuri de specialiști maghiari și germani în scopul intensificării exploatarea miniere au afectat numai parțial în cele două centre urbane, Baia Mare și Baia Sprie, elementul precumpănitor românesc.

În Depresiunea Baia Mare sporul natural a cunoscut fluctuații: în perioada 1930 — 1966 creșterea a fost de numai 11‰ față de perioada 1910 — 1930 cînd aceasta a fost de 30‰. Ritmul cel mai înalt de creștere a fost înregistrat însă în perioada dintre ultimele două recensăminte, 1966 și 1977, cînd populația a crescut de la 128 462 la 168 488 de locuitori (cu peste 31 %), datorită atît sporului natural (natalitate de 17‰), cît

¹ Exemplarul de vîrstă multiseculară din lunca Lăpușului (Colțău), declarat arbore ocrotit, este o măturie a codrilor de odinioară, ce acopereau întreaga regiune.

și aportului soldului migrator (în mediul urban). Privind această creștere pe cele două medii urban și rural, se constată o creștere „explozivă” a populației urbane (peste 52% și în special a orașului Baia Mare grație aportului sporului migrator care a variat între 15 și 24‰), în timp ce în mediul rural s-a înregistrat o creștere nesemnificativă (sub 4%), valori mai ridicate prezentând așezările din zona periurbană băimăreană (Satu Nou de Sus 9%, Lăpușel 10%, Mocira 8%, Cătălina 19,2%, Coltău 13% etc. precum și unele așezări cu funcții industriale (Ulmeni 7,1%, Ilba 10%). Cîteva sate — Tămaia, Merișor, Acua —, afectate în repetate rînduri de revărsările Someșului, au înregistrat scăderi de populație.

Dezvoltarea industriei băimărene în perioada postbelică și amploarea luată de activitatea minieră din regiunea muntoasă învecinată au generat o intensă mișcare migratorie navetistă. Domeniul miniero-metalurgic solicită cel mai mare volum de forță de muncă: peste 12 000 persoane se deplasează zilnic din satele depresiunii către minele Ilba, Nistru, Săsar, Herja, Baia Sprie, Șuioara și Căvnic și circa 2 000 la uzinele metalurgice și flotații. Municipiul Baia Mare atrage un număr de circa 7 000 de persoane, din care 1/3 în activitățile metalurgiei neferoase. La rîndul său, din Baia Mare zilnic se deplasează peste 1400 persoane în localități din depresiune și la diferite activități miniere și forestiere din regiunea montană. Această amplă mișcare pendulatorie de forță de muncă, ce reflectă relațiile organice de reciprocitate, depresiune — munte, se va menține, dată fiind intensificarea activităților de prospectare și explorare din Masivul Igniș — Gutii. Aceeași tendință de atragere a forței de muncă — îndeosebi masculină — va exercita și în viitor Baia Mare, deoarece ramurile solicitate (metalurgie neferoasă, construcții de mașini, materiale de construcție și construcții) vor continua să-și acopere deficitul de forță de muncă din satele depresiunii și chiar din Lăpuș, Codru, Chioar, Sălaj, Oaș și Maramureș.

Dacă în 1948 populația urbană deținea 38,5% din totalul populației depresiunii, în 1988 aceasta a fost de peste 72%, ca urmare a dezvoltării complexe a orașelor care au atras un număr considerabil de locuitori.

În ceea ce privește structura profesională se remarcă caracterul pregnant agricol al tuturor așezărilor rurale (exceptînd Tăuții de Sus, Ulmeni și mai recent Fărcașa, care dis-

pun de obiective industriale). În orașele Baia Mare și Baia Sprie structura profesională este dominată de ponderea celor ocupați în industrie (peste 52% și, respectiv, 60% din populația activă) și în activitățile terțiare (15% și respectiv 5,5%).

Depresiunea Baia Mare a constituit un spațiu optim de stabilire și înjghebare a numeroase așezări care, cu excepția citorva cazuri de desființare prin contopirea lor cu alte așezări învecinate s-au menținut și dezvoltat de-a lungul secolelor, alcătuiind astăzi o rețea deasă: 64 de sate și două orașe. Exceptînd Arieșu de Pădure și Poșta situate pe terasa inferioară, apoi Satu Nou de Jos, dezvoltate pe Culmea Groșilor, toate celelalte așezări sînt situate pe arterele de circulație din lungul rîurilor, de obicei însoțind ambele maluri, tipice în acest sens fiind aliniamentele de sate din lungul Someșului și Lăpușului. Satele sînt în proporție de 75% de mărime mijlocie (între 500 și 2 000 de locuitori). Cele care depășesc acest plafon (Cicir-lău, Tăuții Măgherauș și Tăuții de Sus) sînt situate pe axa rutieră de la contactul depresiunii cu fișia piemontană Seini — Baia Mare — Baia Sprie. Satele mici (sub 500 locuitori) sînt fie cele formate prin roire (Cătălina și Rodina), fie cele limitate în creșterea lor de cauze naturale, ca revărsările Someșului (Arieșu de Cîmp, Merișor, Birgău) (fig. 6).

Tipul predominant este cel de sat adunat cu tendința de concentrare (Lăpușel, Satulung, Ulmeni, Mireșu Mare, Săcălășeni etc.). dar sînt și sate răsfirate, ca cele de pe Culmea Groșilor (Satu Nou de Sus, Groși și Satu Nou de Jos). Textura așezărilor este, în majoritatea cazurilor, neregulată, fapt ce explică vechimea acestora. Puține sînt localitățile a căror tramă stradală este parțial regulată (Ardusat, Satulung, Girdani, Recea). Se observă că satele de la contactul luncii cu terasele și cele din lungul căilor de circulație (Tăuții de Sus, Tăuții Măgherauș, Hideaga, Săcălășeni, Sălsig etc.) sînt prin excelență lineare, în timp ce așezările de pe terase și interfluvii (Groși, Satu Nou de Sus) au formă neregulată.

Condițiile naturale au fost foarte favorabile dezvoltării economice a acestei regiuni. Luncele și terasele Someșului, Lăpușului și Săsarului au oferit terenuri de cultură, pășuni și finete naturale. Pantele domoale piemontane de sub Munții Ignișului, cu expunere sudică, au favorizat cultura viței de vie și a pomilor fructiferi. Climatul de adăpost cu




Fig. 6. Depresiunea Baia Mare.

ierni blinde lipsite de geruri aspre și veri moderate cu precipitații abundente (700 — 900 mm anual), ca și solurile aluviale, bine podzolite și argiloiluviale sporesc potențialul agricol al regiunii. Excepție fac terenurile din aria de convergență a Someșului cu Birsăul, Lăpușul, Săsarul și Băița, ale căror soluri gleice, cu drenaj slab, stinjenesc practicarea culturilor și sint utilizate cu precădere ca pășune.

Ponderea cea mai mare o dețin terenurile agricole (78%), ca urmare a defrișărilor masive din secolul XIX în scopul extinderii domeniului pășunabil solicitat de creșterea oilor. Peste 50% din suprafața agricolă o reprezintă terenul arabil, care a permis extinderea culturilor de cereale, furaje și legumicole. Ponderea redusă a viilor (0,5% din suprafața agricolă) este suplinită de cultura

pomilor fructiferi, extinsă pe mai mult de 3 000 ha (7%).

Cerealele (56,6% din suprafața cultivată) au răspîndire largă în partea centrală și de vest a depresiei: pe interfluvii predomină grîul, iar în lunci și pe terase porumbul (Ulmeni, Mireșu Mare și Satulung). În ultimul deceniu au fost extinse culturile de cartof și legume, lunca Lăpușului oferind, după executarea lucrărilor de îndiguire, condiții optime de dezvoltare a grădinăritului. La Recea, Lăpușel și Coltău se conturează principalul bazin legumicol al depresiei, care contribuie la aprovizionarea populației Băii Mari și a fabricii de conserve din localitate. Ambele culturi dețin în prezent circa 10% din suprafața cultivată a depresiei.

După cereale, ca răspîndire, urmează culturile furajere (20,4%). Cerințele crescînde cu precădere ale unităților zootehnice cu caracter industrial au impus extinderea culturilor trifoliene, dar mai cu seamă a celor însilozabile (porumb) și rădăcinoase, care dețin peste 3/4 din producția totală de furaje. Cele mai mari suprafețe se cultivă la Satulung, Mireșu Mare și Ulmeni, unde aceste culturi dețin peste 1/3 din suprafața cultivată.

Între culturile extinse în ultimii ani apare înul pentru fuior cultivat pe aproape 1200 ha (în 1989), care se dezvoltă optim în sud-estul depresiei, unde, în 1968, la Ulmeni, a fost construită o topitorie cu o capacitate de 1.000 tone fibre în/an.

Cultura pomilor fructiferi — utilizare eficientă a terenurilor — a fost considerabil extinsă, ajungînd la o suprafață de peste 3 000 ha. Cele mai întinse livezi sînt localizate pe treua piemontană dintre Baia Mare și Tăuții Măgheraș, pe Culmea Groșilor și în bazinul Dumbrăviței, unde livezile dețin între 10 și 20% din suprafața agricolă, avînd ca specie dominantă mărul (65% din numărul total de pomi), soiurile Jonathan și Parmen auriu.

Beneficiînd de o bază furajeră naturală consistentă (aproape 18 000 ha de pășuni și fînețe naturale și importante suprafețe cultivate cu plante de nutreț), creșterea animalelor se adaugă pomiculturii pentru a defini profilul agriculturii din Depresiunea Baia Mare. Pentru creșterea bovinelor (peste 10 000), cu caracter industrial, s-au construit complexe de creștere, îngrășătorii și ferme specializate la: Bușag, Săcălășeni, Satulung, Mireșu Mare și Arduzel. Ovinele (favorizate de folosirea într-o măsură mai mare a „văratului” mon-

tan) se mențin în număr relativ ridicat (peste 32 000 în 1987). Un aport substanțial au fermele specializate în creșterea și îngrășarea oilor de la Recea și Ariniș.

Activitatea industrială de bază din Depresiunea Baia Mare este legată de existența bogatelor resurse miniere, forestiere și materiale de construcții din regiunea muntoasă învecinată prelucrate cu precădere în cele două centre urbane industriale Baia Mare și Baia Sprie. Dar ca urmare a utilizării forței de muncă locale, cîteva așezări rurale au fost incluse în acest proces: Tăuții de Sus, așezare cu caracter periurban în care industria este reprezentată de patru întreprinderi (Flotația Centrală, întreprinderea de utilaj minier și reparații, fabricile de cherestea și de materiale de construcții); Ulmeni, nod feroviar cu topitoria de in, întreprinderea de prefabricate și bolțari de mină și o secție textilă; Fărcaș cu fabrica de sticlă, Satulung, cu ateliere de reparat mașini agricole; Mireșu Mare, Mogoșești, Bîrgău și Cicirlău, renumite prin balastierele din albia Someșului. Activitatea din Depresiunea Baia Mare este asigurată de căile de comunicații. Magistrala feroviară București—Cluj Napoca—Dej—Baia Mare—Satu Mare străbate depresiunea, urmîrind cursul Someșului, iar căile rutiere, a căror densitate este de 0,7 km/km², facilitează legătura așezărilor depresiunii cu regiunile învecinate.

Municipiul Baia Mare. Așezarea cea mai reprezentativă a depresiunii, Baia Mare ocupă un loc propice pentru locuire pe malurile Săsarului, la poalele fișiei piemontane a Ignișului, dovadă numeroasele urme materiale arheologice descoperite aici: unelte de piatră, obiecte din bronz, podoabe, arme, vechi exploatări de aur și cupru și de prelucrare a acestor metale. Recentele descoperiri arheologice pun în evidență continuitatea preocupărilor miniere ale populației așezării, care cunoscuse o mare dezvoltare în timpul primelor voievodate.

Zăcămintele aurifere au atras atenția du-cilor și regilor unguri, care prin înfrîngerea rezistenței voievozilor români Menumorut și Gelu pun stăpînire pe acest ținut. În timpul dinastiei arpadiene Baia Mare, cu mina Săsar, consemnată documentar în anul 1327 sub numele de Civitas Rivuli Dominarum, devine proprietatea regelui Carol Robert, care, pentru majorarea veniturilor visteriei, stimulează minieritul prin acordarea de drepturi

privilegiate proprietarilor de teren, lucru pe care-l amplifică ulterior Ludovic I, în același scop, în anul 1347. Prezența minereurilor auroargintifere și acordarea de privilegii au dus la înființarea în anul 1411 a unei monetații, care, sub Corvinești avea să fie cea mai importantă dintre monetațiile Transilvaniei și Ungariei, în care se executau comenzi monetare pentru unele state europene (Veneția, Polonia).

În timpul lui Matei Corvin orașul prosperă, meșteșugarilor li s-a dat dreptul de a se constitui în bresle, de a ține târg, de a-și construi ziduri de apărare și bastioane. În secolele următoare, atât minele de pe raza orașului, cât și monetația, trecând rînd pe rînd sub stăpînirea maghiară, sîrbă, austriacă sau în proprietatea panilor polonezi și principilor Transilvaniei, cunosc perioade de avînt și declin. Spălarea minereurilor se făcea cu ajutorul șteampurilor de pe apa Săsarului, iar prelucrarea minereurilor se efectua în topitoarele de la Ferneziu, construite la sfîrșitul secolului XVII, în locul vechilor cuptoare rudimentare. Intensificarea exploatarea miniere a dus în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, la construirea dublei legături feroviare — către Satu Mare (în 1884) și către Dej (1889).

După primul război mondial, Baia Mare cunoaște o relativă înviorare a industriei miniere și de prelucrare a metalelor. La numeroasele ateliere meșteșugărești, care au luat locul breslelor de altădată, se adaugă cîteva întreprinderi de cherestea, bere, mori etc.) cu producții reduse și fluctuante.

În perioada postbelică, economia Băii Mari a căpătat o dezvoltare pe multiple planuri prin investiții masive în domeniul minier și al metalurgiei neferoase. Orașul devine unul dintre marile centre metalurgice ale țării în prezent, deținînd 20% din producția globală a metalurgiei neferoase naționale.

Dezvoltarea capacității de extracție a minelor existente, precum și deschiderea de noi mine (Ilba, Șuitor) au determinat construirea la Baia Mare a unei flotații centrale de mare capacitate (peste 4 000 t/24 ore). Exponentul industriei metalurgice îl constituie întreprinderea de metalurgie neferoasă (PHOENIX S.A.), extinsă pe vechea platformă industrială din estul orașului, unde funcționează uzina de cupru, laminorul de plumb, fabrica de acid sulfuric, producînd peste 50 sortimente. Activitatea metalurgică însă a generat un grad

ridicat de poluare (reactivi de plumb, bioxid de sulf), care afectează nu numai cîmenii ci și vegetația și animalele.

Dezvoltarea activităților miniero-metalurgice a dus la crearea de noi ramuri industriale: industria construcțiilor de mașini, utilaj minier și reparații și întreprinderea de mașini-unelte și accesorii de schimb. Alte trei ramuri industriale valorifică și alte resurse locale: industria materialelor de construcție reprezentată prin întreprinderea de produse ceramice „FAIMAR” și întreprinderea de prefabricate, prelucrarea lemnului (cherestea, mobilă și bînale) și industria alimentară cu fabrica de conserve „AGROFRUCT”, întreprinderea de morărit și panificație, întreprinderea de industrializarea cîrnii. A treia categorie de industrii o formează ramurile dezvoltate cu scopul utilizării disponibilului forței de muncă feminine, și anume industria textilă reprezentată prin filatura de bumbac „MARATEX”, fabrica de confecții și secția fabricii de tricotaje „UNITATEA” din Sighetu Marmatei.

Baia Mare constituie un complex urban industrial de tip miniero-metalurgic (metalurgia neferoasă, inclusiv activitatea extractivă a minereurilor reprezintă în 1987 peste 50% din producția globală industrială a orașului) care exercită o influență nemijlocită asupra așezărilor depresiunii, care la rîndul lor participă cu un efectiv considerabil de forță de muncă angajat în aceste activități (peste 10 000 persoane). Este așadar un unicat între orașele României (asemenea Hunedoarei în siderurgie), care se dezvoltă prin multitudinea relațiilor create de activitățile determinate de minerit și metalurgia neferoasă.

Baia Mare dispune și de un însemnat patrimoniu agricol cu două categorii principale de utilizare a terenurilor favorizate de condițiile naturale și de tradiție: pomicultura și creșterea animalelor. Cultura pomilor fructiferi s-a dezvoltat, pe fondul pomicol tradițional, prin plantații masive pe trena piemontană dintre Valea Borcutului și Apa Sărată (Stațiunea experimentală Baia Mare cu peste 400 hă de livezi intensive cu soiuri ce asigură o producție anuală de peste 5 000 tone). Zootehnia este reprezentată de complexul avicol, amplasat în vestul orașului, cu capacitate de peste un milion păsări. La Baia Mare își are sediul un centru de reproducție și selecție creat în scopul dezvoltării

calitative a zootehnicii, precum și întreprinderea de întreținere și exploatarea pajistilor. Evoluția teritorială a orașului marchează etape distincte. În secolul XIV, cînd este atestat documentar prima dată, Baia Mare

dralei Sf. Ștefan (secolul XIV), Turnul Măcelarilor (Turnul de Muniții), clădirea Ordinului minorităților, în care a funcționat colegiul Schola Rivulina, Casa Elisabeta construită în secolul XV de către Ioan de Hunedoara




Fig. 7. Municipiul Baia Mare. I, Primul plan cunoscut al cetății-oraș, figurat pe un blazon din 1483; II, schița orașului Baia Mare din sec. XVII-lea (1, fragment din zidul cetății; 2, „Poarta podului”; 3, monetăria; 4, casa Elisabeta Huniade; 5, Schola Rivulina; 6, turnul Ștefan; 7, catedrala Sf. Treime; 8, bastionul măcelarilor; 9, poarta de sud); III, evoluția teritorială a orașului: 1, întinderea orașului în sec. XIV-lea; 2, extinderea orașului în sec. XVII-lea; 3, extinderea în 1880; 4, extinderea în 1930; 5, extinderea actuală; IV, creșterea numerică a populației orașului Baia Mare în perioada 1800-1984.

se întindea pe un perimetru care corespunde cu vechea piață, păstrată și astăzi în aceeași formă dreptunghiulară din care porneau străzi înguste, până la zidurile de apărare străjuite de bastioane (fig. 7).

Dintre edificiile mai de seamă construite în secolele XIV - XVIII și rămase până în zilele noastre sînt de amintit: Turnul cate-

și clădirea monetăriei din secolul XV și reconstruită în secolul XVII, azi sediul Muzeului județean Maramureș. În 1643 populația era estimată la 2 800 - 3 000 de persoane. La sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX Baia Mare marchează o extindere în afara fostelor ziduri (distruse în secolul XVIII), în părțile de sud și de

vest, iar populația, potrivit unei statistici oficiale efectuate în 1842, număra 4 250 locuitori. La sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX, odată cu dezvoltarea mineritului și prelucrării metalelor se produce o nouă extindere a orașului de o parte și de

Vatra orașului prin extinderea treptată în partea de nord, pe pantele domoale ale trenei piemontane către vechile cartiere miniere — Valea Roșie și Valea Borcutului dar mai ales în părțile de sud și vest în lunca Săsarului, ocupă în prezent peste 900 ha.




Fig. 8. Municipiul Baia Mare. Zonele funcționale: 1, industrială; 2, feroviară; 3, comercială și cultural-administrativă; 4, rezidențială; 5, spații verzi și de agrement; 6, alte folosințe; 7, centrala termoelectrică; 8, mină; 9, carieră de andezit; 10, carieră de argilă; 11, iaz de decantare.

alta a Săsarului. După primul război mondial, orașul își prelungește tentacular cartierele marginase, mai cu seamă de-a lungul căilor de acces dinspre sud și vest, în lunca joasă din dreapta Săsarului (fig. 7).

Dezvoltarea urbanistică se înregistrează după 1950, concomitent cu cea a activităților industriale, comerciale și cultural-administrative.

Planul general de sistematizare a fost conceput în concordanță cu particularitățile cadrului natural și cu necesitățile asigurării de locuințe populației ajunsă în 1992 la 148 815 de locuitori.

Nemaiputînd face față cerințelor crescînde ale traficului de mărfuri și călători și „strangulată” de extinderea orașului, gara, cu vechea arteră feroviară, au fost desființate și s-a construit în partea de vest un nou și modern edificiu. În imediata sa apropiere s-a format noua platformă industrială (de vest), detașată de zona rezidențială.

Cîmpul Tineretului de sub Dealul Florilor, formează principala zonă rezidențială în care sînt amplasate numeroase obiective culturale, sportive și de interes științific (fig. 8).

Municipiul Baia Mare se înscrie printre centrele urbane de mare atracție turistică

echipat cu cinci hoteluri pentru a face față fluxului de turiști sporit de la an la an (peste 140 000 în anul 1988).

Personalitatea municipiului Baia Mare este dată pe de o parte de existența orașului vechi, cu aspect medieval, în care se păstrează importante vestigii istorice, alături de noul oraș, cu numeroase obiective industriale, edificii cultural-administrative și rezidențiale: Palatul prefecturii județului Maramureș, Universitatea, Casa de cultură a sindicatelor, Sala sporturilor, Palatul telefoanelor, Gara centrală etc., obiective care plasează străvechiul Rivulus Dominarum de la poalele Ignișului printre cele mai moderne orașe industriale ale României, dar și cu un grad ridicat de poluare datorită activităților minierometalurgice.

Orașul Baia Sprie. Situat pe ambele maluri ale Săsarului, amunte cu 8 km de Baia Mare, orașul își confundă existența cu dezvoltarea mineritului. Având același an de atestare documentară cu Baia Mare (1327) s-a dezvoltat lent, activitatea de bază a populației fiind, aproape exclusiv mineritul, cu succedarea perioadelor de avânt și regres manifestate pe parcursul a peste șase veacuri. Populația sa la începutul secolului XX nu depășea 4 500 de locuitori. Deși după primul război mondial se amplifică activitatea minieră, populația înregistrează o ușoară scădere: 4 127 de locuitori în 1930.

Revitalizarea orașului în perioada postbelică se reflectă în procesul de modernizare și în creșterea demografică; la recensămintul din 1966 s-a înregistrat o dublare a populației față de anul 1910, iar în 1992 a ajuns la 16 068 locuitori.

O influență pozitivă a exercitat-o intrarea în exploatare a zăcămintului minier de la Șuior și înființarea întreprinderii de prelucrare a lemnului. Intensificarea exploatarea minei Baia Sprie face ca în anul 1987 activitatea minieră să dea peste 80% din valoarea producției globale industriale a orașului, activitate care cuprinde circa 45% din populația activă. Între Baia Sprie și Baia Mare se înregistrează o vie și permanentă mișcare navetistă reciprocă: către Baia Sprie și Șuior se deplasează mineri, iar către Baia Mare, personal angajat la obiectivele industriale și în activitățile de servicii.

Orașul Baia Sprie nu dispune de obiective notabile de interes turistic — exceptând catedrala și câteva edificii din secolele XVII — XVIII, dar pentru că se află pe drumul

național ce leagă Baia Mare de Țara Maramureșului, este implicat în turismul de tranzit, iar apropierea munților Igniș și Gutii — Creasta Cocoșului cu numeroase atracții și dotări corespunzătoare (Stațiunea Izvoarele, Complexul Șuior, Cabana Bodi, Popasul Pințea Viteazul) impun valorificarea bazei turistice.

2.2.2.3. Dealurile și depresiunile Silvaniei

Dealurile și depresiunile, măgurile și piemonturile situate între munții scufundați din „jugul intracarpatic” în est și cimpurile Someșului și Barcăului în vest, alcătuiesc unitatea geografică pentru care poate fi generalizată denumirea de Dealurile Silvaniei. Prin poziție și geneză aparține dealurilor pericarpatiche din latura vestică a Carpaților (V. Mihăilescu, 1966). Ele au însă legături strânse cu Podișul Someșan. Dealurile Silvaniei — nivelate în tardidacian odată cu transformarea șelfului submarin într-un uscat extins — se racordează peste înșeuări și curmături, cu același nivel ușor înălțat din Podișul Someșan. Acest fapt, la care se adaugă prezența horsturilor cristaline sub formă de măguri ce contrastează față de colinele domoale din jurul lor, creează unele afinități cu unitatea geografică din estul Culmii Meseșului. Literatura geografică oferă puține date despre această regiune și destul de disparate, neexistând un studiu de sinteză.

Dealurile Silvaniei au altitudini joase (150 — 400 m) și energie de relief redusă (60 — 150 m), ceea ce nu exclude ca, pe alocuri, contrastele de relief și de peisaj să fie pregnante. Față de nivelul general al dealurilor domoale se detașează prin forma rotunjită și peisajul dominant de pădure măgurile cristaline: Măgura Șimleului (569 m), Măgura Chilioarei (347 m) și Culmea Codrului (579 m), considerate ca resturi ale unei catene muntoase sfărâmate (St. Mateescu, 1929; C. Martiniuc și P. Coteț, 1960), dar care și astăzi limitează — morfogenetic — spre vest, o depresiune tectonică importantă. Între măgurile cristaline se desfășoară largi depresiuni colinare, alungite după râurile mari care străbat regiunea și care au creat, de-a lungul lor, culoare cu terase ocupate de așezări și culturi, în contrast cu versanții și interfluviile din nivelul general. Ca urmare, morfologia de ansamblu se înfățișează ca o alternanță de culmi deluroase și culoare largi de vale, întrerupte, uneori, de măgurile cu




Fig. 9. Dealurile și depresiunile Silvaniei — diviziunile reliefului. I, Depresiunea deluroasă a Silvaniei; 1, Piemontul Plopișului; 2, Depresiunea Plopișului; 3, Piemontul Bănișorului; 4, Depresiunea Crasnei; 5, Piemontul Meseșului; 6, Piemontul Osteanei; 7, Dealurile Meseșeni—Panic; 8, Depresiunea Zalăului; 9, Piemontul Codrului; 10, Culoarul Sălajului; 11, Dealurile Sălajului; 12, Depresiunea Guruslău; 13, Muncii izolați; 14, Măgura Șimleului; 15, Măgura Chilioarei; 16, Culmea Codrului; III, Dealurile piemontane marginale; 17, Dealurile Toglaciului; 18, Colinele Sărmășagului; 19, Colinele Codrului; 20, Culoarul Barcăului.

substrat mai rezistent. La contactul cu munții se întind prispe piemontane, tăpșane de acumulare, glacisuri și bazine de eroziune sculptate la ieșirea râurilor din munte (fig. 9).

Pe acest relief cu suprafețe plane ori ușor ondulate și cu culoare de vale largi se întindeau odinioară păduri de foioase și poieni cu finețe. Locul lor, pe cea mai mare întindere, a fost luat de culturi agricole cerealiere, de livezi și de podgoriile renumite de la Șimleu Silvaniei, Zalău, Șamșud. Acest fapt a fost favorizat de climatul mai blând (temperaturi medii anuale între 8 și 9°C și chiar peste 9°) și mai umed (precipitații între 700 și 800 mm/an), de solurile relativ fertile, scoase de sub covorul stejerișurilor și gorunetelor.

Descoperirile arheologice atestă existența unor comunități omenești încă din neolitic (Șimleu Silvaniei, Crișeni, Rațiu) și din epoca bronzului (Animă, Meseșeni de Sus, Derșida, Marca, Crasna, Cizer, Nușfalău). Din epoca fierului sunt menționate așezările dacice de la Șimleu Silvaniei și Stîrciu. Continuitatea locuirii a permis dezvoltarea unei civilizații înfloritoare, fapt relevat de existența unor așezări pe toate treptele de relief.

Din cele 61 de localități numai ale Depresiunii Șimleului, 38% sunt atestate în secolul XIII. Majoritatea sunt așezări de vale, situate fie în luncă (Marca, Crasna, Zalău, Cehu Silvaniei), fie la contactul acesteia cu dealurile (Boghiș, Zăuan, Crișeni, Guruslău, Sîncraiu Silvaniei) sau cu muntele (Pria, Cizer, Lazuri, Subcetate, Bădăcin etc.) și

foarte rar pe interfluvii (Periceiu Mic, Făgetu, Recea Mică). În medie revin 5,5 așezări la 100 km², dar valorile variază între 9,8 în partea vestică a depresiunii și 3,7 în Piemontul Plopișului sau în Dealurile Codrului.

Așezările au o structură adunată (Zăuan, Bocșa, Crasna, Bănișor, Stîrciu), răsfirată (Huseni, Bic, Delani, Deja, Ratin, Crișeni, Iaz) sau chiar risipită (Tusa, Preoteasa, Făget), iar în marea lor majoritate sunt așezări mici și mijlocii (peste 90%) și adăpostesc peste 68% din populația rurală.

Așezările rurale dau nota generală a peisajului, acestea avînd funcții agricole determinate de predominarea suprafețelor arabile (Crișeni, Virsolt, Inău, Herclean, Crasna, Sălățiș, Dobrin), ale pășunilor naturale (Pleșca, Pria, Cizer, Bădăcin) sau cu ponderi egale a categoriilor de utilizare a terenurilor (Sig, Valecău, Meseșeni de Jos, Horoatu Cehului). Pe ansamblul regiunii se observă că densitățile scad către părțile înalte, odată cu accentuarea caracterului de răsfirare și risipire. O parte din așezări evoluează spre tipul urban (Ip, Nușfalău, Crasna, Bocșa, Sărmășag). Rețeaua urbană este alcătuită din cinci orașe: Șimleu Silvaniei, Zalău, Cehu Silvaniei, Marghita, în Culoarul Barcăului și Jibou în Depresiunea Guruslău. Cu toate că ele cuprind un număr important de locuitori (peste 125 000 în 1992), gradul de urbanizare al regiunii este încă scăzut (fig. 10).

Unitare prin geneză și trăsături de ansamblu, Dealurile Silvaniei sunt nuanțate în structura orografică de detaliu prin numeroase

unități, ierarhizate după mărime și particularități ecogeografice. Astfel, mediana formată din măguri-horst care începe în vecinătatea orașului Șimleu Silvaniei (Măgura Șimleului) și se termină aproape de localitatea Poiana Codrului (Târnița, 551 m) încadrează

velul bazinelor hidrografice se individualizează bazine de eroziune, unele largite și reunite prin înșeuări și curmături în arii mai extinse, cu trăsături de depresiuni: Depresiunea Șimleului, Depresiunea Zalăului și Depresiunea Sălajului, fiecare din ele consti-




Fig. 10. Dealurile și depresiunile Silvaniei. Distribuția și mărimea așezărilor. 1, Măguri și culmi de roci cristaline; 2, dealuri piemontane; 3, arii depresionare; 4, terase; 5, lunci; 6, cuestas; 7, defileu; 8, șa.

în estul său Depresiunea Silvaniei, sau Depresiunea colinară sălăjană, sau Depresiunea Zalăului (Șt. Mateescu, 1927). Deși depresiunea este bine conturată, totuși, la nivelul dealurilor din cuprinsul său, trece — în lungul unor culmi prelungi — prin porți largi de 15 — 20 km, în dealurile din vest. Dar la ni-

tuind, de fapt, o asociere de dealuri și largiri de eroziune ce poartă în fizionomia lor reflexul substratului.

Depresiunea Șimleului. În unghiul dintre Munții Meseș și Muntele Șes, începând din marginea Piemontului Osteanei, se desfășoară, până în Măgura Șimleului și interflu-

viul Crasna—Zalău, cea mai mare depresiune din regiunea deluroasă a Silvaniei. Contactul depresiunii cu hórstul Meseşului este marcat de o denivelare pronunţată (legată de falia Parameseş), iar în lungul lui au fost modelate micile depresiuni de la Pria, Poniţa, Hurezu Mic şi Meseşeni. Către Munţii Plopişului, denivelările sînt mai atenuate din cauza piemontului care s-a păstrat mai bine, dar se conturează o limită destul de clară prin lărgirile de la Tusa, Preoteasa, Plopiş, Halmăşd şi Cerişa. Limita nordică începe la Marca, pe valea Barcăului, printr-un scurt defileu sculptat în cristalin şi se continuă cu cuesta ce însoţeşte Barcăul şi valea Cumpenii, între Ip şi Şimleu Silvaniei. De la Măgura Şimleului şi pînă la Munţii Meseşului limita este preluată de Dealurile Meseşeni—Panic, menţinute de bolta unei structuri anticlinale, deschisă la Aghireş şi Panic în două butoniere. Prin acţiunea de eroziune subsecventă, Crasna şi Valea Meseşenilor au deschis un front puternic de cuestă, de alunecări, ravene şi torenţi. La baza cuestei se întinde un glacis prelung utilizat pentru culturi de cereale, iar abruptul dinspre muchie, mereu în retragere, formează domeniul plantaţiilor pomiviticele şi al pădurilor de cereto-gorunete. Înseuarea largă de la Virşolt facilitează legăturile între Depresiunea Şimleului şi Depresiunea Zalăului. Aceeaşi funcţie o îndeplineşte şi curmătura de la Aghireş.

Două riuri mari — Crasna şi Barcău — adună în convergenţele de la Crasna şi la Nuşfalău afluenţii coboriţi din munţii adiacenţi sau cu obîrşiile în dealurile pliocene alăturate. Avale de aceste convergenţe, cele două riuri se arcuiesc treptat către vest, însoţite în nord de fronturi de cuestă, dar şi de depresiuni largi, înainte de a se angaja în defileele epigenetice de la Şimleu Silvaniei şi de la Marca. Spre aceste arii joase se apleacă interfluviile pornite din prispele piemontane ale Plopişului ori Meseşului (500—600 m), atingînd valori de numai 250—300 m în marginea nordică a depresiunii. Crasna şi Barcăul sînt însoţite de lunci întinse, parte mlăştinoase, şi cîmpuri de terase etajate pe cinci nivele (4—6 m, 20—25 m, 30—35 m, 50—55 m, 90—110 m), acoperite de ogoare de grîu şi porumb. Formaţiunile fiind predominant monoclinale, versanţii sînt asimetrici, afectaţi de ravene, torenţi şi alunecări de teren. Asimetria şi fragmentarea intensă completează nota de ansamblu a acestui teritoriu, iar repartiţia şi regimul principalelor elemente

climatice sînt influenţate evident de relief. Din această cauză, faţă de temperaturile medii anuale cuprinse între 8 şi 9°C, cu o scădere sensibilă spre munte, unde se ating valori de 6°C, se observă topoclimate de adăpostire ori expoziţie favorabilă, cu temperaturi ce trec de 9°C şi cu precipitaţii mai scăzute (550 mm/an) decît media generală (700—800 mm) din dealuri. Un topoclimat specific prezintă versantul sudic al Măgurii Şimleului şi cuesta de pe dreapta Crasnei, unde se dezvoltă bine viţa de vie, piersicul şi chiar migdalul. Faptul că cea mai mare parte a precipitaţiilor cade în perioada de primăvară—vară scurgerea de primăvară este dominantă: 40—45% din scurgerea anuală, faţă de cea din timpul verii (20%) şi din timpul toamnei (5—10%). Inundaţiile sînt frecvente şi pot atinge nivele catastrofale (1970, 1975).

Depresiunea Şimleului adăposteşte o populaţie de peste 115 000 de locuitori. În intervalul 1869—1979 populaţia depresiunii s-a dublat, creşterea medie anuală fiind de 547 de locuitori. Dar această creştere este neuniformă. În intervalul 1970—1980 unele aşezări continuă să înregistreze scăderi (Cizer, Crasna, Plopiş), în timp ce altele cresc, în special oraşele Şimleu Silvaniei şi Zalău, datorită dezvoltării lor industriale. Cea mai mare densitate a populaţiei apare în Depresiunea Crasnei cu 100—150 loc./km², iar cele mai mici în Piemontul Plopişului, în salba de sate de sub munte, 50—80 loc./km² (Plopiş, Sig, Cizer, Herculean). Schimbările economice şi sociale reflectă şi repartiţia populaţiei pe medii, în care populaţia rurală reprezintă 68%.

În aceste condiţii de relief şi climă favorabile, la care se adaugă fertilitatea destul de bună a solurilor (brune eu-mezobazice, brune luvie şi local luvisoluri albice, agricultura s-a dezvoltat ca o ramură de bază în economia regiunii, specializată în cultura cerealelor, plantelor furajere şi creşterea animalelor, cuprinzînd 70% din populaţia depresiunii. În anumite areale (Piemontul Plopişului, Dealurile Meseşenilor, Depresiunea Crasnei şi a Plopişului) populaţia din agricultură ajunge la 85—95% (fig. 11).

Din totalul suprafeţei agricole, 60,7% revine terenurilor arabile, 30,5% păşunilor şi fînelor naturale, 8% livezilor şi 0,8% viilor şi pepinierele viticole. Sub aspectul structurii culturilor predomină cele de grîu (40—45% din suprafaţă), de porumb (30—35%), de plante furajere (15—20%), de floarea-soa-




Fig. 11. Dealurile și depresiunile Silvaniei. Utilizarea terenurilor. 1, Teren arabil, fânețe și pășuni; 2, păduri; 3, vii și livezi; 4, localități; 5, cale ferată; 6, drumuri.

relui și cartof. Condițiile locale au favorizat dezvoltarea pomiculturii și viticulturii. În partea sudică (Halmășd, Plopiș, Bănișor, Sig, Stîrciu, Meseșeni), se conturează o zonă pomicolă în care predomină prunul, iar în cea nordică, alta, unde alături de pruni cresc meri, piersici și caiși (Nușfalău, Șimleu Silvaniei, Pericea, Crasna). În extindere continuă sînt terenurile cu viță de vie.

În sectorul zootehnic ponderea principală o dețin bovinele cu densitate de 25 capete la 100 ha teren agricol. Zonele specializate în creșterea animalelor sînt cele din depresiunile

Plopișului și Crasnei. Creșterea ovinelor este specifică așezărilor de sub Culmea Meseșului (Meseșeni de Sus, Stîrciu, Hurez, Meseșeni de Jos, Horoatu Crasnei, Bănișor), unde densitatea este de 40 — 50 ovine la 100 ha teren agricol.

Pădurile, defrișate în mare parte la sfîrșitul secolului XIX, ocupă o suprafață de 20 500 ha și reprezintă 17,9% din suprafața depresiunii.

Cu toate trăsăturile sale unitare pe ansamblu, Depresiunea Șimleului se nuanțează printr-o serie de subunități joase și de dealuri,

fiecare purtînd în fizionomie note de originalitate.

Depresiunea piemontană a Plopișului are forma unui culoar larg și asimetric situat sub nivelul piemontului din poala Munților Plopiș. Lîngă munte s-au format bazine de eroziune de obîrșie mărînd, astfel, spațiul depresionar al văii Barcăului. Depresiunea se lărgeste mult la Nușfalău, apoi este întreruptă brusc de poarta epigenetică de la Marca. Depresiunea piemontană a Crasnei, mai ramificată și mai largă decît cea a Plopișului, reprezintă ulucul central al bazinului vechi tectonic și, probabil, sectorul inițial de drenaj în suprafața piemontană primară tardidaciană. Desimea mare a așezărilor și extinderea culturilor agricole pînă pe interfluviile largi și ușor aplecate către Crasna dovedesc gradul ridicat de umanizare a depresiunii. Aici se află orașul Șimleu Silvaniei.

Orașul Șimleu Silvaniei. Orașul situat pe valea Crasnei sub Măgura Șimleului, este cunoscut din secolul XVI ca cetatea Șimleului, construită în scop de apărare împotriva turcilor. Împreună cu cele trei sate subordonate administrativ a ajuns la o populație de 17 605 de locuitori (1992). Populația activă lucrează în agricultură, industria de prelucrare a laptelui, în industria materialelor de construcție și de prelucrare a lemnului.

Către Munții Meseș, în bazinele submontane, pășunile, livezile de pruni și meri au luat locul pădurilor. Acestea se mai păstrează doar pe virfurile izolate din dealurile extinse spre vest. Amenajările de terenuri și regularizarea văilor (lacul de la Virșolt) sînt semnele trecerii către o fază de exploatare intensivă a potențialului agricol și hidrografic. Piemontul Plopișului (sau Dealurile Cosniciului, Al. Savu, 1965) formează o treaptă de relief mai joasă cu 200 — 300 m decît muntele de alături și reprezintă o asociere de interfluvii și văi paralele perpendiculare pe Barcău. Interfluviile se îngustează către munte, din cauza eroziunii regresive a afluenților mărunți, conturîndu-se aici mici lărgiri pe cale de a compune un uluc submontan : Ceriș—Tusa. Dealurile piemontane ale Bănișorului, între valea Barcăului, în vest și cea a Crasnei, în est, se apleacă de la altitudini de 350 — 400 m în vecinătatea Barcăului, pînă la 250—300 m, la contactul cu terasele Crasnei. Nivelul înalt poate fi apreciat ca „moștenire” din vechiul piemont, iar interfluviile mai coborîte pot fi socotite ca singenetice cu glaci-

surile piemontane dinspre poala Munților Meseș. Dealurile piemontane ale Meseșenilor ocupă partea estică a Depresiunii Șimleului, fiind fragmentate sub formă de interfluvii, cînd paralele, cînd convergente, care despart bazine de eroziune mai bine conturate la contactul cu muntele. Spre nord se racordează cu prispa piemontană din sudul Depresiunii Zalăului. Prezintă afinități morfologice și structurale (cueste și abrupturi sculptate pe structurile anticlinale și sinclinale Meseșeni—Aghireș—Panic), cu Dealurile Panicului, interpusse între depresiunile Șimleului și Zalăului.

Depresiunea Zalăului. Interfluviul Crasna — Zalău, marcat de o șa mai joasă prin care trece drumul de legătură dintre așezările din bazinul superior al Crasnei și municipiul Zalău, constituie limita sudică. La vest, limita este dată de culmea deluroasă care leagă măgurile Șimleului și Chilioarei, la est de Culmea Meseșului, iar la nord, de interfluviul care desparte bazinul hidrografic al Zalăului de cel al riului Sălaj. În spațiul respectiv, Zalău și-a sculptat un bazin ramificat cu precădere la poala Munților Meseș, unde s-a dezvoltat orașul Zalău. Avale de oraș se deschide un culoar larg, orientat nord-vest — sud-est, în general asimetric. La vîrsarea pîraielor Miții, Badonului și Siciului în riul Zalău apar lărgiri ale culoarului, marcate de așezări omenești mai mari (Herculean, Bocșa). Versantul nordic al depresiunii reprezintă o ripă de împingere abruptă, subminată de deplasări în masă. Valea largă a Zalăului, pe alocuri cu sărături și suprafețe mlăștinoase, contrastează cu versanții, prin culturile dominant cerealiere, prin desimea așezărilor și prezența căilor de comunicație. Pe măsura depărtării de munte, unde altitudinea reliefului se menține la 400 — 500 m, iar livezile și viile domină în peisaj, înălțimile scad treptat, încît la Bocșa ating doar 200 m, iar culturile de cereale predomină în structura agrosistemelor.

Alternanța de roci permeabile (nisipuri și pietrișuri), cu roci impermeabile (argile, marnă) și tectonica în anticlinale și sinclinale au oferit posibilitatea formării orizonturilor acvifere arteziene, importante în alimentarea cu apă a populației (I. Mac, Gr. Nuna, 1964).

În anumite etape, populația Depresiunii Zalăului a cunoscut o creștere continuă: de la 40 — 50% (1880 — 1910) la peste 50% (1930 — 1956); în prezent se înregistrează ritmuri mai ponderate, realizate în principal

pe baza sporului migratoriu (45% numai pentru Zalău) cu un spor total de până la 13%.

Așezările din depresiune sînt în general mici și mijlocii cu o populație sub 1 500 de locuitori (Cristur, Gîrceiu, Guruslău, Firminiș, Moigrad), cu funcție predominant agricolă, specializate în cultura grîului, porumbului, cartofului, sfecei de zahăr, în creșterea animalelor (cu predominarea ovinelor și bovinelor) și în pomicultură (livezile cu pomi fructiferi și viile dețin peste 4 500 ha).

Municipiul Zalău, cea mai mare localitate urbană din Dealurile Silvaniei, este localizat într-o regiune de străveche populare. La o distanță mică se află așezarea, mai întii dacică și apoi romană, Porolissum, de la Moigrad. De-a lungul existenței sale această localitate a trecut prin fazele de sat, tîrg (*oppidum*) și oraș (*civitas*). Viața economică era întemeiată pe agricultură, la care s-au adăugat comerțul și meșteșugurile. În anul 1910 populația se cifra la 8 000 de locuitori, iar în anul 1956 la 13 000 locuitori. Cel mai dinamic proces de dezvoltare începe odată cu reorganizarea administrativă din anul 1968, cînd Zalăul redevine reședință de județ. Astfel, la 5 ianuarie 1977 se înregistrau 31 235 locuitori iar în anul 1992, 68 322. Din populația angajată în diferite ramuri de activitate industriei îi revin 61,8%, agriculturii și silviculturii 8,2%, gospodăririi comunale și altor servicii 6,0%, transportului și telecomunicațiilor 6,6%, comerțului 9,2%, învățămîntului, culturii și artei 6,2%, iar restul altor ramuri. Rezultă așadar că funcția principală a orașului este industrială, urmată de cea comercială și agricolă. În același timp, localitatea își menține însemnata funcție culturală și administrativă. Orașul Zalău a cunoscut o remodelare teritorială și urbană pronunțată, iar în acest proces s-a realizat o largă platformă industrială amplasată în partea de nord a orașului, în lîncă, văii Zalăului și a afluentului său Valea Miții. Industria este orientată către producția de țevi, armături metalice, prelucrarea lemnului (fabrica de mobilă), producția de anvelope, de prelucrare a bumbacului și de prelucrare a resurselor locale (ceramică, alimentară) etc. Ritmul mediu anual de dezvoltare industrială a orașului a depășit cu mult ritmul mediu de dezvoltare pe țară.

Condițiile naturale oferă un potențial valoros pentru dezvoltarea agriculturii în zona periurbană a orașului. Suprafața agricolă totală a municipiului Zalău era în anul 1980 de 5 106 ha, din care arabilul deținea apro-

ximativ 48%, pășunile și fînețele circa 31%, iar restul era ocupat cu vii și livezi. În structura culturilor se remarcă cele de cereale, iar legumele și zarzavaturile dețin suprafețe modeste (0,8% din arabil). O însemnătate mare s-a acordat sectorului zootehnic (creșterea bovinelor pentru lapte și carne, a ovinelor și porcinelor) prin dezvoltarea unor ferme specializate. De subliniat este și importanța orașului ca nod rutier, care, prin Poarta Meseșului, alături de Poarta Sălajului, facilitează legăturile dintre Cîmpia Someșului și Depresiunea Transilvaniei, atît pe pîrîul Strîmturii și Valea Sărată către Jibou, cît și peste Culmea Meseșului spre Cluj Napoca.

Înaintările regresive ale Ortelecului, Apei Sărate, dinspre răsărit, și ale Sălajului și afluenților lui, dinspre nord, au creat curmături largi prin care trec drumurile spre acel sector al Depresiunii Silvaniei care se deschide larg către Depresiunea Baia Mare, adică spre *Depresiunea* sau *Culoarul Sălajului*. Alungirea acestei depresiuni pe direcția sud — nord, paralel cu Dealurile Sălajului care o încadrează la est și Culmea Codrului, dinspre vest, a fost determinată tectonic. Din imediata vecinătate a micului podiș suspendat de la Crișeni, păstrat ca o mărturie a vechiului nivel piemontan, valea Sălajului devine foarte adîncă. Spre nord, valea se lărgeste treptat, iar spre axa văii coboară interfluvii înguste, la început mai repede și apoi din ce în ce mai atenuat. Între ele, pe afluenții torențiali ai Sălajului, se rînduiesc mici lărgiri de eroziune, cu sau fără așezări rurale (Asuaju de Sus, Băița de sub Codru, Odești, Stremț, Oarța de Sus, Deja, Nadiș etc.). Interfluviile dinspre Culmea Codrului, mult mai prelungi și mai extinse, compun un nivel piemontan prin intermediul căruia Depresiunea Sălajului se leagă de horstul cristalin, care o alimentează cu ape numeroase și o protejează de vînturile dinspre vest. Este explicabilă așadar stepizarea mai pronunțată din cuprinsul depresiunii, reflectată de prezența pîlcurilor de gorunete și a livezilor extinse cu pomi, mai iubitori de căldură (cireș, cais, nuc). Despădurirea, în folosul extinderii terenurilor agricole, a avut și urmări nefavorabile prin înlesnirea apariției eroziunii și alunecărilor ajunse să cuprindă suprafețe însemnate. În spațiul depresiionar al Sălajului se află orașul Cehu Silvaniei (8 941 locuitori), centru agroindustrial și cultural. Localitățile rurale împînzesc depresiunea, densitatea populației fiind destul de ridicată, între 80 și 100 loc./km².

Situate între culoarele Sălajului și Someșului (Depresiunea Guruslău — I. Berindei și Ersilia Iacob, 1961), datorită netezirii culmilor principale, *Dealurile Sălajului* par să reprezinte un rest dintr-un relief de tip piemontan. Deși pietrișurile caracteristice piemontului nu au fost cert stabilite, totuși altitudinea reliefului de 300 — 350 m și netezimea culmilor racordabile cu nivelul piemontan din restul Dealurilor Silvaniei, îndreptățește considerarea lor ca atare. În latura sudică a Dealurilor Sălajului este modelat un culoar de către Apa Sărată, prin care sînt bine delimitate de Dealul Dumbrava; spre nord, relieful se apleacă treptat pînă la confundarea cu terasele Someșului de la Ulmeni și ale văii Sălajului la Ariniș.

În urma unei eroziuni regresive viguroase, afluenții Someșului, dinspre Depresiunea Guruslăului, au împins cumpăna de ape mult către vest. La obîrșile lor s-au format mici depresiuni (Șoimuș, Birsă, Domnin, Noțig), în care se ajunge pe drumurile ce urmăresc văile înguste cu numeroase strîmturi. În micile depresiuni și pe versanții mai domoli se întind ogoare și livezi, în vreme ce pe culmile deluroase netede, orientate perpendicular pe Someș domină fâgetele, asociate cu cîrpinișuri și, rar, cerete.

Dealurile și Depresiunea Sălajului prezintă trăsături comune în privința vechimii și continuității elementului uman, marea majoritate a așezărilor fiind atestate documentar între secolele XIV și XVIII. Așezările s-au dezvoltat pe aliniamente orientate aproape nord — sud, localizate fie în lărgirile de obîrșie, fie la contactul șesului aluvial cu prisma deluroasă (Ariniș, Cehu Silvaniei, Sălățiș, Bulgari, Sincraiu Silvaniei, Dobrin, Arduzel, Mînciu etc.), avînd o structură adunată sau răsfrîntă.

Peste 93% din numărul total al așezărilor se încadrează în grupa celor cu sub 1 500 locuitori (Tămășești 254, Ciuta 522, Odești 805, Noțig 822, Sălățiș 516 locuitori) și cu densitate a populației de sub 80 loc./km² (Sălățiș, Dobrin 60 — 80 loc./km², Băița de sub Codru, Bicză 60 loc./km²). În ansamblul mediului rural predomină populația feminină (53%), iar în cel urban se manifestă un oarecare echilibru.

Funcția principală a așezărilor este cea agricolă. Din totalul suprafeței agricole, arabilul deține 59,2%, pășunile și fînețele naturale 30,4%, iar viile și livezile 4,8%. Structura suprafețelor cultivate reflectă și mai preg-

nant funcția agricolă, așezările rurale fiind specializate în cultura grîului, porumbului, cartofilor și legumelor, cu ponderi însemnate și în ceea ce privește numărul bovinelor și ovinelor. Unele așezări (Băița de sub Codru) au tendințe de specializare în pomicultură.

Orașul Cehu Silvaniei. Situat în Depresiunea Sălajului a fost declarat oraș în 1968. Împreună cu cele patru sate (Horoatu Cehului, Motiș, Uleiug și Nadiș) are o populație de 8 941 locuitori (1992). Este un oraș mic cu o industrie legată de exploatarea și prelucrarea lemnului și a produselor alimentare.

În lungul Someșului, între Dealurile Sălajului, la vest și Dealurile Prisaca și Prisnel, la est, amunte de Defileul Țicău, se desfășoară Depresiunea Guruslăului cu aspect de culoar. Cea mai importantă localitate este orașul Jibou, situat în extremitatea sudică.

Orașul Jibou. Așezat pe stînga Someșului în apropiere de întîlnirea acestuia cu Agrijul, a fost declarat centru urban în 1968 și are 11 980 locuitori (1992). Este cunoscut mai ales ca nod de cale ferată (de aici desprinzîndu-se, din magistrala 4, calea ferată spre Zalău), ca centru al industriei locale și centru turistic.

Munceii izolați. Ivirile de cristalin, sub formă de măguri sau culmi scurte și înguste, pe un aliniament orientat nord — sud, a dus la recompunerea unei imagini de mediană morfostructurală în cuprinsul Dealurilor Silvaniei. Avînd altitudini ceva mai săltate față de dealurile înconjurătoare, munceii cristalini reprezintă o suprafață redusă în cuprinsul Dealurilor Silvaniei, dar peisajul aparte, impus de litologie, relief și învelișul dominant forestier, le conferă calitatea de individualități geografice între Depresiunea Silvaniei și dealurile piemontane marginale. Culmile lor netede reprezintă resturi de peneplenă exhumată. Prin versanții convecși, dar cu declivitate mare și prin glacisurile care le dau ocol se asigură trecerea spre dealurile piemontane.

Măgura Șimleului (596 m) are forma unui „muncel”, tăiat de văi adînci, între care se află creste de intersecție ramificate după evantaiul afluenților. Mai abruptă spre valea Crasnei și mai domoală către nord, măgura păstrează pe culme o suprafață netedă, considerată o „platformă de eroziune exhumată, sincronă cu cea din Mășivul Preluca” (V. Mihăilescu, 1966). În timp ce relieful neted al culmii este utilizat pentru culturi cerealiere, versantul sudic, mai abrupt,

a fost amenajat în terase și acoperit cu vii și pomi, iar cel nordic suportă păduri de gorun în amestec cu alte esențe. Acestei mici unități i se atașează Dealul Omanului (277 m) și Dealul Cehei (273 m), desprinse de Măgura Șimleului în urma adâncirii râului Crasna. Măgura Chilioarei (420 m), netedă, este doar cu puțin mai înaltă decât colinele domoale din jur. Forma alungită și văile nu prea adânci o apropie de dealurile modelate pe roci sedimentare. Păstrarea pădurilor pe creștet asigură nota de distincție față de restul reliefului. Culmea Codrului este cea mai reprezentativă din șirul înălțimilor cristaline, extinsă pe aproximativ 25 km și culminând la 580 m altitudine în vârful Lespezi. Forma arcuită, cu convexitatea în direcție vestică, o aseamănă foarte mult cu Munții Meseșului.

Spre extremități, înălțimile coboară pînă sub 450 m, iar pe laturi abrupturile trec ușor în piemonturile scurte și fragmentate care o însoțesc. Contactul dintre culme și piemonturi este marcat de limita între păduri și terenurile agricole și de numeroase așezări mici, localizate în obârșii de văi.

Culmea Codrului constituie o adevărată „barieră” în calea vînturilor de vest, lucru ce explică cantitățile mari de precipitații, peste 800 mm, și temperaturile medii anuale mai scăzute (8°C), față de depresiunile înconjurătoare (9°C). Din această culme izvorăsc o mulțime de râuri care alimentează valea Sălajului, ori se dirijează radiar spre vest, fragmentînd colinele piemontane marginale. Peisajul cu păduri de făgete și făgete cu gorunete pe margini i-a atras denumirea de „codru” sau de Culmea Făgetului ori Culmea Bicului. Peisajul forestier, fragmentarea laterală avansată, din cauza proceselor de eroziune, și pantele mai accentuate îi conferă o evidentă individualitate geografică, un muncel dominant, înrădăcinat în stiva sedimentelor groase ale colinelor piemontane înconjurătoare.

Dealurile piemontane marginale. Asupra teritoriului colinar de la vest de șirul măgurilor cristaline, literatura geografică oferă foarte puține date, dar s-a pus în evidență caracterul unitar și independent al regiunii (V. Mihăilescu, 1966) și aspectul general de suprafață netezită. Fundamentul rupt în bucăți și scufundat la adîncimi diferite se reflectă în relieful major, condiționînd bombări locale, marcate printr-un relief de „podîș” divergent. Fundamentul cristalin este acoperit de stiva

depozitelor pliocene, iar către cîmpie, de cuvertura depozitelor cuaternare. Actuala compartimentare morfologică respectă în mare pe cea tectonică, dar perfectarea ei a fost determinată de rețeaua hidrografică venită din unitățile muntoase din est. Înfățișarea actuală a reliefului este mai mult de coline și mai puțin de „podîș”. Văile mari sînt largi, cu lunci bine constituite, dar cu terase estompate care, în multe locuri, trec pe neobservate în profilul lin al versanților, supuși unui proces intens de glaciare. Cu toate că interfluviile principale se prelungesc, fără modificări de profil, în dealurile din Depresiunea Silvaniei, există, totuși, o diferențiere geografică mai pregnantă. La vest de cheile Barcăului, Crasnei și Zalăului, descendența reliefului este mult mai clară (de la 380 m pînă la 180 — 200 m în vecinătatea cîmpiei), iar desfășurarea radiară a văilor și culmilor dovedește că, după ieșirea din strînsurile cauzate de cristalin, riurile s-au despletit și au pendulat pe spații mari. În spatele cheilor, dimpotrivă, relieful a evoluat pe direcții determinate structural. Atenuarea înălțimilor este urmată de scăderea precipitațiilor spre vest (600 — 700 mm) și de diminuarea gradului de podzolire a solului. În pădurile din ce în ce mai restrînse începe să predominie stejerișul. Se observă o tendință de stepizare reflectată în structura culturilor agricole în care predomină culturile de cereale.

Între văile largi, modelate de riuri alohtone, relieful, asociat cu celelalte componente ale peisajului, oferă posibilitatea unor subdiviziări regionale.

Colinele Toglaciului, desfășurate inițial sub forma unei culmi unitare între Crasna și Barcău, se desfac, la vest de aliniamentul localităților Zalnoc—Pădureni, în tăpșane din ce în ce mai răsfricate pînă aproape de Tășnad. Aspectul de podîș ușor săltat în apropiere de Camăr trebuie pus pe seama unui simbul de cristalin ascuns. Culmea principală este împădurită, iar versanții sînt cultivați cu cereale și afectați de alunecări superficiale și de ravene. În marginea estică a culmii sînt rînduite lărgiri de obîrșie care oferă adăpost satelor Zalnoc, Dumuslău, Carastelec și Pusta. Singură, depresiunea de la Camăr, înconjurată de o cuestă, pătrunde dinspre Culoarul Barcăului în interiorul părții principale a acestei grupe de dealuri. Culoarul Barcăului, larg dar ușor asimetric prin deplasarea Barcăului spre Dealurile Toglaciului, le desparte pe

acestea de Dealurile Plopișului de la sud. Așezările, numeroase și mari, se înșiră în lungul Barcăului pe ambele părți iar între acestea s-a dezvoltat Marghita ca centru urban.

Orașul Marghita, Situat pe valea Barcăului, este menționat documentar în anul 1352. În 1992 avea o populație de 18 924 de locuitori, din care aproape jumătate este ocupată în industrie și construcții. O pondere importantă în economie o au fabrica de încălțăminte „Bihoreana”, fabrica de confecții „Marghita” și schela de foraj și extracție „Marghita”.

Dealurile Sărmășagului se desfașoară imediat la vest de Măgura Șimleului și Măgura Chilicarei (Coșeiului), între Crasnă și Valea Majei. Culmilele depresionare, dominate de lunci și terase, comunică între ele prin șaua de la Sălăjeni. În sectorul lor de maximă înălțime (348 m) prezintă trăsături asemănătoare cu Dealurile Toglaciului (334 m).

Dealurile Codrului se mențin între 180 m și 350 m, constituind o „bordură” a Culmii Codrului către Cîmpia Someșului. Reprezintă o asociere de interfluvii prelungi și văi torențiale, care mențin aceleași particularități de peisaj între valea Majei (Corund — Bogdand) și valea Homorodului. Terminația prispei piemontane (lată de 2 pînă la 10 km) este marcată de convergențele piraielor alimentate din dealuri și mai puțin din Culmea Codrului. La nord și est de mica depresiune a Homoroadelor, prispa dealurilor se restrînge foarte mult, ca apoi să recîștige dimensiuni și semnificație economică de o parte și alta a Văii Vinului. Acest compartiment din nordul Culmii Codrului poate fi denumit Piemontul Ardușului, după localitatea cea mai mare din apropiere.

În dealurile piemontane marginale s-a format o rețea bogată de așezări rurale organizată pe aliniamente cu o dezvoltare generală nord-est — sud-vest. Un prim aliniament îl formează așezările din bazinele de obîrșie ale văilor: Poiana Codrului, Cuța, Stîna (Colinele Codrului), Sighetu Silvaniei, Valea Pomilor, Bădăcin (Dealurile Sărmășagului), Camăr, Zahoc, Cehal (Colinele Toglaciului). Cel de-al doilea este aliniamentul așezărilor situate la contactul cu cîmpia (Belciug, Dobra, Săcășeni, Giorocuța, Tășnad, Cean, Pir, Mișea, Sirbi etc.). Între aceste două aliniamente se situează, pe o fișie mult mai largă, așezările

de vale care sînt de fapt cele mai numeroase: Homoroad, Hodișa, Socond, Boldă în Dealurile Codrului; Chegea, Cehăluț, Vișoara, Suiug în Dealurile Toglaciului. Aici așezările de interfluvii sînt foarte rare (Orbău, Giurtelecu Hododului).

Ca structură, așezările sînt adunate, dar mai multe sînt cele răsfirate, mai rar, risipite. Risipirea apare ca fenomen insular numai la contactul cu Munții Plopișului.

Pe categorii de mărime, predomină așezările mici și mijlocii sub 1 500 de locuitori, fără să lipsească însă și așezările mari de peste 2 000 locuitori (Belciug, Bobota, Sărmășag, Cehal, Brusturi). Aceeași variație se remarcă și în ceea ce privește densitatea populației, care este de 100—120 loc./km² în Dealurile Dornei și sub 40 loc./km² în Dealurile Codrului, cu predominarea densităților cuprinse între 40 și 80 loc./km². Creșterea densităților în sectorul Sărmășag se datorește în primul rînd exploatărilor de cărbune și industriei de exploatare și prelucrare a petrolului de la Suplacu de Barcău.

Agricultura se bazează pe ponderea mare a terenurilor arabile, 50 — 70%. Agricultura zonei piemontane marginale este profilată dominant pe cultura grîului și porumbului. Pomicultura ocupă, de asemenea, suprafețe întinse în Piemontul Tășnadului și Dealurile Codrului, unde apar și cele mai mari livezi în sistem intensiv cu meri, cași, piersici, alături de întinse suprafețe cultivate cu căpșuni (Dealurile Codrului). Viticultura găsește condiții propice de dezvoltare, astfel că viile ocupă suprafețe mari la poalele dealurilor la Chioag, Tria, Mișea, Iteu, Vișoara, Cehăluț, Dobra, Belciug pînă la Homoroad. Majoritatea așezărilor rurale sînt profilate pe cultura plantelor și creșterea animalelor, dar prezintă și unele specializări în pomicultură sau viticultură.

O trăsătură cu totul aparte a Dealurilor Silvaniei o constituie existența unor resurse energetice aflate în bazinul Barcăului și bazinul Sărmășag—Chieșd—Bobota. Bazinul carbonifer al Barcăului se impune prin zăcămintele de lignit de la Vilcelele, Valea Cerului, Ip, Zăuan-Băi, unele exploatări executîndu-se la suprafață. Producția este destinată în proporție de 75% centralelor termoelectrice. Există, de asemenea, și două stații de înobilare și brichetare a lignitului, la Voivozi și Varviz. Bazinul Sărmășag—Chieșd—Bobota, a cărui exploatare a început în prima parte a secolului XX, conține

importante rezerve de lignit cantonate în depozite pliocene.

Au fost descoperite și puse în exploatare (în 1961) și zăcămintele de țiței de la Suplacu de Barcău (țiței asphaltic) și Abrămuț (țiței parafinos). Recent au fost puse în evidență și date în exploatare, la vest și la est de Barcău, alte noi structuri petrolifere (Roșiori, Fâncica, Chișlaz, Vișoara, Foglaș, Port, Șumal, Leșmir). Prelucrarea țițeiului asphaltic se face la rafinăria de la Suplacu de Barcău.

În dealurile piemontane marginale există un centru al industriei sticlei, situat la Poiana Codrului, în dealurile cu același nume, cu o veche tradiție, specializat în obiecte artistice de o excepțională valoare artistică.

2.2.3. Dealurile Crișanei

2.2.3.1. Caracterele generale

Fișa de dealuri desfășurată fără întrerupere la periferia vestică a Munților Apuseni, începînd de la sud de valea Barcăului, pînă la Munții Zarand, urmărește fidel, ca o prispă, marginea festonată a munților, formînd acele pătrunderi adînci sub aspectul de depresiuni-golf (Depresiunea Oradea-Borod, Depresiunea Crișului Negru sau a Beiușului, Depresiunea Crișului Alb sau a Zarandului). Ca urmare a acestei poziții, puternic răsfîrîntă asupra multor elemente ale peisajului, dealurile au caracter fie de dealuri periferice, situate la extremitatea vestică a munților, fie de dealuri interne, alcătuiind relieful depresiunilor-golf, în bună parte și cu funcție intermontană (I. Berindei, 1977).

Înfățișarea lor actuală este de culmi prelungi și largi, chiar de poduri, cu altitudini de 200 — 550 m, ușor înclinate către cîmpie, ori către axa depresiunilor (V. Mihăilescu, 1966). Înclinarea generală spre vest și spre axele depresiunilor, desfășurarea divergentă și convergentă a văilor și a culmilor, prezența unor resturi de cuvertură piemontană sînt suficiente mărturii ale provenienței dealurilor dintr-un piemont de acumulare pliocen, erodat și nivelat prin procese de glacis, apoi fragmentat într-un relief deluros. Văile cuprind lunci foarte largi, începînd încă de la ieșirea riurilor din munte, deasupra cărora se desfășoară pînă la 6 nivele de terasă dispuse asimetric și în evantai. La baza tuturor frunților de terase și în mod deosebit la contactul cu luncile s-au format glacisuri întinse.

Deplasările în masă și procesele de ravenăre apar pe povirnișuri cu manifestări și intensități variate: profunde, în Dealurile Tășadului și Lugașului, superficiale în Dealurile Pădurii Craiului, Dealurile Beznei și Dealurile Codrului. Un rol deosebit în declanșarea lor îl joacă prezența marnelor și argilelor pontiene (acoperite în cea mai mare parte de nisipuri daciene) îndepărtarea vegetației forestiere și pășunatul intensiv.

Poziția lor în vestul Munților Apuseni, le expune advecției maselor de aer umed dinspre sud-vest, vest, și nord-vest, unei activități frontale intense, precum și unor reactivizări ale maselor de aer, condiții care determină scăderea treptată a temperaturii aerului și creșterea precipitațiilor de la vest spre est și dinspre axa depresiunilor spre rama muntoasă. Diferențele de temperatură dintre vatra depresiunilor și regiunile deluroase din bordură sînt în general mici, sub 2°C, iar scăderea temperaturii se face conform gradientului termic mediu vertical, ușor modificat de expoziția versanților. În schimb, scăderea temperaturilor de la vest la est, în cazul dealurilor, este mai pronunțată — peste 2°C —, depășind valoarea gradientului mediu. Temperaturile medii anuale sînt destul de ridicate pentru o regiune deluroasă, ele fiind de 10.4°C la Oradea, 9.2°C la Borod, 10.3°C la Beiuș, 9.9°C la Gurahonț, 10.5°C la Ineu, ceea ce subliniază rolul jucat de influențele vestice și sud-vestice în clima regiunii. În timpul anului, temperaturile medii lunare au un mers normal, cu un minim în ianuarie (Oradea — 2.1°C; Borod — 1.3°C; Beiuș — 1.1°C; Gurahonț — 2.5°C; Ineu — 2.2°C) și un maxim în iulie (Oradea 21.3°C; Borod 18.7°C; Gurahonț 20.1°C; Ineu 20.8°C). Temperatura medie a lunii ianuarie, mai scăzută la Oradea decît la Borod, reprezintă o abatere ușoară, condiționată de prezența în Cîmpia Crișurilor a unor inversiuni termice. De altfel, această abatere mai apare și în vetrele depresiunilor, comparativ cu dealurile, tot datorită fenomenului de inversiune termică din anotimpul rece. Dar trebuie subliniat că, în ansamblu, Dealurile Crișanei se caracterizează prin ierni blînde, datorită posibilităților frecvente de pătrundere a maselor de aer vestice și sud-vestice și poziției mai adăpostite, față de invaziile aerului polar-continental dinspre est și nord-est. Desprimăvărarea se face repede, în luna martie înregistrîndu-se valori medii de peste 4°C (Oradea 4.9°C; Gurahonț 4.9°C; Ineu 5.1°C), iar

în luna aprilie depășindu-se media anuală (Oradea 11.0°C; Gurahonț 10.7°C; Ineu 11.1°C), lunile de vară nu au temperaturi medii prea ridicate. În noiembrie și, uneori, în decembrie, sînt foarte frecvente invazii de aer cald din sectorul sud-vestic.

Deschiderea largă spre vest și reactivizarea orografică a maselor de aer pe pînîșurile Munților Apuseni explică cantitățile anuale de precipitații mai abundente decît în alte unități pericarpatiche (Oradea 635,3 mm; Aleșd, 676,0 mm; Vad 744,5 mm — pentru Culoarul Oradea — Borod; Tina 630,5 mm; circa 900 mm la contactul Dealurilor Bihorului cu regiunea montană — pentru culoarul Crișului Negru; Gurahonț 732,0 mm; Ineu 631,4 mm — pentru Depresiunea Zărandului). Luna cea mai secetoasă este martie (Oradea 34,6 mm; Aleșd 32,7 mm; Vad 33,6 mm) datorită predominării regimului anticiclonal și lipsei de convecție termică. Luna cea mai ploioasă este iunie (Oradea 82,1 mm; Aleșd 99,0 mm; Vad 114,2 mm), iar în septembrie apare al doilea minim, secundar (Oradea 42,6 mm; Aleșd 55,0 mm; Vad 57,6 mm). Activitatea ciclonică mediteraneană condiționează în luna decembrie înregistrarea celui de-al doilea maxim de precipitații (Oradea 51,5 mm; Aleșd 52,6 mm; Vad 41,3 mm; Gurahonț 50,9 mm; Ineu 50,7 mm).

De-a lungul depresiunilor apare o circulație locală fie prin canalizarea curenților din circulația generală, fie prin circulația de tip brize. Un aspect caracteristic îl reprezintă topoclimatul de adăpost, care apare cu precădere în Dealurile Bihorului și în cele ale Codrului, pus în evidență de prezența vegetației termofile.

În funcție, mai ales, de caracteristicile reliefului se întîlnesc trei situații distincte în formarea apelor freatice din regiune. În lunci apele freatice sînt cantonate în nisipurile, pietrișurile și bolovănișurile aluviale, uneori cu intercalații argiloase, la adîncimi de 1 — 1,5 m. Pe alocuri, în microdepresiuni, nivelul hidrostatic se menține aproape de suprafață, favorizînd procesele de lăcoviștire și chiar înmlăștinire. Trebuie remarcat că nu totdeauna apa mlaștinilor are legătură directă cu nivelul freatic, ea provenind din revărsarea unor pîrîiașe care nu ajung la colector (cazul afluenților văilor Topa și Holod din depresiunea intracolinară a Holodului). În glacisurile de la contactul luncilor cu treptele mai înalte nivelul hidrostatic

coboară frecvent sub 5 m adîncime. Fiind dependent de regimul precipitațiilor, nivelul maxim se produce, în general, spre sfîrșitul iernii și primăvara timpurie, imediat după topirea zăpezilor. Nivelele cele mai scăzute apar frecvent în perioada septembrie—octombrie, cînd precipitațiile sînt reduse. În dealurile piemontane sînt dezvoltate stratele acvifere de adîncime, în detrimentul celor freatice, care din cauza mantalei impermeabile de la suprafață și a fragmentării reliefului sînt slab reprezentate și situate la adîncimi de 15—25 m. Pe interfluvii largi, cu înclinare redusă, pătura de argile cuaternare contribuie la menținerea orizonturilor suprafreatice, care în condiții de precipitații mai abundente favorizează formarea excesului de apă la suprafață.

Regimul rîurilor principale se încadrează tipului pericarpatic vestic, cu varianta pluviomivală, caracterizată printr-o scurgere și debite mai timpurii primăvara și la începutul verii, datorită topirii zăpezilor și ploilor de durată și printr-o scurgere și debite minime la sfîrșitul verii și toamna. Scurgerea medie se menține între 3 și 10 l/s./km². O trăsătură specifică o constituie marea frecvență a viiturilor din sezonul de iarnă, care pot să apară în condițiile invaziei maselor de aer cald și umed, însoțite de precipitații lichide ce produc topirea bruscă a zăpezilor (I. Ujvári, 1972).

Covorul vegetal nu prezintă o etajare. În urma acțiunii factorului antropic, vegetația naturală este limitată la mici suprafețe, de obicei pe terenurile improprie agriculturii. Pe alocuri, în lunci, se mai păstrează suprafețe cu cenozele naturale primare, grupate în asociații higrofile și mezohigrofile. Vegetația dealurilor piemontane și a teraselor este puternic diversificată din cauza factorilor termici și hidrici diferențiați în funcție de expoziția versanților. Pe podurile teraselor și pe versanții însoșiți și slab înclinați apar asociațiile de evericee termofile (*Quercus frainetto* și *Q. cerris*), iar la contactul cu rama montană pe interfluvii și mai cu seamă pe versanții puternic însoșiți apar cenozele de amestec *Quercus cerris* și *Q. petraea* (P. Tudoran, 1977).

Condițiile climatice, litologice (argile, luturi argiloase) și de relief au condiționat largă răspîndire a luvisolurilor albice, pseudogleizate și pseudogleice. Pe versanții mai puternic înclinați apar soluri eu-mezobazice și soluri brune luvice, pe suprafețele unde se

manifestă acțiunea eroziunii accelerate se asociază frecvent litosolurile și regosolurile, iar în lunci sînt soluri aluviale în diferite grade de evoluție, de la cele slab solificate, pînă la cele bine dezvoltate. Pe conurile aluvio-proluviale, care parazitează luncile și care nu sînt afectate de inundații se găsesc soluri eu-mezobazice aluviale, de cele mai multe ori scheletice.

Ca și celelalte părți ale dealurilor din latura vestică a Carpaților, Dealurile Crișanei poartă urme bogate ale unei locuiri continue din vremuri îndepărtate. Între acestea, se remarcă cetățile geto-dace (davele) de la Marca, Tășad și Clit, tezaurele geto-dace (monede, podoabe și vase de argint) de la Șilindia, Dezna, Mocrea, Gura Văii etc., așezările și necropolele de la Oradea și Berindia, toate fiind datate din secolul II î. Chr. — secolulul I (S. Dumitrașcu, 1968). Din secolele II — IV sînt cunoscute vestigii ale dacilor liberi la Biharea, Tinca, Rîpa, Rohani, Cociuba Mare etc., precum și tezaurele și monedele de la Uileacu de Munte, Oradea, Haieu, Iglîța, Gurani, Chișindia etc.; secolelor IV — VII le corespund așezările daco-romane și romanice de la Biharea și Ineu. În același timp, pentru secolele VIII — XIII sînt menționate cetățile și așezările românești, întărite, de la Biharea și Oradea, acestora fiindu-le adăugate o seamă de vestigii arheologice la Oradea, Budureasa, Băița, Ștei-Lunca etc. Populația românească a rămas aproape compactă și în secolele următoare, chiar dacă în unele locuri (ca în Culoarul Oradea — Borod) au pătruns, îndeosebi în secolele XVIII și XIX, un anumit număr de locuitori unguri.

Continuitatea de locuire și popularea intensă au determinat modificări importante ale peisajului geografic prin reducerea vegetației forestiere, mai cu seamă în depresiuni, unde pădurea acoperă mai puțin de 10% din totalul suprafeței (Gr. Pop, 1980), iar terenurile agricole au ajuns la 60 — 70%, din care peste 50% terenuri arabile. Această situație a corespuns etapei în care era practică o agricultură de subzistență indiferent de potențialul productiv al terenurilor. Condițiile economico-sociale actuale au introdus, însă, schimbări fundamentale, care se reflectă în mod corespunzător în agricultura regiunii. În continuare sînt necesare schimbări în practica agricolă, în sensul trecerii, în zona piemonturilor și a depresiunilor, la creșterea animalelor pe scară mai largă. În acest scop

se impune renunțarea la cultivarea pe suprafețe mari a cerealelor în favoarea plantelor furajere (Gr. Pop, 1981 a, b)

Modificarea peisajului geografic a continuat spre sfîrșitul secolului trecut și în prima jumătate a secolului nostru prin construirea căilor ferate care urmăresc principalele riuri ce coboară din Munții Apuseni, iar în a doua jumătate a secolului prin dezvoltarea industriei, modernizarea agriculturii și schimbarea esențială a așezărilor rurale și urbane. Industria s-a dezvoltat pe seama unor resurse naturale proprii (industria extractivă a cărbunelui în Dealurile Plopișului și în Culoarul Oradea — Borod, industria ceramicii brute în depresiunile Crișului Negru și Zarandului), dar mai cu seamă prin utilizarea resurselor din spațiul montan apropiat (industria cimentului și a varului în Culoarul Oradea — Borod, industria lemnului în toate cele trei depresiuni ale Dealurilor Crișanei).

Dealurile Crișanei cuprind mai multe subunități, depresiuni sau culoare, înconjurare




Fig. 12. Dealurile (a), și depresiunile. (b), dintre Barcău și Crișul Negru.

de dealuri, adevărate prispe perimontane, derivind, aproape în întregime, dintr-un relief piemontan, grupate în Dealurile Plopișului, Culoarul Oradea—Borod, Dealurile Pădurii Craiului, Culoarul Crișului Negru (fig. 12) și Dealurile și depresiunile Crișului Alb.

și, subordonat, de cer și girniță, iar solurile sînt brune luvice pe povirnișurile văilor și brune eu-mezobazice pe interfluviile netede. Resursele subsolului sînt reprezentate, în primul rînd, prin lignit, care apare intercalat în stratele de nisipuri, argile și marne daciene




Fig. 13. Dealurile Plopișului. Distribuția și mărimea așezărilor. 1, Culmi piemontane; 2, versant prelung cu terase; 3, cueste; 4, defilee.

2.2.3.2. Dealurile Plopișului

Situate în extremitatea vestică și nord-vestică a Munților Plopiș, între Valea Barcăului și Culoarul Oradea—Borod, Dealurile Plopișului au în componența lor Dealurile Oradei, Depresiunea Brusturi, Depresiunea Popești, Dealurile Dernei și Dealurile Bistrei. Înălțimea acestor dealuri, modelate în formațiuni pliocene, este cuprinsă între 200 și 300 m. Deși nu mai păstrează urme ale unor acumulări piemontane, desfășurarea lor la poalele Munților Plopișului, caracterul deosebit de neted al interfluviilor, dubla lor înclinare — una mai domoală, către vest și alta, mai accentuată, spre Bazinul Barcăului — ar indica, totuși proveniența lor dintr-un piemont de acumulare.

Rețeaua hidrografică este nesemnificativă, fiind reprezentată prin câteva piraie, care în timpul verii seacă. Vegetația naturală se rezumă la un singur trup de pădure de gorun

din dealurile Dernei și Bistrei, la adîncimi de 30 — 300 m (Gh. Iacob, 1983). După anul 1950, alături de minele existente (Budoi), au fost deschise altele la Cuzap, Varviz—Vârșari, Vilcelele, Borumlaca și Valea Cerului, ajungîndu-se la o producție de lignit de 1,5 — 1,7 mil. t/an. Lignitul este utilizat în proporție de 80% la centrala termoelectrică de la Oradea, la întreprinderea de materiale de construcții de la Chistag, întreprinderea „Refractara” din Aștileu etc. O cantitate redusă este brichetată în instalațiile de la Voivozi și Varviz. Pentru transportul cărbunelui s-a construit, în anul 1957, calea ferată Chiribiș — Voivozi. Mai recent, au fost identificate alte zăcăminte la Dernașoara și Tria. În Dealurile Dernei, la Derna și Budoi, sînt exploatate nisipurile bituminoase (intercalate în stratele de lignit sau deasupra acestora, la adîncimi de 40 — 100 m) pentru obținerea bitumului (în instalația de preparare de la Derna) și a unor uleiuri minerale (fig. 13).

Populația Dealurilor Plopișului, cu densități mai mari în zona exploatărilor miniere (80 — 100 loc./km² pe teritoriul comunelor Derna și Popești) și a celor care au posibilități mai bune de deplasare zilnică spre Oradea (80 — 100 loc./km² la Sirbi și Spinuș) și mai mici în cele cu predominarea activităților agricole (40 — 60 loc./km² la Cetariu), a contribuit la dezvoltarea unor așezări dispuse la contactul dealurilor cu cîmpia (Cetariu, Sirbi, Spinuș, Mișca, Tăuteu etc.) sau pe văile ce pătrund în spațiul mai fragmentat al dealurilor (Uileacu de Munte, Burzuc, Brusturi, Derna, Budoi, Voievozi, Popești, Varviz, Cuzap etc.).

Profilul economic al acestor dealuri este dat de activitățile miniere și de practicarea unei agriculturi complexe, în cadrul căreia se îmbină cultura plantelor (cereale, plante de nutreț) cu creșterea animalelor (bovine). O notă aparte o prezintă, mai cu seamă în Dealurile Oradei, pomicultura (cais, piersic, vișin, cireș, măr și păr) și viticultura, aceasta din urmă făcînd parte din podgoria Oradea — Valea lui Mihai (fig. 14).

2.2.3.3. Culoarul Oradea — Borod

Drenat de Crișul Repede și afluentul său Borodul, larg deschis spre cîmpie, Culoarul Oradea — Borod este modelat în formațiunile neogene din grabenul cuprins între Munții Plopișului și Munții Pădurea Craiului. Relieful este format din două trepte: dealurile de pe marginea munților și Depresiunea Oradea — Borod, dezvoltate la nivelul teraselor. Dealurile reprezintă un relief derivat din piemonturi de acumulare, cu soluri brune eu-mezobazice tipice, cu păduri de gorun, cer și gîrniță și precipitații anuale de 700—800 mm. În cuprinsul lor se diferențiază trei sectoare: *Dealurile Lugașului*, desprinse din coasta Munților Plopiș sub forma unor culmi scurte, ușor înclinate către valea Crișului Repede, cu o altitudine de 400—500 m, au pe interfluvii urme de pietriș, ceea ce demonstrează proveniența lor dintr-un piemont de acumulare retezat de continuă adîncire și deplasare spre nord a Crișului Repede și a afluentului său Borodul (A. Posea, 1977). *Dealurile Beznei* (sau Podișul Beznei), cu un relief format din culmi netede și monotone, situate în general, la altitudinea de 400 m, au aspect de podiș. Monotonia peisajului este întreruptă de două înălțimi — Măgura Vadului (675 m), situată deasupra defileului de la Vad și Dealul


Craiului (613 m), situat la sud de pasul Piatra Craiului. Văile care fragmentează regiunea sînt largi cu povirnișuri accentuate. Și în cazul lor existența pietrișurilor și a depozitelor de argile piemontane confirmă prezența unui piemont de acumulare. *Dealurile Dobricioneștilor* se desfășoară sub Munții Pădurea Craiului, de la Defileul Crișului Repede pînă în largirea de la Virciorog. În general se înfățișează ca o prispă îngustă ce se desprinde din munte, cu o înclinare ușoară către axul culoarului (fig. 15).

Depresiunea Oradea — Borod reprezintă un relief rezultat din activitatea de eroziune și de acumulare a Crișului Repede și afluentului său Borodul, format din lunci largi, cărora li se adaugă, pe partea stîngă, 3 — 4 terase cu poduri largi dispuse în evantai mai ales în cazul Crișului Repede. Vegetația naturală care a mai rămas în urma procesului de desțelenire este reprezentată prin pajiști secundare stepizate derivate. Solurile sînt brune eu-mezobazice tipice și luvice și soluri aluviale.

Față de celelalte unități ale Dealurilor Crișene, culoarul Oradea — Borod reprezintă axa principală de legătură — rutieră și feroviară — a vestului României cu Depresiunea Transilvaniei, ceea ce a și determinat, în mare măsură, dezvoltarea sa economico-socială. La aceasta se adaugă existența în munții învecinați — Munții Pădurea Craiului și Munții Plopișului — a unor resurse însemnate de materii prime (calcare, argile refractare, bauxită, lemn etc.), iar pe cuprinsul depresiunii, pietrișurile din albia Crișului Repede și lignitul de bună calitate de la Borozel, care urmează să fie exploatat pentru aprovizionarea termocentralei Oradea II.

Imediat după anul 1950, s-a construit hidrocentrala de la Aștileu, cu o putere instalată de 5 MW, care primește apa, printr-un canal, de la Vadul Crișului, unde s-a amenajat un dig de deviere¹. La Aștileu, într-o veche fabrică de cărămidă și cărămizi refractare, s-a dezvoltat întreprinderea „Refractara”, care produce cărămizi refractare silico-aluminoase, plăci termoizolatoare, mortare de turnătorie etc. Anul 1971 a marcat

¹ În prezent, sînt în construcție avansată alte unități hidroenergetice pe Crișul Repede, în Culoarul Oradea — Borod, în 1988 fiind dată în funcțiune UHE Lugaș de Jos, cu o putere instalată de 18 MW. Amenajarea de pe acest riu va îndeplini și funcția importantă de aprovizionare cu apă a orașului Oradea.



începutul producției de ciment în partea de vest a țării prin intrarea în funcțiune a primei capacități de la combinatul de materiale de construcție Chistag, unde se realizează circa 4 mil. tone de ciment pe an, var, amendamente calcaroase și plăci ondulate din azbociment. La cele două întreprinderi mari se adaugă fabricile de ceramică pentru uz casnic de la Vadu Crișului, de mobilă și lemn impregnat (stâlpi, traverse) de la Tileagd, de covoare, construcții metalice și

pentru fuior). Partea nordică a depresiunii, care se bucură de o expunere mult mai avantajoasă, prezintă condiții favorabile pentru culturile pomiviticele (Lugașu de Jos, 12% din suprafața agricolă) (fig. 16).

În privința creșterii animalelor, Culoarul Oradea — Borod nu face notă discordantă față de alte arii cu condiții asemănătoare. Predomină bovinele, al căror număr este de peste 50 capete la 100 ha de teren agricol: Oșorhei, 92; Borod, 79; Aștileu, 73;




Fig. 15. Culoarul Oradea — Borod. Relieful, repartitia și mărimea așezărilor. 1, Terasa de luncă; 2, terasele de 7-15 și 20-25 m; 3, terasa de 55-60 m; 4, terasa de 75-90 m; 5, culmi piemontane; 6, defileul.

mobilă de la Aleșd, ca și stația de preparare a bauxitei de la Chistag.

Agricultura are condiții bune de dezvoltare mai ales în partea vestică a depresiunii, unde terenurile agricole dețin proporții însemnate — Săcădat (90%), Tețchea și Tileagd (82%), Copăcel (70%), Oșorhei (68%), Ineu și Lugașu de Jos (61%) etc., dar care se reduc spre vest — Aușeu (44%), Borod (33%), Vadu Crișului (36%) etc. Frecvența terenurilor arabile prezintă aproximativ același mers, suprafețele cele mai întinse fiind în partea vestică (Oșorhei și Săcădat 73%; Tileagd 70%; Tețchea 64% etc.), unde culturile de bază sînt cele de grâu și porumb — alături de care se mai cultivă plante furajere, plante tehnice (sfecla de zahăr, inul

Aușeu, 69; Vadu Crișului, 61; Lugașu de Jos, 57 etc. Ovinele și porcinele se situează sub media pe țară.

Întrucît în jur de 40% din populația activă este ocupată în industrie (inclusiv cea care se deplasează zilnic spre Oradea) și 35% în agricultură, rezultă că profilul actual al Culoarului Oradea — Borod este industrial-agricol, acest caracter avînd tendințe de accentuare pe măsura apariției altor activități industriale (exploatarea lignitului la Borozel, construirea hidrocentralelor de pe Crișul Repede, avale de Defileul Vadu Crișului).

În Culoarul Oradea — Borod sînt 50 de așezări rurale și una urbană (Aleșd), care însumează aproximativ 65 000 de locuitori față de 31 000 de locuitori în 1880 și 53 000

în 1910. Estul culoarului prezintă densități în general sub 50 loc./km², iar părțile centrală și vestică, densități mult mai mari: 135 loc./km² la Aleșd, 120 la Tileagd, 95 la Ineu, 97 la Oșorhei etc. La nivelul întregii depresiuni s-a înregistrat, în anul 1984, o densitate de 70 loc./km².

Orașul Aleșd. Devenit oraș în 1968; este așezat pe dreapta Crișului Repede în partea centrală a Depresiunii Oradea — Borod și

2.2.3.4. Dealurile Pădurii Craiului

Se desfășoară din bazinetul Virciorogului până în valea Meziadului și sînt sculptate în formațiuni neogene, parțial, în formațiuni permo-mezozoice (V. Mihăilescu, 1966). Culmile cu aspect de dealuri piemontane au o dispoziție divergentă spre Culoarul Oradea — Borod, Cîmpia înaltă a Miersigului și Culoarul Crișului Negru. Interfluviile sînt larg bol-




Fig. 16. Culoarul Oradea — Borod. Utilizarea terenurilor. 1, Teren agricol; 2, livezi, vii; 3, păduri; 4, căi ferate; 5, drumuri modernizate; 6, vetre de așezări.

include localitățile Pădurea Neagră, Peștiș și Tinăud, la care se adaugă comuna suburbană Aștileu (Aștileu, Călățea, Chistag și Peștere). Este menționat documentar încă din anul 1291 și în aproape întreaga sa existență a avut o funcție agricolă, modificată recent prin dezvoltarea unor activități industriale de interes local și mai cu seamă odată cu construirea întreprinderii de materiale de construcții de la Chistag, al cărei personal muncitor locuiește la Aleșd. Ca urmare a acestui fapt, populația localității a crescut repede, respectiv de la 6 371 de locuitori în 1966 la 10 842 de locuitori în 1992, an în care circa 50% din populația activă lucrează în industrie.

tite și în cuprinsul lor apar, pe alocuri, mameleane alcătuite din resturi ale depozitului piemontan inițial. Nu rare sînt cazurile, cînd au aspectul unor suprafețe cu o înclinare ușoară în sensul actual al drenajului. Totodată, datorită structurii monoclinale, unele culmi sînt asimetrice, avînd versanții sub formă de cueste sau suprafețe structurale. Altitudinea lor ajunge la 250 — 350 m, în Dealurile Tășadului, care formează cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice ale Crișului Repede și Crișului Negru (I. Berindei, 1977). Alături de această subunitate se remarcă, mai importante, dealurile: Copăcelului, Căprioarei, Cărandului, Drăgeștilor, Ceisoarei, Dobreștilor, Vălanilor și Sălătrucului.

Văile au o dispoziție radiară, sînt în general înguste, cu luncile în permanent exces de apă, defavorizînd dezvoltarea așeză-

rilor care preferă versanții sau chiar interfluviile. Pe alocuri apar însă largiri cu aspect de mici depresiuni (Ceisoara, Cotiglet ș.a.).

Poziția dealurilor are consecințe asupra climei, ce se caracterizează printr-o medie anuală a temperaturii aerului în jur de 9–10°C și o cantitate medie anuală a precipitațiilor de 700–800 mm.

Rețeaua hidrografică este reprezentată prin piraie, care, uneori, în anotimpul de vară, seacă complet. Scurgerea medie lichidă pe

în concordanță cu cea a spațiului agricol, valorile cele mai mici, în general sub 30% sau chiar sub 20% fiind caracteristice compartimentului central al dealurilor, în timp ce partea estică deține suprafețe mai însemnate pe măsură ce ne apropiem de munte. Trebuie subliniat că terenurile arabile ocupă suprafețe mari (până spre 70% sau chiar mai mult) față de condițiile naturale oferite de regiune, insistându-se pentru cultura plan-




Fig. 17. Dealurile Pădurii Craiului. Utilizarea terenurilor. 1, Teren agricol; 2, livezi, vii; 3, păduri; 4, preparare de bauxită; 5, căi ferate; 6, drumuri; 7, așezări.

povirnișuri se menține la 5–6 l/s.km². Vegetația naturală este alcătuită dominant din păduri de gorun și subordonat din păduri de cer și gîrniță, precum și din pajști stepizate – derivate și secundare. Predomină solurile brune eu-mezobazice tipice și luvice și mai ales solurile brune luvice.

Caracterul radiar al rețelei hidrografice și fragmentarea accentuată a reliefului sînt hotărîtoare pentru stabilirea aspectului general al peisajului, în prezent puternic umanizat prin activitatea agricolă. Terenurile agricole dețin, peste tot, mai mult de 50% din totalul suprafețelor, în unele locuri chiar spre 70%. Repartiția teritoriului forestier este

telor tradiționale în prea mare măsură, în dauna creșterii animalelor (fig. 17).

În prezent, industria este reprezentată doar prin prepararea bauxitei, provenită de la unitățile de exploatare din Munții Pădurea Craiului.

Rețeaua de așezări este formată din localități mici, cele mai multe preferînd povirnișurile sau interfluviile (Tășad, Poiana Tășad, Bucuroaia ș.a.). Șoseaua și calea ferată care leagă Oradea de Culoarul Crișului Negru urmăresc, în general, interfluviile, servind în bune condiții necesitățile populației pentru deplasarea spre unitățile industriale din Oradea sau Beiuș (fig. 18).




Fig. 18. Dealurile Pădurii Craiului. Relieful, repartiția și mărimea așezărilor. 1, Pienmont neted sau ondulat; 2, pietrişuri piemontane; 3, cueste; 4, defilce.

2.2.3.5. Culoarul Crişului Negru (Țara Beiuşului)

Este modelat în umplutura neogenă a grabenului cuprins între Munții Pădurea Craiului — Munții Bihorului și Munții Codru — Moma. În cuprinsul său se individualizează treapta înaltă a culoarului format din Dealurile Bihorului, Dealurile Curmăturii Criștiorului, Dealurile Vașcăului, Dealurile Tărcăiței, Dealurile Dumbrăviței, Dealurile Forăului și Dealurile Drăgotenilor, ultimele situate pe marginile depresiunilor Beiușului și Holodului.

Dealurile reprezintă un relief de culmi bombate larg, cu altitudinea cuprinsă între 250 și 350 m, derivate din piemonturi de acumulare, din care se detașează Măgura Forău (Răbăganilor), un martor de calcare mezozoice. Văile sunt largi, cu lunci extinse, iar pe versanți apar, în general, până la 6 nivele de terase, desfășurate în evantai și dispuse asimetric (fig. 19). Deschiderea largă a depresiunii spre vest permite pătrunderea maselor de aer vestice, dar dese ori în timpul iernii apar inversiuni termice. Periferia deluroasă beneficiază de un topoclimat de adăpost, ceea ce are repercusiuni în dezvoltarea vegetației termofile. Precipitațiile medii anuale însumează 700 — 1 000 mm, contribuind la alimentarea riurilor adunate în două arii de convergență: una în Depresiunea Beiu-

sului, a doua spre ieșirea Crișului Negru în cimpie, în Depresiunea Holodului. Debitul mediu al Crișului Negru la Beiuș este de 13,1 m³/s, iar la ieșirea din culoar, la Tinca, 23,6 m³/s. Regiunea fiind intens despădurită, apar doar trupuri răzlețe de păduri de gorun sau de cer și girniță.

Dealurile Bihorului (sub marginea vestică a Munților Bihor între văile Meziadului și Curmătura Criștiorului) se înfățișează sub formă de suprafețe netede, pe alocuri înguste. Văile dintre ele păstrează tiparul vechilor agestre: cele autohtone, înguste și cu povirnișuri abrupte și afectate de procese de versant. Prin *Curmătura Criștiorului*, modelată în formațiuni permo-mezozoice și mai ales neogene, se face legătura cu dealurile din Depresiunea Brad — Hălmagiu (I. Berindei, 1977).

Dealurile Vașcăului, Dealurile Tărcăiței și Dealurile Dumbrăviței se prezintă ca o prispă în lungul Munților Codru — Moma având un relief mai variat. La sud de Măgura Osoiu se desfășoară o fișie de dealuri, care, deși sunt sculptate în calcare mezozoice și prezintă evidente forme carstice, aspectul și evoluția comună cu dealurile depresiunii obligă, totuși, încadrarea lor în aria depresionară (de exemplu Dealurile Momei, după I. Berindei, 1977). Cele de la nord — Dealurile Tărcăiței — apar ca adevărate contraforturi desprinse din Munții Codrului. Interfluviile sunt fie înguste, fie larg bombate sau chiar sub formă



Fig. 19. Profil transversal prin Culoarul Crișului Negru. 1, Aluviuni; 2, pleistocen; 3, pliocen; 4, cretacic inferior; 5, jurasic; 6, triasic; 7, permian; 8, porfire; 9, riolite; 10, terase.

de suprafețe. Dealurile Dumbrăviței, pe alocuri cu forme carstice, între Valea Mare și Șoimi trec și la nord de Crișul Negru în Dealurile Forăului, până în Măgura Forău (ceea ce a impus tăierea defileului Șuncuius — Șoimi), și se leagă prin șaua largă a Dealurilor Drăgotenilor cu cele din latura nordică a Culoarului. Este foarte posibil ca în timpul formării piemonturilor prin această sa să se fi făcut drenajul Crișului Negru. Dealurile din nordul defileului, Măgura Forău și șaua deluroasă a Drăgotenilor despart depresiunile intracolinare ale Beiușului și Holodului.

Depresiunea intracolinară Beiuș este rezultatul acțiunii Crișului Negru și numeroșilor săi afluenți (Roșia, Nimăești, Crișul Pietros, Crișul Băitei), care au creat un sistem ramificat de văi cu terase și lunci. Datorită folosinței agricole a teritoriului, vegetația naturală este reprezentată numai prin pajști secundare stepizate, iar solurile mai frecvente sînt cele aluviale și subordonat luvisolurile albice și brune luvice, mai ales pe terasele medii și superioare.

Depresiunea intracolinară Holod are aspectul unui golf de cîmpie pătruns și ramificat între dealuri, în care au fost separate o luncă largă și șase nivele de terasă. Panta de scurgere redusă a Crișului Negru și a Holodului determină inundații frecvente, exces de apă, cursuri paralele și un coeficient pronunțat de meandrare.

Vegetația naturală este reprezentată în terenurile uscate prin pajști stepizate (derivate și secundare), precum și prin elemente hidrofile în luncile cu exces de apă. Solurile dominante sînt cele aluviale și lăcoviștile. Parțial, pe podurile teraselor medii și superioare apar soluri eu-mezobazice, brune luvice precum și luvisoluri albice.

Culoarul Crișului Negru. Cel mai caracteristic din cuprinsul Dealurilor Crișanei, culoarul este o străveche vatră a populației românești, despre care istoricul ungar S. Márki (1887, p. 95) arată, „în ceea ce privește Valea Crișului Negru, admit că ungurii

noștri i-au găsit acolo pe români”. Are un număr mare de așezări — anume 162 — din care patru orașe (Beiuș, Ștei, Nucet și Vașcău), opt localități componente ale orașelor și 150 localități rurale, organizate în 26 de comune.

În așezările depresiunii, dispuse altitudinal între 112 m și circa 500 m, trăiesc în jur de 120 000 de locuitori, din care 22% formează populația urbană. Cu destul de puține excepții, așezările sînt mici, mărimea medie a localităților rurale de circa 590 locuitori. Această situație este în legătură nu numai cu condițiile de relief, ci și cu forma de proprietate și tipul de economie.

Urmărirea dispunerii așezărilor permite evidențierea a două tipuri de grupări: în vatra depresiunii și în dealurile piemontane (Viorica Rusu, 1972). În primul caz, așezările își au vatra în luncă (Cheșa, Cociuba Mare etc.), la limita dintre luncă și terase (Cărăsău, Ursad, Suplacu de Tinca etc.), pe podul terasei inferioare (Ginta, Rohani, Căpilna, Rîpa, Dumbrava, Holod, Simbăta, Rieni, Petrieni etc.), pe o succesiune de terase (Tinca, Săldăbagiu Mic, Ștei etc.), la contactul dintre vatra depresiunii și deal (Talpe, Vălanii de Beiuș, Rotărești, Crîncești, Vărășeni, Răbăgani, Brătești etc.). În aria dealurilor piemontane, dispunerea așezărilor prezintă aceeași mare varietate, predominînd cele de vale (Nimăești, Curățele, Pociovaliște etc.) și de interfluvii (Teleac, Saca, Săliște de Beiuș, Stîncești, Cociuba Mică etc.). Alături de situațiile menționate apar numeroase cazuri în care vatra se întinde atît pe vale și versanți, cît și pe interfluvii, acestea avînd specifică o energie mai mare de habitat, care merge de la 30 — 50 m pînă spre 50 — 100 m. Cele mai numeroase sate sînt dispuse pe văi sau pe culmile ușor inclinate, ceea ce face ca energiile caracteristice de habitat în Depresiunea Crișului Negru să fie mai mici de 30 m (fig. 20).

Majoritatea satelor au formă liniară și se află pe văi, la contactul vetrei depresiunii cu dealurile sau cu muntele și pe interfluvii.

În cuprinsul depresiunii populația este răspândită relativ neuniform, dar așezările din vatra depresiunii, situate în general de-a

Lunca 71 loc./km² etc. Spre periferia depresiunii se înregistrează valori mult mai reduse: Budureasa 8 loc./km², Pietroasa 23, Criștioru





Fig. 20. Culoarul Crișului Negru. Relieful, repartitia și mărimea așezărilor. 1, Dealuri piemontane; 2, versanți cu terase; 3, lunca; 4, defileu.

lungul axei rutiere principale, au densități mai mari: Răbăgani 93 loc./km², Drăgănești 92, Pocola 90, Simbăta 86, Buntești 79, Pomezeeu 78, Uileacu de Beiuș 75, Holod 74,

de Jos 25, Căbești 35, Târcaia 36, Roșia 37, Șoimi 39 etc., determinate de faptul că teritoriul comunelor cuprinde spații montane întinse.

Fig. 21. Culoarul Crişului Negru. Utilizarea terenurilor. 1, Teren agricol; 2, livezi, vii; 3, păduri; 4, vetre de aşezări; 5, căi ferate; 6, drumuri.



Până cu trei—patru decenii în urmă, culoarul Crişului Negru se caracteriza, în cea mai mare parte printr-o agricultură de subsistenţă, care nu era în măsură să asigure necesităţile populaţiei, aceasta fiind obligată să coboare în Cimpia Crişurilor de unde-şi procura cereale. În vatra depresiunii terenurile agricole au o frecvenţă ridicată: Simbăta 89%, Pocola 87%, Răbăgani 86%, Căpilna 82%, Cociuba Mare 79%, Drăgăneşti 78%, Beiuş şi Holod 77%, Uileacu de Beiuş 74%, Bunteşti 72% etc. (Gr. P. Pop, 1981), iar fondul forestier deţine valori modeste: numai 4% la Simbăta, 6% la Pocola, 8% la Beiuş, Căpilna şi Pocola, 12% la Drăgăneşti, 21% la Uileacu de Beiuş). Necesarul de spaţiu

agricol a determinat extinderea terenurilor în dauna pădurii şi în spaţiul piemontan, aşa cum este cazul la Lazuri de Beiuş, Lunca, Remetea, Rieni etc. (fig. 21).

Creşterea animalelor are la bază, cu destul de puţine excepţii, numai păşunile şi fâneţele naturale, în general puţin productive, cu consecinţe în numărul redus de animale la unitatea de suprafaţă. La bovine numai într-un singur caz (Bunteşti) se înregistrează peste 100 capete/100 ha teren agricol, în timp ce în toată depresiunea numărul de animale este de 40 — 60 capete/100 ha teren agricol, chiar sub 40 capete la Beiuş, Nucet, Vaşcău, Crişioru de Jos, Lazuri de Beiuş, Pietroasa. De asemenea, numărul oilor este

scăzut. Numai în câteva localități este mai mare de 50 — 60 capete/100 ha teren agricol (Beiuș, Lazuri de Beiuș 85, Buntești și Finiș între 60 și 80). În unele sate sînt chiar sub 30 capete/100 ha teren agricol: Cărpinet, Criștioru de Jos, Dobrești, Pomezeu, Răbăgani, Uileacu de Beiuș (Gr. Pop, 1981b).

Pînă la jumătatea secolului nostru, în afara unor preocupări meșteșugărești, se poate spune că Depresiunea Crișului Negru era lipsită de industrie. Exploatarea unor resurse din spațiul montan apropiat (minereu de uraniu, lemn, marmură, minereuri de metale) a determinat apariția în anul 1956 a celor trei centre urbane din capătul sud-estic al Depresiunii Beiuș (Ștei, Nucet și Vașcău) și dezvoltarea industriei de utilaj minier, de prelucrare a lemnului și a marmurei etc. Ceva mai tîrziu, aproximativ în jurul anului 1970, a intrat în circuitul dezvoltării industriale pe scară mai largă și orașul Beiuș.

În prezent, industria este reprezentată prin fabricarea mașinilor-unelte la Beiuș (aparținînd de uzina de mașini-unelte din Oradea), a utilajului de ridicat și transportat la sol (Întreprinderea mecanică), cherestea la Ioaniș, mobilă la Beiuș și bînale la Ștei, prelucrarea marmurei la Vașcău, cărămidă și încălțăminte la Ceica, tricotaje și ambalaje din carton la Ștei etc. Industria este dispusă axial pe linia ferată și șoseaua care străbat în lung Depresiunea Crișului Negru.

În timp ce rețeaua feroviară, ce pătrunde în depresiune atît peste Dealurile Tășadului (Oradea — Holod), cît și din Cimpia Crișurilor (Ciumeghiu — Holod — Beiuș), se înfundă la Vașcău, șoseaua principală Oradea — Ceica — Beiuș — Ștei — Vașcău face legătura cu Depresiunea Brad — Hălmagiu (prin pasul Virfurile). Din ea se desfac o seamă de șosele: Simbăta — Dobrești, Beiuș — Roșia — Zece Hotare — Aleșd (peste Munții Pădurea Craiului), Beiuș — Budureasa — Stîna de Vale, Lunca — Nucet — Arieșeni — Cîmpeni (peste Munții Bihorului, prin pasul Vîrtop) și Brătești — Holod — Tinca — Salonta.

Orașul Beiuș. Situat în mijlocul depresiunii, cu același nume, la confluența Văii Nîmăiești cu Crișul Negru atît în luncă, cît și pe terasele inferioare ale celor două ape, este una dintre așezările vechi ale Bihorului, atestată documentar din anul 1270, calitatea de oraș (*oppidum*) primind-o încă din anul 1410. La 1451 a devenit oraș liber. În secole-

le XVIII — XIX are loc o intensificare a luptei de emancipare a populației românești, reflectată prin înființarea, în 1828, a gimnaziului din Beiuș și a unor societăți culturale.

În întreaga sa istorie, orașul, dezvoltat cu funcții agricole și de servicii, a fost unul dintre importanțele tîrguri ale Bihorului, unde se întîlneau produsele muntelui și ale dealului cu cele aduse din cîmpie. Funcția industrială aparține ultimelor două-trei decenii, cînd au fost înființate câteva unități cooperatiste de industrie ușoară (confecții, tricotaje, covoare, încălțăminte etc.) și au început să funcționeze o fabrică de mobilă și una de mașini-unelte, acestea contribuind la transformarea Beiușului într-un centru industrial-agrar.

Dezvoltarea sa din ultima perioadă este susținută și de modul în care a evoluat populația: 4 223 de locuitori în 1910, 8 744 în 1966 și 12 237 în anul 1992, cînd orașul, împreună cu localitatea componentă Delani, ocupa o suprafață de 24,75 km².

Orașul Ștei. A devenit oraș în anul 1956, dezvoltarea sa, pe vatra fostului sat Ștei, fiind determinată de exploatarea minereurilor de uraniu și de moliбden din munții apropiați. Ulterior au fost înființate alte unități industriale — întreprinderea de utilaj minier, reprofilită ulterior în întreprindere de utilaj de ridicat și transportat la sol o secție de ambalaje, o secție de mobilă și bînale (a întreprinderii de prelucrare lemnului Oradea), o secție de tricotaje — care conferă orașului un pronunțat caracter industrial. Dezvoltarea industriei și a serviciilor într-un ritm rapid a contribuit în mod corespunzător, la sporirea numărului de locuitori: de la numai 506 în 1910 la 5 754 în 1966 și 10 265 de locuitori în 1992.

Orașul Nucet. Așezat la poalele Munților Bihorului, pe Crișul Băiței și pe DN 76 ce trece, prin pasul Vîrtop, în valea Arieșului, a apărut după al doilea război mondial ca urmare a exploatărilor miniere din regiune, avînd rolul de loc de rezidență pentru populația minieră. Împreună cu cele două localități componente — Băița și Băița-Plai — are o populație de 2 523 de locuitori în 1992.

Orașul Vașcău. Situat în capul sud-estic al Depresiunii Crișului Negru, este amintit documentar în anul 1552 (sub numele de Nagytko, iar la 1599 sub cel de Krayova). S-a dezvoltat ca un centru polarizator al

localităților din jur, în evul mediu fiind menționată obținerea fierului, la care s-au adăugat în decursul timpului, o seamă de meșteșuguri pentru confecționarea obiectelor de îmbrăcăminte, a uneltelor agricole, a ceramicii. Olăritul, spre exemplu, este bine reprezentat și în perioada actuală în localitățile din sudul orașului (Cărpinet, Leheceeni, Săliște de Vașcău și Criștioru de Jos). În prezent în orașul Vașcău funcționează o importantă unitate de prelucrare a marmurei, care este exploatată din imediata apropiere. Împreună cu localitățile componente (Cîmp, Cîmp-Moși, Cobești, Vărzarii de Jos și Vărzarii de Sus) Vașcăul are o populație de 3 313 de locuitori (în anul 1992).

Mare — Sebiș — Beliu (direcționate sud-vest — nord-est și respectiv nord-vest — sud-est (M. Paucă, 1959) și erupțiile tortoniene și sarmatiene, care au determinat împărțirea bazinei în două compartimente. De altfel, structura tectonică a regiunii este cea care a imprimat arhitectura majoră a reliefului. Pe acest fond s-au grefat aspectele morfologice caracteristice, în fazele de modelare continentală din pliocenul superior și cuaternar cînd, sub dominanța acțiunii rețele hidrografice, a fost sculptat fără întrerupere în depozitele neogene și cuaternare, relieful actual (fig. 22).

În ansamblu, aria depresionară a Crișului Alb se caracterizează prin existența unui relief etajat între 110 și circa 400 m, în care suprafețele ocupate de dealuri și de cîmpie sînt în proporție de 65% și, respectiv, 35%. Re-




Fig. 22. Profil transversal prin Dealurile și Depresiunea Crișului Alb. 1, Cristalin; 2, eruptiv-miocen; 3, depozite pliocene; 4, depozite cuaternare; 5, depozite piemontane; 6, pădure; 7, vii; 8, teren arabil; 9, pășuni și fînețe.

2.2.3.6. Dealurile și depresiunile Crișului Alb

Vastul golf depresionar al Crișului Alb, care cuprinde, în sens mai larg, întreaga arie depresionară de subsidență mio-pliocenă dintre Munții Zarandului și Munții Codru—Moma, se deschide ca o uriașă pîlnie spre cîmpie și constituie cea mai adîncă pătrundere a cîmpiei între unitățile muntoase din vestul țării.

Bine populată, cu cîmpuri largi, cultivate pe terase și în luncă, pomi fructiferi și viță de vie pe dealurile marginale, această arie depresionară își merită pe deplin vechea denumire de „Țara Zarandului”.

Rolul hotărîtor în nașterea acestei arii coborîte l-a avut sistemul liniilor de dislocăție marginală Pincota—Cil, Camna—Mocrea, Joia

giunea este drenată de Crișul Alb și de afluentul acestuia Cigheșul, dar în timp ce Cigheșul drenează numai o parte din dealurile continuate din marginea nordică a Highișului, Crișul Alb reprezintă colectorul principal, iar valea sa o axă geografică (de convergență, de circulație) pentru întreaga unitate.

Deschiderea largă spre cîmpie (circa 50 km între extremitățile vestice ale Munților Codru—Moma și Munților Zarandului) face ca pătrunderea aspectului de cîmpie, în lungul arterelor hidrografice majore, să ajungă pînă în dreptul defileelor epigenetice de la Joia Mare (pe Crișul Alb) și de la Tauș (pe Cigheș), acolo unde riurile ies dintre dealuri în depresiunea propriu-zisă.

Prezența acestor sectoare de văi epigenetice trădează procesul general de formare a reliefului, ca urmare a adîncirii rețele hidro-

grafice în formațiunile mai vechi, prin înlăturarea formațiunilor mai noi (începînd cu cele piemontane și apoi lacustre pliocene) pe traseele inițial stabilite.

În cadrul golfului depresionar, briul dealurilor piemontane, cu altitudini ce oscilează între 200 și 400 m, are o dezvoltare simetrică și însoțește, fără întrerupere, poala Munților Codru—Moma și Zarand. Această ramă de dealuri piemontane, cu caracter de plan de racord între treapta montană și vatra depresiunii, suportă influența vecinătății munților sub cele mai diferite aspecte, limita dintre cele două unități fiind uneori greu de stabilit. Ea urmărește, în linii mari, curba de nivel de 400 m, corespunzînd în general limitei dintre depozitele neogene și rama cristalină, precum și limitei inferioare a masivelor păduroase.

În nord, contactul dintre Dealurile Codrului și munți este marcat de linia ce leagă localitățile Șoimi, Boftei, Urviș de Beliu, Groseni, Dezna, Laz, Crocna și Zimbru (situat în mici largiri de contact), de unde coboară spre sud, pe valea Zimbrului, la Gurahonț și Mădrighești.

Contactul dintre Dealurile Cigherului, mult mai extinse și Munții Zarandului urmărește linia foarte sinuoasă care unește așezările: Pincota, Măderat, Agrișu Mare, Arăneag, Nadăș, Minișu de Sus, Joia Mare (P. Cotet, 1957; P. Tudoran, 1977).

Problema stabilirii limitei vestice, spre Cîmpia Crișurilor este dificilă deoarece trecerea de la o unitate la alta se face treptat, totuși se poate recunoaște o fișie de tranziție în care se produce schimbarea particularităților factorilor geografici specifici celor două unități. Se conturează, astfel, o linie de contact pe direcția localităților Belfir, Ucuriș, Craiva, Beliu, Ineu, Moroda și Pincota (Al. Savu, 1958; P. Tudoran, 1983), corespunzător șirului măgurilor andezitice și de conglomerate vulcanice.

Între aceste limite suprafața ariei depresionare însumează circa 1 260 km², ceea ce reprezintă a șasea parte din suprafața Dealurilor Crișanei. Dacă se are în vedere că acest teritoriu este locuit de 78 500 persoane, rezultă o încărcătură umană medie de 62 loc./km².

În comparație cu limitele fizico-geografice ale golfului depresionar al Zarandului, limitele domeniului său economico-geografic cunosc o extensiune mult mai mare (circa 1 900 km²); deoarece cuprind și versanții masivelor muntoase învecinate, atrași în circuitul eco-

nomie al depresiunii. Legăturile cu regiunile învecinate se asigură, în primul rînd, printr-o rețea rutieră bine organizată, axată pe drumul național din lungul Crișului Alb (Arad — Ineu — Gurahonț — Brad — Deva), dublat de calea ferată Arad — Brad (singura de altfel) și drumurile județene modernizate Arad — Tîrnova — Șilindia — Buteni, respectiv Oradea — Beliu — Bocsig — Ineu. Din ele se desprind drumuri secundare, de importanță locală, care fie că pătrund în lungul văilor pînă în munte, fie că taie de-a curmezișul dealurile piemontane, ori subliniază contactul dintre cîmpie și dealuri, asigură legătura dintre toate părțile acestei regiuni, ca și dintre acestea și regiunile vecine.

Eroziunea din timpul cuaternarului mediu și din holocen a separat în cadrul golfului depresionar al Crișului Alb două mari trepte morfologice: a dealurilor și a cîmpiei etajate, care include și culoarul de luncă a Crișului.

Morfologie, dar și climatic și pedologic, Depresiunea Crișului Alb întrunește potențe biologice optime pentru dezvoltarea așezărilor omenești și a economiei agricole. Temperatura medie anuală este de 8 — 10° C în zona dealurilor piemontane și de 10° în Cîmpia Crișului Alb și a Cigherului, iar cantitatea precipitațiilor căzute, în medie, se ridică — datorită influenței maselor de aer oceanic — la 600 — 700 mm/an în partea joasă a depresiunii, în timp ce dealurile primesc, în medie, 700 — 800 mm/an.

Orientarea diferită a celor două masive care încadrează aria depresionară, cu versanți diferit expuși circulației frontale și advecției maselor de aer umed din vest, determină o serie de diferențieri locale în repartiția cantităților de precipitații. Invaziile frecvente de mase de aer vestice și sud-vestice fac ca iernile să fie relativ blinde (—1° C în luna ianuarie), iar verile mai răcoroase (20 — 21° C în luna iulie), amplitudinile termice medii anuale prezentînd astfel valori mai scăzute (20 — 22° C).

Ceea ce conturează imaginea geografică actuală a întregii depresiuni este alternanța suprafețelor cultivate cu cele de pășuni și fîneață și cu peticele de pădure de cer și gîrniță, de gorun și cer, iar la contactul cu munții, de carpen cu fag (fig. 22). Analiza hărților mai vechi atestă intervenții antropice puternice și permanente asupra ele-

mentelor mediului natural (începînd cu sfîrşitul secolului XVIII), astfel încît peisajul natural este slab reprezentat, întîlnit doar în sectoarele înalte ale depresiunii. Pădurile ocupă suprafeţe relativ restrînse (circa 13% din suprafaţa totală) faţă de pajiştile stepizate, utilizate ca păşuni (27%) şi terenurile arabile (48%) extinse pînă la poala munţilor.

Cea mai mare răspîndire o au solurile argiloiluviale (luvisolurile albice pseudogleizate şi planosolurile), la care se adaugă petice de soluri brune cambice, vertisoluri, soluri cernoziomoide. Acest tip predominant de sol prezintă o serie de subtipuri generate de schimbarea condiţiilor locale în care se află.

Seria genetică a solurilor argiloiluviale este specifică dealurilor Cuiedului, Codrului şi Tautului. Pe versanţii cu o înclinare mai mare din zona de contact cu muntele apar solurile brune şi cele brune luvice (podzolite în sectoarele cu un drenaj mai deficitar), iar pe suprafeţele plane ale interfluviilor, luvisolurile albice, ocupate de culturi agricole (cereale, pomi fructiferi).

Sectorul cîmpiei piemontane înalte şi al teraselor din sistemul celor două văi aparţine subdomeniului luvisolurilor albice, asociate, destul de frecvent, cu planosoluri şi soluri brune luvice.

În cîmpiile aluviale şi lunci, cu microrelief specific, determinat de divagarea Teuzului, Cigherului, apar lăcovişti frecvent solonetizate, respectiv soluri gleice. Sint prezente, de asemenea, solurile neevolute — aluviale şi protosoluri aluviale — utilizate în cultura cerealelor, ca păşuni şi fîneţe, necesitînd fertilizări şi măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor.

Cu excepţia Crişului Alb, toate riurile care drenează teritoriul golfului depresionar îşi au obîrşia pe cîina dinspre depresiune a munţilor învecinaţi, iar văile lor, la contactul dintre cele două unităţi, schiţează largiri sau mici depresiuni. Cu aspectul de culoare largi, cu lunci şi terase acoperite cu terenuri agricole reprezintă toate căi de pătrundere în munţi — spre valorificarea resurselor acestora. Avînd panta de scurgere cu valori reduse (0,1 — 0,6 m/km), albiile prezintă numeroase meandre divagante, despletiri şi pături de aluviuni suprainălţate.

Lacul de baraj de la Taut are rolul de regularizare a debitelor Cigherului şi înlăturării pericolului inundaţiilor, iar lacurile amena-

jate pentru piscicultură de la Minerău, Boesig, Ineu — alimentate cu apă de Canalul Morilor — aduc modificări substanţiale peisajului.

Aria depresionară a Crişului Alb a oferit condiţii de locuire prielnice, fapt dovedit de existenţa neîntreruptă a omului pe aceste meleaguri, încă din paleolitic (Valea Mare, Iosăşel). Numărul mare al tezaurilor monetare dacice (sec. III — I î. Ch.) descoperite la Agriş, Şilindia, Almaş, Buteni, Dezna, Dieci, Ineu etc. dovedeşte prezenţa unei populaţii dacice numeroase, o intensă circulaţie şi un grad de civilizaţie materială avansat în acea perioadă.

Potrivit atestărilor documentare, la sfîrşitul secolului XV fiinţau aproape 50% din aşezările omenşti existente azi, unele dintre acestea îndeplinind funcţia de *oppidum* (Sebiş, Taut, Dezna) sau *villa* (Pincota, Mocrea, Drauţ, Dud). Se observă că ele preferau porţiunile mai înălţate ale cîmpiei şi, în al doilea rînd, părţile joase din dealurile piemontane.

Refeaua aşezărilor se completează în secolele următoare, astfel că numărul localităţilor se cifrează în prezent la 92, din care 3 oraşe şi 89 de sate. Densitatea medie areolară de 7,3 sate/100 km² situează această arie depresionară în rîndul unităţilor naturale cu valori ale acestui indicator mult peste media ţării.

De cele mai multe ori, satele sînt fixate în lungul contactelor dintre treptele de relief şi în lungul văilor, evitînd, însă, suprafeţele expuse viiturilor. Aproape 70% din numărul acestora se află la altitudini de 110 — 200 m, frecvenţa lor fiind mai redusă la peste 200 m (fig. 23).

Mărimea medie a satelor este în jur de 880 loc./săt, dar încărcătura umană a vetrelor cunoaşte oscilaţii deosebit de mari, de la 155 locuitori (satul Clit, com. Hăşmaş) la 2 826 locuitori (Boesig), în funcţie de potenţialul natural şi economic al teritoriului respectiv, de prezenţa sau absenţa căilor de comunicaţie majore.

Evoluţia demografică în ultimii 100 de ani arată o creştere permanentă a numărului de locuitori pînă la începutul secolului XX (recensămîntul din 1910). Deceniul al doilea al secolului nostru marchează, însă, începutul unei perioade de scădere continuă a populaţiei, pe ansamblul depresiunii, astfel încît timp de 70 de ani (1910 — 1982) numărul acesteia se reduce cu 15 000, într-un ritm mediu anual de — 0,24‰. Fenomenul

se datorește, în parte, plecărilor definitive determinate de caracterul predominant agricol al economiei, dar și sporului natural foarte redus, negativ de cele mai multe ori, care nu reușește să asigure nici măcar înlocuirea fizică a fiecărui individ. În aceste

Pîncota (pentru scopuri locale); diatomită și bentonită — exploatate în cariera de la Miniș; calcare — pentru obținerea varului (Agrișu Mare, Brazi, în valea Deznei etc.); pietrișuri și nisipuri exploatate printr-o întreagă rețea de cariere și balastiere (Gurahonț,




Fig. 23. Dealurile Crișului Alb. Relieful, răspândirea și mărimea așezărilor. 1, Dealuri piemontane; 2, mături (martori) de andezit; 3, terase și glacisuri; 4, luncă; 5, defileu; 6, canale; 7, eleștee, lacuri; 8, așezări agricole; 9, agro-industriale; 10, mixte. A. Subunitățile de relief: a, Dealuri; b, depresiuni.

condiții structura populației pe grupe de vîrstă indică un tip demografic îmbătrînit.

Formațiunile geologice prezente, ce constituie fundamentul ariei depresionare, oferă foarte puține resurse: andezite — obiectul unor exploatări în cariere la Mocrea, Camna,

Răpsig, Boesig, Beliu, Hășmaș, Tirnova, Archiș, Dezna). De aceea regiunea și-a axat economia, în primul rînd, pe valorificarea resurselor solului.

În structura fondului funciar domină suprafețele arabile (48 %) și cele ocupate de pășuni

și finețe (27%), urmate de păduri (13%), vii și livezi (4%). Îmbinarea acestora, în diferite proporții, în funcție de relief și condiții climatice, dau poziția funcțional-agricolă specifică a diferitelor subunități naturale, caracterul funcțional al așezărilor prezente aici.

culturi cerealiere și creșterea animalelor. Se conturează chiar un mic areal viticol: Măderat — Mocrea, Ineu — Bocsig — Șilindia — Drauț, cu circa 1 000 ha (fig. 24).

Profilul economic al regiunii imprimă structurii populației active un anume specific, ea




Fig. 24. Dealurile Crișului Alb. Utilizarea terenurilor. 1, Teren arabil; 2, vii; 3, livezi; 4, pășuni și finețe; 5, păduri; 6, cale ferată; 7, drumuri; 8, canale; 9, elește, lacuri de acumulare; 10, balastieră; 11, andezit; 12, diatomit; 13, așezări. A. 1, Teren arabil; 2, pășuni; 3, finețe; 4, vii; 5, livezi; 6, păduri; 7, alte terenuri.

Dealurile piemontane îmbină, în general, o serie de caractere agricole de tranziție, constituind substraturi fizice propice dezvoltării pomiculturii, creșterii animalelor și chiar culturilor cerealiere și tehnice, în timp ce partea de cîmpie cu terase și luncă excelează în

fiind dominată de populația agricolă în proporție de 54,3%, în timp ce populația ocupată în ramurile productive industriale reprezintă doar 22,4%. Această din urmă grupă este constituită, în mare parte, din activii care efectuează naveta zilnică spre unitățile

industriale din Arad, dar și din personalul ocupat în industria orașelor Ineu (fabrica de mobilă, secția de tricotație), Pincota (fabrica de mobilă curbă), Sebiș (fabrica de mobilă), Boesig (fabrica de cherestea și parchet), Gurahonț (fabrica de conserve din fructe) etc.

Cele două trepte fizico-geografice — dealurile și cîmpia — departe de a fi uniforme, oferă condiții diferențiate, care permit punerea în evidență a două unități deluroase: în latura nordică, sub versantul Munților Codru-Moma, Dealurile Codrului, iar în sud Dealurile Cigherului, mai puțin uniforme, care încadrează o depresiune întinsă — Depresiunea propriu-zisă a Zarandului — cu cele două subdiviziuni bine delimitate: Depresiunea Almaș — Gurahonț, în est și Depresiunea Sebișului de la contactul cu cîmpia (fig. 23).

Dealurile Codrului. Se înfățișează ca o prispă de dealuri piemontane pe laturile vestică și sud-vestică ale Munților Codrului, o asociere de culmi netede, domoale, ușor înclinate dinspre munte spre cîmpie (care pătrunde pînă la cheile epigenetice de la Joia Mare), cu lățime ce variază între 3 și 12 km. Suprafața de netezire pliocen superioară, modelată ulterior piemontan, este puternic fragmentată de rețeaua hidrografică tipic consecventă (cu excepția văilor Văhani, Beliu și parțial Borzești), drenată de Teuz și de Crișul Alb, formînd un adevărat sistem de culmi paralele de 200 — 300 m altitudine, separate de văi largi, cu pante domoale și pe alocuri cu fragmente de terase.

Acest briu piemontan este străpuns marginal — la contactul cu vatra depresiunii — de mici măguri vulcanice andezitice (Gălău 224 m, Ușumal 284 m, Pleșa Sebișului 403 m, Berindia 363 m), care domină suprafețele aplatizate din jur și închid o serie de mici depresiuni de eroziune diferențială, despădurite și intrate în circuitul agricol al regiunii (Groșeni, Sălăjeni, Buhani, Hășmaș). Chiar dacă eroziunea puternică a determinat reducerea considerabilă a altitudinii interfluviilor, ele prezintă caractere piemontane certe (P. Coteț, 1957).

Relieful cu pante domoale și expunere favorabilă, climatul mai umed și cu temperaturi fără contraste asigură condiții ecologice optime pentru dezvoltarea pomiculturii și culturii cerealelor, iar prezența unei bogate și variate baze furajere (peste 7 000 ha) favorizează creșterea animalelor (ovine și bovine).

În bună parte împădurite (circa 40%) (mai mult decît Dealurile Cigherului), sînt, totuși, bine populate, cu un fond demografic de 14 000 de locuitori — grupați în 36 de așezări rurale, sate mici, sub 500 de locuitori, care prezintă în ultimele decenii o tendință evidentă și constantă de scădere a numărului de locuitori. În aceste condiții, densitatea populației pe ansamblul subunității ia valori mult sub media țării (37 loc./km², în anul 1982).

Dealurile Codrului se numără printre ariile cu cele mai scăzute sporuri naturale din țară, cu o populație puternic îmbătrînită. Fenomenul își găsește parțial explicația în caracterul pur agricol al regiunii, profilat pe creșterea animalelor, pomicultură și cultura cerealelor, cu un consum foarte scăzut de forță de muncă, care, în lipsa unor centre polarizatoare proprii, migrează spre așezările rurale și mai ales urbane, cu un potențial economic ridicat.

Dealurile Cigherului (Depresiunea Cigherului). Situate sub marginea nordică a Munților Zarandului, Dealurile Cigherului se prezintă ca o unitate bine delimitată, dar mult mai variată decît Dealurile Codrului și cu un accentuat grad de complexitate geografică. Morfometric se plasează în categoria regiunilor deluroase de altitudine mică, între 100 m la Moroda, la contactul cu Cîmpia Crișurilor și 400 m, chiar peste 400 m, în dealurile piemontane înalte.

Cunoscută și sub denumirea de Depresiunea Cigherului, această unitate, localizată în partea sud-vestică a Depresiunii Crișului Alb, dar separată de aceasta prin materialul eruptiv dacitic de la Miniș și cel andezitic de la Mocrea și Camna, ivit în lungul liniei de fractură Miniș — Camna — Mocrea, are numai parțial aspect de prispă deluroasă piemontană, pentru că pe de o parte din suprafața sa fragmentată ies în evidență măguri eruptive sau sedimentare, iar pe de altă parte în cuprinsul ei a fost sculptată o arie depresionară (factorul modelator principal fiind Cigherul și afluenții acestuia), extinsă pe aproape jumătate din suprafața unității, cu două trepte distincte: una piemontană, alta de terase și luncă.

Dealurile piemontane se dezvoltă pe seama depozitelor sedimentare pliocene și au aspect de culmi cu spinarea teșită, separate de văi divergente. De fapt aspectul larg ondulat, îmbătrînit — datorită maturizării versanților în bună parte despădușiți — con-

stituie una dintre principalele caracteristici ale acestora. Este pus în evidență un nivel de 250 — 300 m, pe seama căruia s-au format piemonturile de acumulare și de eroziune. Acest nivel se continuă și pe marginea munților unde formează, pe o lățime de 4—5 km, un fel de prispă de eroziune săpată în rocile dure ale Munților Highiş — Drocea.

Relieful de acumulare atestă o deplasare de la sud spre nord a cursului Cigherului, în sectorul Tauț — Moroda.

La nord de depresiunea propriu-zisă a Cigherului (copie la scară redusă a Depresiunii Zarandului) se individualizează Dealurile Cuiedului, o adevărată punte de legătură între Dealul Mocrea și Masivul Drocea, o culme largă, orientată de la nord-vest spre sud-est și puternic fragmentată, din ambele laturi, de afluenții Crișului Alb și respectiv ai Cigherului.

Spre valea Cigherului prezintă un abrupt, o cuestă, pe sub care s-au fixat câteva sate mici: Satu Mic, Șilindia, Luguzău și Camna. Caracterul puternic divergent al afluenților, Crișului, care-și împing obârșile până aproape de marginea sud-vestică a Dealurilor Cuiedului, subliniază caracterul piemontan al acestor dealuri. Despădurite în mare parte, au intrat în circuitul agricol al regiunii, condițiile climatice și de sol favorizând cultura viței de vie și a pomilor fructiferi, alături de cultura cerealelor.

La vest de valea Cigherului, în sectorul Tauț — Nadăș, dealurile piemontane se îngustează din ce în ce mai mult, pe direcția Tauț — Drauț — Arăneag, astfel încît Munții Zarandului vin în contact direct cu cîmpia piemontană printr-o denivelare de 200 — 250 m. Afluenții de pe stînga văii fragmentează puternic suprafața piemontană, dîndu-i un aspect larg vălurit, intens umanizat.

Dealurile piemontane ale Tauțului (200 — 350 m) ca și Cîmpia piemontană etajată (135 — 200 — 250 m) se impun în peisaj ca cel mai populat și mai cultivat sector al Dealurilor Cigherului, unde culturile agricole de pe interfluviile netede, cu aspect de cîmpie, pătrund pînă în munte.

Cîmpia aluvială joasă (Depresiunea Cigherului, numită și a Tauțului), ocrotită de așezări, este parțial inundabilă, cu însemnate terenuri cu exces de umiditate, datorată pantei de scurgere foarte reduse și nivelului freatic ridicat. În aceste condiții, aspectul cîmpiei a fost modificat prin crearea

unei adevărate rețele hidrografice artificiale, reprezentată prin canale de desecare — drenare; s-au ridicat diguri de remu pe malul stîng al Cigherului, iar amunte de Tauț, prin bararea văii Cigherului, a luat naștere lacul de baraj artificial Tauț, cu o suprafață de 322 ha și un volum de apă acumulat de circa 27 milioane m³.

Cu un subsol lipsit de zăcămintele, Dealurile Cigherului se conturează ca o regiune agrozoopomicolă, intens umanizată încă din secolul XV, cînd 3/4 din localitățile actuale erau deja atestate documentar. În limitele celor 430 km² trăiesc peste 24 700 de locuitori, grupați în 20 de așezări.

Mărimea medie a satelor de 950 loc./sat indică existența unor localități rurale mari, populația cărora prezintă însă o tendință evidentă de scădere, ritmul mediu anual al scăderii populației rurale coborînd, în perioada 1972 — 1982, pînă la — 9,5 %.

Orașul Pincota, așezat la poala Dealului Pincotei (230 m), la altitudinea de 110 m, este atestat documentar, ca localitate, încă la începutul secolului XIII (1202 — *villa*). Intră, totuși, în categoria orașelor mici, noi, cu caractere urbane în curs de formare. Împreună cu satul Măderat are o populație de numai 7474 de locuitori (în anul 1992).

Este un orașel cu funcții agroindustriale, cu o dezvoltare, mai ales, a industriei mici. Profilul industrial este dat de prelucrarea lemnului (în cadrul fabricii de mobilă curbată) și argilei (fabrica de cărămidă). Potențialul economic, natural și uman al așezării vor asigura, în etapele următoare, evoluția ascendentă a orașului Pincota, odată cu dinamizarea întregii vieți economico-sociale din zona polarizată.

Depresiunea Zarandului. Se reduce la culoarul larg al Crișului Alb și Teuzului, flancat la nord și la sud de formațiunile piemontane ale Dealurilor Codrului și Cigherului, între orașul Ineu — aflat la marginea cîmpiei, și defileul de la Gurahonț — prin care Crișul Alb iese din munte. Din punct de vedere geomorfologic, dar și economic, se individualizează două sectoare bine distincte: Depresiunea Gurahonț, între Defileul Joia Mare și Defileul Gurahonț — Lelese și Depresiunea Sebișului, adevărată prelungire a cîmpiei din vest, limitată de îngustarea epigenetică a văii Crișului Alb de la Joia Mare.

Depresiunea Gurahonț. Prin poziție, capătă aspectul de arie depresionară intra-

montană, dezvoltată în locul unde Munții Codru — Moma se întâlnesc cu Munții Zărandului și se face legătura, prin lărgirea de la Pleșcuța, cu Depresiunea Hălmașului. Legătura cu compartimentul vestic al „Țării Zărandului” este asigurată prin defileul de la Joia Mare. Unitară și bine individualizată geografic, are caractere locale de adevărată „țară”, cu suprafețe netede, cultivate, cu un climat de adăpost specific.

Între cele două defilee care o închid la est și la vest, de o parte și alta a văii Crișului Alb, se dezvoltă o cîmpie de acumulare în trepte, largă, simetric dispusă față de riul care a creat-o. Nivelele de terasă pot fi urmărite și în lungul afluenților Crișului, cu o evidentă tendință de convergență în amunte.

Locuitorii Depresiunii Gurahonț, intens despădurită, s-au specializat în creșterea animalelor și pomicultură, culturile cerealiere făcându-și și ele loc pe podurile interfluviiilor largi, care coboară de la 350 — 400 m altitudine la 160 m, în lunca Crișului. Alături de aceste activități economice de bază s-au dezvoltat și unele meșteșuguri legate de prelucrarea lemnului și lînii.

Trebuie subliniată prezența unor așezări omenești mari, viabile, cu o populație în continuă creștere: Gurahonț, Dieci, Almaș, alături de altele mai mici, cu tendințe permanente de scădere — în ceea ce privește evoluția indicatorilor demografici, care totalizează împreună o populație de peste 11 800 de locuitori. Vetrele satelor găsesc condiții optime de dezvoltare, atât pe interfluvii și versanții domoli, cît și în lungul văilor, pe fragmente de terase și agestre. Ele preferă, de asemenea, zonele de contact ale depresiunii cu unitățile naturale vecine.

În lipsa unor elemente active polarizatoare — orașe sau unități industriale — o bună parte a populației active se deplasează zilnic spre zona minieră Brad sau migrează definitiv spre diferite localități urbane mai apropiate sau mai depărtate.

Depresiunea Sebiș. Prezintă spre Cîmpia Crișurilor o deschidere largă, străjuită de o parte și alta de măgurile eruptive — D. Mocrea (378 m) și D. Gălălău (224 m) — ce străpung masa de sedimente. Crișul Alb și Teuzul au creat aici o cîmpie aluvionară etajată, cu altitudinea între 110 și 200 m. Lunca celor două riuri se impune atenției prin lărgimea sa deosebită (3 — 5 km), brăzdată de albiile puternic meandrate, despletite ale Crișului Alb, dar mai ales ale Teuzu-

lui. Pinza freatică superficială, situată la adîncimi mici (uneori sub 0,50 m), determină o serie de înmlăștiniri și lăcoviștiri.

Pentru îndepărtarea acestor neajunsuri au fost necesare lucrări de îndiguire și regularizare a albiilor celor două riuri și construirea unui sistem de canale locale și magistrale (Canalul Morilor) — cu rol de desecare și colectare —, care brăzdează lunca și chiar terasa de 6 — 10 m, în vederea asigurării drenajului și coborîrii orizontului freatic.

Partea înaltă a cîmpiei se prezintă sub forma unei suprafețe cu dublă înclinare: de la est spre vest și spre axul depresiunii. Nivelele de terase sînt dispuse în exclusivitate pe stînga Crișului Alb, ceea ce denotă o continuă deplasare a talvegului de la sud spre nord, sub influența unor cauze de ordin tectonic. Aici au fost identificate 6 nivele de terasă situate la 6 — 10, 15 — 20, 25 — 35, 45 — 60, 70 — 80 și 90 — 110 m altitudine relativă (P. Tudoran, 1977).

Depresiunea Sebișului, în totalitate un domeniu agricol, a suferit transformări substanțiale sub presiunea permanentă a factorului uman, prin defrișările masive din secolele XVI — XIX, organizarea rețelei rutiere și feroviare, creșterea numărului așezărilor omenești și extinderea teritorială a celor existente deja, executarea unor lucrări funciare etc. Dacă cîmpia înaltă de terase și glacisuri de acumulare este utilizată pentru cultura cerealelor și chiar pentru pomiviticultură, în partea joasă a cîmpiei predomină pășunile, finetele și pajiștile, iar unele arii cu exces de umiditate sînt amenajate pentru piscicultură (eleșteele de la Bocsig și Ineu, alimentate cu apă prin Canalul Morilor) (fig. 24).

În ultimele decenii, peisajul agricol dominant este completat cu elemente de peisaj industrial — prezente în orașele Sebiș și Ineu, precum și așezarea rurală Bocsig —, acesta din urmă oferind prin industria de prelucrare a lemnului peste 1 470 de locuri de muncă.

Așezările omenești cu structură compactă, caracteristică satelor de cîmpie, preferă zona de contact a vetrei depresiunii cu Dealurile Codrului, de asemenea contactul luncă — terasă. Sînt, în general, așezări mari, viabile, bine organizate din punct de vedere social-economic, majoritatea atestate documentar încă din secolul XV. Densitatea generală a populației este mult superioară dealurilor piemontane învecinate (87,5 loc./km²), valorile cele mai ridicate fiind înregistrate în

limitele teritoriilor administrative ale celor două orașe (Sebiș și Ineu), care dețin 50% din populația totală a Depresiunii Sebiș.

Orașul Sebiș. Deși atestat documentar în anul 1552, sub denumirea de *oppidum*, devine totuși oraș abia în anul 1968. Este un centru urban mic și foarte tânăr, situat pe dreapta Crișului Alb, de o parte și alta a văii Sebișului, la o altitudine în jur de 150 m. Totalizează, împreună cu satele componente Donceni, Prunișor și Sălăjeni, 6 926 de locuitori (1992).

Unitățile industriale sînt de importanță locală și județeană: secția de prelucrare a lemnului, secția de prelucrare și deshidratare a legumelor și fructelor, ateliere ale cooperăției etc. și ocupă peste 1 470 de activi.

Orașul Ineu. Situat în fișa de trecere a depresiunii în Cîmpia Crișului, pe ambele maluri ale Crișului Alb, la altitudinea de 110 m, polarizează în jurul său comunele Craiva, Beliu, Hășmaș, Boesig, Șilindia, Cermei — cu o populație totală de circa 30 000 de locuitori. Atestat documentar în anul 1214 — ca *villa*, localitatea se conturează în secolele următoare ca un important centru de schimb al produselor agricole, funcția comercială completînd pe cea agricolă. Reședință a comitatului Zarandului, apoi reședință de plasă și de raion (1950 — 1968), este declarat oraș în anul 1968. Împreună cu satul Mocrea — ce-i aparține din punct de vedere administrativ — Ineu a avut în anul 1992 o populație de 10 879 de locuitori. Începuturile dezvoltării industriale datează din 1875, anul înființării fabricii de mobilă „Mundus”, dar abia după 1960, intrînd în funcție o secție nouă de prelucrare a lemnului (cu producție și pentru export) și secția textilă, de tricotate, capătă o importanță industrială. În prezent are un profil economic industrial-agricol-comercial. Îndeplinește, de asemenea, și funcția de nod de cale ferată de importanță regională.

2.2.4. Dealurile Banatului

2.2.4.1. Caracterele generale

Trăsăturile fizico-geografice. Dealurile Banatului se desfășoară de la Culoarul Mureșului, în nord, pînă aproape de valea Nerei, în sud, apărînd ca o treaptă piemontană bine individualizată la marginea vestică a Mun-

ților Banatului (V. Mihăilescu, 1966). În cea mai mare parte se mențin între 200 și 300 m altitudine absolută. Valori mai mici de 200 m se găsesc în cele trei depresiuni (ale Făgetului, Brebului și Carașului), iar altitudini mai mari de 300 m apar frecvent în dealurile Lipovei, Lugojului și Buziașului. Înălțimi de peste 400 m, legate de apariția șisturilor cristaline și a rocilor eruptive, se află în Dealurile Bulzei (D. Ciordan 459 m), Dealurile Lăpugiuului (D. Săliște 518 m), Dealurile Lugojului (Măgura Surducului 496 m), Dealurile Poienii (Măgura Poienii 438 m) și Dealurile Oraviței (Tilva Mică 430 m).

Dealurile Banatului formează un ansamblu de culmi ce înclină ușor spre cîmpia de alături, de care sînt separate pe alocuri prin denivelări foarte mici, dar în general pierzîndu-se pe nesimțite în suprafața acesteia. Limita dinspre munte este marcată prin denivelări pronunțate ca urmare a diferențelor tectonice și a alcătuirii litologice dintre cele două unități: roci friabile (marne, argile, nisipuri și pietrișuri) în dealuri, roci mult mai rezistente (calcare, șisturi cristaline) în aria muntoasă. La contactul dealurilor cu munții apar depresiuni mici de contact, iar văile, micșorîndu-și panta profilului longitudinal, se lărgesc dintr-odată.

Dealurile Banatului sînt formate pe un fundament de șisturi cristaline mezo- și epimetamorfice, care apar la zi în dealurile Lugojului, Buziașului, Dognecei și Oraviței. La acestea se adaugă mase de roci eruptive cu iviri în dealurile Lipovei, Lugojului, Dognecei și Oraviței. Peste acest fundament se află calcare masive din jurasicul superior și gresii cuarțoase și argilite cretacee. Aceste formațiuni se află la zi, pe suprafețe restrînse, în Dealurile Bulzei (V. Mutihac, L. Ionesi, 1974).

După depunerea formațiunilor mezozoice a urmat o lacună de sedimentare care a ținut pînă în miocen, cînd datorită unor mișcări de afundare a început un nou ciclu de sedimentare începînd din acvitanian.

Formațiunile acvitaniene (conglomerate, gresii grosiere și argile) se găsesc numai la Soceni, localitate situată în Depresiunea Ezerișului. Depozitele tortoniene care au urmat sînt dispuse transgresiv peste termienii anteriori miocenului și afloréză în dealurile Bulzei și Lăpugiuului. Sînt formate dintr-o gamă litologică variată: breccii, conglomerate, pietrișuri, nisipuri, marne, marne argiloase, calcare și piroclastite. Sarmațianul apare la

zi pe suprafețe mai întinse în dealurile Dognecei și Oraviței reprezentat prin nisipuri, pietrișuri, argile, calcare și gresii.

Cele mai răspândite depozite din Dealurile Banatului aparțin pannonianului, alcătuit din marne, argile marnoase, nisipuri și pietrișuri care se aștern discordant peste sisturile cristaline. Cu acestea se încheie succesiunea formațiunilor sedimentare neogene, urmînd acumulările cuaternare.

Depozitele cuaternare acoperă periferia Dealurilor Banatului și pătrund în lungul râurilor, pînă în munte, ca depozite de terasă și luncă.

În Dealurile Banatului, G. Vergez-Tricom (1929) a semnalat existența mai multor suprafețe de nivelare, cea mai veche situată la 400 m altitudine absolută, retezînd masivele vechi scufundate de pe dreapta Pogănișului, spre obîșirșia Cernovățului și dintre Timiș și Mureș. Urmează alte patru nivele, cu o dezvoltare mai largă decît primul, situate la 300 m, 260 m, 250 m și 205 m care reteză depozitele friabile. Sub aceste nivele se află trei terase înalte situate la 180 — 190 m, 150 — 160 m și 130 — 140 m, care coboară pînă în cîmpie.

Cercetările mai recente efectuate în Dealurile Lipovei (E. Vespremeanu, 1972) pun în evidență existența a trei nivele morfologice situate la 400 — 500 m (platforma Deva), 350 și 300 m¹.

Fundamentul cristalin este afectat de numeroase falii cu direcția sud-sud-vest — nord-nord-est și sud-sud-est — nord-nord-vest, unele dintre acestea au înlesnit apariția magmatitelor din dealurile Lipovei, Lugojului, Dognecei și Oraviței și a izvoarelor termominerale de la Buziaș.

Falii importante au fost puse în evidență în partea de est a Dealurilor Oraviței „linia Oravița” (Gr. Răileanu și colab., 1964) în lungul căreia s-au manifestat erupțiile banatitice. Prin căderea sau ridicarea compartimentelor mărginite de falii, fundamentul cristalin a fost transformat într-un sistem de grabene și horsturi situate la diferite adîncimi. Astfel, falia Lugoj — Zărand (M. Săndulescu, 1984) a determinat ridicarea compartimentului ei estic, reprezentat prin masivul Poiana Ruscă, iar falia Buziaș — Arad ridicarea compartimentului ei vestic, care a dus la

aflorarea cristalinului de la Buziaș. Jocul pe verticală al blocurilor cristaline a influențat și grosimea inegală a depozitelor de molasă neogenă.

Rețeaua hidrografică s-a adîncit ușor în formațiunile moi de molasă, formînd adevărate golfuri care pătrund adînc în dealuri. Dintre riuri cel mai important este Timișul, în lungul căruia Cîmpia Banatului înaintează mult spre est sub numele de Cîmpia Lugojului, cu deschidere largă spre Depresiunea Caransebeșului, marcînd cea mai importantă discontinuitate geografică din dealurile bănățene (V. Mihăilescu, 1966). La nord de Cîmpia Lugojului, pînă în Culoarul Mureșului, se desfășoară Dealurile Lipovei care prezintă cea mai mare lățime din Dealurile Banatului, iar sub marginile de vest și de nord ale Munților Poiana Ruscă se întind dealurile Lăpușului și Lugojului (fig. 25). La sud de Timiș



Fig. 25. Dealurile Banatului — subunități: a, dealuri; b, depresiuni.

se află o altă grupă de dealuri, despărțite în mai multe sectoare de văi largi. Astfel, între Cîmpia Lugojului și valea Pogănișului se situează Dealurile Pogănișului, între văile Pogănișului și Carașului se desfășoară Dealurile Dognecei, iar la bordura vestică a Munților Aninei de la Caraș și pînă aproape de Nera se află Dealurile Oraviței.

¹ E. Vespremeanu (1972), *Dealurile Lipovei și Defileul Mureșului. Studiu de geomorfologie*, Rez. tezei de doctorat, Univ. din București.

Regimul climatic al Dealurilor Banatului pune în evidență efectele predominante ale circulației maselor de aer dinspre vest, sud-vest și nord-vest. Influența activității ciclonice dinspre Marea Mediterană, cu frecvente procese frontale care generează timp umed cu precipitații și încălziri locale persistente, se simte, dar într-o măsură mai mică decât în aria muntoasă din est. Valorile termice medii anuale se mențin în jur de 11°C, cu scăderi până la 9–10°C, în regiunile mai înalte ale Dealurilor Lipovei și creșteri peste 11°C în depresiuni. Precipitațiile medii anuale sînt cuprinse între 700 și 800 mm, coborînd sub 700 mm în depresiuni.

Scurgerea lichidă și cea solidă din Dealurile Banatului este uniformă. Scurgerea medie specifică are valori cuprinse între 2 și 5 l/s. km², coborînd sub 2 l/s. km² în ariile depresionare. Scurgerea medie de aluviuni în suspensie este de sub o tonă/ha/an (Atlas R. S. România, planșa V–4, 1974).

În Dealurile Banatului predomină solurile brune luvice (podzolite) și luvisolurile albice (soluri podzolice argiloiluviale). Pe șisturi cristaline se află solurile brune luvice (podzolite) și psamosolurile, iar pe magmatite solurile brune acide și andosolurile. În spațiile depresionare și în văile largi predomină solurile aluviale și protosolurile aluviale. Pe aceste soluri se află păduri de cer și gîrniță (*Quercetum brainetti* — *cerris banaticum*) și păduri de gorun cu cer. Cele mai mari suprafețe sînt ocupate de pajiști colinare secundare cu iarba vintului și păiuș roșu și terenuri agricole, terenuri agricole și pajiști secundare de fișcă, precum și terenuri agricole și pajiști secundare de sadină. Poziția Dealurilor Banatului, între munții de la est și cîmpia de la vest, s-a reflectat prin numeroase elemente de favorabilitate în desfășurarea vieții omenеști și a activității economice în această unitate deluroasă.

Populația și așezările Cercetările arheologice au dovedit că Dealurile Banatului, ca și celelalte unități naturale învecinate, au fost locuite din timpuri străvechi. Semnificative în acest sens sînt urmele culturilor materiale neolitice de la Zorlențu Mare, Oravița, Berliște etc., succedate în timp de cele din epoca bronzului, descoperite la Comorîște, Surducu Mare, Tievanu Mare, Tirol, Remetea—Pogănici etc. Pentru epoca fierului se atestă o formă superioară de organizare socială (mărturie sînt descoperirile de la Fîrlug, Remetea-Pogănici, Surducu Mare,

Vărădia, Berliște) și o dezvoltare a așezărilor și cetăților, dacice ca Arcădava de la Vărădia, Tibiscum de la Jupa, ca și cele de la Constanțin Daicoviciu (fost Găvojdia), Vrăniut, Fișez, Șistarovăț (C. Daicoviciu și colab., 1963). În perioada romană se înregistrează un salt în conturarea rețelei de așezări și în prosperitatea vieții economice, prin intensificarea unor activități preluate de la daci și organizarea de instituții și așezăminte militare, de drumuri strategice și militare și prin diferite colonizări. Toate acestea au fost identificate în localități ca: Vărădia, Milcoveni, Surducu Mare, Făget, Cricova ș.a.

Ca și în cazul regiunilor vecine, cadrul geografic al dealurilor de la sud de Mureș a oferit condiții favorabile pentru desfășurarea nestîngherită a vieții în „romaniile” bănățene, contopite mai tîrziu (sec. X) în formațiunea politico-teritorială a voievodatului lui Glad și apoi al lui Ahtum (Șt. Pascu, 1971). Anterior acestei maturizări politice (în sec. VII) își fac apariția unele populații migratoare în întreg Banatul, dintre care, în masă, slavii, asimilați de fondul românesc autohton după o lungă perioadă de conviețuire (S. Dragomir, 1944). Documentele consemnează că în prima jumătate a mileniului al doilea, sudul Banatului (incluzîndu-se o mare parte a dealurilor) era bine locuit și prezenta un stadiu avansat de activitate economică și socială, mai ales în zona Carașului și Oraviței. Între secolele XII și XV așezările românilor s-au înmulțit (mai ales în jumătatea sudică), alături de care au ființat și unele fortificații. În anul 1200 a fost menționat pentru prima dată și Comitatul regal al Carașului (care nu se suprapunea întocmai județului actual, dar cuprindea și cea mai mare parte a zonei analizate), cu cele „13 cetăți, 10 orașe (probabil *oppidum*, țiguri) și 200 de sate” (S. Dragomir, 1944). Procesul dezvoltării social-economice a cunoscut un regres în întreg ținutul sub dominația otomană (1552 — 1718), cauzat fiind de puternicele relații feudale.

La începutul secolului XVIII, teritoriul Banatului, în totalitatea lui, de la Dunăre pînă la Mureș, a trecut în stăpînirea Imperiului habsburgic. Provincia anexată a fost organizată ca un domeniu al coroanei, sub denumirea de Banatul timișan. Interesată în realizarea unor venituri cît mai mari din noua provincie, administrația imperială a inițiat o serie de măsuri pentru a mări și

diversifica economia. Astfel, și în zona de dealuri, începe să se practice creșterea viermilor de mătase (pentru care se extind suprafețele plantate cu duzi), se introduce cultura cartofului, meșteșugurile sînt încurajate și li se dă prioritate (*Județul Timiș — Monografie*, 1981). Pentru creșterea populației și implicit a veniturilor, Curtea vieneză a inițiat o vastă acțiune de colonizare cu șvabi desfășurată în trei etape: carolingeană (1718 — 1736), tereziană (1740 — 1780) și iozefiniană (1782 — 1787) (T. Simu, 1924).

Între populația autohtonă și coloniștii șvabi s-au dezvoltat relații de bună conviețuire, de eforturi comune pentru ridicarea economică și culturală a regiunii. O schimbare de structură s-a petrecut în 1778, cînd provincia a fost împărțită în comitate, după sistemul maghiar și cînd, după un an, părțile centrală, nordică și nord-vestică (adică cemitatele Caraș, Timiș și Torontal) au fost încorporate Ungariei, iar partea sudică a rămas în continuare sub administrația Vienei. Năzuințele de veacuri ale românilor de aici și din întreaga țară, de formare a cadrului național și social-economic unitar, propice dezvoltării mai rapide a forțelor de producție, s-au realizat odată cu istoricul act al Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Prin manifestările și tendințele de evoluție a populației, Dealurile Banatului s-au încadrat din totdeauna tipului regional demografic bănățean. Totuși, de-a lungul timpului s-au înregistrat și câteva particularități distincte în această privință. De pildă, colonizarea cu șvabi întreprinsă de austrieci în secolulul XVIII, în scopul remedierii situației precare a Banatului de după dominația otomană, n-a cunoscut aceeași intensitate pe întreg teritoriul. Dealurile, fiind o regiune mai populată din Banatul veacului XVIII (populația se retrăsese aici în cea mai mare parte, din pricina asupririlor), au constituit o arie de deplasare a populației către cîmpie, la contactul dintre dealuri și cîmpie, în cursul mijlociu al Carașului, în locuri de importanță minieră etc.

Sporul demografic s-a resimțit în urma imigrărilor populației din Oltenia, mai ales în ultimul secol, înălăturînd, în bună parte și scăderile numerice provocate de războaie. Dealurile de la sud de Timiș (Dealurile Oraviței, Depresiunea Carașului etc.) au reprezentat o arie de permanentă concentrare a populației. Consecința imediată a fenomenelor

demografice respective a fost creșterea populației (în ritmuri diferite de la o localitate la alta) pînă la începutul secolului XX.

După un interval de 18 ani (1930 — 1948), populația acestei grupe de dealuri a înregistrat o fază de stagnare și chiar de regres, cauzată de soldul natural negativ, din jurul Oraviței, de la nord și sud de Bocșa și din unele comune din Podișul Lipovei. Concomitent cu mișcarea naturală de mici proporții (cauzată de o serie de factori social-economici, natalitatea scăzută în centrele muncitorești, menținerea la un nivel ridicat a mortalității infantile și generale), mentalitatea populației de a face căsătorii premature și de a limita numărul moștenitorilor, ca și cele două războaie mondiale au contribuit la generarea acestui deficit.

După anul 1948, creșterea sporadică a populației s-a realizat nu atît pe seama excedentului natural, cît mai ales pe seama soldului migrator, care a manifestat tendințe de diminuare în localitățile cu profil economic mai bine conturat (Oravița, Lipova, Tomești, Margina). Diversificarea activităților economice (industriale, forestiere, agricole, specializate în pomicultură și creșterea animalelor, de transport) a sporit necesarul de forță de muncă, asigurat, în mare parte, din ariile excedentare ale Olteniei și din nord-vestul țării.

În perioada dintre ultimele două recensăminte (1966 — 1977) un număr redus de localități (circa 10%) manifestă o tendință de creștere a populației mai evidentă în cazul orașelor (Oravița și Lipova) și de proporții mai reduse pentru cîteva sate de la contactul mîlților cu Dealurile Lăpugiuului și Lugojuului (Pogănești, Baloșești, Românești) și al Podișului Lipovei cu lunca Mureșului (Lipova și Căpîlnăș). Aceleași categorii aparțin localităților Broșteni, Răchitova (ca sate componente ale orașului Oravița), Măguri și Tapia, care aparțin de municipiul Lugoj.

Satele a căror populație stagnează sînt în număr mic (4%) și mai răspîndite în Dealurile Lugojuului și Lăpugiuului (Birna, Botești, Botinești, Jurești, Tomești, Curtea).

Cea mai mare parte a așezărilor omenesti însă (86%) înregistrează o scădere a numărului de locuitori de la mai puțin de 50 pînă la peste 500 loc./sat. Între comunele cu scăderi mari, de pînă la 1 000 de locuitori, fac parte cîteva din Podișul Lipovei (Bata, Șisțarovăț, Ohaba Lungă), iar dintre cele cu scăderi moderate, de circa 500 locuitori/comună,

se remarcă majoritatea celor din Depresiunea Făget (Făget, Margina, Mănaștiur) și din grupa Dealurilor Dognecei (Ramna, Tievanu Mare).

Întrucât dealurile de la sud de râul Timiș se reduc la o fișie îngustă, numărul așezărilor se micșorează, dar tendințele de evoluție actuală a populației păstrează aceleași caracter. În general se conturează câteva areale de sate cu scăderi de peste 100 locuitori/săt: Zorlențu Mare, Zorlencior, Copăcele, Zorile din Dealurile Poienii; Vărădia, Tievanu Mic, Secășeni, Răcășdia etc. din Depresiunea Carasului ș.a.

În timp ce sporul natural a atins valori negative în anul 1966 (între -1 și $-0,02_{0/00}$), în anul 1977 a fost, în medie, de $3_{0/00}$ (mai puțin Oravița care a avut $0,7_{0/00}$); chiar dacă în unele comune s-a înregistrat peste $5_{0/00}$ (Firdea $7_{0/00}$, Copăcele $15,4_{0/00}$, Pălăniș $17,3_{0/00}$). Cît privește soldul migrator, în ambii ani de referință, prezintă valori subunitare negative pentru majoritatea așezărilor rurale, datorită slabei diversificări a activităților economice și implicit a activității și stabilității reduse a populației. Soldul total a dobîndit aceleași caracteristici fluctuante și cu valori mici, ca și sporul natural și soldul migrator.

La sfîrșitul secolului XVIII în partea colinară a Banatului densitatea medie era de 20 loc./km². Densitatea de 30 — 40 loc./km² se întîlna înprejurul orașelor, iar valoarea maximă de 47 loc./km² a fost atinsă în valea Pogănișului, la nord de Bocea.

În perioada actuală densitatea se prezintă, de asemenea, diferențiat, cu valori pînă la 20 loc./km² către contactul cu aria montană (Tievanu Mare, Pietroasa, Firdea), de 20 — 50 loc./km² în mai tot cuprinsul lor (Firlug, Zorlențu Mare etc.), 50 — 100 loc./km² în localitățile cu un potențial economic mai ridicat (Mănaștiur, Făget) și peste 100 loc./km² în orașul Oravița.

Populația Dealurilor Banatului este grupată teritorial-administrativ într-o rețea de așezări bine încheată, ce cuprinde circa 200 de sate (ceea ce le conferă un pronunțat caracter rural), și numai un singur oraș (Oravița).

¹ Orașul Lipova este așezat în Culoarul Mureșului, dar prin funcțiile sale influențează structura și evoluția multor fenomene economice și demografice din partea nord-vestică a Podișului Lipovei.

□ Așezările rurale cuprind cele două forme proprii de organizare: așezările „sezoniere”, cunoscute sub denumirea de „sălașe” și întîlnite mai freevent către zona montană și așezările permanente — satele. □

În alegerea poziției, satul a manifestat o preferință evidentă pentru văile mai evolute (Bega, Beregsău, Miniș, Pogăniș etc.), pentru contactul deal—luncă, deal—cîmpie. Dintre toate tipurile poziționale însă, tipul de vale cu variantele de obîrșie (Buzad, Comeat, în Podișul Lipovei), de fund de vale cu extindere pe versanți (Ohaba Română, Ohaba Lungă etc.), de la confluență (Stanciova, Cuvejdia, Nadăș etc.), de luncă cu extindere pe versant (Birchiș, Spata, Crivobara, în Podișul Lipovei, Firdea, Surducu Mic, în Dealurile Lugoșului, Dragomirești, Zorlencior, în Dealurile Pogănișului etc.).

Mărimea demografică și caracterele morfologice ale așezărilor variază în raport cu natura și potențialul de habitat al terenului pe care s-a organizat vatra, dar mai ales cu profilul economic, aflat în continuă diversificare. Astfel, mărimea medie a localităților rurale pe întreaga regiune este de 600 locuitori. Consecință a unei baze economice mai complexe, se întîlesc sate care au însă peste 2 000 de locuitori (Zăbrani, Coșteiu, Făget). Acestea posedă intravilanuri întinse, structuri adunat-compacte, construcții edilitare noi cu un grad sporit de confort.

Cele mai numeroase sînt satele mici, de pînă la 500 de locuitori (Secaș, Checheș, Crivobara, Vizma, Hodoș, Lucareț, Teș ș.a. din Podișul Lipovei; Lăpugiu de Jos, Baștea, Cosești, Grind din Dealurile Lăpugiuului etc.), care au o răspîndire mai mare în dealurile de la nord de Timiș. Relieful fiind mai fragmentat, mai greu accesibil și cu condiții mai puțin favorabile desfășurării activităților economice a contribuit la dispersia populației în așezări mici și foarte mici.

Cu valori peste medie sînt unele sate din Depresiunea Făget (Mănaștiur, Margina, Curtea), Depresiunea Carasului (Tievanu Mare, Vărădia), Depresiunea Brebu (Zorlențu Mare, Brebu), ce se impun tot mai mult în procesul de valorificare complexă a potențialului economic din regiune.

Cît privește fizionomia vetrelor se deosebesc două tipuri distincte: sate cu formă poligonală neregulată, întîlnite mai ales în partea centrală a Podișului Lipovei (Duboști, Terșnic, Hodoș, Coșarii), în Dealurile Bulzei (Făgetel, Mihăiești, Baștea, Lăpugiu de Jos,

Fîntoag, Grindu) și în cele ale Lugojului și Lăpușului, cu ponderea cea mai mare, și sate poligonale regulate care sînt mult mai reduse ca număr (Bethausen, Brestovăț, Remetea-Luncă, Balinț, Mănăstîr, Știuca, Pădureni ș.a.). Acestei trăsături i se asociază structura care diferențiază așezările de tip adunat, de la nord de riul Timiș și din lungul Pogănișului, Bîrzavei și Carașului (cele mai multe fiind sistematizate în a doua jumătate a secolului XVIII) de cele de tip răsfirat și mixt (adunat și răsfirat) din Dealurile Pogănișului (Zorlencior, Zorile) și Dealurile Oraviței (Jitin, Ilidia, Socolari, Potoc). Textura prezintă, de asemenea, diferențieri teritoriale, în funcție de care se deosebesc sate cu textură ordonată (cele menționate cu formă regulată), cu textură neordonată (care sînt majoritare), monostradală etc.

După funcția economică așezările rurale se includ tipurilor: pomicol-zootehnic, cu cea mai largă răspîndire; pomicol-zootehnic și cu activități forestiere (mai frecvente către limita cu muntele, în dealurile Lugojului, Lăpușului, Oraviței și în partea central-vestică a Podișului Lipovei); industrial-agricol (numai cîteva localități: Margina, Mănăstîr, Tomești); complex (Făget).

Cu implicații distincte în propulsarea vieții economice și în direcționarea deplasărilor de populație se inscriu cele două orașe Lipova și Oravița, precum și orașele mai mari din apropiere (Timișoara, Arad, Buziaș, Lugoj, Bocșa).

Incluse orașelor mici, ca număr de locuitori, Oravița își exercită influența teritorială prin unitățile economice și de servicii de care dispune, iar Lipova prin secții ale industriei constructoare de mașini, ale industriei alimentare și unități agricole de stat.

În structura actuală a rețelei de așezări se remarcă unele localități rurale cu un potențial uman și economic ridicat (Făget, Margina, Mănăstîr) și cu posibilități de a deveni, în perspectivă, centre de polarizare și influență locală, cu caracter urban. Cît privește satele foarte mici și fără acces la căile de comunicație principale, acestea trebuie implicate tot mai mult procesului de valorificare a resurselor locale.

Activitățile economice. Apariția din cele mai vechi timpuri a unor îndeletniciri cu caracter productiv, permanența și continuitatea acestora au fost stimulate de condiții

geografice favorabile, de varietatea resurselor solului și subsolului din dealuri sau din regiuni apropiate. Încă din primele decenii ale secolului XVIII se remarcă un început de progres, prin construcția unui cuptor înalt pentru topirea minereurilor de cupru, la Oravița. De la acea dată activitatea industrială s-a extins și diversificat prin apariția unor ramuri caracteristice: industria sticlei, de prelucrarea lemnului, chimică, pentru construcții de mașini, alimentară etc.

Industria construcțiilor de mașini este marcată de prezența unor secții de reparații și construcții metalice. Industria chimică este proprie comunei Margina, unde funcționează o distilerie de lemn, înființată în anul 1911. Producția sa este profilată pe distilarea lemnului, fabricarea acidului acetic și a eterilor săi folosiți ca solvenți. Se mai produc lichid antigel, gudron de fag, spumantol etc. Industria materialelor de construcții se axează, îndeosebi, pe latura extractivă, fiind condiționată de evoluția celorlalte ramuri industriale, a transporturilor etc. De menționat sînt unele balastiere din albiile rîurilor Timiș, Bega, Caraș; extracțiile de bazalt, de la Lucareț (D. Lipovei), folosit ca piatră brută cioplită sau concasată; granit de la Surducu Mare (D. Dognecei) și Brădișoru de Jos (D. Oraviței); nisip metalurgic, de la Doclin și Surduc (D. Dognecei), folosit în siderurgie la Reșița; nisip cuarțos de la Jupinești, Zolt, Gladna Montană (D. Lugojului). În cadrul industriei locale se fabrică ceramică brută (cărămizi și țigle) la Grăniceri, Ghizela, Făget, Criciova.

Industria sticlei este reprezentată de întreprinderea de sticlărie de la Tomești (înființată în anul 1820), al cărei profil este sticlăria fină de menaj (produce peste 100 de sortimente) și avea o pondere de 1,6% în cadrul ramurii pe țară. Exportă sticlărie de menaj în șapte țări: Germania, S.U.A., Franța, Austria, Olanda, Elveția și Canada.

Industria de prelucrare a lemnului se bazează în mai mică măsură pe fondul forestier local și mai mult pe cel din regiunea montană învecinată. Ca unități de prelucrare se disting fabricile de cherestea de la Mănăstîr și Făget. Industria ușoară (textilă, confecții, pielărie) întregeste profilul economic al mai multor localități (cele două orașe și cîteva comune: Făget, Vrani, Coșteiu. Industria alimentară cuprinde secții de morărit și panificație, de industrializare a laptelui și a cărnii, cazane și distilării, care

prelucrează, mai ales, produsele agricole locale și este prezentă la Oravița, Lipova, Făget, Margina etc.

În Dealurile Banatului o deosebită atenție se acordă punerii în valoare și aducerii la capacitatea integrală de producție a unor terenuri. De pildă, pe terenurile situate de-a lungul cursurilor de apă și aflate sub influența excesului de umiditate s-au executat lucrări de regularizare a albiilor, de îndiguiri și desecări (cele mai importante sînt lucrările din Depresiunea Făget, de pe teritoriul comunelor Margina, Mănăștiur, Bethausen, Ohaba Lungă, Balinț, Belinț, Traian Vuia). Amenajările pentru irigații s-au efectuat, de asemenea, tot în Depresiunea Făget (comunele Margina, Făget, Mănăștiur), avînd perspective de extindere în Dealurile Lugojului, prin crearea de acumulări de apă în sistemul Pogăniș, bazinul Glavița și amunte de Surduc. Combaterea eroziunii solului și recuperarea terenului agricol degradat include extinderea plantațiilor cu vii și pomi în bazinele Begăi (pe teritoriul comunelor Recaș, Bara, Brestovăț și Pogănișului (Zorlențu Mare, Fîrluig, Tievaniu Mare).

Agricultura Dealurilor Banatului are două ramuri bine conturate: pomicultura (suprafețele ocupate cu pomi fructiferi dețin circa 5% din totalul terenurilor agricole) și de creșterea animalelor ce are ca bază furajeră pășunile și fînețele naturale (în majoritatea comunelor dețin peste 45% din totalul terenului agricol).

Ținînd seama de rolul pomiculturii în valorificarea terenurilor slab productive din regiunea de deal s-a trecut la refacerea patrimoniului pomicol prin amenajarea primelor plantații de tip intensiv la Păltiniș și Brebu. Dezvoltarea sectorului pomicol urmărește în continuare îmbunătățirea structurii speciilor cultivate, creșterea ponderii speciilor deficitare (cum sînt cireșul, vișinul, piersicul, caisul, nucul, alunul etc.), defrișarea speciilor îmbătrînite etc. Producția pomicolă se realizează în cadrul unor bazine mari ca Brebu (prun, arbuști fructiferi) și Tievaniu Mare — Cîrnecea (prun, nuc) — fiecare cu circa 1 000 ha —, dar și a plantațiilor mai mici din Dealurile Lipovei (plantațiile din culoarul Begăi, de la Curtea, Bara, Bethausen etc.). Printre comunele pomicole din dealurile de la sud de Timiș sînt de menționat Forotie (600 ha), Ezeriș, Zorlențu Mare etc.

Gospodăriile individuale s-au constituit în asociații pomicole, între care mai importante sînt la Tievaniu Mare, Brebu, Ramna,

Ciclova Română. Materialul săditor este asigurat de pepinierele de la Caransebeș și Constantin Daicoviciu.

Tradiția și experiența bogată, condițiile naturale favorabile (între 40 și 60% pășuni și fînețe naturale din totalul terenului agricol) au determinat ca sectorul creșterii animalelor să precumpănească în economia agricolă a regiunii. În teritoriu se observă o diferențiere pe specii de animale: în Dealurile Lipovei predomină bovinele, porcinele și ovinele, pe cînd în dealurile de la sud de Timiș precumpănesc ovinele (112 capete/100 ha agricol), urmate de bovine (30 bovine/100 ha agricol) și de porcine. Dintre centrele importante de creștere a animalelor sînt de amintit: Vrani, Grădinari (pentru ovine), Bethausen, Balinț (pentru bovine), Recaș, Brestovăț (pentru porcine).

Cultura viței de vie este semnalată în majoritatea comunelor de la nord de riul Timiș, conturîndu-se chiar două podgorii: *Podgoria Recaș* (circa 1 000 ha), care cuprinde localitățile Recaș, Izvin, Petrovaselo, Stanciova, inclusiv plantațiile învecinate de la Topolovățu Mare, Cralovăț și Ianova, este situată pe versanții sudici ai Podișului Lipovei și are un potențial ridicat de producție; *Podgoria Buziaș* (circa 700 ha), una dintre cele mai cunoscute din Banat, cu o veche tradiție, se întinde pînă în comuna Darova. În dealurile de la sud de Timiș, viticultura întrunește numai în cîteva locuri condiții favorabile și cu deosebire în bazinul Tirolului.

Între culturile de cîmp predomină cerealele pentru boabe (aproape 70% din totalul suprafeței cultivate), folosite în mare parte și ca bază furajeră, și plantele de nutreț. Porumbul se situează pe primul loc între culturile de cereale, după care urmează ovăzul, orzul, secara și grîul. Suprafețe întinse dețin și plantele tehnice (înul de ulei, îndeosebi), precum și culturile de legume și cartofi, practicate în luncile rîurilor Bega, Timiș, Caraș (producții ridicate fiind obținute în comunele: Bethausen, Balinț, Ghizela, Tievaniu Mic, Tievaniu Mare etc.). Pentru asigurarea de legume timpurii și extratimpurii au fost amenajate primele sere legumicole la Oravița. Cartoful se cultivă, pe suprafețe întinse în Podișul Lipovei și în ținuturile depresionare (Făget, Brebu și Caraș). Căile de comunicație reflectă vechile drumuri comerciale, dar orientarea și structura funcțională a rețelei de căi de comunicație au fost condiționate de rolul polarizator al Timișoarei.

Teritoriul este traversat de magistrala feroviară de sud — București, Lugoj, Timișoara și de alte căi ferate care au apărut de timpuriu (Oravița — Baziaș, construită între anii 1854 și 1856 și Reșița — Bocșa — Berzovia). Mai există linii ferate cu ecartament îngust, de interes local, pe care se transportă produse agricole, materiale de construcții și alte produse industriale, precum și călători: Constantin Daicoviciu — Nădrag; Șanovița — Topolovățu Mare, Lucareț — Chizătău (care fac legătura între carierele de piatră și stațiile CFR) și linia ferată forestieră Margina — Poieni — Curtea — Pietroasa — Crivina (de la Poieni se desprinde o ramificație pe Valea Mare, în Dealurile Bulzei).

Toate aceste activități economice stau la baza clasificării funcționale a așezărilor în: așezări agricole (pomicole și creșterea animalelor), care sînt majoritare (Șiștarovăț, Ohaba Lungă, Birna, Brestovăț, Bara, Forotic etc.), așezări industrial-agricole (Margina — industria chimică, Făget, Mănăștiur — industria lemnului, Tomești — industria sticlei), agroindustriale (Jupinești, Surducu Mare), agroforestiere. Profilul economic al orașului Oravița aparține tipului funcțional „de servicii”.

2.2.4.2. Dealurile Lipovei

Unitar constituite orografic, Dealurile Lipovei sînt clar delimitate de Culoarul Mureșului, la nord, de Bega și Depresiunea Făget, la sud. Spre vest limita este dată de o denivelare de 40 — 60 m, ce se poate urmări pe linia localităților Alioș, Mașloc, Remetea Mică Bencecu de Jos și est de Ianova (V. Mihăilescu, 1966), care le separă de Cîmpia Vinșii. Spre est se îngustează simțitor. Denivelări mai pronunțate le separă de Depresiunea Ilia pe direcția Văii Mari în dreptul localității Grind. Între aceste limite, Dealurile Lipovei au o lungime de 80 km pe direcția est — vest și o lățime maximă de 20 km, fiind cea mai întinsă unitate din Dealurile Banatului.

După condițiile naturale concrete, specificul economic actual și caracterul rețelei de așezări se pot individualiza două subunități: în vest, Podișul Lipovei, în est, Dealurile Bulzei.

Podișul Lipovei. Podișul Lipovei este despărțit de Dealurile Bulzei prin valea Căpîlnașului, afluent al Mureșului. Rocile cele mai răspândite aparțin molasei neogene for-

mată dintr-o alternanță de marne, argile, nisipuri și pietrișuri care stau peste un fundament cristalin și roci sedimentare mezozoice. Acestea din urmă apar la zi pe suprafețe restrinse la nord-vest de localitatea Zăbălț și în Dealurile Bulzei. Peste formațiunile de molasă se află petice de depozite pleistocene la înălțimi de peste 300 m. Mișcările tectonice au afectat puternic fundamentul cristalin dînd naștere la numeroase falii care se întretaie și-l compartimentează în blocuri, cu consecințe în evoluția reliefului. Pe una din aceste falii apare la zi masivul de bazalte de la Lucareț — Șanovița.

Relieful Podișului Lipovei apare sub forma a două trepte ușor înclinate. Treapta înaltă, mai restrînsă, se află la altitudini absolute de peste 300 m și se desprinde din Dealurile Bulzei pentru a înainta spre vest prin înălțimile: Dealul Înalt (311 m), Cugla (318 m), Măgura (353 m) și Poienile Mălicușului (311 m), situate de-a lungul Culoarului Mureșului. Treapta mai joasă, de 200 — 300 m, este larg dezvoltată și se desfășoară periferic, dar are o extindere mai mare în sudul și vestul podișului.

Fiind supus mișcărilor de înălțare în bloc odată cu ariile muntoase vecine, rețeaua hidrografică s-a adîncit ușor în rocile friabile, dar inegal din cauza ariei de subsidență de la sud (V. Mihăilescu, 1966). Astfel, afluenții de pe dreapta ai râului Bega (Beregsău, Brestovăț, Miniș, Cladova, Topla și Pădurani), atrași de subsidența din Cîmpia Begheului, au înaintat cu obirșile regresiv pînă aproape de Culoarul Mureșului. Împingînd spre nord cumpăna de ape dintre Mureș și Bega, au creat o asimetrie generală a podișului. Văile riurilor amintite, adîncite în roci friabile, sînt largi, cu terase și cu o pantă lină spre Bega. Interfluviile, sub forma unor culmi prelungi, cu spinarea netezită, incluzînd și terasele vechi ale râului Bega, înclină ușor spre Cîmpia Lugojului. Temperaturile medii anuale ajung pînă la 10°C, iar precipitațiile sînt cuprinse între 700 și 800 mm.

În condițiile unei energii de relief de peste 100 m s-au dezvoltat numeroase așezări care, în majoritate, au un plafon altitudinal de pînă la 200 m. În funcție de locul unde sînt fixate, pot fi deosebite cîteva categorii: așezări de vale (cu subtipurile: așezări de obirșie — Buzad, Comeat; așezări în lungul văii — Sintar, Lăpușnic, Ohaba Română, Ohaba Lungă, Hitiaș, Coșarii; așezări de confluență — Secaș, Paniova, Nădaș, Stanciova, Cuvej-




Fig. 26. Dealurile Lipovei. Funcțiile așezărilor : 1, așezări agricole mixte ; 2, pomicol-zootehnice ; 3, agroindustriale. Utilizarea terenurilor : 4, terenuri arabile ; 5, pășuni și fânețe ; 6, livezi ; 7, vii ; 8, vii și livezi ; 9, păduri ; 10, marmură ; 11, bazalt ; 12, drumuri ; 13, căi ferate.

dia), așezări de versant — Vizma, Bara, Rădămănești ; așezări de interfluviu — Spata, Bunea Mică, Dubești, Bruznic, Labașinț.

Corelat cu specificul locului și respectiv cu posibilitățile de habitat, populația se grupează în așezări de mărimi diferite (fig. 26). Cele care au între 500 și 1 000 de locuitori sînt mai puțin numeroase (Herneacova, Sălciuma Nouă, Remetea Mică, Chelmac, Belotînt) și se află la contactul cu cîmpia și culoarul Mureșului. Satele cu mai puțin de 500 de locuitori reprezintă categoria cea mai răspîndită. Raportul dintre categoriile de așezări s-a schimbat foarte mult în ultimele două decenii. Involuția numerică a populației înregistrată de majoritatea localităților între ultimele două recensăminte (1966 — 1977) a dus, de exemplu, la creșterea numărului de așezări cu 500 — 750 locuitori și a celor cu sub 500 locuitori. Sate ca Ususău, Coșaru au trecut în categoria așezărilor cu 500 — 750 locuitori, iar sate ca Brestovăț, Stanciova, Bruznic, Zăbalt, Cuveidia, Șistarovăț au scăzut de la 500 — 750 și chiar peste 750 de locuitori la mai puțin de 500 de locuitori.

Cele mai mari scăderi de populație se manifestă în satele din partea centrală a podișului, însumînd, uneori, la nivel de comună, un deficit de circa 1 000 de locuitori (Brestovăț, Secaș, Bara) în perioada 1966 — 1977. Valori mai diminuate în această privință prezintă satele de la periferia podișului,

totalizîndu-se scăderi între 200 și 600 de locuitori pe comună (Birchiș, Dorgoș, Șistarovăț, Balinț etc.).

Singura localitate a cărei populație a crescut este orașul Lipova, care, împreună cu cele două sate componente de pe dreapta Mureșului, Radna și Șoimoș, a ajuns de la 11863 în 1977 la 11 993 de locuitori în 1992. Sporul este însă cu totul insuficient pentru a compensa scăderile înregistrate pe ansamblul regiunii. Avînd aceleași cauze (spor natural redus și sold migrator definitiv ridicat), cele două tendințe se manifestă și în perioada actuală.

Forma vetrei, influențată direct de particularitățile locale ale reliefului și ale rețelei hidrografice, prezintă cîteva aspecte caracteristice. Astfel, cele mai răspîndite sînt satele de formă poligonală neregulată (Bogda, Checheș, Nadăș, Crivobara, Bara, Ohaba Română, Bunea Mare, Groși etc.), amplasate, de regulă, în interiorul regiunii, la contactul dintre văile înguste și versanți. Cazuri secundare și puțin frecvente sînt formele poligonală neregulată, alungită, liniară sau triunghiulară. Primul tip se întîlnește în condițiile amplasării satelor de-a lungul văilor slab evolute (Sintar, Comeat — în cursul superior al Beregsăului, Povirgina — de pe valea Șerbenilor) și de-a lungul unor drumuri care sînt fie de importanță locală și urmăresc mici interfluvii (Spata, Pătîrș), fie de importanță majoră și urmăresc contactul deal — lunca Mureșului (Valea Mare).

Forma triunghiulară apare, de asemenea, destul de rar: Buzad, sat de obirșie, întins într-un bazin de recepție, Dubești, aflat într-o mică depresiune de eroziune, mărginită de dealurile Goinova, Ciraca și Ciraca Mare; Vizna și Crivobara situate la confluența unor cursuri secundare cu pîrîul Miniș; Belotînț și Chelmac, dezvoltate la contactul luncii Mureșului cu versantul, dar pătrunzînd pe o vale către dealurile alăturate (fig. 26).

Rezultat al desfășurării unor importante evenimente istorice (colonizările din secolul XVIII), precum și al interferențelor favorabile din fișile de contact, forma poligonală regulată este caracteristică satelor Birehiș, Ostrov, Herneacova, Brestovăț, Bethausen, etc. După structura vetrei se identifică așezări adunate, unele cu un grad avansat de compactizare (Remetea-Luncă, Cladova, Bara, Brestovăț) care sînt cele mai frecvente și așezări cu structură mixtă, adică cele care au un nucleu înconjurat de gospodării răsfrate, situație impusă de prezența unei confluențe hidrografice sau a unor suprafețe agricole în vatră (Nadăș, Bunea Mică, Bulza etc.). Uneori tendința de răsfrare se manifestă în afara vetrei prin locuințe izolate, ca în cazul așezărilor Stanciova și Checheș.

În privința profilului economic al Podișului Lipovei se constată o predominanță a activităților specifice întregului sector deluros bănățean — pomicultura și creșterea animalelor. Între localitățile cu o structură a modului de folosință elocventă a tipului de economie menționat și cu un șeptel concludent se evidențiază: Ususău, Șiștarovăț, Bara, Brestovăț, Coșarii, Lalașint, Bulza, la care suprafața pomicolă este de 5—10% și chiar peste 10% din totalul agricol, suprafața cu pășuni și finete naturale este de 20—30% și peste 30%, iar densitățile principalelor specii de animale sînt de 40 de bovine și circa 100 de ovine la 100 ha teren agricol. Acestor activități agricole de bază li se adaugă cultura viței de vie (mai ales în Dealurile Recășului), cartofului, cerealelor (îndeosebi pentru boabe) etc. (fig. 26).

Totodată, în economia Podișului Lipovei se manifestă un început de diversificare a activităților, prin implantarea unor unități industriale în orașul limitrof Lipova (fabrica de strunguri, secții de reparații metalice ș.a.) și a unor secții de importanță locală în cîteva centre de comună. Cea mai mare parte din regiune continuă să se afle în aria de in-

fluență a două mari orașe din apropiere — Arad și Timișoara.

Dealurile Bulzei. Delimitate de Podișul Lipovei prin valea Căpîlnașului și Depresiunea Ilia și prin valea Icuilui spre Dealurile Lăpugiului, aceste dealuri au altitudini de peste 400 m (D. Ciordan 459 m, Dimbul Cornului 437 m) și reprezintă sectorul cel mai înalt din Dealurile Lipovei. Față de Podișul Lipovei se deosebesc prin înălțime și prin alcătuirea geologică. Deși au o suprafață redusă, litologia lor este foarte variată. Spre Culoarul Mureșului apar calcare masive jurasice și o alternanță de gresii cuarțoase, argilite și calcarenite de vîrstă cretacic inferior. Acestea sînt acoperite discordant de depozitele friabile neogene care apar și mai la sud. Cea mai mare suprafață o ocupă, însă, andezitele și rocile piroclastice grosiere pe care se înseriu și cele mai mari înălțimi.

Morfologic, Dealurile Bulzei sînt formate din două culmi principale cu direcția nord-nord-vest — sud-sud-est, despărțite de valea adîncă a Peștișului, orientată către Mureș. Din acestea se desprind culmi secundare domoale și creste, unele dintre ele calcaroase cu procese carstice. În cuprinsul lor se pot recunoaște trei nivele morfologice (suprafața Deva la 400 — 500 m, nivelul de 350 m și nivelul de 300 m) care se succed în trepte cu extensiuni diferite (E. Vespremeanu, 1972)¹.

În condițiile unor temperaturi medii anuale de 10°C și ale unor precipitații în jur de 700 mm, cea mai mare parte a Dealurilor Bulzei sînt acoperite cu păduri de cer și gîrniță, la care se adaugă pădurile colinare de fag și carpen dinspre Culoarul Mureșului. Aceste păduri se dezvoltă pe soluri brune acide și andosoluri. În partea de sud, la altitudini mai joase, se află terenuri agricole și pajiști secundare de fișcă pe luvisoluri albice și soluri brune luvice (podzolite). Aici se găsesc și cele cîteva localități — Bulza, Groși, Nemeșești, Coșteiu de Sus și Fintoag —, a căror populație valorifică aceste resurse naturale (fig. 26). Printre Dealurile Bulzei și Dealurile Lăpugiului, urmînd Valea Mare și valea Icuilui, trece calea ferată Lugoj — Deva și tot pe aici, dar trecînd prin pîsul Coșevița (321 m), își are traseul șoseaua națională Lugoj — Deva.

¹ E. Vespremeanu (1972), *op. cit.*

2.2.4.3. Dealurile Lăpugiuului și Lugojuului

Se desfășoară sub forma unui arc care înconjură spre nord-vest Munții Poiana Ruscă, între localitățile Dumbrăvița și Maciova. Din această unitate deluroasă face parte și Depresiunea Făget, care se dezvoltă de o parte și alta a râului Bega.

Datorită diferențierilor litologice, contactul dintre dealuri și munte este pregnant înscris în relief. În partea de nord-vest, în general, limita urmează linia localităților Dumbrăvița, Bujoru, Roșcani (pe valea Dobrii), Crivina de Sus (pe valea Bega Poienilor), Tomești (pe valea Bega Luncanilor), Gladna Română și Hăuzești. Mai departe limita se îndreaptă spre sud, pînă la localitatea Maciova, iar dealurile se îngustează treptat. În acest sector nu sînt localități pentru a putea fi luate ca puncte de reper pentru limita deal — munte, dar aceasta se înscrie pe o denivelare destul de evidentă.

Spre Culoarul Mureșului, limita urmează linia localităților Rădulești, Făgețel și Lăpugiu de Jos, iar, în continuare, spre Dealurile Bulzei, trece pe la localitatea Holdea, apoi urmează, spre vest, pîrîul Ieui pînă la Nemeșești din Depresiunea Făget. Pe linia Nemeșești și Cutina (pe valea Cladova), Depresiunea Făget se mărginește, în nord, cu Podișul Lipovei. Către Cîmpia Lugojuului limita se află pe linia localităților Cutina, Tapia, Cireșu, Jdioara, Tincova și Maciova.

Fundamentul dealurilor Lăpugiuului și Lugojuului este alcătuit din sisturi cristaline puternic faliolate și compartimentate în blocuri. Ele apar la zi în bazinele pîraielor Săraz și Surduc (N. Gherasi și colab., 1968). Depozitele sedimentare mai vechi aparțin cretacicului și sînt reprezentate prin calcare marine, gresii și marne, în partea de sud și numai gresii și marne cu inocerami spre Culoarul Mureșului, la vest de Valea Dobrei. Cele mai răspîndite roci aparțin neogenului și sînt reprezentate prin argile, pietrișuri și marne argiloase tortoniene, care apar la zi între Ieui și Bega Poienilor, apoi prin pietrișuri, nisipuri și argile paunoniene, rocile cele mai răspîndite.

Rețeaua hidrografică a fragmentat puternic aceste roci formînd culmi rotunjite sau netezite care ajung pînă aproape de 500 m altitudine absolută în formațiunile geologice mai dure. Rîurile mai mari și-au format terase și lunci largi care oferă condiții favorabile dezvoltării așezărilor omenești și instalării căilor de legătură lesnicioase.

Dealurile Lăpugiuului și Lugojuului sînt în cea mai mare parte împădurite, iar în Depresiunea Făget predomină terenurile agricole pe luvisoluri albice (soluri podzolice argiloiluviale) pseudogleizate și pseudogleice și soluri gleice (în lunci). În dealuri predomină luvisolurile albice (soluri podzolice argiloiluviale) și solurile brune luvice (podzolite) în condițiile unor temperaturi medii anuale de 10°C și precipitații de 700 mm/an. În Depresiunea Făget temperaturile urcă peste media anuală de 10°C, iar precipitațiile scad sub 700 mm/an.

Dealurile Lăpugiuului. Se află în partea de nord-vest a Munților Poiana Ruscă și sînt despărțite de Dealurile Lugojuului prin râul Bega Luncanilor. Față de Depresiunea Făget au denivelări de peste 100 m. Către munte sînt alcătuite din gresii și marne cu inocerami, iar în vest, din formațiuni neogene. În partea centrală, la vest de valea Dobrii, se află andezite și roci piroclastice grosiere. În ansamblu sînt formate din culmi scurte, netezite, care se desprind din marginea munților după o ruptură de pantă evidentă la contactul dintre rocile friabile din dealuri și sisturile cristaline.

În general culmile depășesc cu puțin 300 m altitudine absolută, dar sînt și înălțimi mai mari ca urmare înscrierilor pe roci mai rezistente. Astfel, dealurile Săliște (518 m) și Dobra (364 m) sînt alcătuite din andezite și roci piroclastice grosiere, iar Dealul Corbului (406 m) este format dintr-o alternanță de argile, pietrișuri, marne argiloase, calcare și tufuri. În aceste dealuri au fost puse în evidență trei nivele de eroziune (E. Vespremeanu, 1972). Suprafața Deva (400 — 500 m) are o dezvoltare mai mare la est de valea Dobrii, iar nivelele de 350 m și de 300 m ocupă suprafețe mari în vestul văii amintite.

Rîurile principale care străbat Dealurile Lăpugiuului își au obîrșile în Munții Poiana Ruscă. Cele din jumătatea nordică a dealurilor (Plaiul, Dobra, Abucea) sînt tributare Mureșului; Lăpugiuul se varsă în Valea Mare, afluent al Mureșului. Bega Poienilor și Bega Luncanilor se unesc la sud de Românești și formează râul Bega, care primește pe dreapta pîraiele Homojdia, Nădreasca și Ieuiul.

Gradul de fragmentare a Dealurilor Lăpugiuului a influențat pregnant aspectul așezărilor. În acest sens se remarcă prezența sateilor cu gospodăriile răsfrînte în vatră (Rădulești, Bujoru din extremitatea estică) sau

în interiorul și în afara vetrei (Baștea, Holdea, Coșevița, Crivina de Sus, situate la altitudini de peste 300 m), cu structură mixtă (Lăpugiu de Sus, Pietroasa), precum și a satelor cu structură adunată, situate în văile evoluale ale piraiei Dobra și Valea

care depășesc 50% din suprafața agricolă (fig. 27).

Dealurile Lugojuui. Se desfășoară între Bega Luncanilor și Culoarul Bistrei, dominind Cimpia Lugojuui și Depresiunea Făgetului cu peste 100 m. Sînt alcătuite predom-




Fig. 27. Dealurile Lăpugiuului și Lugojuui. Funcțiile așezărilor : 1, așezări dominante cerealiere ; 2, pomicol-zootehnice ; 3, agroindustriale. Utilizarea terenurilor : 4, terenuri arabile ; 5, pășuni și fînețe ; 6, livezi ; 7, păduri ; 8, nisip cuarțos ; 9, căi ferate ; 10, drumuri principale ; 11, alte drumuri ; 12, limita Depresiunii Făget.

Mare sau în mici bazine de eroziune (Panc, Panc — Săliște). Gradul ridicat de dispersie a gospodăriilor în vatră, suprafața redusă, forma frecvent alungită și textura neordonată sau monostradală a vetrei sînt consecințe firești ale existenței unor văi înguste și ale unei fragmentări mari a reliefului. Cele mai multe sate au sub 500 de locuitori (Bujoru, Panc, Panc-Săliște) și numai două au între 500 și 750 de locuitori (Roșcani și Lăpugiu de Sus). Funcția zoopomicolă a celor mai multe dintre așezări este oglindită de suprafețele ocupate de livezi și pajiști naturale

minant din pietrișuri, nisipuri și argile de vîrstă pannoniană dispuse transgresiv peste sisturi cristaline, aflate la zi la sud de valea Surducui. Aspectul lor general este de culmi prelungi, netezite și largi (aflate la peste 600 m alt. abs.) în jumătatea de nord și culmi scurte, rotunjite, de la Crivina spre sud, unde de altfel fișa de dealuri se îngustează treptat. Astfel, de la nord la sud sînt dispuse : Culmea Poienii (306 m) între văile Vădana și Munișel, culmea din sisturi cristaline a Surducui, dominată de Măgura Surducui (496 m), care se leagă cu cristalinul

din Munții Poiana Ruscă și culmea prelungă și ramificată dintre valea Sărazului și Cimpia Lugojuului, marcată de Dealul Fintinii (263 m), Dealul Cîrla (233 m) și Dealul Șura (223 m). Această culme reprezintă prelungirea spre sud-vest a Dealurilor Lugojuului. La nord și sud de valea Nădragului remarcăm culmile scurte Poiana cu Nuci (299 m) și, respectiv, Iricești (366 m). Dealurile Lugojuului sînt fragmentate de o rețea deasă de piraie colectate de riuri cu obîrșia în Munții Poiana Ruscă: Bega Luncanilor, Vădana, Riul și Sărazul, afluențe ale Begheiului. Timișul primește riul Nădrag și un număr însemnat de piraie scurte cu obîrșia tot în Munții Poiana Ruscă.

Pe Bega Luncanilor și Săraz, terasele și luncile intră adînc în dealuri pe văi largi, facilitînd construirea căilor de comunicație și dezvoltarea așezărilor. Pe alte riuri mai mici, cum sînt Munișelul, Gladna și Firdea (care formează Riul) s-au format lărgiri de eroziune care, prin unirea lor la confluențe, au format o depresiune largă — cea de la Surduc —, unde a fost construit barajul și lacul de acumulare cu același nume.

Fragmentarea prin văi largi deschise către Depresiunea Făgetului și Cimpia Lugojuului a oferit un cadru propice pentru dezvoltarea așezărilor. Aflate la altitudini cuprinse între 200 și 300 m o mare parte a satelor își au vetrele situate fie în lungul văilor unor piraie (Drinova, Jurești, Sarazant în valea Sărazului: Drăgsinești, Mitnicu Mic în valea Munișelului, Brănești, Balosești, Jupinești în valea Vădanei, Firdea și Surducu Mic în valea Riului), fie la contactul dintre lunca Timișului și dealuri (Criciova, Jdioara), sau pe unii versanți mai domoli și estinși (Bucovăț, Botinești, Pogănești).

Categoriile de mărime a satelor prezintă diferențieri în funcție, mai ales, de potențialul de habitat al teritoriului. În general, satele sub 500 locuitori se întîlnesc către contactul cu muntele (Jupinești, Balosești, Drăgsinești, Mitnicu Mic, Botinești, Sărazani, Bîrnă, Jurești), iar cele cu 500 — 750 de locuitori (Bucovăț, Brănești, Cireșu) și mai mari, cu 750 — 1 000 de locuitori (Românești, Criciova, Jdioara), către Depresiunea Făget și Cimpia Timișului.

După fizionomia vetrei se deosebesc două categorii de sate cu structură răsfirată, cauzată de prezența unor terenuri agricole între diferite grupări de gospodării (Balosești, Ju-

pinești, Botinești, Jurești) și cu structură adunată, formă și textură uneori regulată (Drăgsinești, Mitnicu Mic, Bucovăț etc.).

Activitățile economice de bază, pomicultura și creșterea animalelor, sînt susținute de aceleași elemente (suprafețe pomicole cuprinse între 200 și 400 ha, pășuni și finete naturale cu ponderi pe peste 50% din terenul agricol). O diversificare a activităților economice de bază este dată de prezența industriei sticlăriei în localitatea Tomești.

Depresiunea Făgetului. Se desfășoară în lungul riului Bega și are o formă alungită pe direcția est — vest, asemenea unui golf, avînd ca axă valea Sărazului, larg deschisă spre Cimpia Lugojuului. Contactul cu unitățile deluroase vecine este marcat prin denivelări bine înscrise în relief.

Această depresiune s-a format în lungul unei importante dislocații tectonice care se continuă în Cimpia Banatului și este pusă în evidență de ariile de subsidență. Relieful este format din terasele inferioare ale Begheiului dezvoltate mai mult pe stînga (la marginea nordică a Dealurilor Lugojuului) și dintr-o luncă largă, inundabilă.

Vatra depresiunii înclină ușor de la est (circa 170 m) spre vest (circa 150 m) și este străbătută de mai multe piraie care rățăcesc în lunca largă: Vădana, Băiașina, Riul, Sărazul și Glavița, toate pe partea stîngă a Begheiului. Pe dreapta, din Podișul Lipovei, vin piraiele Pădurani, Topla și Cladova.

Depresiunea Făgetului reprezintă o regiune cu condiții foarte favorabile pentru instalarea și dezvoltarea așezărilor care au căutat cu precădere contactele dintre formele de relief principale. Satele de la contactul cu dealurile (Bichigi, Temerești, Sintești) sînt desfășurate în lungul drumului și au tendința de răsfirare la periferia vetrei către dealuri. Satele de vale evoluată, cu vetre extinse sînt amplasate de o parte și alta a Begăi, la confluențele unor cursuri secundare (Răchita), sau la traversarea văii de un drum principal (Mănăștiur, Făget). Satele de luncă corespund obișnuit cu intersecțiile de drumuri (Dumbrava, Jupani, Susani, Sudriaș). În aceste condiții de amplasare s-au conturat cîteva tipuri de sate cu structură adunată, cu formă poligonală mai puțin regulată și cu tendința de compactizare (Mănăștiur, Sudriaș, Jupani, Criciova).

Spre deosebire de ceea ce este în dealurile vecine, unele sate din depresiune sînt mari — Făget cu 3 700 de locuitori, Margina, Mănăș-

tiur cu peste 1 000 locuitori — iar cele mai multe (Sintești, Temerești, Traian Vuia, Susani, Jupani) au între 500 și 750 de locuitori, exprimând 90% din numărul total. Există comune (Făget, Margina) care au în componență sate mici, însă cele mai multe aparțin Dealurilor Bulzei și Dealurilor Lipovei.

Pe baza valorificării resurselor naturale (fondul forestier, mai ales cel din regiunea muntoasă apropiată, producția agricolă vegetală și animală) au apărut unele ramuri industriale, ca: industria lemnului la Margina, Făget, Mănăștiur, industria chimică la Margina, secții ale industriei alimentare la Făget etc., fapt ce a impus localităților respective un profil economic agroindustrial. Agricultură prezintă unele diferențieri structurale, în sensul că, pe lângă pomicultura (mai extinsă în partea colinară a comunelor Făget, Margina) și creșterea animalelor (efective mari de bovine dețin comunele: Făget, Traian Vuia și Margina) se mai practică și culturi de cereale pentru boabe, plante furajere, cartofi etc., mai ales în comunele din partea vestică (Traian Vuia, Mănăștiur), al căror teren arabil este de circa 70% din suprafața agricolă.

Ca o măsură de modernizare a agriculturii se remarcă extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (desecări și mai puțin irigații) în scopul creșterii fondului funciar.

O importanță deosebită pentru stabilitatea demografică și dezvoltarea economică a regiunii o au drumurile modernizate și calea ferată ce face legătura între Culoarul Mureșului și Timișoara.

2.2.4.4. Dealurile Pogănișului

Situate în partea de nord a munților Dognecei și Semenice, Dealurile Pogănișului se desfășoară ca o fișie lungă de 50 km între Cîmpia Buziașului și Depresiunea Caransebeșului. Limita dinspre Cîmpia Lugoșului, o denivelare ușoară, urmează o linie care ar uni localitățile Sacoșu Mare, Dragomirești, Zgribești și vest Zăguzeni. Spre sud-est, limita dinspre munți o formează, în general, valea Pogănișului.

Aceste dealuri sînt alcătuite din marne, nisipuri și pietrișuri pannoniene, iar la extremitățile din nord-vest și sud-est apar la zi șisturile cristaline din fundament. În ansamblu sînt formate din culmi largi, cu aspect de poduri, despărțite de văi evolute, mai lungi în partea dinspre Cîmpia Lugo-

jului și mai scurte spre valea Pogănișului din care cauză Dealurile Pogănișului sînt asimetrice (V. Mihăilescu, 1966). În general culmile se mențin la altitudini de 300 m, dar apar și cîteva proeminente înscrise pe simburile de șisturi cristaline, ca Dealul Scaunului (324 m) și Dealul Luncoiu (367 m) în partea de nord-vest și Măgura Poienii (448 m) în partea de sud-est.

Ca urmare a altitudinii scăzute și a văilor relativ largi, Dealurile Pogănișului sînt bine populate. În jumătatea de nord-vest plafonul mediu de locuire este la mai puțin de 200 m (Sacoșu Mare, Silagiu, Izgar, Zorlențu Mare, Remetea-Pogănici, Valea Mare, Duleu), iar în partea de sud, sud-est, unde relieful este mai înalt, acesta se situează la 200 — 300 m (Zorlencior, Ohaba Mitnic, Zorile, Cornuțel, Brebu). Concomitent cu creșterea în altitudine, fizionomia vetei prezintă caracteristici diferite. Relieful de joasă altitudine de la contactul dealurilor cu cîmpia și văile mai largi au facilitat apariția unor sate cu structură adunată, uneori compactă (Silagiu, Izgar, Vișag, Știuca, Pădureni, Dragomirești, Scăiuș, mai puțin Sacoșu Mare, care are o structură mixtă). La peste 200 m altitudine se diferențiază tipul de sat cu structură mixtă (adunată în cea mai mare parte a vetei și cu ușoare izolări către margini: Zorile, Copăcele, Cornuțel), sau cu gospodării răsfirate în afara vetei (la sud de Scăiuș). Particularități distincte în această privință se remarcă la localitățile din valea Pogănișului (Brebu, Valeadeni, Delinești), care au o structură adunat-compactă în interiorul vetei și mai multe gospodării răsfirate în afară, tendință impusă de activitățile specifice pastoral-pomicole. Satele au de la cîteva sute de locuitori (sub 500), ca Dragomirești, Ohaba Mitnic, Zorlencior, Ruginosu, Valea Mare, Remetea-Pogănici, Duleu, pînă la peste 1 000 locuitori — Fîrlug, Zorlențu Mare (fig. 28).

Numai o parte redusă din Dealurile Pogănișului mai este acoperită cu păduri de cer și girniță și păduri de stejar (*Quercus robur*). Cea mai mare parte a suprafeței reprezintă terenuri agricole și pajiști secundare de fișcă și de sadină. Acestea se dezvoltă pe soluri brune luvice (podzolite), care ocupă cele mai mari suprafețe, soluri brune luvice (podzolite) și planosoluri situate în ariile mai înalte și soluri gleice în valea Pogănișului. Vegetația și solurile se dezvoltă în condițiile unor temperaturi medii anuale de peste 10°C și ale unor precipitații în jur de 700 mm/an.

Agricultura este ocupația de tradiție în economia Dealurilor Pogănișului. Pomicultura și creșterea animalelor sînt ramuri de bază, prima fiind mai extinsă în localitățile Firliug, Zorlențu Mare și Zorlencior, iar cea de-a doua se practică mai ales în localitățile

Dealurile Buziașului. Acestea se extind în jumătatea de nord-vest a Dealurilor Pogănișului, între Cîmpia Lugojului, la nord-est, Cîmpia Buziașului la nord-vest și sud-est și valea Pogănișului la sud. Limita cu Dealurile Poienii trece pe la vest de localitatea Vișag și




Fig. 28. Dealurile Pogănișului. Funcțiile așezărilor: 1, așezări dominant cerealiere; 2, pomicol-zootehnice. Utilizarea terenului: 3, teren arabil; 4, pășuni și fînețe; 5, livezi; 6, vii; 7, livezi și vii; 8, păduri; 9, căi ferate; 10, drumuri principale; 11, alte drumuri.

Copăcele, Firliug și Zorlențu Mare cu un efectiv mare de animale, depășind densitatea medie pe aria dealurilor. Suprafețe cultivate cu vii se întîlnesc mai mult în partea de nord-vest, pe Dealul Scaunului (la est de Silagiu), iar celelalte plante de cultură se extind tot mai mult în localitățile de la contactul cu cîmpia.

Întreaga regiune este străbătută de o rețea de căi de comunicație convergentă către Lugoj și Caransebeș, așa încît sensul de manifestare a fenomenelor demografice, economice și sociale este orientat de prezența celor două orașe.

Condițiile naturale și activitățile economice permit individualizarea în Dealurile Pogănișului a trei subunități distincte: Dealurile Buziașului, Dealurile Poienii și Dealurile Zorlențului.

este formată din valea Torani, cu obîrșia în Dealul Dîmpuri (255 m), care debosează în valea Cincăi (afluent pe stînga al Timișului).

Partea centrală a Dealurilor Buziașului este formată din horstul cristalin al Buziașului, puternic faliat, înecat în depozite fluvio-lacustre, pe care se înșiră înălțimile Luncariu (367 m), Dealul Scaunului (324 m) și Poiana Întă (277 m). În ansamblu formează o culme prelungă, cu petice de pădure, din care se desprind radiar culmi secundare prelungi care coboară spre cîmpia din jur. Culmile sînt despărțite de o rețea relativ deasă de piraie: Salcia și Firgimociu, cu obîrșia în Dealul Scaunului, unite în pîrîul Șurgani (afluent al Timișului), piraiele Cîncă și Cherăstăul, cu obîrșia în dealurile Poiana Întă și Luncariu, afluate ale Timișanei. Spre Pogăniș vin, de asemenea, mai multe piraie scurte (Igazărul, Vermeșul etc.).

În cea mai mare parte Dealurile Buziașului sînt ocupate de terenuri agricole și pajiști secundare. Un loc important îl ocupă podgoria Buziașului, al cărei areal se întinde pe teritoriul localităților Buziaș, Silagiu și Sa-coșu Mare.

Dealurile Poienii. Acestea se desfășoară în jumătatea de sud-est a Dealurilor Pogănișului, între Cîmpia Lugoșului și Depresiunea Caransebeșului, la nord-est, valea Pogănișului, la sud-vest și văile piraiei Torani și Cîmca spre Dealurile Buziașului. Cea mai mare parte a lor este formată din roci friabile, panoniene, la care se adaugă în nord-est depozite cuaternare. Din depozitele friabile se ridică horstul cristalin al Măgurii Poienii (438 m), punctul cel mai prominent din aceste dealuri. Cele mai mari înălțimi (Dealul Glodului, 297 m; Dealul Lutului, 302 m; Vîrful Dealului, 275 m; Dîmpuri, 255 m), toate situate spre valea Pogănișului pun în evidență asimetria. Din acest aliniament de dealuri pornesc, spre Cîmpia Lugoșului, culmi prelungi netezite, despărțite de văile piraiei Mitnic, Vîna Secănească, Spaia și Timișana. Spre valea Pogănișului culmile ca și văile sînt foarte scurte.

Spre deosebire de Dealurile Buziașului, Dealurile Poienii au o rețea de așezări mai densă. Localitățile sînt situate pe interfluvii netede, în văile mai largi și la contactul cu Cîmpia Lugoșului. În partea de sud-est aceste dealuri sînt traversate de drumul național și calea ferată Reșița — Caransebeș, iar în partea de nord-vest de drumul național Reșița — Lugoș.

Dealurile Zorlențului. Împreună cu Depresiunea Brebu, situate la sud-vest de Dealurile Poienii, sînt alcătuite dintr-o culme prelungă, cu multe ramificații, pe care se înșiruie de la vest la est, Tilva Mare, 307 m; Dealul Șopot, 358 m; Culmea Mare, 354 m și Danciu, 328 m.

Partea centrală a Dealurilor Zorlențului este formată din roci friabile, pliocene, constituind o largă înșeuare care facilitează legăturile dintre Reșița și Caransebeș. La nord-vest (în dealurile Tilva Mare și Șopot) se află granodiorite în care pîrîul Tău, care formează limita spre Munții Dognecei, și-a săpat chei relativ largi, străbătute de drumul național Lugoș — Reșița. În partea de sud-est, aceste dealuri sînt formate din șisturi cristaline.

Depresiunea Brebu. Se desfășoară în bazinele mijlociu al râului Pogăniș, pe o lungime

de circa 20 km, între localitățile Delinești și Dezești, fiind cuprinsă între dealurile Poienii și Zorlențului. Prin cheile scurte, epigenetice, de la Dezești se face legătura cu lărgirea de la Fîrlug, alungită pe partea stîngă a Pogănișului.

Depresiunea Brebu are vatra situată la circa 200 m altitudine, astfel că dealurile din jur o domină cu peste 100 m. Este asimetrică, cu versantul drept abrupt, iar cel stîng, în trepte, purtînd urmele evoluției depresiunii prin existența celor trei terase (7 — 8 m, 20 — 22 m, 40 — 45 m), bine dezvoltate între Apadia și Zorlențu Mare (L. Badea și colab., 1956).

În cea mai mare parte depresiunea este ocupată de terenuri arabile și livezi, acestea ocupînd suprafețe întinse la Delinești (unde se exploatează și mangan), Apadia, Valeadeni, Brebu, Zorlențu Mare și Dezești. La acestea adăugăm localitățile Fîrlug, Remetea-Pogănici și Duleu din lărgirea de la Fîrlug.

2.2.4.5. Dealurile Dognecei

Dealurile Dognecei mărginesc ca o prispă munții de la care își au numele între văile Pogănișului, la nord și Carașului, la sud. Limita dintre cele două unități este evidentă datorită diferențierilor litologice — roci friabile în dealuri, șisturi cristaline și banatite în munți — și urmează linia localităților Bărbos, Biniș, Doclin, Surducu Mare, Forotic, Cîrnecea și Secășeni. Trecerea spre Cîmpia Banatului este dată de o grăbire a pantelor ce poate fi urmărită pe linia localităților Valeapai, Ramna, Fizeș, Clopodia, Lățunaș, pînă în frontiera cu Iugoslavia.

Aceste dealuri nu depășesc înălțimea de 300 m, în afară de Dealul Verzișor care are 362 m. Sînt alcătuite din marne, nisipuri și pietrișuri panoniene, cu excepția Dealului Verzișor, un simbur de șisturi cristaline și a culmii dintre văile pîrîului Vornicu și Bîrzavei, unde apar banatite. La fel ca Dealurile Pogănișului, sînt formate din culmi netezite, acoperite cu argile pleistocene, care scad în altitudine spre Cîmpia Banatului și Depresiunea Carașului și se ramifică în culmi secundare: Culmea Teiușului Mare (229 m), între Pogăniș și pîrîul Vornicu, Culmea Mielor (257 m) și Culmea Lețului Binișel (249 m), între Bîrzava și Fizeș, sau altele, mai la sud, orientate nord — sud, Cîrsta (237 m), Surducu Mare (251 m), Sapa (215 m) și Verzișor, situată la vest de valea Ciornovățului, Pecania

(234 m) și Nandrașul (216 m) la est de Cernovăț, ce coboară spre Depresiunea Carașului. Dealurile Dognecei au constituit de timpuriu cadrul favorabil pentru dezvoltarea unor așezări mari (Ramna, Biniș, Comoriște — cu peste 1 000 de locuitori și Forotic, Surduc Mare, Doclin și Tirol — cu 750 — 1 000 de locuitori). Orașul Bocșa, situat la contactul cu muntele, se extinde mai mult în Munții Dognecei și a fost prezentat în cadrul acestora. Sint și câteva sate mai mici, Brezon și Bărboșu cu sub 500 de locuitori și Cîrnecea cu peste 500 locuitori (fig. 30).

La contactul dealurilor cu cîmpia și în văile mai largi au luat naștere vetre de localități cu fizionomie ordonată (rețea de drumuri ordonată și structură adunată pînă la compactă): Ramna, Biniș, Fizeș, Tirol. Structuri bine încheiate, dar cu un grad mai redus de regularitate prezintă satele Doclin, Surduc Mare, Forotic, Cîrnecea, Comoriște. Fragmentarea mai accentuată din partea de sud a dus la o ușoară răspîndire a gospodăriilor în afara vetrelor deja constituite (între Forotic și Cîrnecea, între Cîrnecea și Secășeni). În Dealurile Dognecei sint caracteristice solurile brune luvce (podzolite) și planosolurile pseudogleizate, ca și planosolurile și luvisolurile albice pe care se dezvoltă terenuri agricole și pajiști secundare de fișcă. Nota generală a economiei pomicol-zootehnică este reflectată de suprafețele mari pomicole (la Ramna cu peste 1 000 ha, Forotic, peste 500 ha, Tievaniu Mare, Cîrnecea) și de numărul animalelor (oi între 1 000 și 2 000 de capete și bovine în medie 1 000 de capete pe comună) ce folosesc ca bază furajeră pășunile și fînețele naturale care reprezintă 40% din suprafața agricolă. Condițiile pedoclimatice din regiunea Tirolului au favorizat extinderea viticulturii, care se practică pe o suprafață de aproape 1 000 ha. La Doclin se exploatează nisip cuarțos iar la Surduc Mare banatite.

2.2.4.6. Dealurile Oraviței

Acestea se desfășoară la vest de Munții Aninei, între Caraș, la nord și Nera, la sud. Limita spre Munții Aninei corespunde cu o linie tectonică majoră (pe care s-au insinuat erupțiile banatitice), dublată de abruptul calcaros al acestor munți. Spre Depresiunea Carașului limita este dată de o denivelare evidentă cu un mers sinuos pe linia localităților Tievaniu Mic, Agadici, Răchitova, vest Oravița, Broșteni, Răcășdia, Macoviște și

Nicolinț. Fișa de dealuri prezintă două îngustări importante între Agadici și Oravița și între Răcășdia și Macoviște (fig. 29).


Fundamentul Dealurilor Oraviței este format din șisturi cristaline care apar la zi la contactul cu Munții Aninei, între Gîrliște și Ilidia și pe dreapta Nerei. Tot la marginea Munților Aninei, între Oravița și Potoc, apar și depozite mezozoice calcaroase. În afara acestor roci, dealurile sint formate din marne, nisipuri și pietrișuri panoniene, la care se adaugă o fișie îngustă de depozite sarmațiene la contactul cu formațiunile cristaline și mezozoice. În apropierea munților înălțimile ajung pînă la 500 m, dar coboară spre Depresiunea Carașului la 200 m. În partea mai înaltă ele reprezintă un piemont de eroziune situat la 300 — 500 m, format pe roci cristalino-mezozoice. Spre periferie au aspectul unui piemont de acumulare-eroziune, cu înălțimea în jur de 200 m (P. Cotet, 1970). Piemontul este fragmentat de văi cu lunci largi, în culmi netezite: Culmea Pietrele Albe (340 m), între Caraș și Jitin, Culmea Gădișului (346 m), între Jitin și Lișava; Culmea Prisaca (430 m), între Lișava și Oravița; Culmea Ciclovei (504 m spre Munții Aninei, 376 m în Dealul Mare) între Oravița și Ciclova; culmea prelungă dintre Ilidia și Nera, pe care se înșiră virfurile Ciuchiciului (235 m) și Lațovei (241 m).

O parte din așezările Dealurilor Oraviței, aflate spre contactul cu muntele (Oravița, Ciudanovița, Ciclova, Montană, Ciclova Română, Ciuchici, Naidăș), se situează la altitudini mai mari de 200 m și dețin suprafețe însemnate de pădure, continuare a celor din munte. Cele mai multe vetre de sat se află, însă, la contactul cu Depresiunea Carașului, la o altitudine în jur de 200 m.

Localitățile se grupează în mai multe categorii de mărime: Socolari, Petriloa, Macoviște, Agadici, Jitin au sub 500 de locuitori; Răchitova, Ilidia între 500 și 750 de locuitori; Brădișoru de Jos, Broșteni între 750 — 1 000 de locuitori; Ciclova Română peste 1 000 locuitori. În ansamblu, densitatea populației este între 25 și 50 loc./km², cu excepția orașului Oravița (cu 15 228 locuitori în 1992), unde este de peste 60 loc./km² (fig. 30).

Sub aspect economic se constată o oarecare diversificare a profilului localităților. Pe lângă activitățile agricole de creșterea animalelor, în special a oilor, bazată pe pășuni și fînețe naturale, cultura cerealelor și

Fig. 29. Dealurile Oraviței și localitatea Potoc (foto V. Senen).






Fig. 30. Dealurile Dogneci și Dealurile Oraviței. A. Mărimea și funcțiile așezărilor: 1, așezări dominante cerealiere; 2, pomicol-zootehnice; 3, agroindustriale; 4, de servicii; 5, limita Depresiunii Carasului. B. Utilizarea terenurilor: 1, teren arabil; 2, pășuni și fânețe; 3, livezi; 4, vii; 5, vii și livezi; 6, păduri; 7, vetre de așezări; 8, balastiere; 9, granit; 10, nisip pentru metalurgie; 11, căi ferate; 12, drumuri principale; 13, alte drumuri.

pomicultura pe suprafețe mai restrinse (în preajma Oraviței și Ciclovei Române), sint prezente și unele activități industriale și de transport, ce aparțin în marea majoritate Oraviței. Importante în această privință sint cele două unități de exploatare a banatitelor

de la Brădișoru de Jos și a minereurilor complexe de la Ciclova Montană, secțiile industriale de importanță locală de la Oravița (materiale de construcții, prelucrarea lemnului, alimentară etc.), precum și cîteva activități terțiare (Oravița este unul din cele două

puncte terminus ale primei căi ferate din țara noastră, Oravița — Baziaș, construită între anii 1854 și 1856). Profilul economic al așezărilor este zootehnic-cerealier-pomicol, excepție făcând, bineînțeles, orașul Oravița.

Orașul Oravița. Rezultat al contopirii a două localități: Oravița Română și Oravița Montană, orașul este așezat în lungul văii cu același nume și se desfășoară aproape în lungul unei singure străzi, pe o distanță de mai mulți km (cu excepția zonei nou-construite). În secolul XVIII, odată cu dezvoltarea în regiune a activității miniere, Oravița a devenit un important centru de extracție și prelucrare a cuprului și aurului. Prin înființarea în anul 1817 a teatrului orășenesc, cel mai vechi din țară, Oravița a început să exercite o remarcabilă funcție culturală. În prezent are funcții de servicii, complementarizate de activitatea citorva unități industriale alimentare și de prelucrare a lemnului, ceea ce a determinat o continuă creștere a populației (de la 8 622 locuitori în anul 1966, la 10 738 de locuitori în anul 1977, fără satele care sînt incluse), în 1992 avînd 15 228 de locuitori.

Depresiunea Carașului. Se dezvoltă pe stînga Carașului, între Dealurile Dognecei, la nord-vest și Dealurile Oraviței, la est și sud. În ansamblu este o cîmpie de terase, situată la 160 — 170 m sub Dealurile Oraviței și coboară în trepte pînă sub 115 — 90 m deasupra luncii Carașului (V. Mihăilescu, 1966). Carașul o străbate de la nord-est spre sud-vest, avînd pante de 0,3 — 0,4 m/km și o luncă inundabilă lată de aproape 3 km. Pe stînga primește mai mulți afluenți cu obîrșia în Munții Aninei: Gîrliște, Jitin, Lișava, Valea Lungă și Vicinie.

Depresiunea Carașului este bine populată, localitățile ocupînd preferențial porțiunile de la confluența pîraielor cu Carașul. Predomină satele cu 500 — 750 de locuitori (Mercina, Tievanu Mare, Greoni, Vrani, Iam, Ciuchici) și peste 1 000 de locuitori (Vărădia, Răcășdia, Grădinari) (fig. 30).

Fizionomia vetei se definește prin structuri adunate (Ciuchici, Petrilova) pînă la compacte (Greoni, Vrani); texturi neordonate (Ciuchici, Berliște), parțial rectangulare (Greoni, Vărădia) și chiar rectangulare (Vrani) și forme, de asemenea dintre cele mari variate (dreptunghiulară, Vrani, Vrăniuț; poligonală neregulată, Nicolint, Răcășdia etc.).

În Depresiunea Carașului predomină terenurile agricole și pașistile secundare de sa-

dină, care se dezvoltă pe vertisoluri și pe soluri brune (eu-mezobazice), freatic umede cu strat acvifer la 3 — 5 m adîncime. Ca urmare, baza economică a așezărilor o constituie agricultura. Terenurile arabile ocupă peste 70 % din suprafață și permit cultivarea cerealelor, legumelor (Grădinari, Vrani) și a altor plante. Pomicultura și viticultura sînt prezente în proporții mai reduse, conturîndu-se, totuși, două areale: unul pomicol, la vest de Vărădia și unul viticol, la sud-sud-est de aliniamentul Petrilova, Ciuchici, Ruscova Veche, cu mici extensiuni pe Dealul Satului, Dealul Lațova și Dealul Berliște.

Sectorul zootehnic este dezvoltat, fapt oglîndit de densitățile principalelor specii, ale căror valori se apropie de media întregii zone (60 bovine/100 ha agricol și 140 ovine/100 ha agricol). Cîteva frecvențe ale celor două specii de bază sînt concludente: mai mult de 70 (Răcășdia) și 50 — 70 (Berliște, Vărădia, Grădinari), la bovine și mai mult de 100 (Ciuchici, Vărădia) și 40 — 60 (Berliște, Răcășdia, Grădinari), la ovine.

2.3. Cîmpia Banatului și Crișanei

2.3.1. Caracterele generale

Cîmpia Banatului și Crișanei, a doua mare regiune de cîmpie din țara noastră, în suprafață de 16 500 km², s-a format la marginea Munților Oașului, Dealurilor Silvaniei și Crișanei, Munților Zarandului și Dealurilor Banatului, la periferia estică a Depresiunii Dunării Mijlocii. Se desfășoară de la nord la sud sub forma unei fișii ale cărei lățimi sînt foarte variabile — între 15 și 120 km —, ca urmare fie a înaintării spre vest a unor promontorii muntoase sau deluroase (Dealurile Oradei, Dealurile Pădurii Craiului și ale Codru — Momei, Munții Zarandului, Dealurile Buziașului), fie a pătrunderii adînci spre est a golfurilor de cîmpie, în interiorul dealurilor și munților. Ea se suprapune unei regiuni scufundate în trepte, de la est către vest, care își menține un pronunțat caracter piemontan în latura estică, deoarece este alcătuită din conuri aluvio-proluviale largi, parțial îngropate de materialul aluvionar mai recent, răsfrînte în relief prin glacisuri prelungi și netezite. Partea dinspre graniță are aspectul unei cîmpii joase, aproape netede, cu puține diferențieri morfologice și litologice, deoarece aproape tot timpul a fost supusă

unor procese intense de înmlăștinire și colmatare.

Dacă limita de vest este dată de frontiera de stat cu Ungaria și Iugoslavia, precizarea limitei estice ridică o serie de probleme, datorită pătrunderii ei sub formă de „goluri” în cuprinsul dealurilor, de-a lungul râurilor, ca și ușoarei inflexiuni ce apare la contactul treptelor superioare de glacis cu cele mai vestice prelungiri ale dealurilor. Dacă se ia în considerare întregul complex de factori geografici, limita estică poate fi stabilită de-a lungul unui aliniament subliniat de contactul dintre formațiunile cuaternare proprii cîmpiei, cu cele sedimentare neogene din dealuri, ori chiar cu formațiuni sedimentare mai vechi sau de o altă natură, cum este, de exemplu, cazul rocilor eruptive (Munții Oașului, dealurile Mocrei și ale Pincotei), cristalofiliene (Munții Zarandului) etc. Acest contact este materializat printr-o denivelare de 40 pînă la 60 m, prin care se termină dealurile deasupra cîmpiei, sau de 100 pînă la 300 m la contactul direct cu spațiul muntos (Munții Oașului și Munții Zarandului). Aproximativ din dreptul acestui aliniament crește spre est precipitațiile, la peste 700 mm (media multianuală), scade temperatura medie anuală la sub 10,5°C în sudul cîmpiei și la sub 10°C în nord, apare o serie de izvoare constituind obârșile unor piraie autohtone și de aici se conturează posibilități de captare a unor ape termale ori minerale. La vest de acest contact rețeaua hidrografică a trebuit îndiguită, iar vegetația spontană suferă schimbări importante. Dacă în cîmpie pădurile au un caracter răzleț, ocupînd suprafețe reduse (0,1 — 5%), ele devin în dealuri păduri bine încheiate, cu o pondere de 20 pînă la 35% din suprafața lor. De-a lungul acestei limite se trece de la solurile brune eu-mezobazice și brune luvice pseudogleizate caracteristice Cîmpiei Înalte, la cele brune eu-mezobazice și brune luvice pseudogleizate erodate, ceea ce condiționează scăderea fertilității, precum și schimbarea tipului de culturi.

În dreptul depresiunilor limita este ezitantă, prin modificarea gradată a elementelor geografice. Ca urmare, cu aproximație, ea poate fi stabilită prin dreptul trecerii teraselor în podurile glacisurilor din Cîmpia Întoarsă și pe acolo de unde s-a simțit necesitatea ca rețeaua hidrografică autohtonă să fie îndiguită.

Evoluția paleogeografică s-a desfășurat în câteva etape începînd cu existența unui fun-

dament vechi (acoperit pe alocuri cu depozite paleozoice și mezozoice), inegal scufundat apoi în trei sectoare — de nord, central și de sud — delimitate de două alinamente de falii majore, orientate în general vest—est (nord Muntele Șes — Mihai Bravu; nord Inand). Sectorul central este mai adînc scufundat decît celelalte, dar toate sînt compartimentate în horsturi și grabene (ca o tablă de șah), de linii de falii secundare, cu direcții diferite. În mod deosebit, se remarcă tendința tuturor râurilor mari autohtone de a urmări grabenele fundamentului.

Etapa de bazin se instalează ca efect al mișcărilor orogenice stirice medii, manifestate prin scufundări importante și un proces de sedimentare general (gresii, argile, nisipuri, calcare-badenian superior). Mișcările moldavice de la începutul sarmațianului determină izolarea Bazinului Panonic, ceea ce are ca rezultat îndulcirea progresivă a apelor. Mișcările attice din sarmațianul mediu provoacă retragerea temporară a apelor și transformarea regiunii într-o zonă continentală pînă la începutul pontianului cînd se reinstalează o fază lacustră, care a determinat acumularea de sedimente cu structură încrucișată — un complex petrografic marnos, cuprins între un orizont conglomeratic în bază și unul argilos nisipos, deasupra.

Mișcările rhodanice de la sfîrșitul pontianului au determinat retragerea apelor și apoi acumularea, spre sfîrșitul pliocenului, a unui complex petrografic fluvio-lacustru și apoi fluvial, cu vădit caracter piemontan. Cu această fază începe etapa de formare și modelare a cîmpiei, în timpul căreia se diferențiază Cîmpia Întoarsă a glacisurilor și Cîmpia Joasă de divagare.

Ariile de subsidență (Bodrog, Sáréth, Mako, Timișul inferior) corespund marilor grabene ale fundamentului, fiind definite la suprafață prin punctele de convergență ale râurilor și prin grosimea mare a depozitelor cuaternare. Aria de subsidență Sáréth a avut întîietate de manifestare, determinînd convergența, pînă în holocenul inferior, a Tisei și Someșului, Crasnei și Barcăului (prin culoarul Ierului), Crișurilor și cel puțin un braț al Mureșului. Ulterior, au acționat mai puternic celelalte trei arii, determinînd modificări ale cursurilor și formarea actualei structuri a rețelei hidrografice. Măsurătorile geodezice au stabilit manifestări actuale negative, de ordinul 1—2 mm/an, pentru cea mai mare parte a Cîmpiei Joase. Tot în timpul holocene-

nului s-au produs acumulări de nisipuri mobile (Cîmpia Valea lui Mihai) și de praf (din spulberarea nisipurilor din cîmpiile Nyir și Deliblat), generînd depozitele de loess și loessoide din care sînt formate cîmpiile cu aspect tabular ale Careilor, Diosigului, Peregului, Jimboliei etc. În timpul fazei atlantice a avut loc un proces intens de eroziune și adîncire a văilor, urmat de o intensă aluvionare a Cîmpiei Joase în faza subatlantică (I. Berindei, 1968, 1969).

În urma acestei îndelungate evoluții paleogeografice sub influența mișcărilor fundamentului propriu sau din regiunile vecine, relieful Cîmpiei apare dispus în trei trepte — Cîmpia Înaltă, Cîmpia Intermediară și Cîmpia Joasă — care la rîndul lor au fost diferențiate (în funcție de acțiunea locală a factorilor modelatori) în subunități cu particularități genetice și morfologice evident diferite de la una la alta (I. Berindei, 1977; Gh. Măhăra, 1977).

Cîmpia Înaltă se desfășoară la poalele dealurilor de la est, la altitudinea de 140 — 200 m, avînd o energie a reliefului cuprinsă între 11 și 20 m. Desfășurarea ei nu este continuă, deoarece evoluția sistemelor hidrografice alohtone (Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Pogăniș, Bîrzava) a condiționat dispariția acestei trepte pe anumite sectoare, astfel că ea apare sub formă de fragmente. Este constituită predominant din depozite aluvio-proluviale (nisipuri, pietrișuri, argile loessoide), provenite din erodarea dealurilor de la est în villafranchian — cuaternar inferior și acumularea lor sub forma unei cîmpii piemontane. În timpul formării teraselor din dealuri a suferit un proces intens de glaciare, ce a avut drept consecință formarea unor trepte de glaciuri, situate în prelungirea teraselor, la ieșirea riurilor din dealuri în cîmpie. Acestor depozite li se adaugă nisipurile din dunele de la Valea lui Mihai și loessurile sau depozitele loessoide din regiunea Careilor. Drept urmare, în treapta înaltă se individualizează o *cîmpie de glaciuri* alcătuită dintr-o succesiune de fragmente (Ardud, Buduslău, Miersig, Vinga, Buziaș, Gătaia, Fizeș), o *cîmpie tabulară pe depozite de loess*, *cîmpia Careilor* și o *cîmpie de dune* (Valea lui Mihai).

Cea de-a doua treaptă se menține la altitudinea de 100 — 130 m. Prin geneză, alcătuirea petrografică și aspectele reliefului, prezintă trăsături caracteristice atât Cîmpiei Înalte (cîmpii de glaciuri, cîmpii tabulare

pe depozite de loess), cît și Cîmpiei Joase (cîmpii de divagare). Drept urmare, în cadrul ei se pot individualiza fragmente de cîmpie de glaciuri (Cig, Biharea, Gepiu, Cermei, Pusta Radnei, Hodoni, Duboz, Tormac, Jamu Mare), situate în continuarea glaciurilor din treapta înaltă, fragmente de cîmpie tabulară pe depozite de loess (Diosig, Pereg) și porțiuni de cîmpie de divagare (cîmpiile Matca, Ierului, Aradului, Sînnicolaului).

Treapta cea mai joasă, de vîrstă holocenă, ocupă suprafețe întinse și este legată de activitatea rețelei hidrografice, mai ales din faza anterioară procesului de îndiguire (care a început la sfîrșitul secolului trecut), sub influența ariilor de subsidență. Ca urmare, relieful poartă amprenta acestor condiții: suprafețe întinse de divagare, cu aspect de luncă, o cîmpie brăzdată de urmele a numeroase alpii părăsite. Pe alocuri, s-au suprapus (în regiunile cu caracter pronunțat negativ) procese de înmlăștinire — azi desecate —, ori s-a depus o cuvertură de loess pe porțiunile rămase mai ridicate prin adîncirea riurilor. În cuprinsul ei se diferențiază fragmente de cîmpie de divagare (cîmpiile Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bîrzavei), de cîmpie de mlaștini desecate (Ecdeea, Cîmpia Ierului), și de cîmpie tabulară pe depozite de loess (Cîmpia Jimboliei, cîmpurile dintre Bega, Timiș și Bîrzava).

Uniformitatea reliefului permite o repartiție relativ uniformă a fenomenelor climatice, dar extinderea cîmpiei în latitudine pe aproximativ 350 km, precum și ușoara creștere a altitudinii de la vest spre est determină unele diferențieri între sectorul coborît vestic și cel înalt de la contactul cu dealurile și mai evidente între partea de nord, aflată sub influența pătrunderilor de aer rece, din nord și cea de sud, unde se manifestă pătrunderi de aer cald sudic. Lanțul carpatic din est oprește, în cele mai multe cazuri, invazia maselor de aer polar — continentale sau arctice, iar larga ei deschidere spre vest permite advecția maselor de aer umed dinspre sud, sud-vest și nord-vest, ca și o activitate frontală intensă, determinînd creșterea nebulozității, a cantității de precipitații și atenuarea amplitudinilor termice anuale, care nu depășesc 23°C (Lugoj 22.4°C, Jimbolia 22.9°C, Oradea 22.7°C).

Factorii și elementele climatice principale relevă prezența unui climat continental-moderat de cîmpie, cu veri relativ călduroase,

lipsite de intervale cu uscăciune și secetă excesivă și ierni fără geruri intense și persistente.

În aceste condiții temperatura medie anuală scade de la 11°C, în sud, la 9°C în nord (Timișoara 10.9°C, Oradea 10.5°C, Satu Mare 9.7°C). Luna cea mai rece are valori medii mai ridicate decât în estul țării, care scade de la sud la nord (Timișoara — 1.2°C, Jimbolia — 1.5°C, Oradea — 1.5°C, Satu Mare — 2.7°C) dar temperatura poate coborî chiar sub — 30°C, de obicei în Cîmpia Mureșului prin localizarea aerului rece în părțile mai coborîte ale Cîmpiei Panonice (Arad — 30.1°C, Sînnicolau Mare — 30.0°C). Tot iarna pot pătrunde mase de aer cald de origine tropicală, ceea ce duce la creșteri accentuate ale temperaturii aerului, cînd în ianuarie au fost depășite 15°C (Timișoara 16.7°C, Arad 16.7°C, Oradea 17.1°C). Aceste pătrunderi succesive de aer cald și rece creează și o inconstanță a fenomenelor meteorologice. În luna cea mai caldă, valorile descresc, de asemenea, în același sens cu aproximativ 1°C (Timișoara 21.6°C, Arad 21.4°C, Oradea 21.2°C, Satu Mare 20.1°C). Vara se înregistrează valori ale temperaturii destul de ridicate, putînd depăși și în luna august 40°C (Jimbolia 42.5°C, Arad 40.4°C, Chișineu Criș 40.1°C, Diosig 40.0°C). În anumite condiții sinoptice, pot avea loc și pătrunderi de aer de origine artic-maritimă, ceea ce face ca temperatura să scadă pînă în jur de 7°C în iulie, 5°C în august, 2°C în iunie. Limitele largi de variație a valorilor extreme dovedesc că pe fondul general moderat pot să apară fluctuații, care imprimă o anumită notă de continentalism termic mai evident exprimat în Cîmpia Mureșului.

Pătrunderile frecvente de aer oceanic fac ca umezeala aerului să fie mai ridicată ca în alte regiuni de cîmpie ale țării. Nebulozitatea urmărește în general evoluția și distribuția umezelii relative, înregistrînd valorile cele mai ridicate din întreaga regiune de cîmpie și de dealuri a țării (Timișoara 5,5, Oradea 5,6, Satu Mare 5,6). Frecvența zilelor senine scade de la 130 zile/an în Cîmpia Banatului la 110 zile/an în Cîmpia Someșului, iar zilele cu cer acoperit au o distribuție inversă.

Precipitațiile atmosferice sînt mai abundente ca în estul și sudul țării, dar mai reduse ca în sectorul învecinat de dealuri. Căntitățile anuale medii sînt cuprinse între 530 — 600 mm, arătînd o creștere generală către dealuri și din Cîmpia Mureșului spre nord și

spre sud (Timișoara 621,7 mm, Sînnicolau Mare 533,6 mm, Arad 564,2 mm, Oradea 626,3 mm, Satu Mare 619,3 mm). În lunile de vară cad circa 30% în sud și 34% în nord din cantitatea anuală de precipitații. Luna cu maximum de precipitații, în toate cazurile este iunie (între 65 și 85 mm), iar cel de-al doilea maxim de precipitații (din noiembrie și decembrie cu valori medii peste 50 mm) se manifestă mai evident în Cîmpia Banatului.

Luna cu cea mai scăzută cantitate de precipitații diferă teritorial. În majoritatea cazurilor ea se plasează la sfîrșitul iernii și începutul primăverii cu o medie lunară ce nu scade sub 30 mm. Minimul secundar se plasează, în majoritatea cazurilor, în septembrie. Frecvența zilelor cu precipitații totalizează o medie anuală cuprinsă între 85 și 96 de zile. Intervalele lipsite de precipitații din timpul verii sînt de durată mai scurtă, iar vremea este mai puțin excesivă ca în celelalte regiuni de cîmpie din țară. De asemenea, fenomenele de iarnă sînt mai reduse și au o durată mai scurtă, cu unele deosebiri între părțile sudice și nordice. Perioadele de menținere a stratului de zăpadă la sol sînt relativ scurte, iar numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă crește de la 30—40 de zile în sud pînă la 60 de zile în nord. Bogația în ape de suprafață și subterane conferă întregii cîmpii o caracteristică: excesul de umiditate. Apele subterane sînt reprezentate prin ape cu pinze freatice fără presiune hidrostatică, la mică adîncime, într-o zonă activă din punct de vedere al bilanțului hidrologic și ape de adîncime care apar în orizonturile acvifere cu presiune hidrostatică.

Prezența în sol a unui orizont B compact și impermeabil determină apariția unui strat acvifer suprafreatic sezonier, în afara apelor freatice propriu-zise situate în depozite cu permeabilitate variabilă. În general, direcția de mișcare a apelor freatice este de la est spre vest, avînd gradienti hidraulici mici (0,7% în cîmpia joasă și 1,2% în cîmpia înaltă) și debite specifice reduse (0,1—4,1 l/s.km²). Nivelele hidrostatice medii au adîncimi de 0 — 2 m în partea vestică a cîmpiei, de 2 — 5 m în partea centrală și 5 pînă la peste 10 m în partea estică. Ele au un caracter oscilator, cu o amplitudine de 1 — 3 m, uneori chiar 3 — 4 m. În Cîmpia joasă, drenajul redus și caracterul lor oscilator fac ca în unele perioade (mai ales primăvara) acestea să se ridice și să bălțească la suprafața terenului (Valcani, Bobda, Cruceni, Salonta, Cefa,

Ciumeghiu, Adea, Chişineu Criş etc.). Datorită mineralizării lor au calităţi de potabilitate slabe.

Apele de adâncime au caracter ascensional sau, uneori, în foraje, chiar artezian. Deoarece mineralizarea lor este redusă întrunesc condiţii de potabilitate şi sînt utilizate în alimentarea unor localităţi. Un caz particular al apelor de adâncime îl reprezintă cele legate de sistemul de falii cu caracter panonic. Acestea sînt termale sau intens mineralizate.

Apele de suprafaţă sînt reprezentate atît prin riuri alohtone (Tur, Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bîrzava etc.), cît şi autohtone care, avînd izvoarele la baza glacisurilor sau a teraselor, au caracter semipermanent sau temporar. Densitatea medie a reţelei hidrografice creşte de la vest spre est ($0,0 - 0,50 \text{ km/km}^2$). Luînd în calcul şi reţeaua temporară şi artificială (canale), valoarea densităţii se ridică la $1,25 \text{ km/km}^2$. Panta longitudinală redusă ($0,02 - 0,3\%$) a condiţionat un drenaj deficitar al cîmpiei, cu stagnări locale, grad avansat de meandre, frecvente revărsări, ceea ce a impus lucrări de canalizare, corectări de cursuri şi îndiguiri, în general o puternică modificare a reţelei hidrografice.

Reţeaua de riuri este completată cu numeroase heleşteie pentru piscicultură sau lacuri de retenţie pe unele văi.

Regimul hidric se încadrează tipului cu ape mari de primăvară-iarnă, viituri de vară, cu o scurgere medie sub 1 l/s.km^2 în vestul Cîmpiei Banatului, $2-3 \text{ l/s.km}^2$ la contactul cu piemonturile şi $1-2 \text{ l/s.km}^2$ în restul cîmpiei.

Rîurile autohtone au un debit lichid redus, însumînd doar $6,8\%$ ($30 \text{ m}^3/\text{s}$) din totalul debitului mediu ($445 \text{ m}^3/\text{s}$) transportat de toate riurile peste frontieră. Debitele maxime pot atinge valori însemnate — Someşul şi Mureşul cu $3\,000 \text{ m}^3/\text{s}$ în 1970, Crişul Repede $820 \text{ m}^3/\text{s}$ în 1932, Timişul $1\,420 \text{ m}^3/\text{s}$ în 1966 etc. Datorită intensei utilizări agricole, vegetaţia cîmpiei a fost puternic modificată. Anterior procesului de despădurire şi destelenire, partea înaltă a cîmpiei aparţine etajului forestier al stejarului, iar partea joasă silvostepii. Azi, pădurea a dispărut aproape complet din cîmpia joasă, iar în restul cîmpiei ea se păstrează numai sub formă de insule. La rîndul ei, vegetaţia ierboasă ocupă terenurile care nu au putut fi luate în culturi: cele cu exces de umiditate, cu pajişti higromezofile în Cîmpia Joasă şi pajiştile higromezofile şi mezohigrofile în cîmpia glacisurilor,

cele sărăturate cu pajişti halofile, iar cele nisipoase cu pajişti arenacee.

Diversitatea condiţiilor naturale regionale şi locale şi puternica influenţă a factorului antropic au condiţionat prezenţa unor soluri foarte variate. Astfel, solurile automorfe se eşalonează în trei fişii distincte desfăşurate de la nord la sud. În vest, pînă la linia Curtici—Arad—Timişoara—Peciu Nou—Livezile, se întinde o fişie de molisoluri (cernoziom cenuşiu, cernoziom ciocolatiu şi brun, pe suprafeţele cîmpiei tabulare înalte neinundabile; cernoziom de luncă şi lăcovişti în zonele joase). A doua fişie, lată de $15 - 20 \text{ km}$, se întinde de la Stamora Moraviţa pînă la Carei şi aparţine cernoziomului levigat, de culoare brună. Ultima fişie, cea estică, corespunde glacisurilor superioare, este mai îngustă şi mai festonată, aparţinînd argilivsolurilor, care în sud sînt şi slab roşcate.

În cadrul fişiilor semnalate, anumite particularităţi locale de constituţie a substratului şi de regim hidrologic au condiţionat prezenţa unor soluri intrazonale şi azonale, litomorfe, hidromorfe, halomorfe: soluri nisipoase, lăcovişti, soluri gleice, pseudogleice, sărături sau aluvionare, ceea ce imprimă cîmpiei un aspect de mozaic pedologic.

Acţiunea antropică a provocat în întreaga cîmpie transformarea puternică a spaţiului natural primar şi apariţia peisajelor derivate, cu funcţii noi. Astfel, circa 90% din suprafaţa cîmpiei este utilizată în scopuri agricole: arabil peste 90% la sud de Mureş şi în proporţie de $70 - 80\%$ în restul cîmpiei. În relief au apărut o serie de forme antropice pozitive (ramblee pentru căi de comunicaţie, diguri, tumuli etc.) şi negative (canale, deblee pentru căi de comunicaţie, gropi de împrumut etc.). A apărut un topoclimat legat de peisajul agricol în funcţie de folosinţă şi un topoclimat urban. Lucrările de desecări realizate pe o suprafaţă de circa $850\,000 \text{ ha}$ au creat o reţea deasă de canale în lungime totală de aproximativ $11\,000 \text{ km}$. Acţiunea de prevenire a inundaţiilor a determinat, pe lîngă construirea unor diguri (totalizînd $1\,800 \text{ km}$), executarea unor bazine de retenţie care însumează o suprafaţă de circa $225\,000 \text{ ha}$, la care se adaugă numeroase heleşteie cu scop piscicol. Toate acestea au provocat ridicarea indicelui de fragmentare şi au modificat sensibil regimul de scurgere. Vegetaţia naturală a suferit un proces intens de restrîngere a arealului şi de schimbare a constituţiei asociaţiilor. Astfel, în locul pajiştilor primare

au apărut pajiștile secundare halofile sau nehalofile, iar vegetația lemnoasă primară a fost substituită cu elemente noi. Fondul pedologic al câmpiei a suferit modificări substanțiale prin lucrările de desecare și drenaj, în sensul că solurile hidromorfe și hidroautomorfe evoluează spre solurile automorfe. Apariția sărăturilor secundare este tot o consecință, însă negativă, a factorului antropic, la care se mai adaugă procesul de poluare din ce în ce mai intens al apelor, solurilor și aerului, din vecinătatea centrelor mari urbane (Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara).

În consecință, Cîmpia Banatului și Crișanei, intens umanizată, nu mai poate fi considerată o unitate naturală simplă, ci ca un geosistem, o rezultantă a acțiunii factorilor naturali și antropici. Astfel, în funcție de particularitățile naturale modificate antropice, în câmpie pot fi individualizate două tipuri majore de mediu, Cîmpia Înaltă și Cîmpia Joasă. Criteriul principal care a stat la baza acestei diferențieri este altitudinea (Cîmpia înaltă între 100 și 200 m; Cîmpia Joasă sub 100 m) și trăsăturile substratului care influențează direct topoclimatul și indirect celelalte elemente ale cadrului natural. Astfel, în primul caz temperatura medie multianuală are valori cuprinse între 9,5 și 10°C, iar în al doilea caz valori de 10 pînă la 11°C. Precipitațiile medii multianuale sînt între 600 și 700 mm în Cîmpia Înaltă și scad pînă la circa 520 mm, în Cîmpia Joasă. Altitudinea și energia reliefului condiționează adîncimea diferită a nivelului freatic (în Cîmpia Înaltă între 2 pînă la 10 m; în Cîmpia Joasă între 0 pînă la 2 m), situație care se resfringe în topoclimat, soluri, vegetație.

În Cîmpia Înaltă se disting cîteva subunități clar diferențiate.

Cîmpia de glacisuri, cu relieful format dintr-o asociație de pînă la patru trepte de glacisuri, este fragmentată de văi destul de largi cu albie majore extinse, chiar dacă pîraiele respective au regim torențial. Rîurile alohtone au compartimentat subunitatea într-o succesiune de fragmente: Ardud—Cig, Buduslău, Biharea, Miersig—Gepiu, Susag—Cermi, Pusta Radnei, Vinga—Hodoni, Buziaș—Duboz, Gătaia—Tormac, Fizeș—Jamu Mare, în cuprinsul cărora se impune ca trăsătură generală alternanța cîmpurilor și luncilor. Pe cîmpuri depozitele de suprafață sînt alcătuite din materiale fine lacustre sau aluviale, foarte greu permeabile sau impermeabile, ceea ce determină un drenaj intern și extern

foarte slab. Aici s-au format argiluvisoluri, soluri silvestre afectate de procese de gleizare (brune luvice pseudogleizate). Aceste aspecte determină dificultăți deosebite pentru aplicarea tehnologiilor de cultură și condiții vitrege pentru dezvoltarea culturilor agricole sau spontane. Terenurile suferă de exces de umiditate în timpul primăverii și la începutul verii, uneori chiar în sezonul rece. Pe alocuri, în perioadele secetoase, datorită capacității reduse de înmagazinare a apei apare un deficit potențial de umiditate. Ca urmare solurile suferă de lipsă de apă. În lunci depozitele de suprafață sînt aluviale fine, cu soluri adecvate, dar frecvent apar situații de înmlăștinire sau exces de ape temporare, mai ales cu ocazia inundațiilor. În funcție de aceste condiții și de modul utilizării terenurilor în cadrul fiecărui fragment al câmpiei de glacisuri se pot separa: cîmpuri cu terenuri cultivate, cîmpuri cu păduri, cîmpuri cu pășuni și finețe naturale, lunci cu terenuri cultivate, lunci cu păduri, lunci cu pășuni și finețe naturale.

Cîmpia înaltă tabulară, formată pe depozite de loess și loessoide cu drenaj bun, are suprafața orizontală, dar afectată de microdepresiuni de tasare (crovuri) și aproape lipsită de o fragmentare fluvială. În general drenajul este bun, cu excepția uneori a crovurilor unde pot să apară situații temporare cu exces de umiditate, care sînt intrate, cu precădere, în circuitul agricol, cu soluri molice fertile (Cîmpia Careilor, Cîmpia Nădlacului). Reprezintă în totalitate un domeniu agricol.

Cîmpia înaltă de divagare, ca geneză, reprezintă vechi sisteme de divagare ale Mureșului pe vechiul său con aluvial, situate la o altitudine mai ridicată (110 — 115 m) decît nivelul general al câmpiei joase. Suprafața câmpiei este constituită de grinduri abia schitate și de porțiuni depresionare determinate de vechile brațe ale Mureșului. Datorită depozitelor de suprafață fine, a drenajului deficitar, a nivelului freatic situat la mică adîncime (1 — 3 m) și a apelor temporar stagnante, apare un mozaic de soluri amfigleice luvice. După modul de utilizare a teritoriului se individualizează cîmpuri de divagare cultivate, cîmpuri de divagare cu pășuni și finețe higromezofile, cîmpuri de divagare cu pășuni și finețe higrofile.

Cîmpia înaltă cu dune (Cîmpia Valea lui Mihai) reprezintă o parte sud-estică a Cîmpiei Nirului, avînd un relief de dune fixate cu

plantății de salcîm, cvercinee, cu culturi pomiviticele. Este o regiune cu drenaj bun, dar spațiile dintre dune au exces de umiditate și soluri hidromorfe ocupate de pășuni — pajiști hidromezofile și diferite culturi.

Cea mai mare parte din Cîmpia Joasă este reprezentată de cîmpia joasă de divagare din lungul cursurilor inferioare ale râurilor mari (Someș, Crișuri, Mureș, Timiș). Cîmpia are un microrelief complex (alternanță de grin-duri, bălciuge și cursuri părăsite), dezvoltat pe depozite cu textura mijlocie și fină. Drenajul este slab pînă la satisfăcător, iar nivelul freatic situat la mică adîncime (0 — 2 m) cu un grad ridicat de mineralizare influențează mult caracterul vegetației spontane. Solurile sînt aluviale divers evoluat, dar acolo unde sînt create condiții favorabile regimului hidric exudativ apar soluri salinizate sau solonețuri (în Cîmpia Salonte, Cîmpia Timișului etc.). Pe suprafețe întinse au fost efectuate numeroase lucrări hidroameliorative (canale de desecări, diguri, heleșteie destinate pisciculturii etc.).

Condițiile naturale și modul de utilizare a teritoriului permit separarea mai multor categorii de terenuri: cîmpuri de divagare cu pajiști higromezofile și mezohigrofile, cîmpuri de divagare cu pajiști halofile, cîmpuri de divagare cu păduri mezofile de *Quercus-ulmetum*, cîmpuri cu terenuri cultivate.

Cîmpia joasă tabulară (Cîmpia Jimboliei, cîmpurile Bega — Timiș, Timiș — Bîrzava), prezintă un relief neted, dar cu microdepre-siuni de tasare și cu numeroase forme antropice — gropi de împrumut și canale. Depozitele de suprafață sînt alcătuite din loess, ceea ce determină un drenaj satisfăcător. Adîncimea apelor freatice variază între 2 și 4 m ca nivele medii, avînd posibilitatea de urcare și coborîre cu încă 1 pînă la 1,5 m, iar gradul lor de mineralizare este destul de accentuat (3 — 4 g/l). Solurile predominante sînt cele molice tipice și molice cambice freatic umede. Aproape în totalitatea ei cîmpia este utilizată agricol.

Cîmpia de mlaștini desecate (Cîmpia Ece-dea și Cîmpia Ierului) a suferit intens acțiunea antropică mai ales prin lucrări de desecare. Are un relief neted, cu o înclinare foarte redusă, nivelul freatic ridicat și mineralizat. Solurile predominante sînt lăcoviștile, solu-urile turboase semidrenate, solonețurile și lăcoviștile salinizate.

Resursele solului și subsolului, potențialul agricol ridicat și modul rațional de utilizare

a teritoriului, gradul de populare a regiunii sînt factorii principali care au impulsionat desfășurarea unei activități social-economice intense.

Sînt cunoscute exploatarea de petrol și gaze din județele Timiș (Sînnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Teremia Mare, Varias, Satchinez, Călacea), Arad (Turnu), Bihor (Salonta, Borș, Abrămuț) și Satu Mare (Carei). Zăcămintele de lignit de la Sinersig și Cireșu (jud. Timiș) au fost readuse în actualitate. O mare atenție se acordă folosirii resurselor bogate de ape termale, începînd de la Satu Mare și continuînd la Carei, Valea lui Mihai, Săcueni, Marghita, Oradea, Borș, Băile Felix, Mădăraș, Salonta, Arad, Timișoara etc., pe seama cărora s-au dezvoltat importante stațiuni balneoclimaterice (fig. 31). Sînt utilizate pentru încălzirea unor suprafețe amenajate (serele de la Oradea, Valea lui Mihai) sau chiar pentru încălzirea locuințelor (Oradea). La marginea estică a cîmpiei apar și alte categorii de ape minerale: feruginoase (Tarna Mare, Turț, Valea Vinului, Sîntim-reu, Țipar, Mocrea, Lipova, Buziaș ș.a.), oligominerale (Acîș, Belțuș, Cermci, Chișineu Criș, Socodor ș.a.), bicarbonatate (Tîncă), sulfatate (Inand), unele din ele fiind amenajate pentru tratament (Tîncă ș.a.).

Cîmpia Banatului și Crișanei a cunoscut un vechi proces de populare și de dezvoltare avansată a așezărilor. În cuprinsul ei sînt 18 orașe cu o populație de aproape un milion de locuitori, respectiv 9,5% din populația urbană a țării. Patru se înscriu în categoria orașelor cu peste 100 000 de locuitori (Timișoara, Oradea, Arad, Satu Mare), alte două au între 25 000 și 50 000 de locuitori (Lugoj, Carei), în timp ce majoritatea fac parte din categoria orașelor cu mai puțin de 20 000 de locuitori (Marghita, Buziaș, Deta, Jimbolia, Sînnicolau Mare, Chișineu Criș, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pîncota).

În întreaga cîmpie predomină așezările rurale mari, dar frecvența celor cu peste 2 000 de locuitori, se accentuează în partea de sud. Se observă de asemenea că gradul lor de sistematizare este tot mai accentuat de la nord spre sud.

Industria, activitate de bază în Cîmpia Banatului și Crișanei, este prezentă prin aproape toate ramurile sale. Începuturile ei au fost condiționate de existența materiilor prime locale, respectiv de cele provenite din agricultură, care au contribuit la dezvoltarea



Fig. 31. Lacul Peșea cu apă termală, de la Pâlle 1 Mai (foto V. Sencu).

industrii alimentare și a celei ușoare. Industria energiei electrice este reprezentată numai prin termocentrale de talie mică (la Timișoara, Lugoj, Arad și Satu Mare), la care se adaugă o unitate mai mare (205 MW putere instalată) la Oradea, care utilizează zăcămintele de lignit din bazinul Barcăului. Tot la Oradea (în estul orașului) a intrat în funcțiune o altă termocentrală (Oradea II, cu o putere instalată de 150 MW) care va folosi lignitul exploatat la Borozel (Depresiunea Oradea — Borod) și la Hidișel (Dealurile Tășadului), iar la Arad este în construcție o unitate cam de aceeași mărime.

Industria metalurgiei neferoase este reprezentată numai prin uzina de alumina din

Oradea — prima de acest fel din țara noastră care prelucerează bauxita din Munții Pădurea Craiului.

Construcțiile de mașini și prelucrarea metalelor, ramura industrială cu ponderea cea mai mare, este prezentă prin multe din subramurile sale în numeroase centre. La Timișoara se realizează utilaj minier, chimic, pentru industria alimentară, tractoare, motoare și aparataj electric etc.; la Arad funcționează marea uzină de vagoane și o mare întreprindere de strunguri, o uzină de ceasuri și orologerie industrială, o uzină mecanică pentru agricultură și industrie alimentară; la Oradea se remarcă producția de mașini unelte, de mașini și utilaje pentru agricultură,

de accesorii și diferite piese pentru toate categoriile de mijloace de transport etc., iar la Satu Mare există specializare pentru utilaj minier, pentru vagoane de linie ferată îngustă, utilaj de transport continuu, utilaj chimic, mașini casnice etc. Uzinele din centrele menționate au, în multe cazuri, filiale în orașele mici sau în unele așezări rurale, cum este cazul la Carei, Marghita, Salonta, Chișineu Criș, Ineu, Lipova ș.a. Industria chimică este prezentă numai în câteva centre (Timișoara, Arad, și Oradea), dar realizând o gamă foarte variată de produse: solvenți, plastifianți, lacuri și vopsele, spume poliuretane, detergenți, înlocuitori din piele, îngrășăminte chimice, pigmenți anorganici de precipitare, produse fitofarmaceutice, produse chimice de sinteză organică.

Baza de materii prime insuficientă nu a dus la dezvoltarea unor unități mari de industrie a materialelor de construcții, prezentă totuși în toate orașele mari. Industria de prelucrare a lemnului este reprezentată prin importante fabrici de mobilă de la Satu Mare, Oradea și Arad, Carei, Salonta, Pincota, Ineu, Sinnicolau Mare, Lugoj etc., de placaje și furniruri de la Deta, rechizite școlare la Timișoara, parchet la Satu Mare, Bocsig, plăci aglomerate la Sinnicolau Mare etc. Industria ușoară are o dezvoltare deosebită în întreaga cîmpie cu unități de prelucrare primară a cînepii (Bervenii, Palota, Iratoșu, Nădlac, Biled), de produse textile (Arad, Timișoara, Sinnicolau Mare, Lugoj, Salonta, Oradea, Carei și Satu Mare), confecții și tricotaje (Timișoara, Jimbolia, Periam, Sinnicolau Mare, Arad, Oradea, Marghita, Satu Mare etc.), pielărie, încălțăminte, marochinărie (Satu Mare, Oradea, Marghita, Arad, Lipova, Timișoara și Jimbolia) etc. Industria alimentară are baza de materii prime aproape în totalitate în cîmpie, în unele cazuri ale provenind și din dealurile apropiate. Unitățile principale sînt amplasate în cele patru mari orașe (Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara), și alte numeroase localități (Carei, Valea lui Mihai, Salonta, Chișineu Criș, Sinnicolau Mare, Lugoj etc.).

Agricultura Cîmpiei Banatului și Crișanei are o bună bază de dezvoltare atît în privința condițiilor de mediu, cît și a factorului antropic, care a intervenit mai ales pentru înlăturarea excesului de umiditate din unele zone și din anumite perioade ale anului. În acest scop, au fost efectuate lucrări de îndiguiri și desecări în toate bazinele

hidrografice. Principalele culturi sînt cele de cereale (porumbul și grîul, orzul și orzoaica), după care urmează culturile tehnice: sfecla de zahăr, floarea soarelui, soia, cînepa, inul pentru sămînță etc. Luncile sînt utilizate pe scară largă pentru legumicultură. Trebuie menționată prezența unor importante suprafețe ocupate de sere (Arad, Oradea, Salonta, Sîntana, Valea lui Mihai etc.), în care se realizează cantități mari de legume pentru sezonul rece. În partea sudică este specifică și cultura vișei de vie, în podgoria Teremia Mare și în centrele viticole Recaş, Silagiu, Giarmata și Buziaș, care se întind însă și pe dealurile din apropiere (Lipova, Dealurile Silagiului).

Cultivarea pe suprafețe întinse a cerealelor și a plantelor de nutreț favorizează existența unui sector de creștere a animalelor bine dezvoltat. Se remarcă, în primul rînd, creșterea bovinelor în unități complexe în toate cele patru județe în cadrul cărora se cresc mai ales vite din rasa Bălțată românească. De asemenea, funcționează numeroase complexe de creștere a porcilor, unități pentru îngrășarea oilor și pentru creșterea păsărilor. În ultimele două decenii, au fost amenajate importante suprafețe pentru piscicultură, mai ales pe terenurile joase, cu exces de umiditate, heleșteele de la Cefa, Homorog, Inand și Tămașda (jud. Bihor), Ineu, Seleuș, Bocsig etc. (jud. Arad), Partoș, Banloc, Sacoșu Turcesc etc. (jud. Timiș).

Rețeaua căilor de comunicație este dezvoltată și are drept caracteristică principală existența șoselei și a căii ferate care străbate unitatea de la nord la sud, la care se adaugă căile rutiere și feroviare ce urmăresc toate rîurile principale ce străbat transversal cîmpia. Prin cîmpie se realizează importante legături rutiere și feroviare în Iugoslavia (Jam, Moravița și Jimbolia), Ungaria (Nădlac, Curtici, Vărșand, Salonta, Episcopia Bihor, Borș, Valea lui Mihai, Urziceni) și Ucraina (Halmeu).

Condițiile naturale, puternic modificate antropice, cu diferențieri evidente de la vest la est, ca și de la nord la sud și cu activitate socio-economică diferențiată la rîndul ei și cu tendințe evidente de gravitare către cele patru mari centre de polarizare (Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara) permit conturarea a trei mari subunități geografice: Cîmpia Someșului, Cîmpia Crișurilor și Cîmpia Banatului.

2.3.2. Cîmpia Someșului

2.3.2.1. Caracterele generale

Creație aproape exclusivă¹ a Someșului inferior (împreună cu actualii și foștii săi afluenți : Lăpușul, Turul, Homorodul, Crasna etc.), Cîmpia Someșului este încadrată, spre est, de înălțimile eruptive ale Munților Oaș — Gutii, cu care intră în contact prin intermediul unor fișii înguste de glaciș (la nord de cursul Someșului), respectiv de Dealurile Silvaniei (la sud de Someș). Pătrunde sub forma unor prelungiri către Depresiunea Oașului (în nord-est), Depresiunea Baia Mare (în est), Depresiunea Crasnei (în sud) ca rezultat al condițiilor diferite în care s-au format și al influențelor exercitate de unitățile vecine, mai înalte. Spre sud, delimitarea față de Cîmpia Crișurilor se poate trasa pe interfluviul abia schițat de la sud de valea Barcăului, iar limita vestică urmărește frontierele de stat cu Ucraina, între Tarna Mare și riul Tur și cu Ungaria, între riul Tur și satul Parhida.

Întreaga cîmpie este clădită pe un fundament cristalino-mezozoic, fragmentat de rețea de falii principale și secundare, ce le-au transformat într-o asociere de horsturi și grabenuri scufundate inegal, la adîncimi de peste 1 000 m : 1 450 — 1 700 m în regiunea Foieni, 2 000 m în cîmpia de dune a Nirului, 3 000 m la Carei. Cratoclinalele dețin, în orizonturile de calcare și dolomite, importante rezerve de ape carstice, mezo- și hipotermale, cu caracter ascensional sau artezian, mai abundente la nord de Valea lui Mihai. Față de acestea, horsturile sînt mult mai sărace în asemenea rezerve, fapt ce se remarcă și în distribuția neregulată a actualilor captări ale apelor termominerale.

În alcătuirea petrografică a respectivelor compartimente intră și sedimente paleogene, intersectate în sondajele de la Carei, Pișcolț, Curtuișeni etc. și reprezentate prin alternanțe de argile negricioase, conglomerate poligene, gresii și marne eocene (în petice) și oligocene, pe grosimi de 400 — 600 m.

Depozitele mio-pliocene alcătuiesc, însă, adevărata cuvertură, cu grosimi de peste 1 000 — 1 200 m și cu mari variații de facies (marin, salmastru, lacustru, continental), tră-

dînd etape distincte de evoluție ale cîmpiei, dar și ale regiunilor alăturate ; spre exemplu, intercalarea orizonturilor de tufuri, începînd din badenian, trădează principalele faze de erupții succesive din Munții Oaș — Gutii. Seria sedimentară se încheie cu pachetul de aluviuni fluviale (local și depozite eoliene), pe care se grefează microrelieful actual. Oscilațiile climatice cuaternare au generat, în bună parte, condiții diferite — ca intensitate — ale eroziunii areolare și fluviale, explicîndu-se, astfel, alternanțele de pietrișuri, nisipuri, mluri, în funcție de care se dispun, în prezent, orizonturile acvifere superficiale.

Pentru pliocen, dar mai ales pentru cuaternar, un rol deosebit în evoluția Cîmpiei Someșului l-au jucat mișcările pe verticală, cu deosebire cele două arii de subsidență mai pronunțată, ale Bodrogului și Crișurilor, cu consecințe principale privind remanierile repetate ale rețelei hidrografice, înecarea teraselor, „retezarea” piemonturilor periferice etc.

Încadrîndu-se în categoria șesurilor joase, din vestul țării, Cîmpia Someșului variază, ca altitudine absolută, între 110 și 140 m, cu ușoare înclinări de la nord la sud (130 m la Halmeu, 110 m la Săcueni și ceva mai accentuate de la est la vest (141 m la Apa, 114 m la Berveni). Se depășesc aceste valori numai în cîmpia de nisipuri Carei — Valea lui Mihai, datorită dunelor (155 m la nord-vest de Curtuișeni, 160 m la nord de Scărișoara Nouă).

Uniformitatea reliefului (privit în ansamblu) se diversifică mult în detaliu, prin asocierea cîmpurilor cu denivelări ușoare, cu albiile largi, active sau părăsite ale rîurilor, cu întregul lor complex al microreliefului de luncă : grinduri, albiile părăsite, popine, belciuge, iar ca elemente ale reliefului antropic, diguri, canale de drenaj, rambleuri ale căilor de comunicație etc. O notă aparte prezintă relieful de dune (2 — 18 m înălțime) și microdepresiuni intercalate, în cea mai mare parte cu exces de umiditate. De asemenea, în Cîmpia Ecchedea se individualizează microdepresiuni rezultate din tasarea orizontului superficial (solificat), în urma unor exploatați sau a incendierii accidentale a depozitelor de turbă.

După poziția geografică pe care o au cîmpurile (din ce în ce mai largi spre vest și cu nivelul freatic la adîncimi de 2,5 — 5 m și chiar mai mult), față de culoarele actualelor văi puternic meandrate și cu trasee încă divagante (nivelul freatic sub 2,5 m) se poate

¹ Pentru cîmpia de nisipuri Carei — Valea lui Mihai (Cîmpia Nirului) trebuie luată în considerare și activitatea de aluvionare a Tisei, iar în extremitatea sudică, aceea a Barcăului.

reconstitui delta cuaternară a Someșului, cu virful în sectorul Cicirlău — Ardușat.

Particularitățile climatice, transmise, la rîndul lor, celorlalte componente ale peisajului, sînt determinate de poziția în nord-vestul țării și de contactul cu Depresiunea Panonică.

Regimul termic se caracterizează prin valori medii anuale de 9.7°C la Satu Mare și 9.6°C la Carei, de 20.1°C la Satu Mare și 20.7°C la Carei în luna iulie, — 2.7°C la Satu Mare și — 3.1°C la Carei în luna cea mai rece, ianuarie. Cîmpia Careilor și culoarul Ierului sînt afectate de inversiuni termice.

Mai semnificativ, sub influența circulației de dominantă vest-sud-vestică și respectiv sud-estică (10,6% — determinată de prezența culoarului Someșului), apare regimul precipitațiilor: 618 mm anual la Satu Mare și 584 mm la Carei, cu creșteri progresive spre fișia piemontană. Lunile iunie și iulie înregistrează cantitățile maxime de precipitații (83,1 mm și 76,3 mm la Satu Mare, comparativ cu 81,6 mm și 54,9 mm la Carei), iar ianuarie și februarie, cele mai reduse (41,4 mm și 38,4 mm la Satu Mare, 30,5 mm și 28,0 mm la Carei).

Raportînd media anuală a precipitațiilor la evapotranspirația potențială rezultă un excedent de apă de 94 mm în lunile ianuarie — martie și un deficit de 98 mm în iulie — septembrie. Deficitul de umiditate nu constituie, însă, o problemă pentru Cîmpia Someșului, ci mai curînd excesul de umiditate, care afectează desfășurarea muncilor agricole (cu precădere primăvara), într-o bună parte a teritoriului.

Structura deltaică a aluviunilor cuaternare explică particularitățile apelor freatice din Cîmpia Someșului, în care se întîlnesc, pe lîngă straturile acvifere cu nivel liber (caracterizînd arealele frecvent inundabile, în general înmlăștinite) și celelalte categorii: strate acvifere suprafreatice (epidermice), freatice pe suprafețe restrînse și cu grosimi de 1 — 7 m și strate acvifere captive, la adîncimi variînd între 4 — 5 m (Vîile Satu Mare), 6 — 8 m (Carei) și 23,5 m (Sătmărel) și cu grosimi cuprinse între 1,70 m la Satu Mare și 5,30 m la Sătmărel. Local se întîlnesc și stratificații cu două orizonturi captive. Deși dispun de debite apreciabile, datorită conținutului lor de săruri, sînt ape carbonatate — calice — magneziene, cu valori ridicate ale durtății (între 12 și 16° dH), astfel că devin nepotabile și chiar agresive față de fier și

betoane (I. Buta și colab., 1976, 1977). Mineralizările accentuate (500 — 1 000 mg/l) condiționează, pe alocuri, sărăturarea terenurilor agricole (I. Buta, V. Sorocovschi, 1971).

Rețeaua de riuri — Someș, Tur, Crasna, Ier — se întregește cu o serie de canale de drenaj, pentru înlăturarea excesului de umiditate: canalul Homorodul Nou, colector al tuturor pîraielor coborîte din dealuri (Homorod, Medișa, Valea Morii, Sărata, Gerăușa), canalul Ghilvaci, canalul Keleti, canalul Bălcaia, canalul Vetiș-Doba etc. (fig. 32). În anii secetoși, întreaga rețea de văi autohtone se transformă în areale restrînse de băltiri și mlaștini sau seacă temporar. În schimb, în anii excesiv de ploioși (ca în 1970), debitele medii relativ modeste (8,80 m³/s pe Tur la Turulung, 114 m³/s pe Someș, la Satu Mare, 5,23 m³/s pe Crasna, la Moftinu Mare) au atins valori impresionante (565 m³/s pe Tur, 3 400 m³/s pe Someș, 575 m³/s pe Crasna la stațiile citate) care au afectat, în 1970, nu numai circa 130 000 ha terenuri agricole, ci și peste 50 localități, inclusiv municipiul Satu Mare. Lucrările de îndiguiuri și desecări, cu primele începuturi, menționate în secolul XVIII, dar cu realizări mai substanțiale între 1894 și 1920 (cînd s-a drenat și fosta mlaștină, de circa 34 000 ha, a Ecedei) și între 1951 și 1956 și, mult mai complexe, amenajările recente, după marile inundații din 1970, protejează o suprafață de peste 160 000 ha (terenuri agricole, vetre de așezări, căi de comunicație). Între altele, lacul de acumulare de la Călinești — Oaș (360 ha) a rezolvat în foarte mare măsură problema inundațiilor din bazinul văii Turului. Asemenea retenții, dar de dimensiuni mai modeste, s-au amenajat și pe văi mai mici, atît în bazinul Ierului (Andrid — Dindești, Vășad, Galoșpetreu, Șimian etc.), cît și în cele ale Turului și Homorodului (Micula — Bercu, Medișa, Hodișa etc.).

Vechea regiune de silvostepă a fost luată aproape integral în cultură prin defrișări, desteleniri și desecări, astfel că asociațiile primare de vegetație se păstrează doar insular. Cîteva trupuri mai reprezentative de pădure de stejar (*Quercus robur*), uneori asociate cu carpen (*Carpinus betulus*), pe terenurile mai uscate și de ulm (*Ulmus campestris*), pe cele mai umede, s-au păstrat la Livada, Ardud, Ciuperceni, Foiene, Micula. Sub formă de fișii înguste se mențin pădurile de luncă, de pe terasele vechilor și actualelor cursuri ale Someșului, cu asociații de esențe

moi, în curs de înlocuire cu plantații de plop. În Cîmpia Carei — Valea lui Mihai, pentru fixarea dunelor mobile, s-au executat plantații de salcîm (*Robinia pseudoaccacia*), pin (*Pinus silvestris*) și alte esențe.

Pajiștile naturale, sensibil restrînse, sînt reprezentate prin asociații de țapoșică (*Nardus stricta*) și păiuș roșu (*Festuca pseudocina*), la care se mai adaugă și iarba albastră (*Puccinella limosa*). Festucetele (*F. sulcata*, *F. pseudocina*, *F. valesiaca*) sînt dominante la periferia Cîmpiei Carei — Valea lui Mihai, față de interior, unde se întîlnesc complexe de vegetație arenicolă, cu *Festuca vaginata*, *Agrostis tenuis* și *Carex distans*. Se întîlnesc, apoi, în locurile cu exces de umiditate, suprafețe destul de extinse de asociații higrofile. Ca elemente mai deosebite se întîlnesc: lealeaua pेत्रिță (*Fritilaria meleagris*), protejată în pădurile din preajma Seinelor, lăcrămioara (*Convallaria majalis*) în pilcurile de păduri de stejar ale Careilor, sadina (*Crisopogon gryllus*), ca element mediteranean, pe nisipuri, mixandra sălbatică (*Eryssimum adoratum*), element atlantic-mediterranean. Fauna proprie silvestrei vestice are ca element caracteristic popîndăul (*Citellus citellus*), alături de potîrnice (*Perdix perdix*), prepeliță (*Coturnix coturnix*), fazan (*Phasianus colchicum*) — colonizat, iepure (*Lepus europaeus*), căprior — în păduri (*Capreolus capreolus*). Este de menționat pătrunderea masivă a bizamului (*Ondatra zibethica*), din Ungaria, în părțile mlăștinoase.

Deosebit de interesantă este fauna avicolă, cu elemente rare, care poposesc în perioadele de migrare (specii de rațe, gîște, stîrci, lăcari, nagîți etc.).

Deși în condiții de relativă uniformitate morfologică și bioclimatică, solurile din Cîmpia Someșului prezintă un mozaic determinat, în cea mai mare măsură, de microrelief și mai ales de dependente față de nivelul freatic. Fondului general de luviosoluri albe (podzoluri argiloiluviale și brune luvice, în bună parte gleizate) i se alătură, în Cîmpia Carei — Valea lui Mihai, molisolurile (cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri aluviale), iar ca fișii intercalate, soluri brune eu-mezobazice și brune luvice podzolite (pe terenurile mai zvîntate), soluri pseudogleice, inclusiv luvice (pe cele mai umede), soluri aluviale și protosoluri aluviale (pe luncile joase ale Someșului, Crasnei și Turului) și, cu o frecvență relativ mare, soluri hidromorfe: gleice, pseudogleice, negre clinohidromor-

fice și lăcoviști (pe terenurile cu exces de umiditate cu deosebire în Cîmpia Ecedei și în culoarul Ierului). Cîteva insule de soloneșuri se dezvoltă tot la sud de Someș, între Homorod și Ier. În zona dunelor sînt dezvoltate psamosolurile cu grad redus de fertilitate.

Cîmpia Someșului reprezintă un spațiu propice dezvoltării vieții omenesti, prezența omului făcîndu-se simțită încă din paleolitic și neolitic (culturile Criș și Tisa), dar mai ales din epoca bronzului cu peste 100 de așezări, necropole și depozite. Vestigiile de la Berea, Ciumești, Foieni, Sanislău, Pișcolt, Tiream, Carei, Satu Mare, Lazuri, Medieșu Aurit etc., ca și depozitele de bronz și fier de la Domănești, Vetiș, Livada, Apa, Căuaș, Acîș etc. vorbesc de prezența și continuitatea de locuire a triburilor nord-tracice (dacii mari) pe întreaga cîmpie someșană.

Continuitatea de locuire este atestată de așezările dacilor liberi (de la Medieșu Aurit, Lazuri, Moftinu Mic, Berveni, Carei, Ciumești, Satu Mare, Turulung, Ghirișa etc.). Revelatoare este prezența a numeroase cuptoare de ars ceramică descoperite la Medieșu Aurit („Suculeu”) în 1964 și la Lazuri (1974 — 1980), care demonstrează gradul ridicat de cultură materială, la care ajunsese populația dacică în secolele II — IV d. Chr. fapt pentru care, cele două vetre descoperite — Lazuri și Medieșu Aurit — au fost declarate rezervații arheologice.

În perioada marilor migrații populația continuă să rămînă pe aceleași vetre de locuire. Grupate în obști, conduse după rînduiri proprii (*jus valahicus*), așezările făceau parte din una dintre cele mai mari formațiuni prestatele românești — voievodatul lui Menumorut (sec. IX — X), care dispunea de o puternică cetate — Cetatea Sătmăruului (Castrum Zothmar), pomenită de cronicarul regelui Bela III). Din aceeași perioadă datează și Cetatea Medieșului (A. Tăutu, 1967), care a fost cucerită în secolul XI de feudații maghiari „din mîinile valahilor” (Șt. Pascu, 1979).

Existența în secolele XIII — XIV a districtului românesc și a cetății Ardudului confirmă continuitatea și prezența populației autohtone în aceste locuri. Este de subliniat permanența fondului autohton românesc pe parcursul secolelor în pofida colonizărilor repetate întreprinse cu populație de origine maghiară, germană, ucraineană și slovacă.

Pe ansamblul Cîmpiei Someșului, între 1910 și 1987, populația a înregistrat un mers

ascendent, exprimat printr-o creștere medie anuală de circa $7,0\text{‰}$, mai accentuată în perioada 1966 — 1987 ($8,9\text{‰}$), astfel că în 1987 populația totală a depășit 382 000 de locuitori.

Analiza pe cele două medii — urban și rural — scoate în evidență creșterea vertiginoasă a populației urbane, de la 20% în 1910 din populația totală, la peste 40% (161 000 de locuitori în 1987) pe seama populației rurale, marcată de fenomene de migrare.

Politica de dezvoltare a unor activități industriale diminuează fenomenul de migrare a populației rurale. Așa se explică creșterea populației localităților Seini, Livada, Ardud, Valea lui Mihai.

Între anii 1910 și 1987 densitatea populației a crescut cu peste 35 loc./km² (de la 70 la 107 loc./km²). Valori mai ridicate sînt înregistrate în lungul Someșului (127 loc./km²) și la contactul dintre cîmpiile joasă și înaltă (Ardud — Tășnad — Sălacea — Săcueni 122 loc./km²), compensînd pe cele din regiunea nisipurilor (sub 40 loc./km²).

Sporul natural, în general redus (sub 5‰ media anuală), exceptînd Livada, Turulung, Halmeu și Satu Mare care depășesc 10‰ , nu poate echilibra reculul demografic resimțit în peste 90% din așezările rurale, datorat plecărilor, oglindite de valorile ridicate ale sporului migrator (peste 15‰ în 20 din cele 48 de comune ale Cîmpiei Someșului). Așa se explică sporul total al populației orașelor Satu Mare și Carei, realizat în proporție de 2/3, în perioada 1978 — 1987, prin aportul sporului migrator (media anuală a acestuia în Satu Mare fiind de $19,3\text{‰}$ iar a orașului Carei de $12,2\text{‰}$), în timp ce sporul natural a fost de $10,5\text{‰}$ și respectiv $5,7\text{‰}$. Cîmpia Someșului se situează printre regiunile cu o predominare (63,8%) a celor cuprinși între 15 și 60 de ani (deci populație activă), mai numeroasă fiind grupa celor dintre 20 și 35 de ani. Menținerea nivelului scăzut al natalității face ca grupa populației pînă la 14 ani să dețină 23,4% (mai scăzut în mediul urban, de 21,8%).

Profilul dominant agricol este oglindit de structura profesională, în care populația ocupată în agricultură, exceptînd mediul urban — deținea în 1987 peste 70%. Înaintea celui de-al doilea război mondial populația rurală ocupată în agricultură, cu excepția localităților Seini, Valea lui Mihai declarate orașe în anul 1989 și Ardud și Halmeu — era, în fiecare localitate, de peste 90%. Dezvol-

tarea unor activități productive neagricole (industriale și de servicii), îndeosebi în ultimele două decenii au produs schimbări în structura profesională, din care, cele mai evidente înregistrîndu-le cei ocupați în industrie: de la 7% la 20% din populația activă. În 22 de așezări rurale numărul celor ocupați în activitățile neagricole depășește 30% din populația activă (Micula, Ardud, Livada, Berveni, Săcueni și cele aflate în sfera de influență directă a orașelor Satu Mare și Carei (Lazuri, Botiz, Mărtinești, Odoreu, Păulești, Petin, Ambud, Amați, Mădăraș, Sătmărel și respectiv Căpleni, Lucăceni).

Structura profesională a centrelor urbane este dominată de ponderea celor ocupați în industrie (56% în Satu Mare, 45% în Carei și 40% în Tășnad din totalul populației active).

Unul din fenomenele demografice de mare actualitate îl constituie mobilitatea forței de muncă, exprimată în Cîmpia Someșului printr-un accentuat navetism, generat nu numai de amploarea industriei și construcțiilor, ci și de dezvoltarea activităților terțiare: peste 80% din navetiști, evaluați la 10 000 — 12 000, este înregistrat de Satu Mare.

Influențată deopotrivă de condițiile naturale și cele social-economice, mărimea așezărilor este foarte variată: între 200 și 1 200 de locuitori (fig. 32). Din cele 193 așezări 5 sînt centre urbane: Satu Mare cu statut de municipiu, reședință de județ, Carei, Tășnad, Seini și Valea lui Mihai, ultimele două fiind cele mai tinere orașe cu o industrie variată și agricultură cu profil predominant pomicolo-zootehnic. Aproximativ 60% din cele 188 de așezări rurale sînt cele mici și mijlocii (sub 1 000 de locuitori). Cele mari (1 000 — 3 000 de locuitori) în număr de 17 reprezintă 8,7% din totalul așezărilor. Așezările foarte mari s-au dezvoltat îndeosebi în zonele de contact (Ardud, Săcueni, Dicsig, Sanislău etc.) și de-a lungul căilor de comunicație (Livada, Halmeu, Odoreu, Botiz). Dintre acestea se detașează Săcueni și Livada (cu peste 7 000 de locuitori). Cele mai multe așezări au o formă poligonală neregulată, ceea ce reflectă vechimea lor, spre deosebire de cele mai noi care au forma poligonală regulată. Și unele și altele au tendință de extindere tentaculară de-a lungul căilor de comunicație.

Din categoria așezărilor mixte se evidențiază Botiz, Ardud, Medieșu Aurit, Livada,

Săcueni și localități a căror extindere s-a conceput după planuri de sistematizare.

În general trama stradală a așezărilor vechi este neregulată, uneori întortochiată (Diosig, Săcueni, Sălacea, Domănești, Lazuri, Valea Vinului) spre deosebire de a celor formate prin colonizări, sau recent înființate, în care rețeaua de străzi este ordonată. Asemenea textură regulată au satele alungite cu una sau două axe principale. Structura dominantă este cea adunată cu tendință de aglomerație (Livada, Halmeu, Ardud, Săcueni, Medieșu Aurit etc.). Excepție fac așezările mai noi formate prin fenomenul de roire (Turulung-Vii, Pășunea Mare, Medieș-Vii, Vinătoarești, Mesteacănu).

În partea înaltă a Cîmpiei Someșului și în Cîmpia Careilor sînt localități cu tendință de compactizare în partea centrală a vetrei. Majoritatea așezărilor s-au dezvoltat fie pe terenurile mai înalte din luncile râurilor și pe terasele acestora, fie la contactul cu măgurile vulcanice (Turulung-Vii, Medieș-Vii, Orașu Nou-Vii), sau cu cîmpia înaltă (Homorodu de Jos, Ardud, Belciug, Săcășeni, Tășnad, Sălacea, Otomani, Săcueni, Diosig). Datorită lucrărilor hidroameliorative, așezări noi s-au dezvoltat în ariile umede slab populate (Tur—Someș și Someș—Crasna), ca și în regiunea terenurilor nisipoase (Horea, Scărișoara Nouă).

Gradul cel mai mare de concentrare al așezărilor îl are Valea Someșului, favorizată fiind de fertilitatea terenului și căile de acces.

Tipul funcțional dominant este cel agricol în care se diferențiază cîteva subtipuri: cerealier și de creștere a animalelor în partea centrală și de sud-vest; cerealier, legumicel și de creștere a animalelor în luncile Someșului și Crasnei; cerealier, cultura plantelor tehnice și de creștere a animalelor în estul Cîmpiei Careiului și Ecedei; pomicol-viticel, cultura plantelor tehnice și creșterea animalelor în cîmpiile înalte ale Tășnadului și Ardudului și pomicol-viticel și de creștere a animalelor în Cîmpia Sălacea—Roșiori.

În cadrul tipului predominant — agricol s-au diversificat patru subtipuri determinate de activitățile neagricole: așezări agricole cu funcții industriale (Seini, Valea lui Mihai, Săcueni, Ardud, Berveni, Apa); așezări agricole cu funcții industrială și de servicii (Dorolț, Lazuri, Odoreu, Livada, Păulești), așezări agricole cu funcții de servicii (Vetiș, Botiz, Sătmărel, Decebal, Foieni,

Căpleni); așezări agricole cu funcție de transport (Halmeu).

Marea diversitate morfohidrografică, căreia îi corespunde o mare varietate pedoclimatică (de la molisoluri și argiloiluviale la lăcoviști și psamosoluri), a permis dezvoltarea unei agriculturi complexe, îndeosebi în urma executării amplelor lucrări de îmbunătățiri funciare, cu prioritate hidroameliorative și de valorificare complexă a terenurilor nisipoase, declanșate în ultimele trei decenii. Aceste lucrări au avut drept rezultat modificări în structura fondului funciar.

Astfel, din suprafața totală de 3 600 km² peste 83% îl constituie suprafața agricolă, care după 1950 a fost extinsă ca urmare a amenajării integrale a văii Ierului și executării lucrărilor de modelare și nivelare a dunelor în vederea valorificării pomicol-viticole a acestor terenuri neproductive. În perioada 1950 — 1988, a crescut ponderea terenurilor arabile de la 30 la 70% și a plantațiilor pomicole și viticole, a căror suprafață a fost triplată (acestea însumind în 1988 circa 14 000 ha), ceea ce reprezintă 4,6% din suprafața agricolă. Extinderea plantațiilor în masiv, intensive atît în Cîmpia Înaltă, cît și în regiunea terenurilor nisipoase de la vest de Carei și Valea lui Mihai a făcut ca pomicultura să devină una din ramurile agricole cu cea mai înaltă productivitate.

Viile, prin noile plantații din cîmpia înaltă (Ardud, Tășnad, Sălacea—Săcueni) și cele de la poalele măgurilor vulcanice ale Oașului, au ajuns la peste 4 500 ha (1,5% din suprafața agricolă). Trei noi centre viticole — Rătești, Săcueni și Valea lui Mihai — s-au adăugat celor vechi: Seini, Ardud, Belciug și Diosig.

În structura culturilor agricole cerealele dețin 66,3% din suprafața cultivată, cu predominarea porumbului (47% din suprafața ocupată de cereale). Secara se cultivă cu precădere pe terenurile nisipoase, pe cînd orzul și grîul preferă terenurile mai svîtate din Cîmpia joasă și din estul Cîmpiei Careiului. Respectarea măsurilor agrotehnice diferențiate și introducerea soiurilor hibride de mare productivitate au permis ca producția de cereale a Cîmpiei Someșului să depășească, în 1987, 400 000 tone.

Cîmpia Someșului se detașează prin cultura plantelor textile — cînepa și inul pentru fuior (5,7% din suprafața cultivată) — cu predominarea cînepii în Ecedea și Cîmpia Ierului, iar a inului pentru fuior în Cîmpia Înaltă (Ardud și Tășnad), dar și în cîmpia

joasă, pe terenurile mai svintate. De subliniat că în Cîmpia Crasnei se obțin cele mai mari producții de cîneapă din țară (peste 5 000 și chiar 7 000 kg tulpini/ha). Dublarea suprafeței cultivate a dus la construirea a două noi unități de prelucrare a inului și cînepii la Carei și Supuru de Jos.

O creștere considerabilă a suprafeței cultivate a înregistrat sfecla de zahăr (peste 8 ori nivelul antebelic), cîmpia joasă și cea a Ierului deținînd 2/3 din suprafața cultivată, care în 1987 a fost de aproape 11 000 ha. De asemenea, cultura cartofului și a legumelor s-a extins de peste 6 ori, iar producția totală a crescut de circa 11 ori, ajungînd în anul 1987 la peste 250 000 t (locul doi după cereale). Cultura legumelor se practică pe suprafețe mari în lunca Someșului și s-a extins considerabil în ultimul deceniu în Cîmpia Carei — Valea lui Mihai și datorită solicitărilor tot mai mari de legume ale fabricilor de conserve de la Valea lui Mihai și Carei. Totodată se cultivă și pepenii.

Cîmpia Someșului se impune pe plan național și prin cultura căpșunului (pe 1 790 ha, adică 18% din suprafața cultivată cu căpșuni pe țară), îndeosebi în partea de nord-est, în Cîmpia joasă a Someșului.

În regiunea terenurilor nisipoase s-a introdus, în ultimii ani, cultura lăptășului (350 ha) în scopul ridicării fertilității solurilor.

Dezvoltarea creșterii animalelor a impus extinderea culturilor furajere de la 12 000 ha la peste 22 000 ha, pe care se cultivă trifoliene în proporție de peste 60%. Densitatea animalelor (pe specii) este superioară mediei pe țară la bovine și porcine (50 față de 47 bovine la 100 ha teren agricol și respectiv 180 față de 124 porcine la 100 ha teren arabil) și apropiată la ovine de media țării (122 față de 125 ovine la 100 ha/agricol).

În perioada postbelică s-a pus accentul și pe creșterea păsărilor în ferme avicole de mare capacitate (Seini, Satu Mare). Caracterul modern și în același timp eficient al zootehniei someșene îl constituie extinderea sistemului de creștere în ferme specializate, complexe și îngrășătorii (peste 30 de asemenea unități), la care își aduce o însemnată contribuție centrul de selecție și reproducție județean Satu Mare, precum și Stațiunea de cercetări Livada.

Ca resurse ale subsolului, Cîmpia Someșului deține rezerve importante de ape termale și termominerale cu slabă mineralizație (1,2 —

1,5 g/l), dar cu temperaturi ce variază între 50 și 80°C la suprafață și 120 — 140°C la adîncimea de 2 000 m (în aria celor 5 anomalii geotermice depistate — Mihai Bravu, Roșiori, Ciocaia, Săcueni, Găloșpetreu și Pișcolt). Utilizarea actuală a apelor termominerale în scop terapeutic și de agrement se face la Satu Mare, Carei, Mofinu Mare, Ady Endre, Acîș, Tășnad, Ciocaia și Săcueni.

În ultimul deceniu au fost puse în evidență mai multe structuri de hidrocarburi la Carei, Tiream, Pișcolt, Curtușeni, Săcueni, Ciocaia, Mihai Bravu și Roșiori. Dintre acestea sînt exploatate cele de la Carei, Săcueni, Ciocaia și Roșiori. Sînt de asemenea utilizate argilele de la Carei, Tășnad și Valea lui Mihai (la fabricile de cărămidă), balastul din depozitele aluviale ale Someșului (Apa, Culciu, Berindan, Satu Mare), dar mai cu seamă nisipul cuarțos, exploatat la Valea lui Mihai și Sanislău pentru industria metalurgică.

Grație echipării moderne a unităților industriale, în ultimele trei decenii, volumul producției industriale a Cîmpiei Someșului a crescut substanțial. De subliniat că ponderea cea mai mare din producția industrială (94,7%) o deține Satu Mare, Carei și Tășnad. Cea mai mare parte a industriei este concentrată în Satu Mare, centru care a exercitat o influență pozitivă asupra unei regiuni întinse, stimulînd înființarea de întreprinderi independente sau secții ale unor unități industriale sătmărene în numeroase localități rurale: Ardud, Beltiug, Livada, Odo-reu etc. Dintre ramurile industriale, cea a construcțiilor de mașini precumpănește (peste 48%), datorită modernizării întreprinderilor din Satu Mare. Prelucrarea lemnului deține aproape 10%, dar are o răspîndire mare (Satu Mare, Carei, Tășnad, Ardud, Livada, Săcueni etc.). Industria ușoară deține 22% din valoarea producției globale industriale a regiunii, ocupînd primul loc după ramura construcțiilor de mașini. Răspîndirea cea mai mare, dintre toate ramurile, o are industria alimentară, care valorifică o mare parte din resursele vegetale și animale ale regiunii; deține 15% din volumul total al producției globale și livrează produse din carne, lapte și produse lactate, uleiuri comestibile, paste făinoase, conserve, vinuri, tutun etc. În noua orientare privind valorificarea pe loc a resurselor agricole se înscrie și aceea a prelucrării cînepii și inului în topitoriile de la Bervenii, Carei și Supuru de Jos. În ultimii

ani s-au înființat numeroase unități cu caracter meșteșugăresc (pentru producția de covoare, tricotaje, confecții, produse din mase plastice etc. la Livada, Ardud, Beltiug, Rătești, Sanislău, Săcueni), în scopul utilizării judicioase a disponibilului forței de muncă locale.

Cîmpia Someșului dispune de o variată rețea rutieră și feroviară, ordonată pe axa Oradea — Carei — Satu Mare — Baia Mare, care pune regiunea în legătură directă atât cu întreaga țară, ca și cu statele vecine — Ungaria și Ucraina prin punctele de frontieră Valea lui Mihai, Berveni, Petea și Halmeu.

Sporindu-se gradul de viabilitate prin acțiunea de modernizare integrală a drumurilor naționale și în proporție de peste 3/4 a celor județene și comunale, a crescut fluenta traficului de mărfuri și călători, cînd regiunea a fost conectată la sistemul aerian de comunicații.

Cîmpia Someșului dispune totodată și de un apreciabil patrimoniu turistic exprimat atât prin peisaje naturale, unele cu un grad ridicat de atracție, ca lunca Someșului, rezervațiile silvice de la Noroieni, Livada și Foieni și floristice de la Voivozi, parcul dendrologic de la Carei, cît și prin numeroase obiective istorice: rezervații arheologice (Lazuri și Medieșu Aurit), cetăți și castele feudale (Ardud, Medieșu Aurit, Livada și Carei), muzee (Carei și Satu Mare), monumente istorice (Carei, Satu Mare), case memoriale (Apa) și amenajările cu caracter balnear și de agrement (Satu Mare, Carei, Moftinu Mare, Beltiug, Acis, Tășnad, Valea lui Mihai, Săcueni).

2.3.2.2. Cîmpia Înaltă a Someșului

La contactul dintre Dealurile Silvaniei și Cîmpia Someșului se desfășoară o fișie continuă de glacisuri, cu lățimi ce variază între 3 și 15 km, ocupînd o suprafață de circa 560 km², care constituie o treaptă înaltă a Cîmpiei Someșului. Pe toată lungimea de peste 100 km, relieful fragmentat de riurile Homorod, Crasna, Ier și afluenții acestora reprezintă asocieri de forme fie cu treceri domoale, sub forma unor trene ca în sectoarele Crucișor — Ardud — Beltiug și Acis — Tășnad — Sălacea, fie cu pante mai accentuate între Beltiug și Dobra și Sălacea — Diosig (fig. 32).

Particularitățile morfo- și pedoclimatice au favorizat locuirea timpurie intensivă și neîntreruptă, iar numeroasele vestigii arheologice reprezintă mărturii ale răspîndirii culturilor materiale (Otomanii și Suciu de Sus, așezările fortificate de la Ardud și Crucișor, cu rol de apărare în fața popoarelor migratoare în sec. X — XI).

În cele 50 de așezări actuale locuiește o populație de peste 68 000 de locuitori, ceea ce reprezintă o densitate de circa 122 loc./km², dublă față de cea din Cîmpia joasă a Someșului.

Acțiunea de dezvoltare a industriei mici, de dotare edilitară a unor așezări (Ardud, Beltiug, Rătești, Săcueni, Viile Satu Mare etc.) este menită să atenueze fenomenul de diminuare demografică. Deja Ardud și Săcueni au fost echipate, în perioada 1978 — 1988, cu mai multe capacități industriale și construcții edilitare.

Cîmpia Înaltă a Someșului, avînd un relief cu expunerea generală spre nord-vest, un drenaj bun și precipitații suficiente (650 — 700 mm), a favorizat dezvoltarea culturilor de pomi fructiferi (circa 5 000 ha în 1988) și de viță de vie (3 000 ha), alături de culturile cerealiere și tehnice tradiționale (în și cînapă peste 3 600 ha). Paralel cu lucrările de combatere a eroziunii și terasării terenurilor s-au executat ample lucrări hidroameliorative: regularizarea cursurilor Homorodului, Crasnei, Fâncicai prin crearea a 12 acumulări permanente pentru atenuarea viiturilor.

S-au conturat patru arii specializate pomicol-viticole: Homorod — Viile Satu Mare — Ardud (predominant pomicol), Beltiug — Rătești (viticol), Tășnad (pomicol) și Săcueni — Cadea — Diosig (pomiviticol) cu largi perspective de dezvoltare. Pe fondul tradițional, creșterea animalelor, în perioada 1960 — 1988 a fost dezvoltată pe baze noi cu caracter intensiv. În 1988 regiunea dispunea de circa 20 000 de ovine, peste 58 000 de bovine și 27 500 de porcine, remarcîndu-se unitățile de la Ardud, Beltiug, Tășnad, Pir, Săcueni, și Cadea. Cîmpia Înaltă a Someșului este favorizată prin accesul la două artere feroviare care o leagă de Oradea, Satu Mare, Carei și Marghita și trei șosele naționale care asigură traficul de mărfuri și călători.

În cadrul Cîmpiei Înalte a Someșului se disting trei subunități naturale, și anume: Cîmpia Ardudului, Cîmpia Tășnadului și

Cîmpia Sălacea — Roșiori, ce se impun în peisajul geografic regional.

Cîmpia Ardudului (circa 200 km²). Dispusă în evantai în vestul Culmii Codrului și drenată de Homorod și afluenții săi și pîriul Maria ce debosează în Crasna, prezintă particularități geografice favorabile dezvoltării cu precădere a pomiculturii, a viticulturii și culturii plantelor tehnice (inul pentru fuior). În prezent grupează 15 așezări cu o populație de peste 20 000 de locuitori, între care se detașează: Ardud, Viile Satu Mare și Beltiug, așezări mai evolute, cu o populație ce depășește 2 000 de locuitori. Reculul demografic (de -3,2% în perioada 1966 — 1977) a fost parțial atenuat în perioada 1978 — 1988 prin dezvoltarea industriei locale: reparații de mașini și utilaj agricol, prelucrarea lemnului (Ardud), textile și confecții (Beltiug, Rătești, Ardud, Viile Satu Mare), ca și ferme agricole cu profil pomicol (Homorod-Necopoi, Beltiug, Ardud etc.), viticol (Rătești inclusiv de vinificație) și zootehnic (Ardud, Beltiug, Viile Satu Mare). Ardudul este o localitate cu un pregnant caracter apropiat de cel urban, singura din regiune care depășește 5 000 de locuitori.

Pentru dezvoltarea agriculturii s-au efectuat lucrări de îmbunătățiri funciare (de combaterea eroziunii, terasări, lucrări hidroameliorative, ca acumulările de pe Medisa și Hodișa și regularizarea afluenților Maria, Sărata, Bolda etc. Culturile de cereale ocupă peste 2/5 din suprafața cultivată și sînt urmate de cultura inului pentru fuior (22,5% din suprafața cultivată). Cîmpia înaltă a Ardudului participă cu peste 10% la producția națională de fibre de in. Pomii fructiferi ocupă în prezent peste 2 400 ha, iar vița de vie peste 1 200 ha, ceea ce înseamnă nu mai puțin de circa 23% din suprafața agricolă a regiunii. Cele mai importante livezi se găsesc pe raza localităților Homorodu de Jos, Necopoi, Viile Satu Mare, Ardud, Șandra și Beltiug, iar vița de vie la Rătești, Ardud-Vii și Beltiug, prima dintre acestea fiind echipată cu instalații de vinificație și conservare. Un rol de seamă în dezvoltarea pomiculturii îl are Stațiunea pomicolă de la Viile Satu Mare.

Creșterea animalelor dispune de un fond natural furajer de peste 2 700 ha și se înscrie cu 4 700 de bovine, 3 900 de porcine și peste 13 500 de ovine (în 1988), printre regiunile cu participare apreciabilă de lînă și lapte.

Cîmpia Tășnadului (230 km²). Asemenea Cîmpiei Ardudului, se prezintă sub forma unui larg evantai, cu expunere nordică și nord-vestică cuprins între valea Ierului și Crasna. Relieful coboară în trepte, domină ușor cîmpia joasă a Ierului printr-o prelungire a cîmpurilor înalte și sîvîntate, în ce mai mare parte despădurită. Pantele domoale orientate spre vest și nord-vest, solurile argilo-luviale și precipitațiile (650 — 750 mm) favorizează dezvoltarea culturilor, cerealiere tehnice și furajere, dar mai ales a pomilor fructiferi și viței de vie (peste 1 800 ha în 1988 — adică 8,1% din suprafața agricolă). Regiunea reprezintă un spațiu locuit intens din cele mai vechi timpuri, spațiu pe care s-a format substratul etnic al populației românești, cuprinsă în secolele IX — X în ducatul lui Menumorut. Așezările sînt străvechi: 17 din cele 21 sînt atestate documentar în secolele XIV — XV, cînd Tășnadul (1456) și Chereușa (1476) erau țiguri. Potrivit datelor recensămîntului din 1910, populația totală a Cîmpiei Tășnadului era de 20 121 de locuitori, din care peste 25% îl deținea Tășnadul. Creșterea demografică lentă a așezărilor pînă în 1966 a fost urmată de un recul, consecință a plecărilor definitive către Satu Mare și Oradea. Singura localitate care a înregistrat o creștere demografică a fost Tășnad (10 394 de locuitori în 1992), ca urmare a dezvoltării social-economice și conferirii statutului de oraș în anul 1968, creștere care se reflectă și în populația totală a cîmpiei (24 900 de locuitori în 1987).

Activitatea industrială este concentrată în proporție de peste 9/10 în Tășnad, unde în prezent se produc piese de schimb și utilaje pentru industria chimică, mobilă, produse ceramice, încălțăminte.

Valoarea producției industriale a crescut de peste 8 ori în ultimele trei decenii, ceea ce a făcut ca numărul celor ocupați în industrie să reprezinte peste 37% din populația activă. La funcția industrială se adaugă și cea balneară și de agrement datorită valorificării zăcămintelor de ape termominerale.

Economia agricolă a Cîmpiei Tășnadului este marcată de extensiunea culturilor cerealiere și furajere (3/4 din suprafața cultivată), urmată de plantele tehnice (în și cîneapă 8,7%).

La contactul cu dealurile este extinsă cultura pomilor fructiferi și a viței de vie (5,9% și respectiv 2,3% din suprafața agricolă), ambele culturi beneficiind de condiții în care se obțin producții de circa 6 000 tone fructe

anual, solicitate și la export. Creșterea animalelor se recomandă prin creșterea intensivă a ovinelor, bovinelor și porcinelor în ferme specializate, ca cele de la Santău, Pir și Tășnad.

În desfășurarea complexelor activității economico-sociale un rol de seamă îl au calea ferată Carei — Tășnad — Sălmășag și cele patru drumuri naționale ce pun regiunea în legătură directă cu orașele Satu Mare, Carei, Oradea, Marghita și Zalău.

Cîmpia Sălacea — Roșiori (125 km²). Compartimentul sud-vestic al Cîmpiei înalte a Someșului se prezintă sub forma unei fișii înguste de numai 2 — 5 km, alungită între Pir și Roșiori Bihorului pe o distanță de 40 km. Sub raport morfologic este un șes înalt (150 — 180 m), slab fragmentat, dar care se detașează net de Cîmpia Ierului printr-o denivelare de 20 — 35 m, la baza căreia s-au constituit așezările Sălacea, Otomani, Tîrgușor, Cherechiu, Săcueni, Cadea etc., atestate încă din secolele XII — XIII. În anul 1910 se detașau ca așezări cu peste 3 000 de locuitori Săcueni (5 580) și Sălacea (3 709), celelalte nedepășind 1 500 de locuitori. În decursul a peste 7 decenii evoluția demografică a marcat două perioade: una pozitivă, dar lentă, între 1910 și 1966 (sporul anual de numai 3,0‰) și alta negativă, între 1966 și 1988, cu un recul demografic de - 4,3‰. Între toate localitățile numai Săcuenii au crescut cu peste 2 000 de locuitori între anii 1910 și 1977, datorită dezvoltării economiei (industriei, plantațiilor vitipomicole și zootehniei).

Descoperirea recentă de importante zăcăminți, hidrocarburi și ape geotermale în vecinătatea așezării va favoriza propulsarea economică a Săcuenilor. Plantațiile masive din ultimele două decenii de la Diosig, Cadea și Săcueni au făcut ca livezile și viile extinse pe suprafețe relativ egale (1 442 ha și 1 376 ha) să dețină 27,1% din suprafața agricolă a regiunii. Particularitățile pedoclimatice ale podului neted și înalt al Cîmpiei Sălacea au favorizat extinderea cu precădere a culturilor cerealiere (grîul 50%) și tehnice (în pentru fuior). Creșterea animalelor secondează culturile agricole prin șeptelul superior numeric și calitativ: peste 5 400 bovine, 4 300 porcine și circa 12 600 ovine (în 1988), un rol, însemnat avînd complexe de bovine și ovine de la Săcueni și ferma specializată în creșterea tineretului taurin de la Cadea.

Legăturile cu regiunile vecine sînt asigurate de magistrala feroviară Oradea — Satu Mare și de sistemul căilor rutiere, a cărui axă corespunde cu linia așezărilor de contact Mihai Bravu — Diosig — Săcueni — Sălacea.

2.3.2.3. Cîmpia Joasă a Someșului

Dezvoltată de o parte și de alta a Someșului, extinzîndu-se, din Măgurile Oașului pînă la vest de Crasna, Cîmpia joasă a Someșului ocupă o suprafață de circa 1 800 km² cu o netezime mare, slab înclinată în direcția nord-vest, pe care se recunosc vechile cursuri divagante ale Someșului, aflat sub influența ariei de coborîre a Bodroglui (în Ungaria), cursuri preluate de arterele actuale regularizate: Tur, Egher, Sar, Racta etc. Notă aparte face Ecedea, fosta regiune mlăștinoasă din cursul inferior al Crasnei, care, prin ample lucrări hidroameliorative a intrat integral în circuitul agricol. Oferind condiții prielnice, a fost locuită intens din vremea dacilor. Numărul mare de cuptoare recent descoperite vine să confirme ipoteza, potrivit căreia Cîmpia Someșului a constituit o însemnată arie de cultură materială dacică, care, împreună cu ținutul Crișurilor, a stat la baza alcătuirii formațiunii prestatale românești — ducatul lui Menumorut (sec. IX). Castrum Zotmar (cetatea Sătmăruului) și Castrum Megessala (cetatea Medieșului) se înscriu printre dovezile peremptorii privind autohtonitatea și continuitatea neîntreruptă a românilor în cuprinsul regiunii.

Intrată sub stăpînirea maghiară, regiunea a cunoscut umările politicii de colonizare din secolele XI — XII și XVIII, de asuprire și deznaționalizare accentuată la sfîrșitul secolului XIX, cu repercusiuni asupra ponderii elementului autohton. Numărul total de locuitori în 1910 a fost de 128 949, din care 34 892 aparțineau orașului Satu Mare. Între anii 1910 și 1977 cu toate consecințele celor două războaie mondiale, populația a crescut (cu peste 80 000 de locuitori), un aport la revitalizarea demografică avîndu-l populația românească venită din Oaș, Maramureș și Munții Apuseni după primul război mondial (1922). Analizînd populația pe cele două medii urban și rural, se constată o creștere explozivă a celui urban de la 26,8% în 1910 la 52,4% în 1988, pe seama populației rurale, care, deși avînd un spor natural ridicat,

totuși, prin plecările definitive, media creșterii anuale a fost diminuată de la 3,6‰ la 1,7‰ în perioada 1966—1977. O creștere mai accentuată au marcat localitățile în care au fost înființate obiective industriale și ferme agro-zootehnice — Livada, Seini, Lazuri, Dorolț, Botiz, Vetis etc. Aceștea li se adaugă Apa și Odoreu, așezări care au primit populația satelor afectate de inundațiile din 1970.

În perioada 1977 — 1987 fluctuația sporului natural (între 2,5 și 13,0‰), coroborată cu menținerea celui migrator la cote ridicate (între 10 și 25‰), au făcut ca populația așezărilor rurale să marcheze o descreștere numerică, exceptând Livada și Seini.

Recul demografic accentuat au înregistrat așezările Sinmiclăuș, Ghirolț, Istrău, Terebești, Craidorolț, Boghiș etc. cu profil exclusiv agricol. Densitatea populației a crescut de la 70 loc./km² în 1930 la peste 135 loc./km² în 1987.

Caracterul predominant agricol al economiei se reflectă și în structura profesională a populației: 80% este cuprins în aceste activități. Prin dezvoltarea unor activități industriale structura profesională a așezărilor rurale a cunoscut substanțiale mutații, proporția celor ocupați în aceste ramuri variind între 20 și 43% (Seini, Livada, Apa, Medieșu Aurit, Micula, Căpleni, Berveni etc.).

Cu pondere ridicată în activitatea de transport 24,5%, se evidențiază Halmeu, important centru feroviar de frontieră. O pondere ridicată a celor ocupați în industrie dețin și localitățile din apropierea orașului Satu Mare: Lazuri, Botiz, Odoreu, Păulești etc.

Pe substratul dacic s-au constituit numeroase așezări, de obicei în luncile și pe grindurile din lungul râurilor Someș, Tur, și Crasna. Săpăturile arheologice au confirmat frecvența mare de vetre locuite ce și-au perpetuat existența în ciuda repetatelor revărsări care aveau loc. 66 din cele 103 localități existente astăzi sînt consemnate documentar din secolele XII — XIV (între acestea figurînd Satu Mare și Mintiu, acesta din urmă constituit în secolele XI — XII prin colonizări cu populație de origine germană).

Lucrările de asanare și indiguire începute la sfîrșitul secolului XIX și reluate după primul război mondial au permis constituirea a 25 localități atît la nord de Someș, cît și în bazinele inferioare ale Homorodului și Crasnei (7 înainte primului război mondial și 18 în perioada interbelică).

Majoritatea așezărilor sînt mici și mijlocii: 57% au o populație sub 1 000 de locuitori, 29% între 1 000 și 2 000 locuitori și numai 14% au peste 2 000 de locuitori. Peste 5 000 de locuitori au doar Seini și Livada, așezări cu funcții și dotări edilitare ce le apropie de nivelul urban (fig. 32).

Specializarea ramurilor agricole, înființarea de obiective industriale, care să valorifice resursele naturale locale au contribuit la distingerea a patru tipuri funcționale de așezări:

- 1) așezări agricole (de cultura plantelor și creșterea animalelor), cu cea mai mare pondere (peste 80% din numărul total de așezări), diferențiate în cinci subtipuri în funcție de frecvența culturilor: a) așezări cu predominanța culturilor cerealeire, tehnice și furajere (Moftinu, Căpleni, Terebești, Valea Vinului); b) cerealiere-legumicole (Medieșu Aurit, Culciu, Petin, Cămin); c) cultura cerealelor și plantelor furajere (Micula, Dorolț, Doba); d) predominanța culturilor de cereale, de furaje și a pomiculturii (Vetis); e) cu predominanța culturilor cerealiere, a plantelor furajere și culturii căpsunului (Halmeu, Turulung);

- 2) așezări agricole cu funcții industriale (Seini, Berveni, Apa);

- 3) așezări agricole cu funcții industriale și de servicii (Livada, Odoreu, Lazuri, Păulești);

- 4) așezări agricole cu funcții de servicii (Botiz, Sătmărel).

Utilizarea agricolă a Cîmpiei joase a Someșului, de o mare diversitate, a avut o evoluție determinată de lucrările hidroameliorative de anvergură (începute la sfîrșitul secolului XIX), prin care au fost redat agriculturii circa 7 000 ha.

Excesul de umiditate din bazinul inferior al Turului, Someșului și Crasnei a fost în cea mai mare parte înlăturat, permițînd valorificarea solurilor hidromorfe (lăcoviști) și a luvisolurilor albe cu tendință de pseudogleizare. Avantajată de regimul climatic, Cîmpia joasă a Someșului întrunește condiții optime de dezvoltare unei game largi de culturi agricole.

Terenurile agricole ocupă 85%, din care 4/5 îl dețin terenurile arabile. Pășunile și fînețele naturale, reduse aproape la jumătate din suprafața anterioară, se mențin, totuși (19,2% din suprafața agricolă a regiunii).

Cerealele ocupă peste 63% din suprafața cultivată, preponderentă fiind cultura porumbului (53% din suprafața cultivată cu

cereale de pe care se obțin 3/4 din producția de cereale a regiunii). De mare eficiență economică este cultura cinepii pentru fuior (5 650 ha în 1987), cultură prin care regiunea se impune pe plan național, extinsă cu precădere pe terenurile mai umede din Cîmpia Ecetia și pe valea Crasnei (la Berveni, Căpleni, Moftin, Craidorolț, Doba etc.). Inul pentru fuior se cultivă pe terenurile mai înalte, svîntate, din vestul regiunii (Medieșu Aurit, Livada, Apa, Turulung, Pomi, Valea Vinului, Culciu, Păulești etc.). Producția de in și cinepă este prelucrată în topitoriile de la Carei, Berveni și Supuru de Jos. Sfecla de zahăr a fost extinsă în ultimele două decenii (de la 450 ha la peste 3 500 ha). Favorizată de gradul ridicat de nebulozitate și de soluțiile hidromorfe, cultura cartofului se practică pe o suprafață de peste 3 400 ha.

Suprafața cultivată cu legume a crescut în ultimii ani de 2,5 ori, iar producția de peste 5 ori, prin utilizarea terenurilor din luncile Someșului și Crasnei (Satu Mare, Vetiș, Căpleni, Cămin). O mare parte din producția de legume este prelucrată la fabricile de conserve de la Carei și Valea lui Mihai.

Cultura plantelor furajere a fost extinsă pe o suprafață de circa 3 300 ha, ocupînd al doilea loc, după cereale. Alături de culturile perene s-au extins și plantele pentru însilozare (porumbul).

În anul 1988 structura șeptelului era reprezentată din 90 500 de bovine, 169 200 de ovine și peste 240 000 de porcine, ceea ce, față de anul 1962, înseamnă o dublare a efectivului pentru primele două specii și o creștere de peste 5 ori a porcinelor. Dintre unitățile zootehnice specializate, care dispun de efective apreciabile se remarcă complexele de bovine de la Satu Mare, Odoreu, Dorolț, Lazuri, Livada, de porcine de la Seini, Satu Mare și Moftin, iar pentru ovine fermele de la Vetiș și Halmeu.

Activitatea industrială în Cîmpia joasă a Someșului este concentrată în producția de peste 9/10 (94,5% din volumul producției globale industriale) în orașul Satu Mare. Avînd la bază o tradiție a activităților meșteșugărești, industria, deși variată ca profil, a rămas totuși limitată ca volum de producție pînă în anul 1960. În perioada 1960 — 1988 datorită investițiilor mari a căpătat o dezvoltare complexă în domeniul construcțiilor de mașini, ramură care deținea în anul 1987 46,1% din volumul total al producției industriale.

Caracterul dinamic și competitiv al industriei îl confirmă creșterea de peste 6 ori în ultimele două decenii și gama variată de mașini și utilaj minier, de mobilă fină, de confecții și produse alimentare, apreciate pe piața externă.

Valorificarea resurselor naturale și utilizarea eficientă a disponibilului de forță de muncă au dus la crearea unui număr apreciabil de obiective industriale, în peste 20 de localități (topitoria de cinepă de la Berveni, întreprinderile de produse abrazive și de drojdie de bere de la Seini).

Un rol important în dezvoltarea economico-socială a Cîmpiei joase a Someșului l-au avut și căile de comunicație. Rețeaua rutieră s-a extins pe o lungime totală de aproape 400 km și este formată în mare parte din cele cinci artere naționale dispuse radial. Modernizarea în proporție de 75% a drumurilor permite efectuarea unui trafic sporit de mărfuri și călători. Dintre arterele cu cea mai mare fluentă a mijloacelor de transport sînt drumurile naționale Satu Mare — Carei — Oradea și Satu Mare — Baia Mare, primul asigurînd și un trafic de mărfuri în tranzit (către Ucraina) prin ramificația Livada — Halmeu. Pentru tranzitul de călători (către Ungaria) se utilizează traseul Satu Mare — Dorolț — Petea.

Rețeaua feroviară are ca act de naștere construirea în 1871 și 1872 a liniei Oradea — Satu Mare — Halmeu, devenind și funcționînd ca o parte din magistrala feroviară vest-carpatică Timișoara — Oradea — Satu Mare — Halmeu. La liniile existente, în anul 1986 s-a adăugat și linia Satu Mare — Bixad, prin înlocuirea liniei cu ecartament îngust construită în 1906.

Activitățile urbane din Cîmpia joasă a Someșului sînt concentrate în două orașe: Seini și Satu Mare, acesta din urmă avînd rolul dominant pentru un spațiu mult mai întins.

Orașul Seini. Situat în lunca Someșului la o distanță relativ egală de Satu Mare și Baia Mare, cu care se leagă feroviar și rutier, orașul Seini este o așezare veche, atestată documentar din secolul XIV, cînd avea și funcție de apărare (Castrum Zynyr). În 1992, împreună cu cele două localități componente, învecinate — Săbișa și Viile Apei — numără 9 180 de locuitori.

Resursele naturale variate de care dispune (andezit și balast, păduri de fag și gorun, terenuri agricole propice unei game variate de culturi prin lucrări de drenaj și fertilizare) au constituit premisa dezvoltării și apariției unor obiective industriale și agrotehnice în care este cuprinsă populația activă în proporție de 60%: o carieră de andezit de mare capacitate (peste 500 000 t. anual), o întreprindere de produse abrazive, o unitate de industrializare a lemnului (mobilier), trei unități ale industriei ușoare (textilă, confecții și încălțăminte) și tot atâtea unități din sectorul alimentar (panificație, oțet și drojdie de bere) și, drept unicat la nivel național, producerea de microbule reflectorizante pentru industria optică. În domeniul agriculturii, la Seini sînt numeroase ferme cu profil viticol, pomicol și zootehnic. Avînd plantații în terase și în masiv (650 ha), complexe de bovine și ovine, o mare îngrășătorie de porcine (peste 100 000 de capete), două ferme avicole cu un rulaj anual de circa 400 000 de păsări, livrează mii de tone de fructe, carne și lapte.

Procesul de modernizare al noului oraș este marcat de noile construcții rezidențiale (blocuri cu 2 și 4 nivele) ce însumează 450 apartamente, liceul agroindustrial, complexul comercial cu trei nivele etc.

Municipiul Satu Mare. Situat în partea centrală a Cîmpiei joase a Someșului, Satu Mare reprezintă una dintre așezările fortificate, a cărei atestare depășește un mileniu care, ca și Biharia (consemnează Anonymus în *Gesta Hungarorum*) nu a putut fi cucerit de oștile lui Arpad, decît prin luptă și asediere. În secolele XI și XII, sub dinastia arpadiană, au fost aduși coloniști germani, care s-au stabilit pe malul drept al Someșului, formînd localitatea Mintiu (Nemeti), investită cu aceleași privilegii ca și Sătmarul. Ambele așezări au fost ridicate în anul 1331 la rangul de oraș (*civitas*).

Evoluția teritorială a celor două orașe în evul mediu a fost influențată și de capriciile Someșului, prin revărsări frecvente.

Arsă și ocupată în 1564 de habsburgi, cetatea este reconstruită de către aceștia, după tipul cetăților italiene ale epocii. În secolele XVIII și XVIII atît Satu Mare, cît și Mintiu își extind vatra, concomitent se înmulțesc numărul breslelor (12 în Satu Mare și 14 în

Mintiu) și se dezvoltă schimburile prin negustorii veniți din Lipsca, Viena, Lioy, Sofia și Brusa. Secolul XVIII se caracterizează printr-un proces de urbanizare și sistematizare, ca urmare a înlăturării pericolului turcesc și încetării luptei dintre habsburgi și transilvăneni. Rolul cetății Sătmarului scade, astfel că după 1705 cetatea este demolată și încep lucrări de regularizare a albiei Someșului și de desecare a albiilor secundare, ceea ce a permis unirea celor două orașe Satu Mare și Mintiu (1721) în unul singur, care devine oraș liber regal.

În acest secol XVIII s-au construit clădirea în stil neogotic, care adăpostește muzeul județean, primăria veche a orașului și hanul, s-au pavat străzile din partea centrală, s-a construit digul de-a lungul Someșului etc. (fig. 33A).

În a doua jumătate a secolului XIX, Satu Mare, prin construirea căilor ferate Oradea — Satu Mare — Halmeu (1871 — 1872) și Satu Mare — Baia Mare (1884), devine cel mai important nod feroviar din nord-vestul țării, care atrage după sine construirea unor industrii și implicit creșterea numerică a populației de la 9 881 de locuitori în 1809, la 34 892 în 1910.

La recensămîntul din 1930 Satu Mare număra 51 495 de locuitori, iar la recensămîntul din 1956, 52 000 de locuitori. După ce a devenit centrul administrativ de coordonare a ansamblului de activități economico-sociale ale județului Satu Mare, populația marchează un salt considerabil, ajungînd la 131 859 de locuitori în 1992 datorat, în proporție de 2/3, sporului migratoriu (19,6%).

Schimbări substanțiale s-au produs și în structura profesională, în care ponderea cea mai mare (65%) o dețin cei din industrie, ramură economică reprezentativă a municipiului, urmată de cei ocupați în construcție și transporturi (peste 20%).

Ansamblul activităților industriale pune amprenta economică a municipiului prin cele peste 30 de întreprinderi. Analiza structurii industriei arată că industria construcțiilor de mașini deține peste 50% din producția globală (1984), fiind reprezentată prin uzinele UNIO (specializată în mașini și utilaje pentru activitățile miniere), combinatul „Saturn” S.A. (mașini și utilaje pentru industria chimică), întreprinderea de mașini casnice emailate. Aceasta este urmată de




Fig. 33. Municipiul Satu Mare. Evoluția teritorială.

industria ușoară (14,5%), alimentară (9,0%), de prelucrare a lemnului (8,5%) etc.

În perioada postbelică volumul producției industriale a orașului Satu Mare a crescut de peste 6 ori.

Disponind de peste 10 000 ha teren agricol cu un grad ridicat de fertilitate, orașul obține cantități însemnate de cartofi, legume, cereale și nutrețuri. La un grad ridicat de dezvoltare și modernizare se situează zootehnia, aceasta fiind reprezentată de complexe

necesară redimensionarea digurilor și construirea a trei poduri noi de mare gabarit. S-a amenajat parcul „Someș”, în care sunt valorificate balnear sursele hidrotermale (A. Pricăjan, 1985, p. 306).

Ampla dezvoltare pe multiple planuri a municipiului Satu Mare a generat în ultimele două decenii o puternică mișcare navetistă, pe o rază de circa 30 km, care antrenează 10 000 — 12 000 de persoane.



Fig. 34. Municipiul Satu Mare — Cartier nou în apropierea râului Someș.

specializate în creșterea porcinelor, bovinelor, ovinelor și păsărilor.

După 1960 orașul Satu Mare a înregistrat un amplu proces de modernizare, cînd în ciuda unor calamități de proporții (inundațiile din mai 1970) s-au construit 30 000 de apartamente, în care locuiește circa 40% din populația municipiului (fig. 34).

Ținîndu-se seama de fluctuațiile de debit ale Someșului între 100 și 3 000 m³/s, care nu o dată au pus în pericol Satu Mare, a fost

2.3.2.4. Cîmpia Careilor (Carei — Valea lui Mihai)

Situată între valea Ierului, cursul Crasnei și frontieră, Cîmpia Careilor ocupă o suprafață de circa 675 km², cu peste 150 m (alt. abs.), prin care domină unitățile limitrofe. Sub raport morfologic prezintă două compartimente distincte: unul vestic (aproximativ 270 km²), acoperit cu nisipuri, o prelungire, pe teritoriul României, a Cîmpiei Nirului și altul estic, mai extins (peste 400 km²)

fragmentat ușor de rețeaua de văi tributară Ierului.

Compartimentul vestic are aspectul unei câmpii înalte cu altitudini între 130 și 160 m, alcătuită dintr-o succesiune de șiruri de dune (3 — 15 km), orientate pe direcția nord-est—sud-vest, între care se aliniază depresiuni largi de 0,5 — 1,5 km.

Dintre factorii climatici, un rol de seamă îl are regimul termic, care, deși se află sub influența climatului oceanic (cu precipitații în jur de 600 mm), în care media temperaturii lunilor de vară nu depășește 20°C, iar a celor de iarnă nu coboară sub — 1,5°C, totuși nisipurile, vara, se încălzesc puternic, dăunând culturilor. Deși cad precipitații suficiente în lunile de vegetație (peste 300 mm), din cauza infiltrării și evaporării rapide, culturile de pe nisipuri sînt prejudiciate.

Un regim deficitar de apă se manifestă și în timpul iernii, deoarece dunele sînt superficial acoperite cu zăpadă.

Nisipurile au, totodată, un conținut redus de substanțe nutritive (conținutul de humus fiind de 0,40 — 0,70%). Particularitatea acestor nisipuri constă în prezența interstratelor feruginoase (ortstein), care stînjenesc înrădăcinarea vegetației arborescente. Depresiunile dintre dune, însă, prezintă caracteristici deosebite: alternarea stratelor cu compoziție granulometrică mai fină decît în aria dunelor, fapt ce permite înmagazinarea apei freactice la numai 0,5 — 1,8 m adîncime. În unele arii depresionare mai joase apa freatică a favorizat apariția fenomenului de gleizare, lăcoviștire și înmlăștinire și chiar de formare a unor organisme hidrografice — Valea Neagră, Salcia etc., cu scurgere intermitentă. Solurile din aceste arii sînt mediu și puternic inhumificate (2,4 — 2,7%), ceea ce permite, în condiții de drenaj, dezvoltarea culturilor agricole.

Utilizarea rațională a terenurilor nisipoase a fost posibilă numai după executarea lucrărilor de fixare a dunelor prin plantații silvice diferențiate care ocupă în prezent o suprafață de 6 200 ha. În plantații predomină salcîmul, care, pe lângă fixarea și protecția nisipurilor, are o valoare economică, dat fiind ciclul scurt de producție (22 — 25 ani), calitatea lemnului, valoarea meliferă și adaptabilitatea la cele mai sărace și expuse terenuri.

Prezența masivă a salcîmului (peste 60% din suprafața totală forestieră) asigură, grație creșterii medii curente de

peste 5,5 m³/ha/an, exploatarea unui volum de 18 000 — 25 000 m³ anual.

Fondul forestier are în același timp o importanță cinegetică: pădurea Foieni (1 400 ha), alcătuită în proporție de 40% din evercinee, este declarată rezervație silvo-cinegetică.

Stăvilirea procesului de mobilitate a nisipurilor a făcut posibilă creșterea suprafeței agricole cu peste 10 000 ha.

În compartimentul estic au fost create 13 acumulări pentru atenuarea viiturilor și alimentarea cu apă. Relieful neted, predominanța molisolurilor (cernoziomice) și precipitațiile ce depășesc 600 mm anual au favorizat o utilizare axată pe marile culturi de cîmp — cereale, plante, tehnice și furajere. Spre deosebire de acesta, sectorul vestic nisipos se caracterizează printr-o mare varietate a culturilor. Dintre amenajările reprezentative și eficiente sînt plantațiile de viță de vie și pomi fructiferi (1480 ha și, respectiv, 3 570 ha în 1987, ceea ce reprezintă 18,7% din suprafața regiunii), plantații care au solicitat lucrări de nivelare sau modelare a dunelor (Valea lui Mihai, Curtuișeni, Sanislău etc.).

Pomicultura este o creație recentă în urma amenajărilor complexe, pe seama plantațiilor în masiv și a fermelor specializate de măr și piersic, care însumează circa 3 000 ha, cu un număr de peste un milion de pomi fructiferi.

Producția de fructe a regiunii a fost în anul 1987 de peste 25 000 tone, din care 2/3 l-au reprezentat merele. În sectorul Curtuișeni — Valea lui Mihai — Șimian s-a format un veritabil bazin pomicol, constituit din 5 ferme (fig. 35).

În vederea dezvoltării pomiculturii s-au înființat două puncte permanente de cercetare (la Sanislău și Valea lui Mihai).

În domeniul zootehniei s-au creat complexe și ferme de bovine la Carei, Urziceni, Foieni, Sanislău, Pișcolt, Curtuișeni, Valea lui Mihai și Șimian, de porcine la Carei și Valea lui Mihai, iar de ovine la Carei, Sanislău și Valea lui Mihai. În anul 1987, Cîmpia Careilor dispunea de peste 26 000 de bovine, 75 000 de porcine și 73 200 de ovine cu lînă fină și semifină.

La Carei și Valea lui Mihai s-au înființat complexe zootehnice moderne, primul fiind profilat pe creșterea merinosului transilvan, de la care s-au obținut 12 kg lînă/oaie.

Creșterea păsărilor e reprezentată prin două ferme specializate, înființate la Sanislău și Urziceni. Tot la Sanislău s-a creat și o crescătorie modernă de animale pentru blană (nutrii).

Profilul actual al agriculturii Cîmpiei Carailor — creșterea animalelor, pomicultură,

produselor agricole (cereale, floarea-soarelui, cîneapă, sfeclă de zahăr), în prezent a cunoscut o diversificare accentuată. Astfel, paralel cu dezvoltarea a patru unități ale industriei alimentare, la Carei s-au înființat o întreprindere constructoare de mașini (secție a uzinelor „UNIO”), o fabrică de mobilă, o filatură




Fig. 35. Cîmpia Carailor. Plantațiile viticol-pomicole.

viticultură — valorifică eficient potențialul natural și uman al acestei regiuni al cărei peisaj a fost sensibil modificat.

Ca și agricultura, industria a înregistrat în ultimii 30 ani o creștere de peste 5 ori. Este concentrată în Carei (în proporție de 4/5) și Valea lui Mihai. Axată inițial pe prelucrarea

de bumbac, o topitorie de in și cîneapă și o fabrică de nutrețuri combinate.

Cu semnificații majore pentru dezvoltarea așezărilor este crearea numeroaselor unități ale industriei mici în mediul rural la : Sanislău, Valea lui Mihai, Foieni, Tiream, Pișcolt, Urziceni etc.

În sectorul industriei extractive se remarcă descoperirea și intrarea de curînd în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze naturale de la sud-est de Carei și valorificarea apelor termale din nord-estul orașului în scop terapeutic. Lucrările de prospecțiuni geologice întreprinse la Pișcolt, Valea lui Mihai și Curtuișeni au depistat noi zăcăminte de hidrocarburi și resurse geotermale.

Cîmpia Careilor reprezintă o regiune permanent locuită din cele mai îndepărtate timpuri. Vestigiile descoperite la Berca, Ciumești, Sanislău, Foieni, Curtuișeni, Valea lui Mihai constituie mărturii edificatoare pentru prezența elementului autohton și continuitatea acestuia, care a conviețuit vremelnice cu diferite popoare migratoare. În secolul XVIII (între anii 1718 și 1786), în așezările Urziceni, Cămin, Foieni, Ciumești, Sanislău, Petrești, Tiream, Curtuișeni și Valea lui Mihai au fost făcute colonizări cu populație de origine germană (șvabi).

La recensămîntul din 1910 populația regiunii număra 56 264 de locuitori, din care 16 078 în orașul Carei. Evoluția demografică a avut, în general, un mers ascendent dar lent, în care fluctuația mediului rural a fost compensată de creșterea progresivă a populației urbane (de 3,4% între 1910 și 1966 și de peste 20% între anii 1977 și 1987). Prin conferirea statutului de oraș localității Valea lui Mihai în 1989, ponderea populației urbane a crescut de la 32,7% la 48%.

Avînd o structură aproape în totalitate adunată cu tendință de aglomerare, dar cu textură neregulată a tramei stradale, așezările din Cîmpia Careilor sînt ordonate pe două aliniamente distincte: unul care urmărește, în general, contactul cu regiunea nisipurilor (Voivozi, Șimian, Urziceni) și celălalt la contact cu Valea Ierului (Tiream, Vezendin, Andrid, Vășad și Tarcea). Excepție fac satele Scărișoara Nouă, Horea, Vișoara și Urziceni-Pădure.

Orașul Valea lui Mihai. Cu o atestare documentară din a doua jumătate a secolului XIII (1270), noul oraș Valea lui Mihai se detașază net nu numai demografic (10 433 de locuitori în 1992), dar și prin importanța economică de așezările învecinate, fapt pentru care i s-a conferit statutul de centru urban. Dispunînd de un întins teritoriu (7 627 ha din care 3/4 îl reprezintă terenurile agricole și-a dezvoltat activitatea agricolă prin valorificarea rațională a terenurilor nisipoase pe care s-au extins culturile de cîmp

(cereale, plante furajere și legumicole), plantațiile de vii nobile și de pomi fructiferi (peste 1 200 ha), ce se impun în noul peisaj umanizat al acestui gen de terenuri.

Înființarea de numeroase ferme și complexe zootehnice (de bovine, de ovine și de porcine, în ultimii 25 de ani, de la care anual sînt livrate 4 000 — 5 000 t carne), a făcut ca și acestea să echilibreze, sub raport valoric, activitățile industriale ale noului oraș.

Cea mai reprezentativă unitate industrială este fabrica de conserve. Acestea i se adaugă unități de reparat mașini agricole, un atelier de împletit sîrmă, o fabrică de mobilier, numeroase unități de mică industrie, precum și o carieră de nisip metalurgic.

Funcția agroindustrială este dublată de cea comercială și de transport — tradițional loc de tîrg în schimbul de produse al așezărilor din regiune și punct vamal.

Orașul Carei. Situat în nord-estul cîmpiei ce-i poartă numele, pe axa de circulație rutieră și feroviară (Oradea — Satu Mare), este al doilea centru urban ca mărime din Cîmpia Someșană. Atestarea sa documentară este consemnată în 1320 sub numele de Villa Karul. În secolul XV era deja cunoscut ca un renumit tîrg. În anul 1473, în partea centrală a așezării s-a înălțat un edificiu întărit, care, către sfîrșitul secolului XVI, din cauza pericolului otoman s-a transformat în cetate fortificată cu șanțuri de apărare și bastioane, ce avea să fie demolată la sfîrșitul secolului XVII. Între sfîrșitul sec. XVIII și recensămîntul din 1910, populația orașului Carei a marcat o creștere de la 8 000 la 16 000 de locuitori. Între cele două războaie mondiale și perioada postbelică, 1944 — 1956, populația a stagnat din cauza influenței exercitată de cele două centre urbane industriale — Oradea și Satu Mare. După 1956 însă, și îndeosebi după 1966, odată cu dezvoltarea funcției industriale, se înregistrează o sensibilă creștere demografică reflectată de sporul anual (24^o/_{oo}, între anii 1966 și 1977). În 1992 orașul Carei avea 26 325 de locuitori. Crearea a 8 unități industriale de interes național (construcții de mașini, lemn, textile, încălțăminte, alimentară etc.) a făcut ca forța de muncă din industrie să se tripleze în ultimii 20 de ani, ea reprezentînd peste 50% din totalul populației ocupate în economie, iar producția globală de peste 6 ori. De remarcant și creșterea

calitativă; multe din produsele obținute aici, sînt solicitate la export (mobilă, benzi transportoare, ulei comestibil filtrat etc.). Și în ceea ce privește domeniul agricol, Careiul este renumit prin complexele zootehnice.

Funcțiilor industrială, agricolă și cultural-administrativă li se adaugă și cea turistică, orașul Carei dispunînd de valoroase obiective din care se evidențiază: castelul medieval, care adăpostește un muzeu (arheologic și de științe naturale), parcul dendrologic (în suprafață de peste 10 ha), monumentul ostașului român și instalațiile balneare și de agrement, care valorifică apele termominerale din apropiere.

2.3.2.5. Cîmpia Ierului

Cîmpia Ierului, partea cu cea mai joasă altitudine din Cîmpia Someșană (104—125 m), are înfățișarea unui culoar între Cîmpiile Tășnad — Sălacea și Careilor, străbătut, pe toată lungimea sa (70 km), de riul Ier, astăzi în întregime canalizat.

În geneza și configurația cîmpiei un rol decisiv l-a avut fenomenul de basculare al părții de nord-est a Cîmpiei Panonice, care a determinat schimbarea de direcție a Someșului pe actuala vale a Ierului, sub influența ariei de subsidență din regiunea Crișurilor.

Procesul de colmatare a dus la formarea unei stratificații inegale și variate care a creat un microrelief neuniform cu implicații nu numai asupra configurației rețelei hidrografice. Ierul și afluenții săi — Sînmiclăuș, Checheț, Santău, Ieru Rece etc. — trădează caracterul cîmpiei de divagare în care apele, înainte de executarea lucrărilor de regularizare, aveau un curs lent și sinuos, chiar stagnant, cu numeroase brațe și meandre părăsite, năpădite de o vegetație bogată. Excesul de umiditate, care afecta circa 25 000 ha, era întretinut de prezența pinzei freatice la 1 — 1,5 m adîncime. De asemenea procesul de salinizare în sectorul de nord-est al Cîmpiei (Căuaș, Ghenci) are implicații asupra culturilor.

Programul de amenajare s-a materializat prin edificarea canalului magistral Ier, acumularea tip polder de la Andrid și numeroase bazine de retenție pe afluenții Valea Morii, Zimoiaș, Rîț, Ganaș, și Ier — Diosig etc. Grație acestor lucrări au fost scoase de sub pericolul inundațiilor circa 50 000 ha.

Din suprafața de 570 km² a Cîmpiei Ierului, 88% sînt deținute de terenurile agricole,

iar din cadrul acestora 4/5 îl reprezintă terenurile arabile. Cerealele ocupă peste 65% din terenurile cultivate (din care 48% de porumb). Fertilitatea solurilor a favorizat extinderea culturilor de cîneapă (5%), legumicole (5,7%) și furajere (8,5%).

În ultimii ani s-au dublat suprafețele cultivate cu legume, pe măsura solicitărilor fabricii de conserve din Valea lui Mihai și crearea de sere și solarii la Săcueni, Diosig, Jianca, Mihai Bravu etc. Cîmpia Ierului dispune de un efectiv considerabil de bovine (25 300), porcine (peste 106 000) și ovine (74 100 în 1987), aceasta explicîndu-se și prin faptul că multe așezări din regiunile limitrofe își au amplasate fermele zootehnice în Cîmpia Ierului de (exemplu, Săcueni, Cadea, Sălacea, Tarcea, Pir, Andrid etc.). Dintre fermele zootehnice se detașează cea profilată pe creșterea ovinelor — rasa merinosul transilvan — de la Chereușa.

Cîmpia Ierului a fost locuită din cele mai vechi timpuri în așezări statornice, fixate pe grinduri. Frecvența revărsărilor Ierului a silit populația să-și restrîngă considerabil aria de locuire în puncte mai apărate. Așa se explică numărul redus de așezări în cuprinsul cîmpiei (de numai 13), însă de mare importanță sub raportul vechimii și mai ales al locuirii neîntrerupte. Încă din secolele XII — XIV sînt atestate toate așezările existente. La începutul secolului XX populația era de peste 14 000 de locuitori. Dintre așezările regiunii se detașează Diosigul cu peste 9 000 de locuitori (în 1992). Creșterea nesemnificativă a populației (sub 1‰) în perioada 1910 — 1966 a fost urmată de un recul reflectat de soldul negativ de 6‰, cauzat de plecările definitive către Oradea, Satu Mare și Carei.

Paralel cu acest fenomen, frecventă este mișcarea navetistă către municipiul Oradea.

Cîmpia Ierului se înscrie printre regiunile excedentare în produse agricole animale, cerealiere, tehnice (cîneapă) și legumicole, profilul său fiind zootehnic-cerealier.

Deosebit de important pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei regiunii este prezența zăcămintelor de hidrocarburi depistate la Săcueni, Ciocaia, Diosig, Mihai Bravu și Roșiori, dar mai cu seamă a celor geotermice în tot cuprinsul cîmpiei, valorificate deja la Săcueni, Ciocaia, Mihai Bravu și Roșiori.

2.3.3. Cîmpia Crișurilor

2.3.3.1. Caracterele generale

Compartimentul central și cel mai puțin întins al Cîmpiei Banatului și Crișanei (cu o suprafață de aproape 3 500 km², ceea ce reprezintă peste 21 % din Cîmpia Banatului și Crișanei și 1,46 % din suprafața țării), este o creație în întregime a Crișurilor, de unde și numele cîmpiei. Se desfășoară de la nord de localitățile Santău Mare — Biharia, pînă la o linie ce ar uni în sud Pincota, Olari, Șimand, Sînmartin.

Limita dinspre dealuri poate fi materializată prin numeroase modificări ale elementelor naturale ce se manifestă aproximativ pe o linie ce unește localitățile Pincota, Bocsig, Beliu, Olcea, Belfir, Tinca, Husasău de Tinca, Sititelec, Păușa, Apateu, Sînmartin, Oradea, Biharia. Aici se produce contactul dintre formațiunile cuaternare ale cîmpiei cu cele pliocene ale dealurilor, reflectat printr-o denivelare ce oscilează între 30 și 200 m. Aici se observă o creștere a ponderii pădurilor de everceine la peste 20 %. Tot de aici, ca urmare a schimbării condițiilor morfologice, riurile mari reclamă îndiguirea lor în cîmpie. Spre nord, fixarea unei limite sigure este greu de precizat, în schimb spre sud, contactul cu Cîmpia Mureșului de-a lungul extremității nordice a conului fosil al Mureșului, care se ridică cu 5 — 10 m deasupra luncii inundabile a Crișului Alb, este ceva mai clar.

Ca întreaga cîmpie din latura vestică a țării a fost clădită pe același fundament carpatic scufundat, afectat diferențiat de mișcările tectonice, predominant disjunctive, care au determinat formarea unui sistem de falii (orientate în general pe direcția est — vest, nord-est — sud-vest și nord-vest — sud-est) și au transformat fundamentul într-un sistem de grabene (Oradea — Borș, Chișineu Criș — Săcudor) și horsturi (Inand — Tinca, sud Crișul Alb) (D. Istocescu, 1970). Grabenele au constituit regiuni labile, de subsidență, ce au influențat mult direcția rețelei hidrografice majore și formarea unor arii întinse mlăștinoase. De falile cu direcția nord-vest — sud-est sau nord-est — sud-vest depinde căderea fundamentului în trepte către vest și apariția apelor termale, precum și a masivelor neeruptive de la Pincota, Mocrea, Beliu. În alcătuirea petrografică a cîmpiei se întîlnesc formațiunile cristaline și permomezozoice, care în sectorul nordic, pînă la

falia Inandului, reprezintă continuarea scufundată a cristalinului central al Gilăului, a autohtonului de Bihor și chiar a formațiunilor din unitatea pinzei de Codru, acoperită de formațiuni mio-pliocene. În compartimentul sudic, peste cristalinul Apusenilor sudici, apar numai formațiuni miocene și pliocene. Depozitele cuaternare, care au o deosebită semnificație în relieful cîmpiei, acoperă întreaga suprafață și sînt reprezentate prin argile, nisipuri argiloase, nisip fin, nisipuri grosiere, pietrișuri și bolovănișuri proluviale, precum și prin depozite deluvial-proluviale, de tipul argilelor roscate sau depozite loessoide. Holocenului îi sînt atribuite depozitele aluvionare de luncă (pietriș, nisip, mlășuri), depozitele acoperitoare, nisipurile zburătoare din sectorul Macea — Șimand și depozitele mlăștinoase din Cîmpia Joasă a Crișurilor.

Aspectele generale ale cîmpiei au fost determinate de erodarea piemonturilor din dealurile de la est și acumularea materialului rezultat sub forma unei cîmpii piemontane, (într-un proces ce urmărește retragerea treptată spre vest a lacului panonic), de acțiunea de aluvionare a riurilor actuale în holocen, pe fondul unor mișcări subsidente în regiunea Sărethului și implicit sub influența modificărilor paleoclimatice succesive. (I. Berindei, 1977). Drept urmare, principalele forme de relief sînt dispuse în sens longitudinal și coboară de la est la vest în două trepte distincte morfogenetic și morfografic: o cîmpie înaltă de glacisuri și una joasă aluvială.

Cîmpia Înaltă formează o fișie desfășurată la marginea dealurilor de la Biharea, în nord, pînă la valea Teuzului, în sud. Cu o altitudine absolută cuprinsă între 100 și 185 m, este fragmentată transversal de Crișuri în patru compartimente, cu extindere diferită și cu caractere geomorfologice proprii. Astfel, la nord de Crișul Repede se dezvoltă *Cîmpia Bihariei*; între Crișul Repede și Crișul Negru, *Cîmpia Miersigului*; între Crișul Negru și Crișul Alb, *Cîmpia Călăcei*; iar la sud de Crișul Alb, *Cîmpia de terase a Bocsigului* (Gh. Măhăra, 1977), care la rîndul lor sînt fragmentate de o serie de văi torrențiale și vilcele în numeroase cîmpuri plate, cu o înclinare, în general, de la est spre vest. Cîmpia este alcătuită din patru generații de glacisuri, situate la nivelul teraselor fluviatile ale Crișurilor (6 — 10 m și 15 — 20 m; 30 — 40 m; 55 — 60 m; 70 — 80 m), cu care se continuă și se

confundă ușor. Pe alocuri, podul glacisurilor inferioare prezintă o serie de microdepresiuni de tasare, condiționate de prezența depozitelor argiloase, a luturilor nisipoase și a depozitelor loessoide, de înclinare mai redusă a reliefului și de drenajul subteran slab. Ele au, de obicei, formă circulară, cu diametrul de 10 — 30 m și, uneori, cu exces de apă. Glacisul inferior, având o altitudine cuprinsă în general între 100 și 120 m, se aseamănă mai puțin cu celelalte glacisuri și are mai multe afinități cu Cimpia Joasă, ceea ce a făcut ca unii cercetători să o considere ca o subunitate de relief aparte, o cîmpie intermediară sau cîmpia mijlocie (Gh. Măhăra, 1977). Astfel, dacă în cîmpia înaltă propriu-zisă predomină eroziunea pe verticală, înclinarea slabă a suprafeței cîmpiei intermediare (0,2%) condiționează, în unele locuri, chiar absența eroziunii. Predomină însă procesele aluvionare, râurile căpătînd chiar un caracter divagant. În această subunitate indicele fragmentării medii este de 0,5 km/km², față de 0,56 — 1,25 km/km² cit înregistrează în cîmpia înaltă, energia reliefului de numai 5 — 7 m față de 10 — 25 m. La aceasta se adaugă și stratul argilos cu permeabilitate redusă, care condiționează, pe lângă alți factori, prezența unui exces de apă, apariția ariilor mlăștinoase și, drept urmare, necesitatea de a se face canale de desecare.

Văile din Cimpia Înaltă au lunci întinse și, în mod obișnuit, patru terase (6 — 10 m; 15 — 20 m; 30 — 40 m; 55 — 60 m), ale căror elemente sînt mai puțin clar înscrise în relief, cu excepția teraselor Crișurilor la ieșirea dintre dealuri. În general, numărul și altitudinea teraselor scad treptat spre vest, iar în profil longitudinal se manifestă tendințe de convergență. În unele porțiuni trecerea de la un nivel de terasă la altul este slab exprimată, datorită acoperirii cu depozite de versant, interferenței cu glacisurile sau datorită utilizării agricole îndelungate a teritoriului (fig. 36).

Cîmpia Joasă aluvială, rezultat al activității holocene a riurilor în contextul influenței subsidenței Sărăthului și pe fondul unor sensibile modificări climatice și al unor evidente acțiuni antropice, se desfășoară sub izohipsa de 100 m, în estul canalului colector, iar din sudul Crișului Negru, la est de localitățile Talpoș și Apateu. Contactul cu Cimpia Înaltă este marcat de o ușoară inflexiune a terenului, cu excepția situației de la nord de Crișul Repede, unde Crișul

Mort, care curge pe la marginea Dealurilor Oradei și Cîmpiei Bihariei, a condiționat apariția unei denivelări mai evidente. Tendința generală de evoluție a cîmpiei este de înălțare prin procese aluvionare, în prezent fiind în „faza de trecere de la stadiul de



Fig. 36. Diviziunile Cîmpiei Crișurilor: a, Cîmpia Înaltă; b, Cîmpia Joasă.

mlaștină la cel de cîmpie aluvionară svin-tată” (V. Mihăilescu, 1966). Astăzi acțiunea Crișurilor în procesul de acumulare este atenuată ca urmare a lucrărilor de îndiguire și canalizare, rolul lor este preluat, într-o oarecare măsură, de râurile mici autohtone, precum și de procesele deluvio-coliuviale.

Aspectul general al cîmpiei este determinat de suprafața ei orizontală pe care se schițează numeroase albiesi meandre părăsite, cursuri divagante, lacuri, mlaștini, lăcoviști, fragmente de albiesi cu apă. Toate albiile riurilor mici active sau părăsite au mai mult înfățișarea unor șanțuri cu apă, puțin adâncite în suprafața cîmpiei, care la ape mai mari se revarsă pe spații întinse. Drept urmare, interfluviile au aspectul unor cîmpuri joase pe suprafața cărora s-a dezvoltat un micore-

lief de forme pozitive, datorită acumulării neuniforme a materialului aluvionar, și forme negative formate prin tasări locale sau prin procese de divagare, la care se adaugă canalele colectoare de desecare și irigații mai vechi. Cele mai multe microdepresiuni de tasare sunt transformate în suprafețe mlăștinoase sau lacuri, cum ar fi cele din Cîmpia Teuzului sau a Cefei. Un tip aparte îl constituie microrelieful dezvoltat pe solurile sărăturate din regiunea Socodor — Chișineu Criș — Zerind și Sălcuța — Sinnicolau Român, exprimat prin microdepresiuni cu adâncimi foarte reduse, legate între ele prin șanțulețe scurte, deasupra cărora se ridică microforme pozitive cu aspecte insulare de grinduri și popine.

Pantele foarte reduse și drenajul deficitar, prezența materialului fin aluvionar și argilos cu o permeabilitate redusă sînt factorii care participă la conturarea aspectului esențial al acestei cîmpii, de teritoriu cu exces de umiditate și cu o predispoziție accentuată de înmlăștinire și sărăturare.

Aflată în calea advecției maselor de aer, în general, din vest, sud-vest și nord-vest, Cîmpia Crișurilor are o climă cu un caracter relativ uniform, dar particularitățile suprafeței active — caracterizată prin alternanța terenurilor cultivate cu pîcuri de păduri, pășuni, terenuri mlăștinoase și lacustre — au o importanță deosebită pentru imprimarea unei variabilități accentuate a proceselor și fenomenelor climatice din stratul inferior de aer, respectiv pentru formarea topoclimatelor.

Din punct de vedere termic, Cîmpia Crișurilor ocupă o poziție de trecere între Cîmpia Someșului și Cîmpia Banatului cu media anuală de 1.5°C la Chișineu Criș și 10.4°C la Oradea. În timpul iernii apar inversiuni termice — de altfel un element caracteristic pentru întreaga cîmpie —, datorită intensificării circulației anticiclonale; în general, iernile în cîmpie sînt moderate, fără geruri puternice, ca o reflectare a predominării circulației vestice și poziției sale adăpostite față de invaziile aerului polar-continental dinspre est și nord-est. Tot ca o consecință a circulației vestice apar desprimăvăări rapide și veri cu valori termice moderate. În schimb, toamna, începînd din octombrie, temperaturile descreșc brusc, mediile multianuale variînd între 17.0°C , în septembrie și 6.0°C în noiembrie, datorită răcirii aerului prin procese radiative și creșterii advecției aerului rece sub acțiunea dorsalei anticiclonului euro-

asiatic. Datorită inversiunilor termice, primul îngheț de toamnă apare în a doua sau chiar în a treia decadă a lunii octombrie, iar ultimul îngheț în a doua decadă a lunii aprilie, ceea ce asigură un interval mediu de 188 de zile fără îngheț. Observațiile microclimatice ilustrează diferențieri ale valorilor de temperatură în funcție de calitatea suprafeței active (Gh. Măhăra, 1977). Astfel, diferența de altitudine dintre cele două trepte ale cîmpiei impune diferențieri ușor sesizabile. În timpul iernii, Cîmpia Întăa are cu 0.5°C mai mult, iar vara Cîmpia Joasă are cu circa 1.7°C temperatura aerului mai ridicată decît în Cîmpia Întăa. La rîndul lor, mlăștinile și lăcoviștile impun o scădere a temperaturii aerului cu $2 - 4^{\circ}\text{C}$, iar pădurile din Cîmpia Întăa, scăderi și mai pronunțate.

Datorită creșterii spre est a altitudinii reliefului, care obligă masele mai umede din vest să intre într-o mișcare ascendentă, se înregistrează o creștere ușoară a pluviozității în același sens. Astfel, dacă mediile anuale sînt la Chișineu Criș de 543,8 mm și la Tinca de 530,5 mm, la limita dinspre dealuri se apropie de 700 mm. Anotimpul cel mai ploios dă circa 30 — 32% din precipitații, iar iarna se acumulează circa 19 — 22%. Cele mai puține precipitații cad în intervalul ianuarie-martie, datorită predominării regimului anticiclonal și datorită lipsei convecției termice (luna martie, 38,0 mm la Ineu). Din aprilie precipitațiile cresc progresiv pînă în iunie, cînd are loc principalul maxim pluviometric, cu valori cuprinse între 70,1 și 82,7 mm, ca urmare a activității ciclonilor oceanici și intensificării proceselor convective. Din iunie, precipitațiile scad pînă în septembrie, cînd se înregistrează minimul secundar, ce variază între 38,3 și 48,6 mm, datorită predominării regimului anticiclonic de la sfîrșitul verii. În noiembrie și la începutul lui decembrie se înregistrează al doilea maxim, secundar, cuprins între 50,8 și 57,4 mm, condiționat de activitatea ciclonilor mediteraneeni. Stratul de zăpadă la sol nu constituie o caracteristică a iernilor din cîmpie, el menținîndu-se, în medie, abia în jur de 40 de zile, în unii ani chiar sub 10 zile și avînd o grosime redusă (Oradea 35,5 cm; Chișineu Criș 37,8 cm). Cea mai mare frecvență o au vînturile din sectorul sudic (Oradea 17,4%) și cele din sectorul nordic (Oradea 11,3%); în schimb participarea cea mai scăzută o au vînturile din sectorul vestic (Oradea 3,6%). În altitudine crește frecvența vînturilor de vest,

care la 1 000 m devin dominante. În apropierea dealurilor trebuie remarcată prezența unei circulații de tip briză, sesizabilă și în dreptul celor trei văi ale Crișurilor. Față de această particularitate a cîmpiei se impune ca toate construcțiile industriale, cu grad mare de poluare, să fie amplasate în partea vestică a așezărilor.

În mod deosebit litologia și structura depozitelor de suprafață, textura solurilor, regimul precipitațiilor și activitatea umană condiționează bogăția apelor freatice, care a imprimat acestei cîmpii, pe lângă un caracter distinct, pus în evidență de excesul de apă și anumite nuanțări în peisaj (Gh. Măhăra, 1977).

Apele freatice sînt cantonate în nisipuri și pietrișuri cu granulometrie diferită, avînd intercalații de argile, prafuri argiloase sau argile prăfoase. De multe ori, la partea superioară a acestor depozite permeabile sînt formațiuni cu o permeabilitate mai redusă — uneori chiar argile compacte —, care imprimă nivelului hidrostatic un caracter ascensional. Tot ca o particularitate a cîmpiei, apare prezența la soluri a unui orizont B impermeabil, cu textură grea, care condiționează formarea unui strat acvifer sezonier (suprafreatic). Acesta, puternic influențat de condițiile climatice, prezintă oscilații sezoniere accentuate, ceea ce contribuie la existența excesului de apă și la manifestarea procesului de sărăturare a solurilor.

Procese de acumulare a depozitelor cuaternare avînd loc de la est spre vest, în aceeași măsură apare o diminuare a granulometriei depozitelor și a adîncimii stratului freatic. Dacă adîncimea apelor freatice în Cîmpia Întoarsă este de 5 — 10 m, în Cîmpia glacișurilor inferioare de 3 — 4 m, în Cîmpia Joasă și în luncile nivelului freatic este situat la 2 — 5 m, iar în unele regiuni depresionare, cum ar fi Cefa, Salonta, Cîmpia Teuzului sau în vechile albie părăsite și drenate, sub 2 m. O diferență evidentă s-a constatat la panta hidrolică a fluxului subteran care este cuprinsă între 4 — 7% în Cîmpia Întoarsă și 0,6 — 0,8% în Cîmpia Joasă. Acest factor, la care adăugăm permeabilitatea scăzută a terenurilor depresionare lipsite de scurgere fac ca stratul acvifer să nu poată drena apele de suprafață și acestea să fie transformate în terenuri mlăștinoase, cu soluri hidromorfe sau halomorfe și vegetație higrofilă și halofilă. Nivelul hidrostatic este supus influen-

țelor climatice, avînd maximele de nivel în februarie și martie, imediat după topirea zăpezilor și o descreștere treptată pînă în octombrie și noiembrie, cînd sînt înregistrate valorile minime. Ca o particularitate a Cîmpiei Crișurilor apare dependența, într-o oarecare măsură, a regimului apelor freatice și de lucrările de îndiguiri și desecări. Puternica aluvionare actuală a albiilor îndiguite, micșorînd secțiunea de scurgere, face ca la ape mari rîurile să curgă la un nivel superior cîmpiei, iar prin infiltrații să contribuie la ridicarea pînzei freatice spre suprafață.

Apele de adîncime, prezentînd un caracter ascensional sau artezian, sînt folosite în alimentarea cu apă a multor localități. Sînt, de asemenea, folosite apele minerale (Tinca) sau termale de la adîncimi mari.

Rîurile alohtone — cele trei Crișuri — își au obîrșia în Munții Apuseni sau — o altă generație — în Dealurile Crișanei. La acestea se adaugă rîurile autohtone ce aparțin unei generații a glacișurilor. Dacă rîurile alohtone prezintă caracteristicile hidrologice ale regiunilor de obîrșie, în schimb cele autohtone sînt puternic influențate de condițiile climatice și au un caracter temporar.

Numeroasele lucrări de regularizare și folosirea apelor din rîuri, în perioadele de secetă, pentru irigații și în alte scopuri fac ca debitul natural să fie foarte greu de determinat, mai ales că în aceste perioade se fac numeroase derivații de debite dintr-un rîu în altul. În general, rîurile au ape mari în februarie — martie și ape mici în august — octombrie. În ceea ce privește viiturile și inundațiile pe rîurile și pîraiele mici neîndiguite s-a constatat că ele pot să apară în toate sezoanele anului. La rîndul ei, scurgerea medii multianuale specifică este redusă, ea fiind de numai 1 — 3 l/s.km², în timp ce scurgerea medie specifică de aluviuni este relativ ridicată, ceea ce determină procese intense de colmatare atît a canalelor, cit și a ariilor joase, inundabile. În timpul iernii, formațiunile de gheață apar în prima decadă a lunii noiembrie pe Crișul Repede, în a doua decadă a acestei luni pe Crișul Negru, iar pe Crișul Alb în a treia decadă.

În Cîmpia Joasă lucrările hidroameliorative au creat o rețea de canale, cu o densitate ridicată (în vestul Canalului Colector, 0,54 km/km²; bazinul Crișului Alb 0,53 km/km²; regiunea Gurba — Mișca — Socodor — Crișana, 1,25 km/km²). Apariția lor a condiționat modificări importante în hidro-

grafia cîmpiei. Numeroase mlaştini, precum şi unele regiuni depresionare au fost transformate în heleşteie, care însumează o suprafaţă de circa 1 000 ha (Cefa, Inand, Ineu, Seleuş etc.).

Cu toate lucrările hidroameliorative realizate, caracteristica de seamă a Cîmpiei Crişurilor rămîne aceea de regiune cu exces de apă, drept consecinţă a condiţiilor de ansamblu şi locale de constituţie, de relief şi de regim hidrologic.

Prin acţiunea îndelungată a întregului complex de factori naturali, la care trebuie să adăugăm şi omul prin activitatea sa productivă, în cîmpie s-a format şi evoluat o gamă foarte variată de soluri zonale şi intrazonale cu o repartitie mozaicată. În condiţiile de climă cu nuanţă de silvostepă, în sudul Cîmpiei Crişurilor apar soluri molice, care în condiţiile creşterii umidităţii, a scăderii temperaturii medii anuale şi a prezenţei pădurilor pot trece spre nordul şi estul cîmpiei în argiluvisoluri şi cambisoluri de diferite tipuri.

Pe acest fond al solurilor zonale, apar variate soluri intrazonale. Astfel, prezenţa pinzei freatice aproape de suprafaţă (pînă la 1 m adîncime) a condiţionat, în cazul apelor nemineralizate, formarea lăcoviştilor mlaştinoase iar în cazul celor mineralizate formarea solurilor salinizate gleizate, caracteristice Cîmpiei Joase. În schimb, în Cîmpia Întaltă condiţiile sînt favorabile proceselor de gleizare şi uneori de podzolire.

Activitatea omului a exercitat o influenţă puternică asupra evoluţiei solurilor. Prin defrişarea pădurii — mai ales în partea joasă a cîmpiei — s-a declanşat procesul de înţelenire secundară. Luarea în cultură a solurilor a produs schimbări morfologice sau fizico-chimice în orizontul superior al acestora, iar lucrările de desecare şi drenaj au făcut ca solurile hidromorfe şi hidroautomorfe să capete caracterele solurilor automorfe, cum este cazul unor lăcovişti care, fiind stepizate, au evoluat spre molisoluri de fineaţă. Nu rare sînt cazurile (în vestul Canalului Colector, la Socodor), în care, prin lucrări de îndiguii sau de irigaţii, s-a ajuns la ridicarea pinzei freatice şi la apariţia solurilor salinizate.

Prezenţa argiluvisolurilor şi cambisolurilor, care ocupă cea mai mare parte din Cîmpia Întaltă, precum şi prezenţa solurilor caracteristice silvostepii, în Cîmpia Joasă, atestă că odinioară vegetaţia forestieră şi aso-

ciaţiile vegetaţiei ierboase ocupau suprafeţe întinse în Cîmpia Crişurilor. În urma defrişărilor şi a extinderii terenurilor agricole, arealele actuale ale pădurilor sînt discontinui şi cu suprafeţe reduse, ocupînd numai 4,5% din suprafaţa acestei unităţi. Cele mai întinse petice de pădure sînt în Cîmpia Întaltă, reprezentate de păduri de foioase xerofile — cerete şi stejărişuri, cu specii mediteraneene. Frecventă, în acest sens, este asociaţia *Quercetum cerris criscum*. Pădurile de la Chişirid, Păuşa, Gepiu, Miersig, Căuaşd şi Beliu au ca specie dominantă *Quercus cerris*, care poate să ajungă pînă la 88%, în asociaţie cu *Q. frainetto*, *Q. petraea*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus* ş.a. Cele mai semnificative trupuri de pădure se află la Nojorid (166 ha), Leş (202 ha), Apateu — Păuşa — Şauaieu (1 277 ha), Miersig (747 ha), Gepiu (160 ha), Bicaci (155 ha), Căuaşd (1 588 ha), Gurbediu (933 ha), Tinea (185 ha), Olcea — Călăcea (543 ha). În Cîmpia Joasă apar doar cîteva pîcuri de păduri de foioase mezofile (Cefa 247 ha; Ghiorac 440 ha; Şepreuş 327 ha; Adea 495 ha; Sinteş Mare 3 830 ha; Țipar 723 ha; Mişca 644 ha; Chişineu Criş 470 ha; Socodor 570 ha), constituite din stejar, ulm, frasin, cărora li se adaugă şi vegetaţia de luncă formată din esenţe moi. Stratul arbustiv formează desişuri greu de trecut iar vegetaţia ierboasă este mai slab dezvoltată.

Vegetaţia naturală primară a pajiştilor ocupă suprafeţe foarte mici. În Cîmpia Întaltă, pe terenurile cu pinza freatică la mai mult de 2 m, se dezvoltă vegetaţia xerofilă şi xeromezofilă. Alături de *Festuca sulcata* creşte o serie de graminee cu tufa deasă şi talia mică (*Festuca pseudovina*, *Poa bulbosa*, *Lolium perenne* ş.a.). În Cîmpia Joasă şi pe lunci apare vegetaţia mezohigrofilă, pe soluri aluviale umede şi pe lăcoviştile din depresiuni. În aceste fineţe predomină asociaţiile de *Agrostis alba*, *Poa pratensis* etc. Vegetaţia pajiştilor halofile are o răspîndire largă, sub formă de pîcuri, începînd de la Sînnicolau Român spre Cefa, Salonta, Chişineu Criş pînă spre Nădab — Socodor. Structura floristică diferă foarte mult, în funcţie de tipul de salinizare, de adîncimea şi concentraţia de săruri şi de gradul de umezeală. Ca urmare, pe fiecare microformă de relief a sărăturii vegetează specii sau asociaţii de plante diferite. În trecut, o arie largă de răspîndire o avea vegetaţia acvatică şi palustră. Drenajele au determinat retragerea vegetaţiei acvatice în apele heleşteielor, unde are o dispunere zonală (vegetaţie mezo-

higrofilă, higrofilă, pipirig — papură — trestie). Vegetația palustră apare în terenurile cu exces de apă, fiind alcătuită din asociații de ierburi înalte — trestiișuri, păpurișuri, rogozișuri.

În Cîmpia Crișurilor, urmele arheologice atestă prezența așezărilor omenesti încă din neolitic, populația dezvoltînd în această etapă cultura Criș (cu urme la Vârșand și Socodor) și cultura Tisa (Sintana, Socodor, Oradea și Sintandrei), după care, în epoca bronzului (2000 — 1200 în Chr.), numărul așezărilor cunoscute este și mai mare (Vârșand, Socodor, Tămașda, Ateaș, Oradea, Girișu de Criș etc.). Continuitatea de locuire este atestată și în epocile ulterioare, populația fiind formată din geto-daci, a căror prezență este dovedită pe o suprafață mai întinsă. În secolele II și III d. Chr. în perioada dacilor liberi din epoca romană, sint cunoscute așezările de la Belfir, Tămașda, Tinea, Zerind, Girișu de Criș, Livada de Bihor, Oradea (Salca), Sintion, Sintandrei. În secolele IV — VI continuă să trăiască populația autohtonă pe cale de romanizare, iar în secolele VI — X sint cunoscute așezările Socodor, Iermata, Girișu de Criș, Tărian, Oradea și Rohani, care erau locuite de populația românească, ce practica cultura plantelor și creșterea animalelor. În toată perioada din neolitic pînă în secolul X, urmele arheologice arată că populația a trăit, aproape în toate cazurile, în așezări stabile. Începînd cu secolul XI, dar mai ales în secolul XII, pe lîngă urmele arheologice apar și însemnări documentare, care atestă prezența mai multor așezări, unele dintre acestea păstrîndu-se pînă astăzi: Biharea, Oradea, Girișu Negru, Tămașda, Zerind, în timp ce altele au dispărut. De fapt, numărul cel mai mare de așezări apare menționat în documente în perioada secolelor XIII — XV, cînd a fost organizată cancelaria de înregistrare.

Prima jumătate a secolului IX corespunde cu începutul expansiunii regatului feudal ungar asupra Transilvaniei, care a întîmpinat însă o puternică rezistență din partea populației băstinașe românești, organizată în formațiuni politice conduse de voievozi. Astfel, în Crișana, pe Crișuri și pe Someșul inferior, exista ducatul lui Menumorut, cu centrul în cetatea Biharea, care s-a împotrivit „... pretențiilor ridicate de căpeteniile triburilor maghiare de a le ceda țara și stăpînirea...” (C. Daicoviciu și colab., 1966, p. 64).

Prezența milenară a românilor este recunoscută în numeroase lucrări și de către unii istorici unguri. Astfel, S. Márki arată că „de unde începe istoria românilor nu intră în atenția (preocuparea) noastră. În ceea ce privește însă Valea Crișului Negru, admit că ungurii noștri i-au găsit acolo pe români”¹. Cu privire la structura națională a populației, pentru aceeași zonă, autorul menționat arată că, dintr-un total de 182 744 de locuitori, românii dețineau 68,6% (125 329 persoane), maghiarii 30,4%, iar restul de 1% aparținea altor naționalități².

În ultima perioadă de peste 100 de ani (1880 — 1986), populația a înregistrat o creștere importantă pe ansamblul cîmpiei: de la 170 057 la 381 352 de locuitori, ceea ce înseamnă un spor de aproape 125%. Creșterea cea mai însemnată s-a înregistrat în etapa 1880 — 1910, după care au urmat sporuri destul de lente. Partea nordică și cea centrală a cîmpiei se caracterizează, cu foarte puține excepții, prin dinamică pozitivă. Creșterile cele mai mari apar la Oradea, Sintandrei, Nojorid, Sînmartin etc. Sudul cîmpiei, cu excepția orașelor Chișineu Criș și a cîtorva sate, prezintă sensuri negative. După 1950 dinamica populației a înregistrat fluctuații destul de însemnate și în general se caracterizează prin valori mai mici în comparație cu media pe țară. De exemplu, natalitatea în 1956, s-a înscris în limite foarte largi, deținînd valori de 12 — 31‰ în partea nordică, 20 — 25‰ în partea centrală și sub 20‰ în compartimentul sudic al cîmpiei. Pînă în 1966, natalitatea a înregistrat valori și mai reduse, fiind în 1960 pe ansamblul cîmpiei, de numai 14‰. În anii 1967 și 1968 s-a ajuns din nou la o natalitate mai ridicată — media fiind de 19‰, — cu valori, în general, sub 15‰ în sud și peste 20‰ în partea nordică. După această perioadă, natalitatea a scăzut din nou în anul 1985 ajungîndu-se la 10 — 20‰. Mortalitatea a scăzut treptat după 1950 ajungînd, pe ansamblul cîmpiei, la 11,8‰, în anul 1956, la 10,2‰ în 1960 și 9,8‰ în 1974. Ca urmare a fenomenului de îmbătrînire a populației din mediul rural, după 1975 mor-

¹ S. Márki (1887), *A Fekete Körös cs vidéke (Crișul Negru și împrejurimile)*, Oradea, p. 95.

² Problemele de evoluție a populației și a așezărilor sint detaliat analizate în lucrarea: Gr. P. Pop (1977), *Probleme geografico-economice în Cîmpia Crișurilor*, în volumul *Cîmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului*, Edit. Științifică și Enciclopedică, București, p. 103 — 146.

talitatea a crescut din nou, astfel că în anul 1985 a ajuns la valori de $14 - 19\text{‰}$. Excepție la această situație o prezintă orașele în care mortalitatea este mult mai scăzută ($9,8\text{‰}$ la Oradea, 1985; $12,2\text{‰}$ la Salonta etc.), precum și unele comune din apropierea orașelor (Sintandrei $9,4\text{‰}$, Sinmartin $10,2\text{‰}$, Nojorid $12,2\text{‰}$ etc.).

Sporul natural s-a menținut la valori mici: $7,8\text{‰}$ în 1956, $4,1\text{‰}$ în 1960, $6,3\text{‰}$ în 1975 și numai 3‰ în 1985, rezultând că pe întreaga cîmpie apare o creștere lentă a populației, dar destul de diferențiată regional. După 1950 în partea de sud s-au menținut valori negative, iar în nord s-au înregistrat valori ceva mai ridicate la început și apoi tot mai scăzute. De exemplu în 1985, sporul natural a fost de $6,5\text{‰}$ la Oradea, de $7,4\text{‰}$ la Sintandrei, de $6,3\text{‰}$ la Sinmartin și de $-4,2\text{‰}$ la Biharia, $-2,6\text{‰}$ la Borș, $-4,2\text{‰}$ la Cefa.

Mișcarea migratorie înregistrează valori destul de reduse, ea fiind de $2,7\text{‰}$ în 1956, de $3,2\text{‰}$ în 1970 și numai de $1,7\text{‰}$ în 1985, rezultând de aici că deplasarea spre Cîmpia Crișurilor prezintă valori destul de modeste. Cu excepția orașului Oradea, unde sporul migratoriu a înregistrat 25‰ în 1985 și a comunei Sinmartin cu 35‰ , în toate celelalte cazuri valoarea acestui indice s-a caracterizat prin valori accentuat negative, procesul de deplasare a populației din mediul rural spre cel urban fiind specific și etapei actuale. Așa, spre exemplu, în anul 1985, sporul migratoriu a fost de $-40,3\text{‰}$ în cazul comunei Husasău de Tinca, -27‰ la Mădăras, -27‰ la Ciurmeșiu, -23‰ la Cefa.

În anul 1910, pe ansamblul cîmpiei densitatea era de $72,8 \text{ loc./km}^2$, în 1930 s-a ajuns la 91 loc./km^2 , iar în 1986 la 116 loc./km^2 . În repartitia populației apar mari deosebiri de la un loc la altul al cîmpiei. Fără populația orașelor, nordul cîmpiei se caracterizează prin densități ce depășesc 60 loc./km^2 , centrul are valori foarte variabile de la 20 la 100 loc./km^2 , iar în sud, cu puține excepții, densitățile scad sub 60 loc./km^2 .

Privitor la structura pe medii a populației, se constată că în anul 1900 în orașe trăia 27% din totalul locuitorilor cîmpiei, în 1930 s-a ajuns la 35% , în 1966 la 47% , iar în 1985 la 67% , rezultând de aici un grad ridicat de urbanizare, aceasta mai ales ca urmare a prezenței orașului Oradea, care deține 57% din totalul populației cîmpiei.

Din cele 100 de așezări ale Cîmpiei Crișurilor, trei sînt orașe. Cu excepția orașului Oradea al cărui număr de locuitori a crescut de la $48\,018$ în 1900, la $82\,687$ în 1930 și $220\,848$ în 1992, celelalte sînt centre mici: Salonta $22\,943$ de locuitori, Chișineu Criș $9\,014$ de locuitori. Dezvoltarea orașului Oradea a fost mult favorizată de poziția pe una dintre cele mai importante căi de pătrundere din cîmpie spre Podișul Transilvaniei.

Așezările rurale, 96 la număr, au un mod foarte variat de distribuire pe suprafața cîmpiei. După mărime sînt repartizate astfel: 7% cu mai puțin de 500 locuitori, 29% cu $500 - 1\,000$ locuitori, 41% cu $1\,000 - 2\,000$ locuitori, 16% cu $2\,000 - 3\,000$ locuitori, 5% cu $3\,000 - 4\,000$ locuitori, iar în categoria de peste $4\,000$ locuitori se înscriu numai două așezări — Tinca și Șimand —, situate la intrarea în Depresiunea Crișului Negru și, respectiv, la contactul Cîmpiei Crișurilor cu Cîmpia Aradului (fig. 37).

În general, la distanțe destul de mari unele de altele (pînă la $10 - 12 \text{ km}$), localitățile preferă văile riurilor și contactul cu dealurile; pot fi stabilite cîteva alinamente de așezări: de-a lungul văilor principale, la contactul dintre cîmpia joasă (de divagare) și cîmpia înaltă (subcolinară), unde așezările s-au fixat pentru posibilitățile mai lesnicioase de alimentare cu apă, la contactul cîmpiei înalte cu dealurile piemontane, pe cîmpurile dintre văile principale ce traversează cîmpia, gruparea din cîmpia joasă (Gr. Pop, 1970). Pînă în secolul nostru, în partea joasă a Cîmpiei Crișurilor a fost larg dezvoltat fenomenul de risipire a așezărilor (Șt. Manciulea, 1931). În același timp, a început un proces de sistematizare a așezărilor rurale, amplificat în mod deosebit în ultimele decenii, proces tot mai accentuat de la nordul spre sudul cîmpiei.

Marea majoritate a așezărilor au o funcție agricolă (cultura cerealelor și creșterea animalelor), dar la contactul cîmpiei cu dealurile sînt cîteva și cu alte funcții: predominant de servicii, ca Sinmartin (pe teritoriul căreia funcționează Băile Felix și Băile 1 Mai) și Tinca (cu funcție agricolă-turistică). Unele așezări agricole prezintă tendințe de specializare în legumicultură (Sintion, Sintandrei, Borș, Nojorid, Tărian — toate din jurul orașului Oradea; Salonta, Mădăras, Șimand, Olari, Zărand etc.), în piscicultură (Cefa, Inand, Homorog, Tămașda, Seleuș), în îngră-




Fig. 37. Cîmpia Crișurilor. Distribuția și mărimea așezărilor. 1, Dealuri; 2, depresiuni; 3, terenuri agricole; 4, păduri; 5, lacuri; 6, canale; 7, albi părăsite; 8, stațiuni balneoclimaterice; 9, cale ferată; 10, drum modernizat.

șarea animalelor (Palota, unde funcționează o foarte mare unitate de porcine) etc. Toate așezările cîmpiei sînt legate printr-o rețea de căi de comunicație bine dezvoltate, avînd ca axă longitudinală linia ferată și șoseaua Oradea — Arad, care se intersectează cu axe transversale aproximativ pe direcția est — vest, asigurîndu-se prin aceasta

legăturile cu Munții Apuseni și cu Depresiunea Transilvaniei. La granița cu Ungaria se află punctele de frontieră Episcopia Bihorului (feroviar) și Borș (rutier), la vest de Oradea și Vârșand, pe șoseaua ce începe la Chișineu Criș și merge spre graniță. Tot ca axă longitudinală este și drumul Leș — Tinca — Olcea — Ineu, situat la contactul

dintre cîmpie și dealuri. În general, densitatea rețelei feroviare a cîmpiei (8,5 km/1 000 km²) este aproape dublă în comparație cu media pe țară, în timp ce densitatea rețelei rutiere (24 km/100 km²) este simțitor mai redusă.

Cîmpia Crișurilor se caracterizează printr-o economie complexă, industria reprezentînd aproximativ 60%, agricultura 30% iar serviciile 10%.

Cu începuturi încă din prima parte a veacului trecut, industria s-a dezvoltat mai întîi pe baza resurselor agricole locale (mărărit, spirt, bere). Mai tîrziu au apărut noi ramuri industriale care utilizează materii prime aduse din alte regiuni. După locul de proveniență a materiilor prime, se conturează trei zone: o *zonă imediată*, care corespunde în general cu Cîmpia Crișurilor, din care industria primește numai materii prime agricole (tulpini de cîneapă, piei de cornute mari și de ovine, animale îngrășate și păsări, lapte, floarea-soarelui, legume, cereale, sfeclă de zahăr etc.); o *zonă apropiată*, cuprinzînd cîmpiile Barcăului și Crasnei, dealurile și regiunea de munte a județului Bihor, precum și unele spații din județele vecine: Arad, Timiș, Cluj, Sălaj și Satu Mare, din care industria primește cărbune energetic, bauxită, lemn, struguri și alte fructe, lapte, animale etc. o *zonă îndepărtată*, în care sînt cuprinse piețele de aprovizionare cu diferite materii prime de pe cuprinsul țării, sau chiar din afara granițelor: bauxită, metale, azbest, furnire, placaje, plăci fibrolemnoase, bum-bac și diferite fibre și fire, piei crude, piei prelucrate și tananți, mase plastice, malt pentru fabricarea berii, lacuri și pigmenți etc. (Gr. Pop, 1969).

Pe cuprinsul cîmpiei, dar mai cu seamă în orașul Oradea, sînt prezente aproape toate ramurile industriei, aceasta dezvoltîndu-se mai ales după 1960. Ponderea cea mai însemnată revine industriei ușoare (24%), apoi alimentare (23%) și construcțiilor de mașini (19%), care împreună dețin aproape 70% din potențialul industrial al regiunii. Industria ușoară este reprezentată prin producția de țesături (Oradea și Salonta), tricotaje și confecții (Oradea), precum și prin cea de pielărie și încălțăminte (două tăbăcării și trei fabrici de încălțăminte la Oradea) și blănărie (vestita fabrică de la Oradea). În industria alimentară ponderea cea mai însemnată aparține întreprinderilor de industrializare a cărnii (Salonta și Oradea), de fabricare a

uleiurilor vegetale și zahărului (Oradea), de prelucrare a laptelui (Oradea și Chișineu Criș). Industria construcțiilor de mașini, în cea mai mare parte o creație a ultimelor trei decenii, este reprezentată prin întreprinderea de mașini unelte, întreprinderea de piese și subansamble pentru mijloace de transport, întreprinderea mecanică, întreprinderea metalurgică etc. de la Oradea, la care se adaugă alte cîteva unități mai mici de la Salonta și Chișineu Criș. Realizează diferite tipuri de mașini unelte, accesorii pentru mijloace de transport (mecanisme de închidere și deschidere pentru toate mijloacele de transport), diferite utilaje pentru agricultură și industria alimentară, bunuri metalice de larg consum etc.

Metalurgia neferoasă (industria aluminei) deține circa 9% din potențialul industrial al Cîmpiei Crișurilor iar industria chimică 11%. Privitor la fabricarea aluminei trebuie subliniat faptul că a constituit, prin intrarea în funcțiune a uzinei de la Oradea, în anul 1965, o premieră națională. Aceasta valorifică resursele de bauxită din Munții Pădurea Craiului, pe baza cărora se obține alumina calcinată. Industria chimică are tradiție în această regiune, unele produse fiind realizate încă în urmă cu patru-cinci decenii (vopsele, clorură de amoniu, cloroform, extracte farmaceutice, produse cosmetice, diluanți). În prezent, în cadrul Uzinei „Sinteza” din Oradea se produc cantități importante de lacuri și vopsele, pigmenți anorganici de precipitare, produse fitofarmaceutice, produse chimice de sinteză organică etc.

Lipsa resurselor energetice (în ultima vreme au început să fie exploatate unele resurse de petrol și de gaze naturale la vest de Oradea și în zona orașului Salonta), la care se adaugă și depărtarea de marile unități producătoare de energie electrică, au determinat amplasarea la Oradea a unei uzine termoelectrice cu o putere instalată de peste 200 MW, care funcționează pe baza lignitului exploatat în bazinele Barcăului și Crasnei. Pe lîngă producția de energie electrică, unitatea contribuie la aprovizionarea cu abur și apă caldă a unui mare număr de unități industriale și agricole, precum și la termoficarea orașului. În partea de est a orașului a intrat de curînd în funcțiune termocentrala Oradea II, care utilizează lignitul de la Borozel și gazele din regiunea Abrămuț.

Industria materialelor de construcții nu dispune de resurse importante de materii prime. Cele trei fabrici de cărămidă de la Oradea funcționează pe baza argilei exploatare în dealurile din apropiere. Necesitățile în construcția de locuințe au determinat apariția, în anul 1972, a fabricii de beton celular autoclavizat de la Oradea, care a ridicat ponderea acestei ramuri până la aproape 4% din industrie. Pe baza cimentului de la Aleșd, a nisipului și a argilei din apropiere și a azbestului importat, aici se realizează prefabricate din beton, simplu și armat, plăci de diferite forme din azbociment, cărămidă.

Industria de prelucrare a lemnului, care se înscrie cu aproximativ 3% din producția globală industrială a regiunii, s-a dezvoltat pe baza materiilor prime aduse din zonele apropiate și îndepărtate. Prelucrarea lemnului este o îndeletnicire mai veche, dar s-a dezvoltat cu precădere la Oradea (prin intrarea în producție a unei fabrici moderne) și Sălonta.

În jur de 1% din valoarea producției globale industriale aparține industriei poligrafice, care este reprezentată de către Întreprinderea poligrafică „Crișana”.

Cîmpia Crișurilor dispune de o suprafață de peste 297 000 ha de terenuri agricole, ceea ce reprezintă aproape 90% din totalul suprafeței unității (circa 345 000 ha). La rîndul lor, terenurile arabile cuprind, în general, peste 70% din cele agricole, în această unitate înregistrîndu-se condiții favorabile mai ales pentru cultura cerealelor și a plantelor tehnice și de nutreț. Ca urmare a particularităților morfologice, întinderea mare a cîmpiei joase, cu drenaj deficitar, problema care trebuie să stea mereu în atenția agriculturii este aceea a eliminării excesului de apă manifestat mai cu seamă în perioada de primăvară. În acest scop, au fost efectuate lucrări de hidroameliorații de amploare, care constau în îndiguirea celor trei Crișuri și în săparea unui număr important de canale: Canalul Crișurilor (Canalul Colector), Canalul Morilor, Canalul Cermei-Tauț (și altele de mai mică importanță). Lucrările au contribuit la înlăturarea aproape totală a revărsărilor, iar canalele de desecare elimină în bună măsură excesul de apă din incintele îndiguite. Trebuie, însă, rezolvată problema solurilor salin și alcaline, care s-au extins după îndiguirea Crișurilor.

Terenurile agricole ocupă în multe locuri 80% sau chiar peste 90% din suprafață, ex-

cepție făcînd fișa de la contactul cîmpiei cu dealurile, unde suprafețe destul de însemnate sînt ocupate de păduri. Urmărirea structurii terenurilor agricole arată că aproximativ 75% din acestea revin terenurilor arabile, aproape 20% sînt deținute de pășunile naturale, 3% de fînețe, 0,5% de vii și 0,4% de livezi. În legătură cu distribuția terenurilor arabile, care depășesc aproape peste tot 60% din spațiul agricol, apare constatarea generală de descreștere a ponderii acestora de la nord la sud, unde suprafețe însemnate sînt ocupate de pășuni naturale (fig. 37).

Cerealele dețin aproximativ o treime din întreaga suprafață a unității sau în jur de 70% din totalul terenurilor ocupate de cultura plantelor. După cereale urmează plantele tehnice și cele furajere. Cultura grîului are, în general, condiții favorabile de dezvoltare în Cîmpia Crișurilor, acesta fiind cultivat pe o suprafață ce oscilează în jurul a 55 000 ha/an, iar producțiile depășesc chiar 3 500 kg/ha mai ales în aria cernoziomurilor levigate. Porumbul se cultivă aproximativ pe aceeași suprafață ca și grîul, el deținînd în jur de 32% din totalul plantelor cultivate. Cele mai bune condiții de cultură se întîlnesc pe cernoziomurile levigate, pe solurile brune de pădure și pe solurile negre de fîneță, care au o extindere mai mare în partea joasă a cîmpiei. În cea mai mare parte a cîmpiei se realizează între 2 500 și 4 000 kg/ha, în timp ce la contactul cîmpiei cu dealurile numai rar se ajunge la 2 500 kg/ha. Alături de grîu și de porumb, se cultivă orzul (pe o suprafață de circa 8 000 ha) și orzoaica.

Leguminoasele pentru boabe (soia, mazărea, fasolea și izolat lupinul, mai mult ca plantă furajeră) ocupă o suprafață în jur de 4 000 ha. Dintre plantele uleioase, floarea-soarelui deține o suprafață de peste 12 000 ha. În legătură cu repartitia plantelor uleioase, se constată că floarea-soarelui și macul sînt prezente în toată unitatea, în timp ce inul pentru ulei se cultivă numai la contactul cîmpiei cu dealurile, unde, în unele cazuri, deține pînă la 10% din terenurile arabile.

Cînepa pentru fuior se cultivă numai în jumătatea nordică a Cîmpiei Crișurilor, trecînd doar în cîteva cazuri la sud de Crișul Negru. Această situație nu este condiționată de factori ecologici nefavorabili, ci de faptul

că regiunea este departe de centrele de prelucrare primară de la Palota (jud. Bihor) și Iratoș (jud. Arad). Sfecla de zahăr, tutunul și sorgul pentru măhuri ocupă o suprafață de circa 9 000 ha, aproximativ 6% din suprafața cultivată. Sfecla de zahăr se cultivă peste tot (cu excepția fișiei de contact cu dealurile) și se înscrie cu ponderi de 3 — 5% în cea mai mare parte a cîmpiei, pe care se grecează, insular, valori de 5 — 10% sau chiar mai mult (la Nădab, Grăniceri, Șimand etc.). Producțiile medii sînt, în general, de peste 20 000 kg/ha/an, în unele locuri înregistrîndu-se valori mult mai mari.

Cultura legumelor se face pe o suprafață în jur de 2 000 ha. Ca urmare a condițiilor de mediu, la care se adaugă și cerințele pentru aceste plante, apare situația de concentrare a culturii legumelor în partea nordică, respectiv în apropierea orașului Oradea și în partea sudică a cîmpiei. Aproximativ 30% din suprafețe sînt cultivate cu tomate, 25% cu ardei, 12% cu ceapă, 11% cu varză, 7% cu castraveți. Pe lângă cultura legumelor în cîmp deschis, în ultima vreme s-a dezvoltat legumicultura în solarii și sere.

În 1988 suprafața serelor ajunsese la peste 100 ha. Legumicultura în sere este practică la Olari, Șimand, Grăniceri, Siciău, Mădăraș, Batăr, Girișu de Criș, Biharia etc., dar mai ales la Oradea, unde funcționează un complex de 92 ha și la Salonta de 7 ha.

Finetele naturale fiind puține și de slabă calitate, s-a dat atenție introducerii în cultură, pe scară largă, a plantelor de nutreț. În ultimii ani acestea au ocupat circa 26 000 ha, ceea ce înseamnă 16% din terenurile arabile. Rolul cel mai însemnat revine trifoiului și lucernei, care, împreună, dețin 11% din plantele de cultură sau 73% din totalul plantelor de nutreț.

Cîmpia Crișurilor este recunoscută și ca regiune de creștere a animalelor; acest sector deținînd circa 38% din valoarea producției agricole. În ultimii ani numărul anual total al animalelor s-a situat în jur de 100 000 de bovine, 15 000 de cabaline, 250 000 de porcine, 31 000 de familii de albine. Bovinele au o densitate de 40 de capete la 100 ha de teren agricol, dar acestea sînt disproporționat repartizate, ca urmare a concentrării unui mare număr de bovine (Bălțata românească — peste 85% —, Brună și metiși din Brună) în unele unități agricole, cum sînt cele de la Biharia, Borș, Sîntion, Girișu de Criș, Batăr, Oradea etc.

Porcinele ajung la un număr anual de peste 250 000 de capete, revenind pe ansamblul cîmpiei peste 200 de capete la 100 ha teren cultivat cu cereale, dar numărul este neuniform repartizat ca urmare a prezenței marilor complexe sau ferme. Cel mai mare complex pentru porcine este la Palota (în apropiere de Oradea). Un număr însemnat de porcine se cresc, de asemenea, la Oradea, Biharia, Borș, Girișu de Criș, Nojorid, Tinca (Gr. P. Pop, 1971).

Cîmpia Crișurilor dispune de condiții favorabile de creștere a oilor (cu lînă fină și semifină), în această unitate existînd în jur de 310 000 de capete, ceea ce înseamnă circa 120 de capete la 100 ha teren agricol, mai mult decît media pe țară. În partea nordică, densitatea este mai mică de 100 de capete la 100 ha de teren agricol, în cea mediană repartitia este discontinuă, iar în sud densitatea este cea mai ridicată.

După anul 1950, în Cîmpia Crișurilor, ca urmare a condițiilor dintre cele mai favorabile (arii joase pentru amenajarea heleșteilor, canale pentru aprovizionarea cu apă, subproduse agricole pentru alimentarea peștelui) la Cefa au fost extinse heleșteiele, iar la Inand, Mădăraș, Homorog, Tămașda (jud. Bihor), Seleuș și Cermei s-au construit bazine piscicole (Gr. P. Pop, Viorica Rusu, 1968).

2.3.3.2. Diviziunile regionale

Luînd în considerare întreg complexul de factori geografici și în funcție de particularitățile posibilităților de utilizare ale teritoriului, cele două trepte de relief identificate în cîmpie au și funcția de unități regionale: Cîmpia Înaltă, cu altitudini cuprinse între 110 m și 180 m și Cîmpia Joasă, între 80 și 110 m. Limita dintre ele trece pe la vest de Biharia și Oradea, pe la Toboliu, Sinnicolau Român, Homorog, Tulcea, Batăr, Berechii, Cermei.

Cîmpia Înaltă. Este împărțită de văile celor trei Crișuri în trei subdiviziuni. La nord de Crișul Repede apare un fragment redus din glacisul inferior la înălțimea terasei de 8—10 m a Bărcăului — Cîmpia Bihariei. Între Crișul Repede și Crișul Negru, Cîmpia Miersigului este reprezentată prin cele patru glacisuri cu terenuri cultivate pe interfluvii ușor înclinate, acoperite de argiluvisoluri și cambisoluri. Între Crișul Negru și Crișul Alb, Cîmpia Călăcei are aceleași caracteristici. În

legătură cu amplasarea aşezărilor apare evident un aliniament la contactul Cîmpiei Joase cu Cîmpia Înaltă (Palota, Roit, Sînnicolau Român, Inand, Homorog, Berechiu, Moţiori, Cermei etc.) şi un altul la limita dintre Cîmpia Înaltă şi dealuri (Apateu, Şauaieiu, Sîti-telec, Husasău de Tinca, Olcea, Ucuriş, Craiva, Beliu etc.).

Profilul geoeconomic este dominant agrar, la cele mai multe localităţi terenurile agricole reprezentînd peste 90% din suprafaţă (Sîntandrei, Nojorid, Tulca, Cermei, Olcea, Craiva etc.). Frecvenţa terenurilor arabile are valori de la 70 — 80% în Cîmpia Cermeiului, pînă la 80 — 90% în Cîmpia Miersisigului şi nu apar deosebiri prea evidente între Cîmpia Joasă şi Cîmpia Înaltă. La contactul cu dealurile, frecvenţa coboară, local, spre 50%. Ca plante de cultură predomină grîul, orzul, porumbul şi trifoiul care deţin între 5 — 15% din terenurile arabile. Baza furajeră asigură o densitate a bovinelor de 35 — 45 de capete/100 ha de teren agricol, de 60 — 100 de capete/100 ha teren arabil la porcine, iar la ovine în jur de 100 de capete/100 ha. Complexul de creştere a fazanilor de la Păuşa şi fazaneria de la Gurbediu (jud. Bihor) pun în libertate, în fiecare an, un număr mare de exemplare. În întreaga cîmpie sînt de semnalat, în număr mare, căprioara de cîmp şi cerbul lopătar.

Cîmpia Joasă. Se întinde pe aproximativ 2/3 din Cîmpia Crişurilor. Supusă în foarte mare parte inundaţiilor şi stagnării apelor, nu cu multe decenii în urmă avea aspectul unei lunci imense. Pentru eliminarea efectelor inundaţiilor s-a procedat la îndiguirea cursurilor principale, dar în urma acestor lucrări s-a produs ridicarea nivelului pînzei freatice ceea ce a dus, pe alocuri, la apariţia fenomenului de sărăturare. Sistemul de diguri este însoţit de un sistem de canale de drenaj de mari proporţii: Canalul Colector, între Crişul Repede şi Crişul Negru, situat aproximativ la contactul dintre Cîmpia Joasă şi Cîmpia Înaltă, Canalul Cermei — Tăut, Canalul Morilor, situat pe stînga Crişului Alb, între Buteni şi Vârşand etc. Pe seama diferenţierii condiţiilor locale au fost separate şase diviziuni: *Cîmpia Santăului*, *Cîmpia Salontei*, *Cîmpia Crişului Negru*, *Cîmpia Teuzului*, *Cîmpia Crişului Alb* şi *Cîmpia Socodorului*. Aşezările sînt fixate pe porţiunile uşor înălţate ale cîmpiei iar gradul lor de sistematizare se accentuează de la nord la sud.

Două dintre oraşele cîmpiei (Salonta şi Chişineu Criş) sînt aşezate în plină cîmpie joasă, iar altul (Oradea) se află la intrarea în Culoarul Oradea — Borod.

Industria s-a dezvoltat în mod deosebit în oraşul Oradea, unde sînt prezente aproape toate ramurile industriale (energie electrică, metalurgie neferoasă, construcţii de maşini, chimie, materiale de construcţii, prelucrarea lemnului, industrie uşoară şi alimentară, industrie poligrafică), după care urmează Salonta şi Chişineu Criş, în ultimul funcţionînd mai cu seamă secţii ale unor întreprinderi din Arad.

Cu excepţia localităţilor Cefa, Inand, Salonta şi Tămaşda, unde suprafeţe însemnate sînt ocupate de heleşteieşi Chişineu Criş, Mişca, Şepreuş, Țipar şi Sîntea Mare, unde apar păduri mai întinse, la celelalte localităţi terenurile agricole deţin peste 90% din suprafaţă. Terenurile arabile ocupă suprafeţe destul de variabile, ajungînd de la peste 80% din terenul agricol în nordul cîmpiei, la 70 — 80% în partea centrală şi la 60 — 70% în partea de sud (Chişineu Criş, Zerind, Socodor, Grăniceri etc.). Păşunile sînt distribuite în raport invers cu terenurile arabile: în nord 1 — 10% din terenul agricol, în sectorul central creşte la 10 — 20%, iar în sud la 20 — 30%, ajungînd chiar la 30 — 40% la Mişca, Chişineu Criş, Grăniceri.

Suprafeţele cele mai întinse sînt cultivate cu grîu şi porumb, acesta din urmă ocupînd 30 — 40% din spaţiul cultivat. Pe suprafeţe restrînse este cultivat orezul mai ales la Pîlu, Zerind, Sîntea Mare, Chişineu Criş, Țipar etc. Producţia de sfeclă de zahăr este prelucrată la fabricile de la Oradea şi Arad. Floarea-soarelui se cultivă cu precădere în sudul cîmpiei (Pîlu, Socodor, Chişineu Criş, Sîntea Mare, Zărand, Chereluş etc.), iar cînepa pentru fuior numai în jumătatea nordică (prelucrată primar în unitatea de la Palota). Culturile de legume sînt extinse în cîteva areale situate pe Crişul Repede, avale de Oradea, în jurul Salontei, şi pe Crişul Alb. Plantele pentru nutreţ (în special trifoi) ocupă locul al treilea (după grîu şi porumb) între plantele cultivate.

Creşterea animalelor nu prezintă diferenţieri esenţiale în Cîmpia Joasă, faţă de ansamblul cîmpiei. Predomină bovinele din rasa Bălţată românească, care deţine aproape 90% din total şi porcinele din rasa Marele Alb. Aici funcţionează unităţi importante de îngrăşarea bovinelor şi a porcinelor şi pentru creşterea

vacilor de lapte. În sudul cîmpiei ovinele găsesc condiții dintre cele mai favorabile de creștere, unde ajung la peste 150 sau chiar peste 200 capete/100 ha de teren agricol.

Suprafața mlăștinoasă de altădată și canalele au înlesnit amenajarea unor întinse suprafețe piscicole la Cefa, Inand, Homorog, Tâmașda (în apropierea Canalului Colector), Seleuș (în vecinătatea Canalului Morilor), unde se obțin cantități importante de crap din rasele Galician, Lausitz și din cele fitoplanctonofage.

Cele patru orașe, în care se concentrează aproape întreaga producție industrială a Cîmpiei Crișurilor, prezintă diferențe mari ca număr de locuitori și mai ales ca funcții și complexitate a activității urbane. Dacă în nord, la contactul cîmpiei cu dealurile s-a dezvoltat un oraș mare — Oradea — cu influență dominantă pe o arie întinsă, în partea centrală și în sud sînt trei centre urbane mici, ale căror funcții se bazează în mare măsură pe activitatea agricolă.

Orașul Salonta. Situat la jumătatea distanței între limitele de nord și de sud ale Cîmpiei Crișurilor, este atestat documentar în anul 1332. În 1992 a ajuns la 20 943 de locuitori. O perioadă îndelungată orașul a avut funcție agricolă — comercială, care s-a modificat numai în ultimele trei decenii prin apariția unor unități pentru industria alimentară (care dețin aproape jumătate din producția industrială a orașului), industria construcțiilor de mașini (piese auto, rulote și produse metalice diverse) cu 18%, industria textilă cu 14% (țesături de in și cîneapă), pielărie, blănărie și încălțăminte, confecții și prelucrarea lemnului. Anul 1980 marchează la Salonta începuturile exploatarei petrolului și a gazelor asociate. Agricultură de tip intensiv se sprijină pe cultura cerealelor și a plantelor pentru nutreț (16%), pe cultura legumelor (3,5% din arabil) și a sfeclii de zahăr. Sînt întrunite condiții bune pentru creșterea animalelor.

Orașul Chișineu Criș. Devenit centru urban în anul 1968, s-a format prin unirea a două așezări vecine — Chișineu (menționat în 1202 — 1203) și Pădureni (atestat în 1394) — situate pe dreapta și, respectiv, pe stînga Crișului Alb, pe a căror vatră au fost descoperite vestigii dacice și daco-române.

Populația orașului, ocupată aproape în exclusivitate în agricultură pînă nu de mult, a crescut de la 5 235 locuitori în 1910, la 9 014 locuitori în 1992. Alături de activita-

tea agricolă este de menționat activitatea industrială recent apărută în ramurile construcțiilor de mașini (secție de subansamble a întreprinderii de strunguri din Arad) și alimentară (secții de industrializare a laptelui, și de prelucrare a legumelor).

Orașul Pincota. Situat în extremitatea sud-estică a Cîmpiei Crișurilor, la contactul dintre Dealurile Cigherului și cîmpie joasă din lungul Canalului Matca, este una din așezările care a căpătat statutul de localitate urbană recent (1968). În secolul XV era cunoscut ca așezare cu cetate, dezvoltată pe locul unei așezări dacice din secolele II — III. În ultimele două secole s-a afirmat ca centru meșteșugăresc și de schimb, iar în prezent ca centru industrial agrar cu o populație de 7 474 locuitori (1992). Activitatea industrială se bazează pe unități ale industriei de prelucrare a lemnului (o fabrică de mobilă curbată renumită), industrie alimentară și industria materialelor de construcție. De aici, de la Pincota începe să se desfășoare spre sud, pînă în Mureș, podgoria de sub marginea vestică a Munților Zarandului.

Municipiul Oradea. Reședință a județului Bihor, așezat pe Crișul Repede la ieșirea acestuia din Depresiunea Oradea — Borod, face parte din gruparea liniară Satu Mare — Timișoara, proprie Cîmpiei Banatului și Crișanei. Se întinde pe o suprafață de 111,50 km², din care 34,93 km² sînt ocupați de clădiri. În actualul teritoriu al municipiului au fost puse în evidență mai multe vetre de sate neolitice (5 600 — 1 900 în. Chr.), între acestea inserindu-se cele din stațiunea Salca (cultura Tisa), situată pe Pîrîul Pețea (Cartierul Seleuș). Continuitatea de locuire din perioada bronzului (1700 — 800 în. Chr. este demonstrată de numeroasele piese din bronz și de ceramica tracică (cultura de tip Otomani). În prima vîrstă a fierului (Hallstatt, 800 — 300 în. Chr.) populația era formată din dacii epocii arhaice, iar în secolele II în. Chr. — II d. Chr. dacii liberi trăiau în așezările de la Dealul Viilor și Salca, în această din urmă vatră continuîndu-se viețuirea populației dacice, daco-romane și apoi românești.

A doua jumătate a secolului XI corespunde cu pătrunderea feudalismului catolic central-european, cînd este adusă, pe actualul teritoriu al Oradei, populație maghiară. În mod treptat, viața economico-socială capătă

alte dimensiuni, în jurul așezării Salca avînd loc o concentrare de rezidență și apariția unor instituții medievale. Așezarea de pe Crișul Repede este menționată documentar la anul 1113 cu numele actual.

În evul mediu, ca urmare a poziției sale, Oradea devine un important centru economic și comercial, precum și cel mai vechi centru umanist din Transilvania. După 1529 trece în stăpînirea principilor din Transilvania, iar în 1660 este cucerită de otomani, devenind centru de pașalic, care durează numai 32 de ani (pînă la 1692), cînd orașul este ocupat de către austrieci. În perioada următoare se desfășoară cîteva evenimente importante, între care sînt de menționat: înființarea, în anul 1780, a unei facultăți de filosofie, în 1778 a unei facultăți de drept, apariția revistei „Familia”, în 1865 sub conducerea lui Iosif Vulcan, activitatea Consiliului Național Român (1918), care a pregătît unirea Transilvaniei cu România.

Populația orașului a crescut treptat în ultimul secol: 31 324 de locuitori în 1880, 47 018 de locuitori în 1910, 82 682 de locuitori în 1920 aproape 100 000 în 1956, 122 534 în anul 1966, 136 377 în 1970, 181 003 în 1980 și 220 848 în anul 1992. Creșterea populației s-a făcut, în cea mai mare măsură, pe seama sporului migratoriu, care a fost, de exemplu, de 31‰ în anul 1966, de 28‰ în 1975, de 32‰ în 1980 și de 12‰ în anul 1985, în timp ce sporul natural a înregistrat în ultimele două decenii, valori mai mici de 7‰. Cea mai mare parte din personalul muncitor lucrează în industrie și construcții — 58,4 %, apoi în sfera serviciilor — 38,2% (din care 10,7% în transporturi și comunicații, 10% în circulația mărfurilor, 5,3% în gospodărie comună și în alte prestări de servicii, 4,7% în învățămînt, cultură și artă, 4,4% în ocrotirea sănătății, asistență socială și cultură fizică etc.), iar în agricultură 3,4% (fig. 38B).

Activitatea economică a orașului s-a dezvoltat, la început, în direcția utilizării resurselor de materii prime din regiune de meșteșugarii organizați în bresle. Din a doua jumătate a secolului trecut apar primele fabrici de produse alimentare (morărit, bere, spirt etc.). În prima jumătate a secolului nostru apar alte unități industriale: construcții de mașini, produse chimice, materiale de construcții și mai ales produse ale industriei ușoare și alimentare, iar după 1950 are loc o dezvoltare industrială rapidă care a așezat Oradea în categoria orașelor cu funcție in-

dustrială complexă. Structura producției industriale, în anul 1985, se prezenta astfel: 7,4% energie electrică și termică, 23,8% construcții de mașini și prelucrarea metalelor, 5,1% metalurgie neferoasă, 10% industrie chimică, 3,4% materiale de construcții, 5,5% exploatarea și prelucrarea lemnului, 6% industria textilă, 8,3% confecții, 15,2% pielărie, blănărie și încălțăminte, 15,2% industrie alimentară, 0,7 poligrafie și 0,7% alte ramuri industriale. De aici rezultă că orașul Oradea este un centru important al industriei ușoare (29,5% din producția industrială totală), al construcțiilor de mașini, prelucrării metalelor și al industriei chimice, cele trei ramuri deținînd aproape 70% din valoarea producției industriale (fig. 38A).

Industria ușoară este reprezentată printr-o seamă de unități de primă mărime ale industriei textile (fabrica de confecții, fabrica de tricotaje, întreprinderea textilă „Crișana”, întreprinderea care produce articole de pasmanterie, la care se adaugă și unități cooperatiste de tricotaje și confecții) și ale industriei pielăriei, blănăriei și încălțămintei (trei fabrici de încălțăminte și două tăbăcării, fabrica de blănuri). De această ramură industrială aparține și fabrica de prelucrare a maselor plastice „Viitorul”.

Din domeniul industriei grele s-a dezvoltat în mod deosebit subramura construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor (23,8% din producția industrială a orașului), reprezentată prin întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de piese și subansamble pentru mijloace de transport, întreprinderea mecanică (produce diferite mașini agricole, inclusiv tractorul I.F. 650 E) și întreprinderea de produse metalice de uz casnic.

Industria alimentară este reprezentată prin unități importante de prelucrare a cărnii și a laptelui, a fructelor și legumelor, a semințelor de floarea-soarelui, a cerealelor (întreprinderea de morărit și panificație, fabrica de spirt, fabrica de bere și cea de zahăr).

Industria chimică deține o zecime din producția industrială și produce lacuri și vopsele, inclusiv pigmenți anorganici de precipitare, produse de sinteză organică, produse fitofarmaceutice etc.




Fig. 38. Municipiul Oradea. Zonele funcționale: 1, industriale; 2, de transport; 3, rezidențiale; 4, mixte (administrative, comerț, cultură, rezidență); 5, spații verzi; 6, limita orașului; 7, vii; 8, livezi; 9, teren arabil și cu alte utilizări. A, Structura industriei în 1985 (%): 1, energie electrică și termică; 2, metalurgie neferoasă; 3, construcții de mașini și prelucrarea metalelor; 4, chimică; 5, materiale de construcții; 6, exploatarea și prelucrarea lemnului; 7, textilă; 8, confecții; 9, pielărie, blănărie și încălțăminte; 10, alimentară; 11, poligrafie; 12, alte ramuri. B, Evoluția numărului de locuitori din municipiul Oradea în perioada 1880 — 1985.

Alături de unitățile industriale amintite mai sînt centrala electrică și de termoficare (205 MW), care funcționează pe bază de lignit, întreprinderea de alumina, întreprinderea de materiale de construcții, întreprinderea de prelucrare a lemnului (mobilă) etc. De dată recentă este intrarea în funcțiune a centralei electrice și de termoficare Oradea II (150 MW).

În arealul orașului, industria poate fi separată în mai multe zone industriale (fig. 38): *nord-vestică*, apărută în totalitate de la 1965 încoace (cu unități din domeniul energiei electrice, construcțiilor de mașini, aluminei, chimiei, materialelor de construcții, industriei lemnului etc.); *central-vestică* (construcții de mașini, chimie, încălțăminte etc.);




Fig. 39. Municipiul Oradea — vedere generală (foto Gr. Pop).

centrală (profilată în principal în domeniul industriei ușoare și alimentare) și *estică* (profil complex) (Gr. P. Pop, 1972). Municipiul Oradea dispune de o suprafață agricolă de 6 807 ha, din care 59,6% sînt terenuri arabile, 2,8% pășuni naturale, 5,7% finețe naturale, 3,7% vii și pepiniere viticole și 28,2% livezi și pepiniere pomicole, acestea din urmă plantate cu piersic, cais, cireș, vișin, păr etc., extinse mai ales în Dealurile Oradei. Fondul forestier deține numai 2,8% din suprafața totală a orașului.

Alături de culturile tradiționale de porumb, grâu, orz, sfeclă de zahăr etc., suprafețe întinse sînt destinate culturii legumelor (un devărat bazin legumicol pe cursul inferior al Crișului Repede). Alături de legumicultura în câmp deschis și sub adăposturi de polietilenă, pe teritoriul orașului Oradea s-a construit un important complex de sere legumicole, care ajunsese, în anul 1987, la o suprafață de 92 ha, încălzirea sereilor făcîndu-se în parte, cu apă geotermală dintr-o sursă apropiată.

În localitățile din imediata vecinătate a orașului sînt amplasate mari unități de creștere a animalelor: Palota pentru porcine, Sîntion pentru creșterea păsărilor, Biharia pentru vaci de lapte, etc., dar în cuprinsul orașului se crește un număr relativ redus de animale.

Orașul Oradea a fost supus și unor înnoiri deosebite din punct de vedere edilitar-gospodăresc, remarcîndu-se, în primul rînd, construcția de locuințe din cartierele de vest (Rogerius), Seleus, Cantemir și Ioșia, primul cu peste 65 000 de locuitori, precum și o seamă de edificii social-culturale (fig. 39). A fost dezvoltată, de asemenea, în mod deosebit, rețeaua de transport. În anul 1990 lungimea traseelor de tramvai era de 86 km (43,7 km linie simplă), iar a celor de autobuze de 277 km.

Paralel s-a dezvoltat și funcția comercială, prin mărirea și diversificarea numărului unităților de profil.

2.3.4. Cîmpia Banatului

2.3.4.1. Caracterele generale

Cîmpia Banatului, reprezentînd aproape jumătate din cîmpia vestică, se menține între 75 și 180 m altitudine absolută, are o ușoară înclinare generală de la est la vest, iar cele mai coborîte altitudini se află în ariile de subsidență.


În partea de est vine în contact cu Dealurile Banatului și numai la nord de Mureș direct cu Munții Zarandului. Limita cu aceste unități de relief este foarte sinuoasă deoarece cîmpia pătrunde adînc în cuprinsul dealurilor în lungul Begăi, Timișului, Pogănișului și Birzavei. Golful de cîmpie din lungul Timișului înaintază atît de mult spre est, încît face legătura cu Depresiunea Caransebeșului. Este o limită clar marcată morfologic de o denivelare care corespunde cu limita dintre depozitele cuaternare ale cîmpiei și cele panoniene din aria deluroasă sau formațiunile metamorfice și eruptive din Munții Zarandului (fig. 40). Spre vest limita este dată de

granița de stat cu Ungaria (între Sinmartin, în nord și Beba Veche, în sud) și Iugoslavia (între Beba Veche și sud de Lățunaș); spre Cîmpia Crișurilor urmează linia localităților Pincota, Caporal Alexa, Olari, Șimand, Sinmartin, care indică partea de nord a conului fosil al Mureșului.

Cîmpia Banatului are un fundament cutat, carpatic, reprezentat, la sud de Mureș, de extinderea spre vest a transilvanidelor sau unităților cu ofiolite (roci magmatice mezozoice) din sudul Munților Apuseni (M. Visarion, M. Săndulescu, 1979; M. Săndulescu, 1984). Limita sudică a transilvanidelor este marcată de o fractură majoră (falia Lucareț), pe care se află corpul de bazalte pliocene de la Lucareț, de origine subcrustală. Pe direcția acestei fracturi se dispun cîteva epicentre de cutremure normale (fig. 40).

La nord, în fundament se extinde cristalinul de Highia, care ia parte la alcătuirea pinzelor de Biharea, iar la sud de această zonă se află șisturi cristaline și roci sedimentare pretertiare, care formează „masivul”

Fig. 40. Schița tectonică a Dacidelor mediane în Banat și subsolul Depresiunii Panonice (după M. Visarion și M. Săndulescu, 1979). I, Transilvanide; II, Dacide interne (pinzele de Biharia); III, „masivul” serbo-macedonian; IV, pinzele supragetice (a, pinza de Bocșa; b, pinza de Ločva); V, pinza de Reșița—Sasca; VI, pinza getică; 1, banalite; 2, vulcanite neogene; 3, pinze de șariaj; 4, fracturi majore; 5, fracturi secundare; 6, compartiment; a, ridicat; b, căzut; 7, decroșări; 8, epicentre; 9, limita cîmpiei.



serbo-macedonian și pinzele supragetice (pinza de Bocșa și pinza de Locva). Sub depozitele neogene au fost puse în evidență arii cu intruziuni banatitice la Ivanda, Utvin, Bazoș și Gavojdia, diferite de cele extinse sub molasile neogene, care aflorează la Bocșa, Surduc și Gătaia.

În fundamentul Cîmpiei Banatului a fost depistat un sistem complex de fracturi, unele falii majore: Lugoș—Zarand, Buziaș—Arad Nădlac—Jimbolia cu orientare nord-vest—sud-est și falia Lucareț. Faliile Lugoș—Zarand și Buziaș—Arad delimitează un graben important, în care prima falie are o săritură în unele locuri, mai mare de 1 000 m. În ariile coborîte (Sinnicolau Mare—Jimbolia, Foeni și Livezile) depozitele neogene au grosimi mari, putînd ajunge la 2 000 m. Blocuri ridicate mai importante au fost puse în evidență în ariile Arad—Zădăreni—Turnu, Călacea—Satchinez, Liebling—Șoșdea, Bencecu de Sus—Recaș, sud Timișoara, Ivanda, Banloc și Teremia Mare—Cherestur, unde depozitele neogene au grosimi mai mici.

Depozitele de molasă neogene acoperă discordant formațiunile mai vechi și încep cu tortonianul, reprezentat prin nisipuri, pietrișuri, argile, calcare și gresii. Peste acestea se dispun nisipuri și nisipuri argiloase sarmațiene, nisipuri, nisipuri argiloase, pietrișuri, marne și argile pannoniene. Formațiunile caaternare, care acoperă în întregime Cîmpia Banatului, au caracter lacustru în bază și aluvio-proluvial în partea superioară.

Întreaga unitate se caracterizează printr-o mare mobilitate tectonică, manifestată tot timpul cuaternarului și în prezent. Mișcările de subsidență sînt puse în evidență de grosimea mare a depozitelor caaternare a căror stivă crește de la est la vest. Astfel, la est de meridianul Timișoarei, grosimea depozitelor caaternare (inclusiv villafranchiene) este sub 100 m, între Timișoara și Sinnicolau Mare ajunge la 400 m, iar la nord de Sinnicolau Mare la 500 m. Intensitatea lăsarilor subsidente pentru o bună parte din Cîmpia Aradului, întreaga cîmpie a Nădlacului, Arancăi și Jimboliei este mai mare de 1 mm/an, la vest de Sinnicolau Mare valorile ajungînd la peste 2,5 mm/an. Mișcările de subsidență se traduc în peisaj prin despletirea rîurilor, divagarea cursurilor de apă, existența unor suprafețe întinse mlaștinoase de lăcoviști și șesuri aluviale.

În Cîmpia Banatului au fost puse în evidență trei trepte de relief dispuse succesiv de

la est spre vest (V. Mihăilescu, 1966; P. Coteț, Cornelia Stăncescu-Grumăzescu, 1967; *Atlas. R. S. România*, planșa III—1, 1976). Astfel, în continuarea Dealurilor Banatului se află cîmpia piemontană înaltă, pleistocenă, formată din alternanțe de nisipuri cu pietrișuri de proveniență carpatică și argile loessoide, o cîmpie slab fragmentată radial în interfluvii largi, alcătuite din podurile teraselor mijlocii prin care se prelungesc, la o altitudine mai joasă, interfluviile din piemonturile colinare. La periferia cîmpiei piemontane înalte se desfășoară, sub forma unei fișii înguste, cîmpia piemontană joasă, nefragmentată, care face trecerea către ariile de subsidență. În lungul golfurilor de cîmpie care pătrund în dealuri se dezvoltă terasele inferioare ale Begăi, Timișului, Pogănișului și Birzavei.

Cea mai joasă treaptă din Cîmpia Banatului (de obicei sub 100 m) o constituie cîmpia aluvială holocenă de divagare (de subsidență) întrepătrunsă cu cîmpiile piemontane. Ea ocupă suprafețe întinse și se caracterizează prin lipsa teraselor, pantă foarte redusă, albiile meandrate și puțin adîncite, numeroase albiile părăsite, crovuri, suprafețe lacustre și mlaștinoase. În ultimele două secole s-au desfășurat acțiuni ample de desecare a mlaștinilor și de regularizare a albiilor rîurilor. Regimul climatic al Cîmpiei Banatului se află sub influența dominantă a maselor de aer vestice, dar aici se resimt și influențe de natură mediteraneană. Temperatura medie anuală este, în general, sub 11° C, iar precipitațiile medii anuale între 550 și 650 mm. Rețeaua hidrografică principală, formată de Mureș, Bega Veche (Beregsău), Bega, Timiș și Birzava, prezintă particularități dependente de cîmpia de subsidență pe care o străbat. Toate au pante foarte mici și prezintă frecvente meandrări, divagări și despletiri. Pe suprafața cîmpiei se găsesc numeroase cursuri părăsite, mlaștini și terenuri sărăturate. Intervențiile omului prin diguri, canale de desecare, de irigație și navigabile au corectat cursurile de apă și le-au legat între ele.

Solurile prezintă o mare varietate și formează un adevărat mozaic. În cîmpia piemontană predomină cernoziomurile vermice, cambice și argiloiluviale, solurile brune argiloiluviale, luvisolurile albice, vertisolurile și lăcoviștile. În cîmpia de subsidență sînt mai răspîndite cernoziomurile tipice carbonatice, cernoziomurile vermice, cernoziomurile gleizate și cambice, vertisolurile și lăcoviștile,

lăcoviștile și cernoziomurile gleizate și solurile gleizate emerse. Pe aceste soluri predomină terenurile arabile și pajiștile puternic modificate cu păiuș, fișcă, colilie sau bărboasă. În lungul râurilor mai mari se află pajiști de iarbă moale, coada vulpii, pir și asociații higrofile.

Cîmpia Banatului reprezintă o regiune permanent și intens populată, cu urme de locuire numeroase datînd din neolitic și epoca bronzului, mai ales în apropierea cursurilor de apă (Cicir, Păuliș, Giulvăz, Parța, Periam, Pecica). Existența mlaștinilor în cîmpia de divagare a făcut ca populația să se așeze, din timpurile preistorice, pe grinduri, insule și movile.

Odată cu trecerea la îndiguirea râurilor și desecarea mlaștinilor (începînd din secolul XVIII) numărul așezărilor a crescut vertiginos și în spațiile dintre riuri. Un rol însemnat asupra fenomenelor demografice l-au exercitat colonizările din secolele XVIII și XIX, îndeosebi cu populație de origine germană (A. Țintă, 1972).

najare a teritoriului, colonizările, căile de comunicație ș.a.

Așezările temporare (sălașele), frecvente altădată în mai multe sectoare ale cîmpiei (Șt. Manciulea, 1939), se limitează astăzi doar la sectorul vestic al Cîmpiei Aradului și la Cîmpia Nădlacului.

Populația actuală a Cîmpiei Banatului se cifrează la aproape 1 milion locuitori (tabelul nr. 1), cele mai populate fiind cîmpiile Mureșului și Timișului (3/4 din total). În perioada 1966 — 1977 se constată pe ansamblu o creștere importantă a numărului de locuitori și o scădere a acestuia în mediul rural.

În privința densității populației se remarcă, în 1985, valori mai scăzute decît media pe țară (80 loc./km² față de 96 loc./km²), dar cu unele diferențieri pe unități geografice, introduse în special de prezența orașelor Timișoara și Arad în cîmpiile Timișului și Aradului.

Populația este grupată în 293 de așezări, dintre care 9 orașe, reprezentînd 54% din

Tabelul nr. 1

Populația din Cîmpia Banatului

Subunitatea	Populația (1977)	Creșterea demografică (1966 — 1977)		Așezări rurale (număr)		Nr. orașe
		Total	Mediul rural	Total	> 1000 loc.	
0	1	2	3	4	5	6
Cîmpia Mureșului	383 597	+47 625	— 412	68	55	5
— Cîmpia Aradului	260 002	+50 044	+4 540	29	23	2
— Cîmpia Jimboliei	56 746	+ 270	— 779	18	16	1
— Cîmpia Nădlacului	19 767	— 149	— 250	5	5	1
— Cîmpia Arancăi	47 082	— 2 540	—3 923	16	11	1
Cîmpia Timișului	379 316	+93 790	—1 316	66	40	1
— Cîmpia Timișoarei	345 925	+97 956	+2 846	38	29	1
— Cîmpia Ciacovei	33 391	— 4 162	—4 162	28	11	—
Cîmpia Lugojului	77 577	+6 445	—1 246	46	10	1
Cîmpia Vingăi	76 843	— 1 327	+1 327	48	31	—
Cîmpia Birzavei	63 832	— 1 620	—2 820	56	18	2
— Cîmpia Buziașului	16 345	— 12	— 861	14	4	1
— Cîmpia Tormacului	19 951	— 336	— 544	12	5	1
— Cîmpia Gătaiei	25 927	— 1 396	—1 396	26	8	—
— Cîmpia Moraviței	1 609	— 19	— 19	2	1	—
Cîmpia Banatului	981 165	+147 567	—4 467	284	154	9

Spre deosebire de alte unități geografice, Cîmpia Banatului se caracterizează printr-o repartitie a așezărilor relativ uniformă, generată de condițiile social-istorice specifice ale acestei arii, unde amprenta factorilor fizico-geografici este mai puțin evidentă, un loc important avîndu-l și măsurile de ame-

populația totală. Densitatea așezărilor este, în medie, de 2,5/100 km², cu unele diferențieri între unități (cîmpiile Vingăi și Gătaiei — circa 4 așezări/100 km², iar Cîmpia Nădlacului 1,5 așezări/100 km²).

Nota dominantă a așezărilor rurale din Cîmpia Banatului este dată de mărimea

medie ridicată (1 572 locuitori), de tipul adunat și compact al acestora, forma poligonală regulată, precum și de geometria tramei stradale.

Caracteristica principală a componentelor demografice o constituie natalitatea foarte scăzută, din care cauză sporul natural este negativ în numeroase localități rurale (vestul Cîmpiei Aranca, Cîmpia Ciacovei, alte arii dispersate din toată Cîmpia Banatului). În același timp, sporul migratoriu este favorabil majorității centrelor urbane (îndeosebi orașelor Timișoara, Arad și Lugoj) și, în general, deficitar pentru cele mai multe localități rurale.

Cîmpia Banatului se individualizează ca o unitate intens populată, cu profil economic complex și un înalt grad de modernizare și urbanizare a așezărilor. Subsolul acestei cîmpii conține acumulări de țiței și gaze naturale, acestea reprezentînd una din cele mai recente arii petrolifere puse în valoare (fig. 41). Cu un aport de circa 10% în producția




Fig. 41. Cîmpia Banatului. Resursele subsolului: 1, țiței; 2, gaze naturale; 3, ape termale; 4, dioxid de carbon. 5, Căi ferate.

națională de țiței și cu circa 3% în cea de gaze a devenit o regiune de mare importanță energetică (I. Ianoș, O. D. Simuț, 1983). Exploatarea actuală se axează pe trei arii distincte: centrală (Călacea, Satchinez, Șan-

dra, Variaș), vestică (Teremia Mare, Cheres-tur, Cheglevici) și nordică (Turnu, Pecica, Șeitin, Nădlac). Cîmpia Banatului posedă și un ridicat potențial geotermic, concretizat prin valoarea gradientului geotermic de $5.55^{\circ}\text{C}/\text{m} \cdot 10^{-2}$. Apele geotermale sînt utilizate în agricultură (încălzitul serelor — Curtici, Dorobanți, Arad, Tomnatic, Sinnicolau Mare, Lovrin și complexelor zootehnice — Macea, Beregsău Mare), la încălzirea locuințelor (Timișoara, Curtici, Lovrin, Sinnicolau Mare), în industrie (topitoriile de cîneșă Iratoș și Sinnicolau Mare, întreprinderea de produse ceramice Jimbolia) și în balneoterapie (Arad, Călacea, Lovrin, Timișoara etc.). Totodată, în Cîmpia Banatului s-au identificat 15 areale, cu importante rezerve de CO_2 , dintre care arealul Jimbolia se detașează prin volum, puritate și presiune (O. D. Simuț, 1986).

Pe un fond pedoclimatic favorabil, utilizarea terenurilor este dominată de culturile agricole. Suprafața agricolă deține 85% din cea totală, iar cea arabilă 90% din aceasta. Profilul de ansamblu al cîmpiei este cerealiere (cerealele ocupă 67,5% din terenurile arabile), însă un loc important revine plantelor pentru industrializare (15%), plantelor pentru nutreț (9%) și legumelor (6%).

Baza furajeră (îndeosebi plantele de nutreț și culturile cerealiere cu această destinație) și creșterea permanentă a cererii urbane au constituit factori determinanți în dezvoltarea zootehnicii. Structura șeptelului este echilibrată, cu o pondere evidentă în favoarea porcinelor. Densitatea porcinelor depășește 100 capete/ha teren arabil, individualizîndu-se patru arii cu densitate mare: Sinandrei — Variaș — Lovrin — Beregsău Mare, Vinga — Secusigiu — Arad, Macea — Semlac, Bîrda — Gătaia — Voiteni.

Producția agricolă vegetală și cea animală au stimulat apariția unor centre industriale sau consolidarea unor ramuri producătoare de bunuri de larg consum (textilă, pielărie și încălțămînt, alimentară). În general centrele mici sînt dominate de astfel de ramuri industriale (Pecica, Nădlac, Grabaț, Periam, Ciacova, Recaș ș.a.), iar cele mari și-au diversificat baza economică. În producția industrială a Cîmpiei Banatului se impun centrele Timișoara și Arad, unele din cele mai importante ale țării, cu un profil complex, ușor dominat de industria constructoare de mașini.

O caracteristică de bază a procesului de industrializare în Cîmpia Banatului o con-

stituie tendința de descentralizare a marilor centre și dezvoltarea unor așezări rurale sau urbane cu un excedent de forță de muncă. În acest sens sint edificatoare secțiile unor întreprinderi înființate în localitățile Lovrin, Jebel, Recaş, Sintana, Buzias, Gătaia, Teremia Mare etc.

Rețeaua de căi de comunicație este complexă (feroviară, rutieră, fluvială, aeriană), în această unitate geografică înregistrându-se cea mai ridicată densitate a căilor ferate din țară (peste 90 km/1 000 km²) și prima arteră fluvială internă navigabilă (Bega). În distribuția rețelelor feroviare și rutiere se impun cele două centre de convergență reprezentate de orașele Arad și Timișoara.

Modul diferit de îmbinare a elementelor morfohidrografice, de adaptare a activității umane și de utilizare a spațiului în diferite părți ale Cîmpiei Banatului au permis delimitarea și individualizarea a cinci subdiviziuni: Cîmpia Mureșului, Cîmpia Vingăi, Cîmpia Lugojului, Cîmpia Timișului și Cîmpia Birzavei (fig. 42).




Fig. 42. Cîmpia Banatului. Unitățile de relief: a, Cîmpia piemontană; b, cîmpie tabulară de loess; c, cîmpie joasă de divagare.

2.3.4.2. Cîmpia Mureșului

Se desfășoară la nord și la sud de Mureș, începînd de sub versantul vestic al Munților Zarandului, respectiv în continuarea Cîmpiei Vingăi de la linia localităților Satchinez,

Cărpiniș și Checea. În ansamblu prezintă două sectoare mai înalte, reprezentate prin fișia de sub Munții Zarandului și prin Cîmpia Nădlacului, iar în cea mai mare parte este o cîmpie de divagare unde pot fi recunoscute conul de dejecție și fostele meandre ale Mureșului, precum și cele două cursuri principale părăsite, Săraz și Aranca. Ea se menține la aproape 120 m înălțime în nord-est și scade treptat pînă la 80 m, în sud-vest.

La nivelul întregii unități geografice este evidentă apartenența așezărilor la două subsisteme: unul centrat pe orașul Timișoara, iar altul pe orașul Arad, de unde și orientarea generală a fluxurilor de materii prime, produse agricole, populație, energie și informații (fig. 43). După condițiile geografice concrete, în Cîmpia Mureșului se individualizează patru subunități: Cîmpia Aradului, Cîmpia Nădlacului, Cîmpia Arancei și Cîmpia Jimboliei (fig. 42).

Cîmpia Aradului. Această subunitate geografică este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în continuarea Cîmpiei Crișurilor la sud de linia localităților Pincota, Caporal Alexa, Olari, Șimand și Sinmartin pînă în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest cu puțin peste 100 m. La poala Munților Zarandului se distinge o fișie de cîmpie piemontană care nu ajunge pînă la Mureș și care trece treptat într-o fișie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de cîmpie de divagare vizibilă la Curtici.

Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului, Cîmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile. La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile localității Curtici, nisipuri coliene cu un relief de dune fixate. În cuprinsul cîmpiei de divagare sint frecvente albiile și meandre părăsite, grinduri, lăcoviști și sărături.

Mureșul are o pantă redusă (0,22 — 0,39 m/km), fapt ce duce la meandrări puternice și despletiri. Pentru prevenirea inundațiilor Mureșul a fost îndiguit. Ierul, un fost curs al Mureșului amenajat, se află la limita de vest a cîmpiei. Dintre apele temporare se remarcă Matea, Valea Seacă, Valea Sinlean și Mureșul Mort care reprezintă vechi albiile ale Mureșului, parte dintre ele avînd cursul regularizat. La rețeaua hidrografică se adaugă numeroase canale de desecare și irigații (cel mai mare este canalul Militarul), care au

duș la schimbarea radicală a peisajului și creșterea producției agricole.

Cîmpia Aradului se remarcă printr-o densitate ridicată a populației (peste 110 loc./km²), determinată în primul rînd de existența orașului Arad (fără acesta densitatea popu-

lașări „tampon”, unele integrate mediului urban.

Cîmpia Aradului înregistra în anul 1977 peste 260 000 de locuitori, din care aproape 70% locuiau în mediul urban (orașele Arad și Curtici), iar restul se grupa în 29 de așe-




Fig. 43. Sistemul de așezări din Cîmpia Banatului. Ierarhizarea centrelor de polarizare. a, Limita subsistemelor principale; b, limita cîmpiei.

lației s-ar situa sub 50 loc./km²). În repartitia așezărilor se resimte influența unor elemente fizico-geografice, cum este contactul cu Munții Zarandului și mai ales a căilor de comunicație și a prezenței orașului Arad, în jurul căruia au apărut și s-au dezvoltat

zări rurale. În acestea din urmă numărul de locuitori prezintă variații foarte mari (de la peste 13 000, Sintana, pînă la sub 100, Bodrogu Vechi). Cîteva din așezările acestei unități geografice sînt dintre cele mai mari din țară (Sintana 12 133, Pecica 12 931), iar mărimea

medie a așezărilor rurale este de 2 700 de locuitori. Din totalul așezărilor doar 6 au sub 1 000 de locuitori, iar circa 42% au peste 2 000 (fig. 44).

Caracteristica demografică a așezărilor din Cîmpia Aradului o constituie tendința de

specific : una în jurul orașului Arad, profilată pe produse animaliere și legume, alta în estul cîmpiei, la contactul cu zona de munte, cu o pronunțată nuanță pomivitică, iar ultima (cuprinzînd celelalte teritorii) aparține culturilor de cîmp (cereale, plante teh-




Fig. 44. Cîmpia Mureșului. Mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Funcție industrială și de servicii; 2, agroindustrială; 3, agroindustrială și de servicii; 4, industrial-agricolă; 5, industrial-agricolă și de servicii; 6, complexă; 7, tendință de creștere; 8, descreștere; 9, stagnare; 10, limita cîmpiei; 11, limită de subunitate.

creștere a numărului de locuitori între ultimele două recensăminte. În mediul rural populația a sporit cu circa 4 850 de locuitori, iar pe ansamblu cu peste 50 000. Este relevant faptul că între anii 1966 și 1977 peste 65% din numărul așezărilor înregistrează creșteri (Livada, Sinleani 358⁰/₀₀; Vladimirescu 310⁰/₀₀; Șofronea 267⁰/₀₀; Sînbăteni 186⁰/₀₀), 4 localități stagnări (Miniș, Variașu Mare, Variașu Mic și Covăsint), iar 6 au marcat scăderi ale populației (Bodrogu Vechi 820⁰/₀₀, Pecica 62⁰/₀₀, Sînpaul 93⁰/₀₀ ș.a.)

Pe teritoriul Cîmpiei Aradului se pot individualiza, după structura producției agricole și a terenurilor, trei arii cu un anumit

specific — sfecla de zahăr, cinepă, soia, floarea soarelui) și creșterii animalelor.

Cultura legumelor reprezintă o particularitate a Cîmpiei Aradului, deținînd, pe ansamblu, după cereale, suprafețele cele mai mari (peste 5 500 ha). Printre centrele legumicole se impun localitățile : Arad (1 900 ha), Vladimirescu (900 ha), Curtici (600 ha), Sintana (500 ha), Macea (400 ha). Pondere ridicată dețin și culturile protejate de legume, șere existînd la Arad, Sintana, Macea, Curtici, Pecica, Dorobanți.

Creșterea intensivă a animalelor în complexe industriale reprezintă o altă caracteristică a economiei agricole. Acestea se concentrează

în jurul oraşului Arad (Ceala, Sintana, Gai ş.a.) şi în localităţile Pecica (bovine şi păsări), Sintana (bovine), Macea (porcine), Şiria (porcine), Vladimirescu (păsări) ş.a. Efectivele de bovine se cifrează la peste 50 000 de capete, cele de porcine la aproape 200 000 de capete, iar păsările la aproape 500 000 de capete. Concentrarea cu precădere a acestora în partea central-vestică a cîmpiei a determinat modificări în structura cerealelor, caracterizată prin dominanţa culturilor de porumb (suprafaţă de peste 2,5 ori mai mare în comparaţie cu a grîului). Tot în această zonă se observă extinderea culturilor de sfeclă de zahăr şi soia.

În zona de contact a cîmpiei cu Munţii Zarandului culturile de viţă de vie ocupă peste 2 000 ha, fiind concentrate în comunele Şiria, Covăsinţ, Ghioroc şi Păuliş. Livezile în masiv deţin suprafeţe reduse, fiind orientate în special spre producţia de piaţă (piersicii, cireşii, merii): Păuliş, Vladimirescu, Curtici, Pecica.

Activităţile industriale sînt concentrate în oraşul Arad (unde sînt reprezentate aproape toate ramurile), celelalte centre avînd o pondere scăzută în producţia industrială a cîmpiei. Se detaşează însă localitatea Vladimirescu, prin combinatul chimic recent construit, precum şi alte aşezări ca Sintana (construcţii de maşini, materiale de construcţie), Pecica (prelucrarea lemnului, construcţii metalice, alimentară), Ghioroc (balastieră) ş.a.

Oraşul Curtici, devenit centru urban în 1968, se află în zona periurbană a oraşului Arad. Se caracterizează prin funcţiile de servicii şi agricolă. Evoluţia populaţiei pe mari perioade de timp este constant pozitivă, dar lentă (în 1910 avea 6 733 de locuitori; în 1930—8 199; în 1966—8 452; iar în 1977—8 763 locuitori). Tendinţa actuală este însă de descreştere a numărului de locuitori, întrucît sporul natural şi cel migratoriu au devenit negative. Împreună cu localitatea componentă Dorobanţi, oraşul înregistra în anul 1992 10 002 de locuitori.

Structura populaţiei ocupate relevă ponderea celor ocupaţi în transporturi şi circulaţia mărfurilor (peste 1 400 de persoane), dată fiind funcţia sa de tranzit internaţional pe calea ferată. Circa 1/3 din populaţia activă a oraşului se deplasează zilnic în oraşul Arad.

Dezvoltarea tuturor localităţilor din Cîmpia Aradului, precum şi a altora din alte unităţi geografice vecine este strîns legată

de capacitatea de polarizare a oraşului Arad.

Oraşul Arad. Menţionat documentar ca atare în 1135, este amintit ca aşezare în cronică lui Anonymus (900) ca singurul loc de trecere peste Mureş între ducatul lui Menumorut şi ducatul lui Glad. În evul mediu s-a dezvoltat atît ca loc de trecere peste Mureş, cît mai ales ca centru de schimb. Dezvoltarea sa a fost, însă, permanent limitată de inundaţiile Mureşului şi de existenţa în jur a terenurilor inundabile şi mlăştinoase, care au necesitat îndiguirea cursului principal şi drenarea apelor superficiale.

În anul 1534 Aradul era un oraş cu 26 de porţi, iar după năvălirea tătarilor centrul s-a mutat în zona actualului cartier Drăgăşani. La funcţiile comercială şi agricolă i s-au adăugat altele de ordin politico-administrativ şi religios.

În timpul ocupaţiei habsburgice oraşul s-a dezvoltat rapid. În anul 1702 era menţionat ca centrul comerţului cu cereale şi vite pentru această regiune, format din trei părţi principale: centrul, în jurul vechii cetăţi de pămînt, Grădişte şi Schela sau Aradu Nou de astăzi. Această ultimă denumire reflectă funcţia sa portuară din secolul XVIII, cînd activitatea meşteşugărească şi breslele au cunoscut o înflorire deosebită. La jumătatea secolului XIX oraşul a devenit polinuclear, în jurul vechiului centru dezvoltîndu-se nucleele: Grădişte, Gai, Aradu Nou, Sinnicollau Mic şi Micălaca (fig. 45). Dintre acestea doar primele două erau subordonate administrativ oraşului, celelalte fiind localităţi de sine stătătoare.

În prima jumătate a secolului XX, prin dezvoltarea industrială şi creşterea spaţiilor de locuit, terenurile libere s-au restrîns şi s-a stabilit legătura teritorială şi fizionomică dintre toate cartierele. Înainte de cel de-al II-lea război mondial la nucleul oraşului s-a adăugat localitatea Micălaca. Cele două localităţi de la sud de Mureş — Sinnicollau Mic şi Aradu Nou — se unesc, pentru ca după 1950 să devină cartiere ale oraşului. Datorită evoluţiei din perioada postbelică, oraşul Arad s-a extins teritorial şi s-a structurat în 13 cartiere (9 la nord de Mureş, 4 la sud).


În anul 1814 Aradul avea 10 000 de locuitori, pentru ca în 1850 să ajungă la 22 398 de locuitori, devenind al doilea oraş din latura de vest a ţării, după Oradea.

La începutul secolului (1910) înregistra 63 166 de locuitori, dar în următoarele 4 decenii a crescut lent, ajungând în 1948 la 87 290 de locuitori. Ulterior se constată creșteri accelerate ale populației: 126 000 de locuitori în 1966, 171 193 în 1977, 190 088

binat de îngrășăminte chimice, amplasat în localitatea Vladimirescu.

Prin dezvoltarea întreprinderilor industriale, Aradul și-a triplat producția după anul 1970. Structura acesteia (excluzând combinatul de îngrășăminte chimice) relevă

Fig. 45. Municipiul Arad. Evoluția teritorială (stînga) 1, înainte de 1800; 2, 1800 — 1850; 3, 1850 — 1900; 4, 1900 — 1945; 5, după 1945. Zonele funcționale (dreapta): 1, industriale; A, centrală; B, de est; C, de sud; D, de vest; E, de nord-vest; 2, de transporturi; 3, rezidențiale; 4, mixtă (rezidențiale, comerciale politico-administrative); 5, spații verzi.



în 1992. Călea principală de creștere a populației din ultima perioadă a constituit-o sporul migratoriu, care a depășit anual 1 000 de persoane. Soldul natural este pozitiv, dar relativ redus, cu o medie multianuală de 250 de persoane. Structura populației pe ramuri de activitate arată preponderența celor ocupați în industrie (55%) și în servicii (33%).

Economia orașului Arad este dominată de activitățile industriale apărute în prima parte a secolului trecut și dezvoltate îndeosebi după anii 1848 — 1849. În anul 1857 funcționau trei fabrici de spirt, fabrici de bere, de ulei, de oțet, iar în 1860 s-a construit fabrica de țigări. Spre sfârșitul secolului au mai apărut tăbăcăria (1870), fabrica de chibrituri, de mobilă, uzina de vagoane (1891) și fabrica de încălțăminte (1889). La începutul secolului au apărut alte fabrici, ca: întreprinderea de armături metalice de astăzi, Uzinele textile, fabrica de tricotaje, fabrica de zahăr. Procesul de industrializare s-a concretizat în dezvoltarea întreprinderilor vechi și în diversificarea structurii industriale prin noi întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii și industrie alimentară 1946, „Strungul” 1948, „Arădeanca” 1949, fabrica de ceasuri 1956, întreprinderea de confecții 1959. În anul 1976 a intrat în funcțiune unul din marile com-

ponderea ridicată a industriei construcțiilor de mașini (47%), industriei alimentare (17,4%) și industriei textile (14,5%), completată cu industria confecțiilor (5,7%), prelucrării lemnului (5%), pielăriei și încălțăminte (2,4%).

Necesarul în forță de muncă al întreprinderilor industriale depășește disponibilul intern, fiind completat prin navetism. Spre exemplu, la unele întreprinderi proporția forței de muncă navetiste se apropie de 25% sau este chiar mai mare.

Profilul agricol este specific agriculturii preorășenești, cu dominanța legumelor și a creșterii intensive a animalelor în complexe industriale mari, cu o structură a șeptelului echilibrată. În activitățile agricole un loc distinct îl ocupă cele legate de culturile forțate, serele deținând o suprafață de circa 60 ha.

Poziția geografică a orașului Arad, la intersecția mai multor căi de comunicație, îi conferă un rol important în transporturi. Primele căi ferate au fost construite în a doua jumătate a secolului trecut: Arad — Deva (1868), Arad — Timișoara (1870), Arad —

Pincota — Ineu (1877), prelungită apoi la Sebiș în anul 1881. Din Arad pornesc astăzi linii de cale ferată în 8 direcții, iar șosele modernizate, în 9 direcții. Pe teritoriul său administrativ orașul dispune de 6 gări cu un trafic intens de mărfuri și călători. Transportul urban se face în proporție de 70% cu tramvaiul și numai 30% cu autobuzul. Liniile de tramvai au fost extinse cu încă 10 km, asigurând o conectare deplină a localității Vladimirescu la viața orașului.

Aradul continuă să fie și astăzi centrul comercial, de prim rang, al unei arii mari, întinsă de la sud de Mureș, pînă la nord de Crișul Alb și pînă în Țara Moților.

Activitățile social-culturale se limitează la a satisface necesitățile județului Arad, atît în domeniul învățămîntului (17 licee și 10 școli profesionale, o facultate), cît și în al artei, culturii și sănătății.

Activitatea turistică și de recreere se bazează pe punerea în valoare a cadrului natural, a obiectivelor de artă și arhitectonice, a poziției de tranzit a orașului. Dintre clădirile arhitectonice de interes turistic se remarcă: Palatul culturii (1913), Cetatea (1783, în sistem Vauban), Monumentul Sfîntul Ioan Nepomuk (1729), capela Sf. Florian (1753), Catedrala Sfîntul Ioan (1865), Teatrul Mare (1874) ș.a. Ca locuri de agrement sînt recunoscute: insula Trinității, „Faleza” Mureșului, parcul orașului.

După activitatea dominantă, spațiul urban se diferențiază în mai multe zone funcționale (fig. 45). Cele mai extinse sînt *zonele rezidențiale*, care cuprind în întregime cartierele Mureșel și Subcetate, apoi cea mai mare parte a cartierelor Drăgășani, Segă, Poltura, Grădiște și Centru, suprafețe mai reduse din alte cartiere (Micălaca, Pirneava, Aradu Nou, Bujac). Zonele rezidențiale sînt într-o continuă transformare datorită creșterii demografice, și dezvoltării economice a orașului (fig. 46). Astfel, s-au conturat noi evartale de locuințe în ariile Aurel Vlaicu, Banul Măracine, Faleza Sud etc.

Zonele industriale dețin, de asemenea, o parte însemnată din suprafața intravilanului. Se deosebesc cinci zone bine individualizate, mai importante fiind cele din nord și nord-vest. Zona industrială de nord are un profil complex, dar cu o dominanță a industriei constructoare de mașini (Strungul, Vagonul etc. Aici sînt incluse, de asemenea, Combinatul de prelucrare a lemnului și Uzinele Textile Arad. Zona in-

dustrială de nord-vest este axată pe industria alimentară (fabrica de zahăr, fabrica de spirt și drojdie, fabrica de piine, fabrica de bere, abatorul). Celelalte sînt mai mici și plasate în sudul (fabrica de praf de onă, Plafar), în vestul (Arădeanca, secția de fermoare, întreprinderea de construcții montaș) și în estul orașului (întreprinderea de prefabricate, alte unități economice).

Zona de transport se constituie în partea central-nordică și cuprinde Gara CFR, Triajul, Gara Electrică Arad — Podgoria și Autogara.

Zona comercială este conturată în centrul orașului, maxima concentrare fiind în ariile Piața Avram Iancu — Bulevardul Republicii și străzile adiacente, Piața Veche, Piața Sirbească. A doua arie comercială de dimensiuni mai reduse s-a conturat în Aradul Nou.

Zona administrativ-culturală este cuprinsă între Bulevardul Republicii și Splaiul Mureșului cuprinzînd: teatrul, Palatul culturii, licee, tribunalul, cinematografe, cluburi.

Prin activitățile economice și prin funcțiile sale, orașul Arad se conturează ca un punct nodal în relațiile demografice și economice ale regiunii. Astfel, pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, zilnic atrage peste 11 000 persoane. Cei mai mulți navetiști sosesc din localitățile Sîntana (1 800), Curtici (1 300), Vladimirescu (900), Felnac (730), Pecica (620), Macea (600). Totodată, aprovizionarea pieței urbane cu legume și cartofi se face în afara producției proprii din localitățile: Vladimirescu, Pecica, Curtici, Sîntana, iar cu struguri din podgoria Pincota—Siria.

Cîmpia Nădlacului. Limitată de Ier, Mureșul Mort, Mureș și granița de vest, este o cîmpie tabulară de acumulare fluvio-lacustră, nefragmentată, aflată la înălțimea de 90 — 100 m și acoperită în întregime cu loess și depozite loessoide. Pe depozitele de loess s-au format crovuri, în care se dezvoltă o vegetație sărăcăcioasă din cauza stagnării apei din precipitații. În Cîmpia Nădlacului sînt 6 așezări (5 sate și un oraș), totalizînd o populație de aproape 20 000 locuitori (42% în mediul rural). Toate așezările au peste 1 000 locuitori și manifestă, pe ansamblu, o tendință de scădere lentă. Aceste așezări se află sub influența directă a orașului Arad, rolul teritorial al centrului urban Nădlac resimțîndu-se numai asupra localităților Peregu Mare și Peregu Mic (fig. 44).

În Cîmpia Nădlacului predomină terenurile agricole, dar nu lipsesc pajiștile puternic




Fig. 46. Mureșul la Arad (foto V. Sencu).

modificate. Terenurile agricole se extind pe cernoziomuri tipice, care ocupă cele mai mari suprafețe, cernoziomuri vermice, cernoziomuri gleizate și soluri gleice în lunca Mureșului. Din acestea 96% sînt arabile. Griul și porumbul sînt în proporții aproximativ egale în jumătatea vestică a cîmpiei, iar în est predomină cultura porumbului. Dintre plantele tehnice, sfecla de zahăr este urmată în ordine de soia, cîneapă, floarea-soarelui și tutun. Legumele ocupă în medie peste 2 000 ha.

În ultimii ani aici au fost puse în evidență zăcămintele importante de hidrocarburi și ape geotermale. Hidrocarburi sînt exploatare spre marginile cîmpiei (Turnu, Pecica, Seitin, Nădlac), iar apele geotermale sînt folosite pe plan local în scopuri balneologice și pentru încălzit.

Orașul Nădlac (decretat oraș în anul 1968) a fost în vechi centru voievodal românesc în secolele X — XI. După o scădere a numărului de locuitori în prima jumătate a secolului, populația a crescut din nou cîrîndu-se în anul 1992 la 8 450 locuitori. Între ultimele două recensăminte creșterea a fost de 12%. Activitatea economică de bază o constituie agricultura (45% din personalul muncitor), profilată pe legume (1 600 ha) și creșterea animalelor (bovine și porcine). Industria este reprezentată de topitoria de cîneapă, secția de mobilă și alte unități aparținînd industriei meșteșugărești și alimentare.

Cîmpia Arancei. Se întinde la sud de Mureș, de o parte și de alta a vechiului curs Aranca pînă la o linie care unește localitățile Comloșu Mare, Lovrin, Secusigiu. În ansamblu este o cîmpie de divagare, cu arii mlăștinoase, brațe și meandre părăsite. Altitudinea se menține între 80 m, în vest și 90 m în est. Dacă în partea de răsărit este acoperită de loess și depozite loessoide pe care se dezvoltă numeroase crovuri, în partea de vest, în preajma localității Teremia Mare, se găsesc dune fixate.

Cîmpia Arancei este străbătută de vechile cursuri ale Mureșului — Aranca și Galața (Gînceșinu). Aranca, colectorul principal din cîmpie, cu o luncă largă de aproape 8 km, are o pantă de cîțiva cm/km. Din această cauză drenajul apelor este foarte redus și apar bălțiri. Acest fapt a fost înlăturat prin săparea de canale de legătură între Aranca și Mureș, care au ca scop evacuarea apelor în

exces, dar și irigarea cîmpiei în perioadele de secetă.

Zăcămintele de hidrocarburi exploatare sînt concentrate în partea de vest a cîmpiei, în raza localităților Teremia Mare — Vălceni, Cheglevici și Cherestur, iar apele geotermale sînt utilizate pe plan local la Sinnicolau Mare (sere, topitoria de cîneapă), Teremia Mare și Tomnatic.

În structura terenurilor agricole predomină cele arabile (85%), a căror pondere a crescut și va crește, în continuare, ca urmare a mutațiilor intervenite prin lucrările de îmbunătățiri funciare. Deși au fost efectuate lucrări de drenaj și de plantarea terenurilor nisipoase cu viță de vie, pajistile ocupă, totuși, aproape 6 000 ha. Circa 3/4 din această suprafață revine comunelor Dudeștii Vechi, Sînpetru Mare și orașului Sinnicolau Mare, care posedă o structură a șeptelului dominată de ovine. Terenurile ocupate cu viță de vie din regiunea Teremia Mare însumează 1 200 ha și sînt în extindere spre Comloșu Mare și Teremia Mică. De asemenea, în sectorul Periam — Sinnicolau Mare, s-au plantat livezi intensive (circa 1 000 ha), în care predomină piersicul și mărul.

Printre culturile de cîmp, alături de cereale și unele plante tehnice se distinge cultura legumelor din aria Tomnatic (unde s-a construit o fabrică de conserve) — Sinnicolau Mare — Periam. De menționat suprafețele mari ocupate cu cîneapă (2 500 ha), ce este prelucrată la Sinnicolau Mare.

Rețeaua de localități prezintă o densitate redusă (sub 2,5 așezări/100 km²) și se caracterizează prin existența unor așezări mari (Dudeștii Vechi, Cenad, Periam, toate cu peste 5 000 locuitori) care polarizează altele, de regulă mai mici. Este evidentă tendința generală a localităților rurale de scădere a numărului de locuitori atît prin sporul natural negativ, cît și prin cel migratoriu. Pentru a evidenția declinul demografic al unor așezări este tipică localitatea Vălceni, care la începutul secolului avea 5 000 locuitori, iar la recensămîntul din 1977 a înregistrat doar 1 731 (fig. 44).

Orașul Sinnicolau Mare are o poziție centrală în Cîmpia Arancei, impunîndu-se în rețeaua locală de așezări, ca un centru de coordonare teritorială și de convergență a principalelor fluxuri demografice și economice.

Menționată documentar în secolul XIV, localitatea a cunoscut o dezvoltare economică și demografică deosebită, începînd cu secolul

XX, dar cu precădere în ultimii 25 de ani. În anul 1977 orașul avea 1 281 locuitori, cu 1 383 mai mulți decât în anul 1966, iar în 1992 are 13 052 de locuitori,

Structura personalului muncitor relevă ponderea ridicată a celui ocupat în industrie (50%) și în sectorul terțiar (30%). În ultimii ani media numărului de navetiști a fost foarte ridicată (2 200 din 7 500, totalul personalului muncitor). În acest interval au intrat în funcțiune întreprinderi de diferite profiluri: Electrometal (construcții de mașini), Filatura și Țesătoria de cîneapă, Fabrica de ciorapi, Fabrica de lapte praf, Fabrica de nutrețuri combinate.

Prin aceste întreprinderi orașul și-a individualizat o zonă industrială în nord, cuprinzînd cele mai mari unități, și alta în sud (fabrica de produse lactate, fabrica de produse ceramice, serele).

Dintre localitățile rurale în stadii avansate de modernizare și urbanizare se află localitățile Periam (centru industrial de importanță mare — fabrica de pălării, abatorul, fabrica de gheață) și Teremia Mare (centru de vinificație, secție de construcții de mașini) cu rol însemnat în atenuarea procesului de depopulare locală.

Cîmpia Jimboliei. Situată la 90 m altitudinea absolută, face trecerea dintre Cîmpia Mureșului și Cîmpia Timișului (întinzîndu-se pînă la linia localităților Checea, Cărpiniș, Satchinez), dar apare și ca o continuare vestică a Cîmpiei Vingăi. Este o cîmpie tabulară de loess, nefragmentată, cu suprafața afectată de cîrovuri rare (T. Morariu, 1946), puțin adînci, cele mai multe alunghite pe 1 — 8 km; în ele stagnează zăpada și apa de ploaie, iar vegetația este sărăcăcioasă. La acestea se adaugă excavațiile de origine antropică (pentru scoaterea argilei necesară fabricării cărămizilor), unele devenite cuvete lacustre prin ridicarea nivelului freatic. Monotonia cîmpiei mai este întreruptă de relieful de dune de la Biled — Satchinez. Tot la Satchinez există o mlaștină declarată rezervă naturală ornitologică pe o suprafață de 40 ha. Sînt ocrotite numeroase păsări care cuibăresc aici: egreta mică (*Egretta garzetta*), țigănușul (*Plegadis fabinalus*), stîrcul roșu (*Ardea purpurea*), stîrcul de noapte (*Nycticorax nycticorax*), stîrcul galben (*Ardeola rallioides*) și lopătarul (*Platalea leucorodia*).

Fondul pedoclimatic foarte favorabil face ca din suprafața agricolă 95 — 97% să fie terenuri arabile cultivate cu cereale, între care primul loc îl deține porumbul (excepție face arealul Lovrin, unde porumbul și griul ocupă suprafețe egale). Soia și sfecla de zahăr se detașează printre culturile tehnice, iar legumele se concentrează în jurul localităților Lovrin, Tomnatic și Jimbolia. Creșterea bovinelor (Lenauheim, Biled, Lovrin și Cărpiniș) și porcinelor (Grabăț, Jimbolia, Biled și Cărpiniș) s-a dezvoltat în strînsă legătură cu potențialul de consum al orașului Timișoara și cu baza furajeră complexă existentă.

În jurul localității Lovrin se individualizează unul dintre cele mai importante areale pomi-viticole din Cîmpia Banatului, profilat pe struguri de masă (150 ha) și pe cultura piersicilor și cașilor (350 ha).

Producția agricolă relativ diversificată a stat la baza dezvoltării unor ramuri industriale specifice: industrializarea și prelucrarea cărnii (Grabăț), a laptelui (Lenauheim), prelucrarea primară a cînepii (Jimbolia, Biled), industrializarea legumelor (Tomnatic). Cel mai important centru industrial dintre așezările rurale este Lovrin (nod feroviar, în același timp), unde funcționează, alături de alte unități mai mici, o secție de motoare electrice aparținînd uzinei Electromotor.

Resursele geotermice sînt valorificate la Jimbolia (la fabrica de produse ceramice), Lovrin (pentru încălzit, sere și balneologie), Iecea și Lenauheim, iar la Șandra sînt exploatate hidrocarburi.

Populația Cîmpiei Jimboliei este de circa 57 000 de locuitori, iar localitățile, în proporție de 72%, au peste 2 000 de locuitori. Dezvoltarea localităților s-a axat pe o rețea densă de căi ferate, doar 22% (4 sate) nu au acces direct la acestea. Excluzînd orașul Jimbolia, tendința demografică actuală este de scădere rapidă a populației. Doar trei localități, Cărpiniș, Lovrin și Șandra, au marcat o creștere a populației. În nordul cîmpiei rolul de centru de polarizare revine localității Lovrin, iar în sud acesta este îndeplinit de orașul Jimbolia.

Orașul Jimbolia, menționat documentar în anul 1332, a cunoscut o puternică dezvoltare după intrarea în funcțiune a căii ferate Jimbolia — Timișoara (1857). La sfîrșitul secolului trecut, cînd s-a înființat fabrica

de țiglă și cărămidă, devenită cu renume în toată țara, era al treilea centru urban al Banatului cu aproape 11 000 de locuitori. În 1992 cu localitățile componente are 11 829 de locuitori, iar în structura profesională a populației se impune cea ocupată în industrie 65%, ceea ce arată că Jimbolia este un oraș cu funcție industrială dominantă. Dinamica activităților industriale pe subramuri evidențiază o creștere față de anul 1970 de 6 ori a industriei chimice și de 3 ori a pielăriei și încălțămintei, urmate apoi de industria alimentară, prelucrării lemnului, textilă.

În structura sa funcțională se disting două zone, situate de o parte și alta a căii ferate, în nordul orașului. Astfel, zona din partea de nord-vest este profilată pe materiale de construcții și alte ramuri, iar cea din nord-est este mai complexă (întreprinderea de nasturi, întreprinderea de încălțăminte, topitoria de cîneapă etc.).

2.3.4.3. Cîmpia Vingăi

Apare ca o continuare a Podișului Lipovei situată între 170 și 180 m în est și nord-est și 100 și 110 m (altitudine absolută) spre cîmpia joasă. Este o cîmpie piemontană tipică, a cărei cumpănă de ape se află aproape de Mureș, ceea ce arată o desfășurare asimetrică. Unele văi sînt foarte largi și au fost considerate ca vechi cursuri ale Mureșului (P. Coteț, Cornelia Stăncescu-Grumăzescu, 1967). Văile din partea sudică sînt adîncite puternic și radiar, cu orientare spre zona de subsidență a Timișului. Ele au fragmentat cîmpia în interfluvii mai largi sau mai înguste, fără a crea impedimente pentru mecanizarea lucrărilor agricole. În latura nordică se pun în evidență terasele largi ale Mureșului.

Cîmpia Vingăi este acoperită cu nisipuri și pietrișuri fluviale, în partea de est și depozite loessoide în vest, care au influențat natura solurilor și a vegetației.

Rețeaua de localități, alcătuită din 48 de așezări, totalizează aproape 77 000 de locuitori. De notat predominanța așezărilor mari la periferie (Giarmata, Sinandrei, Satchinez, Variaș, Secusigiu, Fintinele, Zăbrani — toate peste 2 500 de locuitori) și de-a lungul axei duble de comunicație dintre Timișoara și Arad (Orțișoara, Vinga, Șagu). În general, mai mult de 1/4 din numărul așezărilor depășește 2 000 de locuitori, iar 34%

au între 1 000 și 2 000 de locuitori. Este singura subunitate din Cîmpia Banatului, în exclusivitate rurală, care, în perioada 1966 — 1977, a înregistrat o creștere (5‰) a numărului de locuitori (fig. 47).

Această particularitate se datorește localităților din apropierea orașelor Timișoara și Arad, care totalizează 91% din volumul creșterilor de populație. Cele mai mari sporuri dețin localitățile: Călugăreni, 543‰, Dumbrăvița 375‰, Fintinele 333‰, Sinandrei și Zădăreni 130‰, iar scăderile cele mai accentuate satele: Sălcuța Nouă — 683‰, Alioș — 144‰, Firiteaz — 136‰, Mailat și Mănăștur — 90‰.

În Cîmpia Vingăi predomină terenurile agricole, care includ și pajiști puternic modificate cu păiușuri și fișcă pe interfluvii și cu iarbă moale, coada vulpii și pir în văile largi. Culturile se practică pe cernoziomuri argiloiluviale, soluri brune argiloiluviale, predominant molice și soluri brune argiloiluviale care predomină în estul cîmpiei. În partea de vest se află cernoziomuri cambice, cernoziomuri vermică, iar pe văile mari se găsesc și lăcoviști cu soluri humico-gleice neprielnice agriculturii.

În funcție de altitudinea cîmpiei și răspîndirea solurilor agricultura cunoaște diferențieri. Astfel, pe treapta mai înaltă din est predomină păioasele (grîul și orzul), care depășesc de două ori porumbul (ca suprafață); livezile și viile dețin suprafețe compacte și mult mai mari (Giarmata, Mașloc, Pișchia, Zăbrani), iar pășunile sînt relativ extinse. În treapta joasă raportul dintre suprafețele cultivate cu porumb și păioase se inversează și crește considerabil proporția culturilor tehnice (soia, sfecla de zahăr, floarea-soarelui și cîneapă). Această diferențiere este reflectată și în structura șeptelului: predomină bovinele și ovinele în treapta piemontană și porcinele în partea joasă a cîmpiei (Felnac, Vinga, Variaș, Sinandrei) (fig. 47).

Cîmpia Vingăi se individualizează ca cel mai productiv areal petrolifer și gazeifer din Cîmpia Banatului, prin zăcămintele exploatate în partea de sud-vest la Călacea, Satchinez și Variaș. Industria prelucrătoare valorifică pe plan local unele produse agricole (Felnac, Secusigiu, Mașloc, Vinga, Șagu) sau prepară furaje concentrate (Giarmata, unde se găsește un mare complex avicol).

astăzi (V. Mihăilescu, 1966) (fig. 48). Din cauza intensității acumulărilor de aluviuni în albi, patul de acumulare s-a înălțat, astfel că Timișul, Bega și Bega Veche curg în prezent deasupra nivelului cîmpiei dintre riuri. Pentru a se evita consecințele inunda-

navigabil (navigație sistematică, cu vase de 600 — 700 t) la începutul secolului XX.

Cu o populație de circa 335 000 de locuitori, Cîmpia Timișului prezintă un grad de urbanizare de aproape 71%, dar care este dat numai de orașul Timișoara, singurul centru




Fig. 48. Cîmpia Timișului. Fragment din aria de divagare de la sud de Timișoara. 1, Cursuri permanente; 2, cursuri părăsite; 3, albi seci; 4, belciuge; 5, mlaștini; 6, canale de desecare; 7, canale de irigații; 8, cursuri de apă îndiguite.

țiilor, cursurile au fost rectificate și îndiguite pe tot parcursul. S-a construit canalul navigabil Bega (care preia apele Begăi la Timișoara) și două canale de legătură cu Timișul, amonte de Timișoara (canalele Coștei — Chizătău și Topolovățu Mic — Hitias) pentru regularizarea debitelor de apă ale Begăi.

Peisajul geografic actual al Cîmpiei Timișului este rezultatul unor intense acțiuni antropice, în primul rînd de amenajare a cursurilor de apă. O notă distinctă este dată de canalizarea rîului Bega, care a devenit

urban din această unitate. Populația rurală se concentrează în 66 de așezări, mai dense și mai mari (65% peste 1 000 locuitori, iar 43% chiar peste 2 000) decît în celelalte diviziuni ale cîmpiei. În același timp acestea înregistrează creșteri de populație (unele foarte mari: Giarmata-Vii 840‰, Moșnița Nouă 440‰, Moșnița Veche 400‰, Ghironda 200‰). Este evident în acest caz rolul orașului Timișoara pentru evoluția demografică pozitivă a localităților situate în apropiere, cu posibilități lesnicioase de navetă. Ele îndeplinesc funcția de cazare a forțe

de muncă, intensitatea deplasărilor zilnice la unele aşezări depăşind cu mult 50% din totalul populaţiei active (Ghiroda, Giroc, Chişoda, Şag ş.a.). Totodată, utilizarea terenurilor din această subunitate geografică şi profilul agriculturii, în general, sînt structurate conform solicitărilor pieţei şi industriei urbane (legumicultură şi zootehnie). Dezvoltarea intensivă a legumiculturii creează posibilitatea utilizării integrale a forţei de muncă locale, inclusiv a navetiştilor, care sînt stimulaţi în realizarea unor venituri suplimentare. Această situaţie determină nu numai menţinerea populaţiei „pe loc”, dar şi o atracţie a populaţiei din aşezări rurale sau regiuni situate la distanţe mai mari.

În cîmpia de la sud de Timiş, agricultura este axată pe cultura cerealelor şi plantelor tehnice, mai puţin a celei de piaţă, pe seama căreia s-a dezvoltat creşterea porcinelor. Aici se cultivă orezul (Banloc, Partoş) şi au fost încercări de introducere în cultură a bumbacului.

Vitalitatea sistemului de aşezări din partea sudică a Cîmpiei Timişului este scăzută (numeroase aşezări nu dispun de acces la cale ferată sau şosele modernizate) şi numai dezvoltarea selectivă a unor localităţi ar determina o atenuare a forţei de atracţie a Timişoarei, care se soldează cu plecări definitive de populaţie. Singura localitate care are conturată deja o arie de polarizare este Ciacova, cu unele unităţi de prelucrare locală a produselor agricole, dar în general dezvoltarea industrială a aşezărilor rurale este mai avansată: Recaş cu secţie a fabricii de încălţăminte din Timişoara, Peciu Nou cu secţie de industrializare a lemnului, Şag cu atelier de timplărie etc.

Oraşul Timişoara, prin potenţialul său demografic şi economic, influenţează organizarea de ansamblu a spaţiului din întreaga unitate.

Municipiul Timişoara, cel mai mare oraş din partea de vest a ţării, cu rol primordial în economia şi demografia întregului Banat, este atestat documentar din anul 1266, cînd a apărut sub numele de „Castrum Temesiensis”, respectiv castrul de pe Timiş. Numele oraşului ar părea un paradox, întrucît oraşul nu se află aşezat pe riul Timiş ci pe riul Bega. În acest sens, documentele cartografice vechi menţionează că actualul riu ce trece prin Timişoara se numea Timişel, denumire păstrată şi astăzi pentru vechea albie a riului Bega, al cărui nume a fost dat

de colonişti şi impus oficial după colonizările de la mijlocul secolului XVIII (M. Bizerea, 1962).

Timişoara exista ca cetate încă din secolele XI — XII, fiind în strînsă legătură cu satele locuite de români din spaţiul înconjurător. Transformarea Timişoarei din centru militar-administrativ în oraş feudal cu funcţie comercial-meşesugărească a fost un proces de durată. În secolul XIV pe locul numit „Insula” s-a construit o cetate de piatră, care, alături de cea veche de pămînt, formează o puternică fortificaţie. În a doua jumătate a acestui secol, importanţa oraşului a crescut sub raport economic şi militar. La un secol după aceasta, oraşul avea 20 000 de locuitori, cuprinşi în două cartiere: Palanca Mare şi Palanca Mică. După o perioadă de relativă stagnare sub ocupaţie turcească cînd s-a adăugat numai cartierul Mehala, începînd din secolul XVIII a cunoscut o dezvoltare puternică. Numai în prima perioadă a acestui secol au fost construite în partea centrală 45 de clădiri administrative, iar ulterior, noile cartiere s-au dezvoltat la circa un kilometru de cartierul central (fig. 49).




Fig. 49. Municipiul Timişoara. Evoluţia teritorială.

Dezvoltarea comerţului şi industriei în secolul XIX şi intensificarea traficului fluvial pe riul Bega au determinat o creştere rapidă a numărului de locuitori, a construcţiilor de locuinţe şi străzi, a magaziiilor, depozitelor, ceea ce a impus acţiuni de sistematizare a oraşului.

Prima sistematizare s-a făcut la sfîrşitul secolului XIX după un sistem radiar-inelar, dar fără o viziune de perspectivă. Începutul secolului nostru coincide cu o nouă perioadă

de extindere teritorială, numai zona de locuit extinzându-se cu 1 800 ha. Noi terenuri sînt ocupate cu întreprinderi industriale, ateliere feroviare și cu construcțiile aferente gării.

Între cele două războaie mondiale, Timișoara s-a mărit cu cartierele din jur, integrate rapid, realizîndu-se o extindere teritorială apreciabilă (Fratelia, Ghiroda Nouă, Plopi, Ciarda Roșie și Freidorf).

Planul de sistematizare adoptat în anul 1964, avînd la bază funcțiile orașului și rolul său regional, a stabilit direcțiile principale în dezvoltarea urbanistică și industrială. În aceste condiții orașul se dezvoltă teritorial și se diferențiază funcțional (I. Ianoș, 1984), ajungînd să aibă un profil economic complex și să dețină o suprafață de 45 km². În structura vetrei cea mai mare parte revine cartierelor de locuit (56%), apoi zonei industriale (16%) și spațiilor verzi (6%), restul de circa 1 km², fiind deținut de rețeaua stradală, zonele de transport, alte spații. Zona de locuit s-a extins prin construirea cartierelor Circumvalațiunii I — IV, Giroc-Stadion, Calea Șagului, Calea Lipovei ș.a.

Evoluția demografică a orașului Timișoara a cunoscut o creștere continuă. În anul 1850 număra 17 669 de locuitori, iar la începutul secolului XX (în 1910) avea 72 555 de locuitori. După 40 de ani orașul înregistra peste 110 000 de locuitori (1948 — 111 987), avînd o creștere de aproape 40 000 de locuitori.

În etapa următoare orașul a cunoscut o creștere vertiginoasă, dublîndu-și populația, între 1956 și 1977 și ajungînd la 268 725 de locuitori. În 1992 populația municipiului înregistra 334 278 de locuitori, plîsînd Timișoara pe locul al patrulea după București, Constanța și Iași. În această perioadă s-au produs mutații corespunzătoare în dinamica și structura populației ocupate. Față de anul 1970, în ultimii 10 ani, populația ocupată a crescut cu peste 50 000 de persoane. Analiza comparativă a structurii acesteia arată o creștere a populației ocupate în industrie cu 2,7% (de la 51,4 la 54,1%), urmată de cea din construcții. În valori absolute creșterile însumează peste 32 000 de persoane în industrie, 5 500 în construcții și aproape 2 000 în transporturi. Numărul celor ocupați în agricultură a rămas aproximativ constant, ceea ce înseamnă că în sectorul terțiar creșterile au fost ceva mai reduse.

Creșterea demografică rapidă este consecința unei dezvoltări economice, îndeosebi în

dustriale intense. În dezvoltarea istorică a orașului activitățile economice s-au modificat în concordanță cu mutațiile survenite în evoluția forțelor de producție. Astfel, de la o activitate agricolă și militară, inițială, s-a trecut la una meșteșugărească și de servicii, iar ulterior la o creștere accentuată a producției industriale. Astăzi, deși economia orașului Timișoara este complexă, totuși este foarte evidentă dezvoltarea industrială și funcția sa industrială. În structura valorică a întregii economii, industria deține circa 4/5, fiind urmată de activitățile comerciale și de transport, de gospodărire comunală și agricole.

Activitatea industrială din orașul Timișoara se desfășoară în 58 de întreprinderi, dintre care 48 de interes național. Industria timișoreană reprezintă circa 3% din volumul global industrial al țării. Structura producției industriale pe ramuri se prezintă astfel: construcții de mașini și prelucrarea metalelor 43,8%, alimentară 16,8%, chimie 15,8%, textile și confecții 11,7%, pielărie și încălțăminte 5,7%, alte ramuri 6,2%.

Începuturile activității industriale în orașul Timișoara datează din prima parte a secolului XVIII, cînd a apărut prima întreprindere mare, respectiv fabrica de bere (1716). În perioada anterioară activitatea era cea meșteșugărească, desfășurată în ateliere mici și dispersate în partea centrală a orașului. De o industrie adevărată se poate vorbi, însă, abia în a doua jumătate a secolului XIX, după ce în prima jumătate mai apăruseră fabrica de săpunuri (1844) și fabrica de țigărete (1847). La sfîrșitul secolului puterea industrială a orașului a crescut și s-a diversificat prin noile întreprinderi de diferite profiluri: Întreprinderea de Rețele Electrice (1884), Tehnometal (1878), Ambalajul metalic (1892), Solventul (1896), fabrica de prelucrare a lemnului (1884), fabrica de pălării (1899), fabrica de dulciuri „Kandia” (1890).

În afara unor unități ale industriei ușoare construite la începutul secolului XX (fabrica de ciorapi, fabrica de încălțăminte Banatul, fabrica de stofe din lînă), cele mai multe datează din perioada interbelică. Pînă la primul război mondial dezvoltarea economică a orașului Timișoara era condiționată de politica Imperiului austro-ungar, care îi imprimase caracterul unei piețe de desfacere,

După făurirea statului național unitar român industria Timișoarei cunoaște o dezvoltare accentuată prin apariția unor întreprinderi din domeniul tehnicii de vîrf (electrotehnică, construcții de mașini, chimică), precum și prin diversificarea generală a acesteia. În perioada interbelică au fost înființate 16 întreprinderi mari, cuprinzînd aproape toate ramurile industriale.

Dintre cele mai importante întreprinderi ale orașului sînt de menționat: întreprinderea mecanică (cea mai mare unitate economică a orașului), Electromotor, Electrobanat, întreprinderea de aparate electrice de măsurat, combinatul petrochimic „Solventul”, întreprinderea de spume poliuretane, întreprinderea de tricotaaje, întreprinderea de confecții „Bega”, întreprinderea de mase plastice și încălțăminte etc.

Personalul muncitor ocupat în industrie este de circa 93 000 de persoane, situîndu-se sub necesarul acestei ramuri economice cu aproximativ 15%, de unde necesitatea completării acestuia din alte localități rurale sau urbane excedentare.

Activitatea comercială, a doua funcție importantă a orașului, este determinată atît de poziția geografică, cît și de gradul de dotare comercială și puterea de cumpărare a locuitorilor urbani sau din aria rurală înconjurătoare.

Grupări de unități comerciale au apărut în toate cartierele, fără a avea complexitatea și extensiunea celor din centrul orașului. Pentru satisfacerea în cît mai bune condițiuni a nevoilor populației s-au dezvoltat și modernizat piețele agroindustriale tradiționale precum Badea Cârțan și 1 Mai.

Orașul Timișoara dispune de toate tipurile clasice de transport. Valoric, în totalul activității de transport urban 75% revin celui de mărfuri și doar 25% celui de călători. Numărul călătorilor transportați în spațiul urban depășește 130 milioane anual. În transportul urban de călători tramvaiul deține aproape 2/3, restul revenind în proporții aproape egale autobuzelor și troleibuzelor.

Un rol important în activitatea de transport îl are funcția de nod feroviar pentru că Timișoara asigură transportul în 9 direcții.

Dispune de un complex feroviar cu trei stații tehnice, dintre care una cu caracter de triaj. Stația Timișoara Nord asigură transportul zilnic a peste 80 000 călători.

Alte activități de transport sînt reprezentate de cele legate de transportul fluvial (anual circa 3 milioane tone între Timișoara și Otelec) și de transportul aerian (care dispune din 1980 de un aeroport internațional la Giarmata-Vii).

Timișoara este centrul principal regional de învățămînt, impunîndu-se atît prin profilul și numărul mare al liceelor, cît mai ales prin instituțiile și dotările de învățămînt universitar și de cercetare. Ca centru universitar cuprinde institute de învățămînt superior cu numeroase facultăți și peste 25 000 studenți. După orașul București, Timișoara dispune de cel mai mare număr de instituții de artă și de publicații.

Dotarea din domeniul sanitar cuprinde numeroase dispensare de cartiere și din întreprinderi, spitale mari specializate pentru efectuarea unor testări, intervenții, analize și tratamente de interes interjudețean.

Teritoriul administrativ al municipiului Timișoara include o suprafață agricolă care reprezintă circa 57% din suprafața totală, redusă față de 1965 cu 10%, ca urmare a extinderii spațiului construit. Populația ocupată în agricultură este în jur de 2 600 persoane, ceea ce înseamnă numai 1,5% din totalul populației ocupate a orașului. Activitățile agricole au cunoscut o specializare tot mai accentuată în funcție de condițiile pedoclimatice și, mai ales, de solicitările pieței și industriei.

Din totalul terenului agricol cele mai mari suprafețe — peste 90% — reprezintă teren arabil. Pășunile și fînețele dețin 8,5%, iar livezile sub 1%. În ultimele decenii, în structura terenului arabil s-au produs schimbări prin sporirea suprafețelor destinate legumiculturii și plantelor furajere, în comparație cu suprafețele ocupate de cereale. Peste 20% din terenul arabil revine culturii legumelor, cartofilor și pepenilor.

Orașul nu reușește să-și acopere decît o parte a necesarului din teritoriul administrativ, deficitul în produse agroalimentare

fiind completat atât din comunele suburbane, cât și din zona preorășenească. Totodată, industria solicită numeroase materii prime agricole, ceea ce implică existența unui areal relativ apropiat care să satisfacă cerințele orașului.

Parcul Trandafirilor, Parcul poporului, Parcul rozelor, Parcul Doina etc. Un loc mult apreciat este Pădurea Verde, situată în nord-estul orașului și care dispune de un camping, un strand cu două bazine, secția etnografică în aer liber. Tipul principal




Fig. 50. Municipiul Timișoara. Zonele funcționale: 1, industriale (A, B, C, D, E, F); 2, de transport; 3, rezidențiale; 4, mixte (administrative, social-culturale, comerciale); 5, spații verzi.

Prin valorile cultural-artistice și istorice pe care le deține, ca și prin activitatea actuală cultural-artistică permanent și variată manifestată, Timișoara reprezintă un centru cu valențe turistice importante. Clădirile, reprezentând diverse stiluri de arhitectură, muzeele, teatrele, parcurile și grădinile orașului oferă o gamă largă de atracții. Dintre clădiri se impun: primăria veche (1731 — 1734), catedrala romano-catolică (1736 — 1754), palatul Deschau (1802), Palatul Dicasterial (1850 — 1854), spitalul și Biserica Mizericodienilor (1735 — 1737), teatrul (1872 — 1875), castelul Huniazilor (sec. XV).

Considerat „oraș al florilor”, Timișoara dispune de numeroase parcuri plasate mai ales în partea centrală: Parcul central, Alpinet,

de turism, este cel de tranzit, orașul având aproape 3 000 locuri de cazare în hoteluri, vile și hanuri. În intravilanul orașului Timișoara s-au cristalizat anumite entități teritoriale în funcție de activitatea economică dominantă desfășurată (fig. 50). Astfel, s-au individualizat zone de locuit, industriale și de depozitare, de transport și comerciale, între care există alte terenuri ocupate cu spații verzi, amenajări sportive, grădini și livezi, spații speciale.

Zonele de locuit înglobează peste 50% din intravilan și cuprind 10 cartiere: Cetate, Fabrica, Josefin, N. Bălcescu, Mehala, Fratelia, Freidorf, Ghiroda Nouă, Plopi și Ciarda Roșie, ultimele șapte reprezentând foste așezări rurale integrate orașului. La aceste cartiere




Fig. 51. Timișoara — Teatrul național și Opera (foto V. Sencu).

istorice s-au adăugat cartiere noi, adevărate ansambluri rezidențiale, cum sînt : Circumva-
lațiunii I — IV, Calea Șagului, Calea Bogdă-
neștilor, Calea Girocului, Calea Torontalului,
Calea Lipovei, Zona Tipografiei etc.

Zonele industriale sînt reprezentate din
arii pe care se concentrează industrii cu pro-
filuri distincte. Zona industrială de sud-est —
cea mai întinsă — are profil chimic și elec-
trotehnic, zona de sud-vest cu profil ali-
mentar (prelucrarea laptelui, cărnii, indus-
tria zahărului și uleiului), zona de nord-est
pentru construcții de mașini, zona de nord
pentru construcții de mașini și industrie ali-
mentară și zona de nord-vest cu profil com-
plex (electrotehnică, chimie, industrie ușoară
și alimentară). Alte unități industriale sînt
repartizate dispersat în teritoriu, impunîndu-se
restringerea activităților unor secții mai
ales din partea centrală, unde poluează sonor
sau prin noxele pe care le degajă.

Zona de transport se individualizează în
partea de nord a orașului, cuprinzînd gă-
rile de Nord, de Est, împreună cu spațiile de
depozitare a mărfurilor (fig. 50).

Zona comercială și de servicii se conturează
în partea centrală a orașului, acolo unde se
concentrează majoritatea magazinelor, insti-
tuțiile de artă și centrul politico-adminis-
trativ (fig. 51).

Zona spațiilor verzi include parcurile prin-
cipale ale orașului situate de o parte și alta
a riului Bega.

Prin funcțiile sale complexe orașul Timi-
șoara polarizează un teritoriu relativ întins
sub raport demografic, al relațiilor economice,
al organizării spațiului periurban.

Locul central pe care îl ocupă Timișoara
în sistemul regional de așezări determină flu-
xuri definitive convergente de populație și
de forță de muncă. Zilnic spre oraș se depla-
sează circa 30 000 de persoane de la distanțe
variabile. În izocrona de 30' se înscrie peste
50% din total, respectiv localitățile Ghiroda,
Giroc, Dumbrăvița, Chișoda, Giarmata,
Sinandrei, Recaș, Uștin, Jebel.

Dezvoltarea industrială a orașului a de-
terminat manifestarea de relații cu aria în-
conjurătoare de cooperare industrială și de
aprovizionare cu materii prime. Relațiile de
cooperare au la bază procesul de descentra-
lizare industrială a Timișoarei prin înființa-
rea de secții în localitățile : Buziaș, Jebel,
Lovrin, Recaș, Teremia Mare sau dezvoltarea
celor existente de la Deta, Mănăștiur, Peciu
Nou. Relațiile de aprovizionare cu materii

prime se bazează pe valorificarea parțială
a țițeiului și gazului natural din aria Șandra —
Variaș — Călacea, a nisipurilor și pietrișu-
rilor de la Timișeni, Uliuc, a unor produse ani-
malierie și vegetale din aria de cîmpie și delu-
roasă.

Aprovizionarea orașului cu produse agro-
alimentare se face diferențiat în funcție de
specializarea localităților rurale : cu legume
și cartofi de la Giroc, Giarmata, Moșnița
Nouă, Remetea Mare, Sinandrei, Beregsău
Mic, cu fructe de la Recaș, Giarmata, Periam,
Tomnatic, Lovrin, Topolovațu Mare, cu carne
și preparate din carne — Dumbrăvița, Moș-
nița Nouă, Beregsău Mare, Birda, Variaș,
Recaș, Dudeștii Noi, cu lapte și produse lac-
tate — Șandra, Peciu Nou, Săcălaz, Șag,
Pădureni, Liebling, Gătaia.

2.3.4.5. Cîmpia Lugojului

Se extinde în lungul Timișului și Begăi ca
prelungire estică a Cîmpiei Timișului, între
Podișul Lipovei, la nord, Dealurile Lugojului
la est și Dealurile Pogănișului la sud, de care
este clar delimitată. Spre nord-est se îngus-
tează treptat și trece pe nesimțite în Depre-
siunea Caransebeș; limita convențională fi-
ind la localitatea Maciova. Se află la altitudini
cuprinse între 140 și 170 m, iar în cuprinsul
ei se distinge o treaptă mai înaltă, situată la
poala dealurilor, cu extindere mai mare sub
Dealurile Pogănișului, unde are aspect de
cîmpie piemontană joasă. Aici se pot recu-
noaște terasele mijlocii și inferioare ale Ti-
mișului și Begăi, fragmentate de piraiele
care coboară din dealuri. Treapta mai joasă
este formată de luncile unite ale Timișului
și Begăi, prin care riurile meandreză puternic
și au lăsat numeroase girle, belciuge, brațe
părăsite, arii mlăștinoase. În urma lucrărilor
de hidroameliorații, luncile au fost protejate
împotriva inundațiilor și sînt valorificate su-
perior agricol.

Rețeaua de așezări se compune din 46 de
localități, însumînd o populație de peste
75 000 de locuitori. Proportia populației urba-
ne este de 57,5% dar aceasta se concentrează
în municipiul Lugoj. De remarcant densitatea
relativ mare a localităților (peste 5/100 km²),
dominanța așezărilor cu mai puțin de 1 000
locuitori (aproximativ 80%) și situarea lor
la contactul dintre diferite trepte de relief
(fig. 52).

Evoluția demografică a localităților rurale
între ultimele recensăminte evidențiază un

sold de populație negativ (1 300 persoane), depășit, însă, de creșterea rapidă a populației orașului Lugoj (6 400). Sporuri de populație înregistrează unele reședințe de comune (Coșteiu, Găvojdia, Topolovățu Mare), sate componente ale municipiului Lugoj (Jabor,

70 — 75%. Pășunile și finetele dețin 7 — 8% și respectiv 15 — 16%. Suprafețele pomiviticele ocupă suprafețe importante în Cîmpia piemontană a Darovei, unde se conturează un areal distinct în sectorul Oloșag — Hodoș (1 500 ha de pomi fructiferi, 200 ha




Fig. 52. Cîmpia Timișului și Cîmpia Birzavei. Mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Funcție agricolă; 2, agroindustrială; 3, agroindustrială și de servicii; 4, industrial-agricolă și de servicii; 5, complexă; 6, tendință de creștere; 7, de stagnare; 8, de descreștere; 9, limita cîmpiei; 10, limită de subunitate.

Măguri, Pini) sau sate cu industrie (Chizătău).

Cea mai mare parte a Cîmpiei Lugojuiei este ocupată de terenuri agricole, dominant terenuri arabile (83%), urmate de pășuni și finete (12%), aflate pe luvisoluri albe (soluri podzolite argiloiluviale), pseudogleizate și pseudogleice freatic umede. În partea joasă se află soluri gleice emerse și soluri brune (eumezobazice) freatic umede. Există diferențieri nete între cîmpia aluvială și cîmpiile piemontane în privința structurii terenurilor agricole. Dacă în prima terenurile arabile dețin 87 — 90%, în Cîmpia Begheului și Darovei, acestea se reduc la

de vii). În structura culturilor sînt dominante cerealele. Legumele și cartofii se cultivă îndeosebi în comunele din jurul orașului Lugoj, conturîndu-se un bazin legumicol de circa 2 000 ha (Coșteiu, Belinț, Boldur și Găvojdia). Creșterea animalelor este axată în principal pe bovine și ovine, remarcîndu-se proporția scăzută a porcinelor în comparație cu situația din întreaga cîmpie a Banatului. Marile complexe de creștere a animalelor sînt înlocuite aici cu fermele de dimensiuni mici de la Racovița și Lugoj.

Municipiul Lugoj are în componența sa satele Măguri și Tapia. Menționat ca fortificație medievală în anul 1334 (pe o veche așe-

zare daco-romană), a devenit, în 1522, reședința județului Severin, în 1779 a județului Caraș, iar din 1873 capitala județului Caraș-Severin.

Prin numărul său de locuitori (50 983 în 1992) face parte din categoria orașelor mijlocii. În perioada 1966 — 1977 a marcat o creștere de aproape 8 000 persoane. Creșterea s-a bazat mai ales pe soldul migratoriu care este anual, în medie, de 900 persoane.

Datorită dezvoltării economice, îndeosebi industriale, au avut loc mutații importante în structura personalului muncitor, relevând dominanța celor ocupați în industrie (53%) și în sectorul terțiar (43%).

Extinderea teritorială actuală a avut ca nucleu inițial așezarea de pe partea dreaptă a Timișului, mai adăpostită față de inundațiile riului. În anul 1717, pe malul stîng, a apărut prin colonizări cu populație de origine germană, „Lugojul German”. Extinderea ulterioară a vetei orașului s-a făcut cu precădere pe arterele de circulație spre Timișoara și Caransebeș. „Lugojul German” s-a dezvoltat în spațiul dintre riul Timiș și calea ferată. De la sfîrșitul secolului trecut orașul s-a extins treptat și, dincolo de calea ferată, a apărut un nou cartier, Lugojul Nou. În evoluția teritorială de ansamblu un rol esențial l-a avut dezvoltarea industrială și a serviciilor. Printre primele unități industriale s-au situat fabrica de țiglă și întreprinderea textilă, multă vreme „unități emblemă” ale orașului. Activitățile industriale s-au dezvoltat prin apariția a noi întreprinderi, dintre care un loc de bază îl ocupă întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat, întreprinderea de utilaje și piese de schimb, fabrica de ceramică fină și faianță, filatura de mătase naturală, fabrica de mobilă. Numai în perioada 1965 — 1980 structura producției s-a modificat fundamental. Astfel, proporția industriei textile s-a redus de la 80% la 47%, iar construcțiile de mașini au crescut de la 3% la 25%. Alte ramuri industriale sînt reprezentate de industria alimentară (16%), faianței (5,1%) și a confecțiilor (5%).

Transporturile reprezintă un domeniu important, datorat poziției geografice a orașului și funcției de nod feroviar și rutier, necesității de asigurare a unor legături eficiente între zonele rezidențiale și industriale, între oraș și localitățile rurale din apropiere. În evoluția sa istorică orașul s-a bazat pe funcția

comercială (și de schimb), pe puterea politico-administrativă și pe amploarea activităților social-culturale. Este recunoscut locul ocupat de orașul Lugoj în mișcarea culturală românească (cu precădere în cea muzicală), prin personalitățile de marcă pe care le-a avut (Efimie Murgu, Coriolan Brediceanu, Tiberiu Brediceanu, Ion Vidu, Victor Vlad Delamarina ș.a.).

În structura spațiului urban propriu-zis, cea mai mare suprafață este deținută de zonele rezidențiale. Orașul se compune din trei mari cartiere: Lugojul Românesc (56% din populație, 54% din suprafața locuibilă și 41% din numărul clădirilor), Lugojul German (34% din populație, 37% din suprafața locuibilă și 45% din numărul clădirilor) și Lugojul Nou (10% din populație, 9% din suprafața locuibilă și 14% din numărul total al clădirilor). Mutațiile cele mai semnificative s-au petrecut în structura Lugojului Românesc, unde circa 15% din clădiri sînt blocuri cu 4 și 10 etaje. În Lugojul German clădirile cu mai mult de două etaje sînt mai reduse (5%), iar în Lugojul Nou toate clădirile sînt mici (parter) și de regulă, unifamiliale.

Activitățile industriale ale orașului Lugoj se concentrează în trei areale distincte: Calea Timișoarei, Calea Buziașului și aria gării. Zona industrială din Calea Timișoarei este cea mai nouă, înglobează cele mai multe și importante unități ale orașului și are un profil complex, dominat totuși, de construcții de mașini (utilaje și piese de schimb, utilaje de ridicat și transportat). În această zonă se află amplasate și unități ale industriilor textile, ceramicii fine și faianței. Zona industrială din Calea Buziașului, conturată în jurul întreprinderii textile, are un profil de industrie ușoară. În apropierea gării s-a conturat o zonă industrială de mici dimensiuni care cuprinde întreprinderea de calapoade, fabrica de mobilă, depozite etc.

Zona comercială este evidentă în centrul Lugojului German, grupînd majoritatea unităților comerciale. Peste riul Timiș, în Lugojul Românesc, se individualizează o zonă mixtă, comercială, culturală și politico-administrativă.

Valențele turistice ale orașului reies din construcțiile vechi, unele monumentale — turnul clopotniță (1728), catedrala (1766), unul din cele mai importante monumente în stil baroc din Banat, ansamblul arhitectonic al Mănăstirii Minoritilor (1733 — 1796), Bir-

tul Poștei — 1726 —, din structura urbanistică, din parcurile și „falezele” de-a lungul Timișului.

2.3.4.6. Cîmpia Bîrzavei

Situată la vest de dealurile Buziașului și Dognecei, cîmpia pătrunde, sub formă de golfuri, în aria dealurilor, de-a lungul Pogănișului și Bîrzavei. Limita este subliniată de o accentuare a pantelor pe linia localităților (de la nord la sud) Silagiu, Izgar, Valea-pai, Ramna, Fișeș, Clopodia și Lățunaș). Spre vest trece pe nesimțite în Cîmpia joasă a Timișului. În cuprinsul ei se poate separa o treaptă mai înaltă de cîmpie piemontană înaltă, aflată la 160 — 170 m sub panta dealurilor, care ocupă cea mai mare parte și coboară lin spre a trece în cîmpia joasă, situată la 100 — 110 m și dispusă sub forma unei fișii înguste. Amîndouă treptele sînt alcătuite din depozite fluviale acoperite cu argile pleistocene. În ansamblu, Cîmpia Bîrzavei este alcătuită din interfluvii plane, separate de văi largi dispuse divergent spre a-i sublinia caracterul piemontan (V. Mihăilescu, 1966). În văile mari ale Pogănișului și Bîrzavei se disting terase fragmentate de o mulțime de pîraie.

Pe interfluvii predomină vertisoluri, soluri brune luvice (podzolite) și planosoluri freatic umede, cernoziomuri cambice gleizate și cernoziomuri argiloiluviale. Pe văile mai mari se găsesc soluri gleice. Pe aceste soluri se dezvoltă pajiști secundare de fișcă, spre poala dealurilor și pajiști puternic modificate cu păiușuri și fișcă în restul interfluvilor. În lunile mari se află pajiști de iarbă moale, coada vulpii și asociații hidrofile. Cea mai mare parte a cîmpiei este ocupată, însă, de terenuri agricole.

În funcție de particularitățile fizico-geografice, în Cîmpia Bîrzavei se individualizează patru subunități: Cîmpia Buziașului, Cîmpia Tormacului, Cîmpia Gătaiei și Cîmpia Moraviței.

Cîmpia Buziașului se desfășoară sub dealurile cu același nume, între Cîmpia Lugojuului și riul Pogăniș, sub forma a două interfluvii mai importante, unde pot fi recunoscute terasele Timișului și Pogănișului, fragmentate de mai multe pîraie, printre care remarcăm pîriul Șurgani. Este ocupată de terenuri agricole și pajiști secundare.

Cîmpia Tormacului este situată între riurile Pogăniș și Bîrzava și coboară sub formă

de evantai, fragmentat de o rețea hidrografică divergentă spre Cîmpia Timișului. Pe marginile ei de nord și sud sînt tăiate terasele Pogănișului și Bîrzavei, iar în vest se poate recunoaște un relief de crovuri. Este ocupată de terenuri agricole și pajiști secundare.

Cîmpia Gătaiei, situată între valea Bîrzavei și frontiera cu Iugoslavia, prezintă aceleași interfluvii netezite care coboară în evantai spre cîmpia joasă. Este fragmentată de Moravița și afluenții acesteia. În cadrul ei se înalță conul de bazalt Șumiga (198 m), declarat monument al naturii.

Cîmpia Moraviței, străbătută de riul cu același nume, este constituită din lunca largă a Moraviței, însoțită de o fișie cu caracter de cîmpie piemontană.

În economia Cîmpiei Bîrzavei agricultura ocupă locul principal cu un profil determinat de creșterea proporției pășunilor și fînețelor de la nord spre sud, ajungînd în Cîmpia Moraviței la peste 25%. Aceasta determină diferențieri în același sens ale importanței creșterii animalelor cu sporirea numărului de ovine (Sacoșu Turcesc — 8 200, Voiteg — 11 000, Gătaia — 18 000, Jamu Mare — 30 000). O diferențiere similară se constată și în creșterea suprafețelor deținute de floarea-soarelui și soia, de la est spre vest. În partea de est se constată o dominanță a culturilor cerealiere și pomi-viticole (Buziaș, Nițhidorf, Jamu Mare etc.), iar în cea de vest o creștere a suprafețelor deținute de plantele tehnice și a celor cultivate cu orz (pe alocuri egalează grîul). Creșterea intensivă a animalelor este o activitate de bază, remarcîndu-se localitățile Bîrda și Voiteg pentru porcine, Berzovia, Gătaia și Sacoșu Turcesc pentru bovine.

Activitățile industriale din așezările rurale aparțin industriei mici, fiind mai dezvoltate în localitățile Gătaia, Jamu Mare, Berzovia, Liebling.

Rețeaua hidrografică divergentă are o importanță mare în distribuirea rețelei de așezări. Din cele 56 de așezări, 37 (2/3) sînt situate pe văi. În anul 1977 Cîmpia Bîrzavei înregistra o populație de aproape 64 000 de locuitori (din care doar 17,8% în mediul urban) cu 1 500 de persoane mai redusă decît în 1966. Tendința de scădere a populației are la origine sporul natural, în general, negativ și mai ales migrațiile definitive. Cele mai semnificative descreșteri s-au constatat în localitățile Gaiu Mic, Bărbosu și Lățunaș. Cu ex-

cepția orașelor (Buziaș și Deta), doar 11 localități rurale au marcat creșteri ale numărului de locuitori (Gherman, Voiteg, Gătaia, Birda etc) (fig. 52).

Densitatea așezărilor este mai mare în Cîmpia Gătaiei și Cîmpia Buziașului ($4,0/100 \text{ km}^2$) decât în Cîmpia Tormacului ($3,4/100 \text{ km}^2$) și Cîmpia Moraviței ($2,5/100 \text{ km}^2$). Circa 60% din așezări se încadrează în grupa de mărime mijlocie-mică. În timp ce localitățile Buziaș, Deta și Gătaia au peste 5 000, Berecuța, Minăstire, Duboz, Cadar, Ersig au sub 500 de locuitori.

Orașul Buziaș, situat la contactul dintre cîmpie și dealuri, beneficiază de o poziție centrală în sistemul căilor de comunicație și față de rețeaua așezărilor rurale. Atestat documentar în anul 1320, s-a dezvoltat în apropierea vechii așezări dacice Ahihis (101 d. Chr.). Elementul esențial în dezvoltarea localității l-a constituit valorificarea apelor minerale, începută încă de la sfîrșitul secolului trecut, atît sub raport terapeutic, cît și alimentar. La recensămîntul din 1910, Buziașul avea 2 900 locuitori, iar la cel din anul 1977 circa 5 200. În 1992 a ajuns la 7 999 locuitori.

Perioada de după anul 1975 a modificat profilul funcțional prin apariția și dezvoltarea activităților industriale. Toate unitățile apărute sînt secții ale unor întreprinderi timșorene iar zona industrială a orașului și profilul ei nu afectează calitățile curative ale

mediului. Prin cele 1 500 locuri de muncă, localitatea s-a transformat într-un centru de convergență a populației din satele situate în apropiere.

Cu toată diversificarea activităților economice, Buziașul rămîne una din stațiunile cele mai solicitate, atît datorită proprietăților apelor minerale (carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, clorurosodice hipotone), cît și climatului blînd fără schimbări bruște de presiune.

Orașul Deta, care, ca și Buziașul, a devenit oraș în anul 1968, a apărut pe locul unei așezări mai vechi; în 1770 înregistra 600 de locuitori. La începutul secolului populația se apropia de 4 000 de locuitori, pentru ca în anul 1966 să atingă 5 978. Cu o creștere medie doar de $3,5\%$, orașul înregistra în 1977, 6 186 de locuitori, iar în 1992, 7 143.

Dezvoltarea sa economică este dominată de întreprinderea de prelucrare a lemnului (placaj și furnire), la care se adaugă fabrica de produse lactate, fabrica de piine, ateliere de confecții și tricotaje aparținînd industriei meșteșugărești și artisanale.

Sub aspect urbanistic orașul se caracterizează prin predominanța clădirilor parter și cu un etaj, prin dezvoltarea sa de-a lungul unei axe orientată nord-sud. În afara zonelor industriale și de transport din partea centrală, în vestul orașului s-a conturat o zonă profilată pe industria alimentară.



PODIȘUL MEHEDINȚI

3.1. Constituția geologică și caracterele reliefului

Una dintre cele mai mici, dar mai bine individualizate regiuni geografice ale țării, Podișul Mehedinți se înscrie ca treaptă intermediară între Munții Mehedinți și Piemontul Motrului, despărțit de acesta prin ulucul depresionar Halinga — Comănești. Acest podiș, lung de circa 53 km și lat de 16 — 25 km, cu o suprafață de 785 km², reprezentând 0,33 % din suprafața țării, este orientat de la nord-vest spre sud-est. Individualitatea geografică a acestei unități a fost observată de L. Mrazec (1896), dar originalitatea sa a fost pusă în evidență de Emm. de Martonne (1904, 1907). Limita dinspre munți, care îl domină cu 400 — 500 m, trece pe la vest de satele Cloșani, Godeanu, Izverna, Gornenți și Negrușa. Contactul dintre cele două unități este bine marcat de un povârniș repede, pe unele locuri chiar prăpăstios, sculptat în genere în calcare. Numai în puține locuri, ca la vest de Costești, contactul este mai șters, prin intervenția Dealului Băia, care formează un fel de treaptă secundară între podiș și munți. Înălțimile mai mari din nordul podișului nu sînt legate strîns de munte, ci despărțite prin curmături sau chiar prin văi.

Spre ulucul depresionar din est se termină printr-un abrupt de 150 — 200 m care trece pe la vest de satele Comănești, Bala de Sus, Rudina, Șovarna, Ilovăț, Șușița, Breznița-Ocol și Dudașu Schelei. În nord-est podișul se întinde pînă la Motru, iar spre sud-vest, pînă la Dunăre, care îl desparte de Podișul Miroc de pe teritoriul Iugoslaviei, unitate naturală cu însușiri asemănătoare.

Podișul Mehedinți, deși este o unitate geografică cu înălțimi caracteristice regiunilor deluroase, are, totuși, o alcătuire petrografică și mai ales o structură geologică specifică munților. Astfel, cea mai mare parte a sa corespunde „pînzei getice”, alcătuită din roci metamorfice (micașisturi, gnaise, cuarțite etc.) venite dinspre vest, peste sedimentarul mezozoicului inferior și mijlociu. Înaintarea pînzei cristaline, care are la bază, în unele locuri, și roci ultrabazice, serpentine, a antrenat și unele formațiuni sedimentare de dedesubt, formînd o altă pînză, iar formațiunile autohtonului au fost cutate și faliatate, reliefindu-se un anticlinal pronunțat de-a lungul podișului, de la est de Baia de Aramă pînă la Virciorova (fig. 53). Această alcătuire complicată a fost observată de G. M. Murgoci (1905) și studiată amănunțit de Al. Codarcea (1940).

Dar Podișul Mehedinți este apropiat de munți nu numai prin rocă și structură, ci și prin evoluția reliefului, marcată, probabil de toate ciclurile de denudare succedate în Carpați. Emm. de Martonne, care a observat (1904 a, b, 1907) gradul înaintat de nivelare a întregului podiș, afirmă că e o peneplenă înălțată, cu relief întinerit recent. Caracterul acestuia este atît de pronunțat, încît „e greu să găsești un exemplu mai tipic de peneplenă dominată de înălțimi izolate, de calcar sau de cristalin, care sînt martori ai primei faze de eroziune” (Emm. de Martonne, 1904 b, p. 440). O observație asemănătoare face mai tîrziu și I. Vintilescu (1941, p. 123): „Cînd ai ajuns sus, deodată orizontul ți se deschide larg și privirea îți alunecă pe suprafețe netezi, uneori perfect orizontale, ori slab vălurite din care se ridică spinări domoale




Fig. 53. Schița geologică a Podișului Mehedinți (După *Harta geologică*, 1 : 200 000, cu simplificări). 1, Cristalin autohton; 2, granit din autohton; 3, sedimentar permo-mezozoic autohton; 4, sedimentar mezozoic din parautohton (plaza de Severin); 5, plaza getică; 6, sedimentar posttectonic, transgresiv, miocen; 7, cuaternar; 8, linia de șarij a plinzei getice; 9, linia de șarij a plinzei de Severin; 10, falie; 11, direcția profilului geologic. A. Profil geologic transversal a — a'. 1, Cristalin autohton danubian; 2, sedimentar permo-mezozoic autohton; 3, sedimentarul mezozoic para-autohtonul de Severin; 4, cristalinul plinzei getice; 5, sedimentarul mezozoic al plinzei getice; 6, sedimentarul posttectonic transgresiv, miocen; 7, planuri de șarij; 8, falie.

ce nu știrbesc cu nimic imaginea care te face să crezi că ești în plină cîmpie (fig. 54). Dar cu cît înaintezi pe întinsul podișului observi că orizontalitatea îți este tulburată de un șir de creste semețe care se aliniază de la nord-est către sud-vest” (fig. 54).

În ciuda individualizării clare față de munții de alături, Podișul Mehedinți prezintă, deci, însușiri asemănătoare cu ale acestora ca alcătuire litologică (șisturi cristaline, calcare

Mai departe, spre sud-vest, nu se mai poate vorbi de o continuare a ulucului depresionar, astfel că cele două fișii care îl încadrează se întîlnesc de-a lungul unei denivelări situate pe stînga văii Bahnei. Fiecare dintre cele trei părți este legată strîns de alcătuirea petrografică și de structură. Astfel, partea dinspre munți este sculptată în cristalinul pinzei getice. Numai în marginea sa dinspre ulucul depresionar ies la iveală și formațiuni-




Fig. 54. Schițe panoramice din partea estică a Podișului Mehedinți luate de pe înălțimile dintre Brebina și Motru (după Emm. de Martonne, 1907).

mezozoice), fragmentare tectonică și nivelare în fazele de modelare precuaternare, intensitatea adîncirii fragmentării, ca și unele trăsături social-economice, ceea ce a făcut ca uneori să fie considerat ca parte a Carpaților Meridionali (V. Mihăilescu, 1963). În același timp, altitudinea mai mică (în medie 500 — 600 m), culmile netezite, cu numeroase așezări omenеști, fac ca Podișul Mehedinți să aibă aspect deluros.

Privit în general, acest podiș se diferențiază în trei părți de forma unor fișii, cu lățime variată, orientate în lungul podișului, adică de la nord-est spre sud-vest : una situată pe sub marginea munților, alta paralel cu ulucul depresionar Halinga—Comănești, iar între ele un uluc depresionar, care se întinde de la Baia de Aramă pînă la Cireșu (fig. 55).

nile sedimentare, cum e cazul la Nadanova, Gornovița și la nord de Balta, iar în bazinul inferior al Bahnei, peste cristalin, apar formațiuni terțiare. Ulucul depresionar coincide, în mare, cu marginea estică a largului sincliniu de la est de Munții Mehedinți și cu o parte a flancului nord-vestic al anticlinalului din lungul podișului. El este sculptat în formațiuni sedimentare calcareoase și în șisturi argilo-grezoase și numai partea dinspre munte a golfurilor pe care le formează către vest, în lungul rîurilor mai mari, e sculptată în roci cristaline. Fișia din latura estică a podișului începe din bolta anticlinalului și de-a lungul său se succed ca fișii, sau apar insular, formațiuni autohtone mezozoice, calcare, marno-calcare, șisturi grezoase, gresii grosiere silicioase și chiar granite (local, la Busești),

apoi cristalinul pinzei, după care urmează, peste cristalin, formațiuni sedimentare tertoniene, sarmațiene, miocene și pontiene (fig. 53).

Partea podișului de sub munte se împarte în trei sectoare cu însușiri proprii: unul de nord, cuprins între Motru și valea superioară a Topolniței, numit Dealurile Izvernei (sau ale Paharnicului), altul de sud-vest, care s-ar putea numi Dealurile Moiseștilor și Mălărișchii, la sud de care se află Depresiunea Bahnei (fig. 55).




Fig. 55: Diviziunile morfologice ale Podișului Mehedinței: a, dealuri; b, podiș; c, depresiuni; d, cornete.

Dealurile Izvernei reprezintă porțiunea cu relieful cel mai accidentat și cu înălțimile cele mai mari din cuprinsul podișului, care culminează în Virful Paharnicului, 887 m, din partea centrală, și Cuca Mare, 788 m, de la vest de satul Gornovița¹. Unele dintre acestea au povirnișuri rezezi până la vîrf (fapt oglindit în toponime, ca „Țapa”, de lângă Izverna), iar altele prezintă trepte întinse și ondulate larg, numite de localnici „săsturi”. Toate aceste dealuri sînt asimetrice: cu povirnișurile dinspre nord și nord-vest rezezi,

ajungînd în unele locuri la 35 — 40°, iar cele dinspre est și sud-est domoale. Acest caracter dominant are urmări însemnate asupra topoclimatului, ca și a modului de folosire. Povirnișurile dinspre nord, sau „dosurile”, au rămas încă acoperite de pădure („Dosu-al Mare”, „Dosul Ursului”), iar cele sudice sînt acoperite de pajiști și culturi agricole („Fața Mare”, „Fața Icoanei” etc.). Apele principale din cuprinsul acestor dealuri, Topolnița și Cosuștea cu afluenții lor, ca și Brebina și Motru Sec, curg de la nord-vest spre sud-est, pe văi largi, cu lunci întinse, astfel încît în lungul acestora sau în imediata lor apropiere sînt sate înconjurate de ogoare, finețe și chiar livezi de pomi fructiferi.

Dealurile Moiseștilor și Mălărișchii, desfășurate între Topolnița și Dunăre, sînt dealuri mai monotone, orientate de la nord-vest spre sud-est. Aici se constată o mare deosebire între relieful care aparține bazinului Topolniței și cel din bazinul Bahnei. În bazinul Topolniței, pe dreapta sa, relieful este evoluat, cu povirnișuri domoale, cu văi largi și nu prea adînci, cu culmi rotunjite larg și rare virfuri mai semețe, însușiri pe care nu le găsim în nici o altă parte a podișului. Înălțimile cele mai mari le găsim în marginea dinspre bazinul Bahnei: 718 m la Gornova, la est de Podeni și 686 m Virful Cristei, la nord de Gornenți. În bazinul Bahnei (Dealurile Moiseștilor) culmile sînt boltite larg, ca și în bazinul Topolniței, cu înălțimi asemănătoare sau puțin mai mari în apropierea muntelui, dar povirnișurile sînt rezezi, iar văile mult mai adînci și mai strîmte. Este evident că această parte a intrat într-un nou ciclu de modelare. Înfațișarea variată a reliefului are urmări însemnate pentru modul de folosire. Dealurile din bazinul Topolniței (Dealurile Mălărișchii) sînt în cea mai mare parte despădurite, iar terenul folosit pentru agricultură (pajiște, livezi) și așezări. În schimb, dealurile din bazinul Bahnei au numai culmile și partea de sus mai domoală a povirnișurilor folosite pentru culturi și așezări, pe cînd povirnișurile rezezi, cu întindere mai mare, sînt acoperite de pădure.

Ulucul depresionar Baia de Aramă — Ciresu se desfășoară de la nord-est de Baia de Aramă pînă la Ciresu, pe mai mult de 30 km, cu însușiri variate. Caracterul său depresionar este mai pronunțat între Baia de Aramă și Nadanova, și mai șters în alte locuri, ca între Sfodea și Ciresu (fig. 55).

Limita de sud-est este foarte clară: un povirniș pe unele locuri chiar abrupt,

¹ Numele suprafeței de nivelare Gornovița, dat de De Martonne (1907), nu provine de la acest sat, ci de la satul cu același nume, aflat în partea de sud-vest a Munților Vilcanului, unde această platformă are o întindere mare.

prin care se trece de jos, din vatra depresiunii, la șesurile întinse ale părții de sud-est a podișului sau la crestele cornetelor înalte, care se întind între Busești și Sfodea. Înălțimea acestui povârniș este de 300 — 350 m la sud de Baia de Aramă, de circa 150 m la nord de Busești și de 95 — 100 m la est de Balta, însă culmile cornetelor domină vatra depresiunii cu mai mult (Virful Cerboanii domină lunca Coșuștei cu circa 400 m la Nadanova). Dar de la Balta până la Cireșu limita nu este tot așa de bine reliefată deoarece pe de-o parte, Topolnița nu mai curge prin ulucul depresionar, ci prin podiș (dar foarte aproape de marginea de sud-est a ulucului, până intră pe drumul subteran din peștera de la Cireșu), iar pe de altă parte, pentru că aici caracterele depresiunii sînt mai șterse, dînd impresia că depresiunea se pierde pe unele locuri, cum e cazul la nord-vest de Sfodea.

De cealaltă parte a ulucului, spre nord-vest, limita nu este clară, în multe locuri fiind o trecere treptată între relieful depresiunii și acela al podișului, contactul dintre cele două trepte avînd forma unei linii sinuoase cu pătrunderi adînci către nord-vest, în bazinul Coșuștei spre Izverna și în bazinul Topolniței spre Prejna. La sud-vest de Balta, unde contrastul dintre relieful depresiunii și cel învecinat e mult mai șters, fixarea limitei e și mai anevoioasă. Lățimea depresiunii e foarte variată: mai mare în unele locuri, ca la Baia de Aramă sau în bazinul Coșuștei, destul de mică în altele, cum e cazul la vest de Cornetul Babelor.

Relieful din lungul acestui uluc este dispus în trepte, aflate în strînsă legătură cu bazinele hidrografice ale rîurilor principale modelatoare: Bulba (cu două nivele superioare, al Ponoarelor și al Zătonului), Coșuștea și Topolnița. Nivelul cel mai coborît din lungul acestui uluc se află la est de Baia de Aramă, în lunca Bulbei (la 275 m alt. abs.), care stă în legătură cu nivelul Motrului. În bazinul Ponoarelor, altitudinea cea mai coborîtă este la Lacul Turcului (330 m alt. abs.), iar înălțimile din împrejurimi se situează la 400 — 450 m. În bazinul Zătonului se mențin aproximativ aceleași înălțimi, dar în bazinul Coșuștei punctul cel mai coborît din lunca rîului este de 400 m la est de Nadanova, iar înălțimile cele mai mari trec în unele locuri cu puțin de 500 m. Mai departe, de la Balta la Cireșu, relieful se menține aproape la aceeași înălțime de 450 — 470 m.

Relieful din lungul acestui uluc este destul de variat. Astfel, în bazinul Coșuștei și al

Topolniței este mai monoton, mai evoluat, cu lunci largi, mărginite de povârnișuri domoale. Dinspre nord-vest coboară gruiuri prelungi, care se pierd pe nesimțite în depresiune; numai acolo unde apare mai mult calcar se înalță „cornețele”, cu înfățișarea lor cu totul aparte (la Nadanova și Gornovița). Între Balta și Cireșu, dealurile din depresiune au povârnișuri mai domoale decît în afara depresiunii și se asociază cu un șir de curmături largi. Văile, ceva mai largi decît dincolo de limitele depresiunii, au lunci mici, dar bine conturate și cu evidente începuturi de polii. Relieful din bazinul Bulbei și al afluenților săi de pe căi subterane, Piriul Turcului și Zătonul, are înălțimi mai mici, dar, cu toate acestea, prezintă un evident caracter de tinerețe. Aici luncile sînt înguste sau chiar lipsesc, iar povârnișurile foarte repezi. Este interesant faptul că partea mai înaltă a dealurilor din depresiune, cu rămășițe din cicluri vechi, se leagă de nivelul inferior al platformei Gornovița din Munții Vilcanului.

Existența acestui uluc depresionar este condiționată în primul rînd de variația petrografică și de structură, el fiind sculptat, în general, în partea superioară a formațiunilor sedimentare de sub cristalinul getic și chiar în marginea acestuia dinspre sinclinal. Numai în extremitatea nordică, de la nord-vest de Busești până la est de Baia de Aramă, eroziunea a ajuns, în unele locuri, chiar la formațiunile granitice din fundament. În acest uluc sau în apropierea acestuia, se găsește partea cea mai însemnată a carstului mehedintean.

Prin poziția și natura ei, această depresiune a avut un rol însemnat în viața omului; de-a lungul său trec drumurile cele mai importante din Podișul Mehedinți și la marginea sa de nord-vest sînt concentrate cele mai multe așezări omenești. De aceea, prin activitatea îndelungată a omului, peisajul natural, mai ales vegetația, a avut de suferit aici mai mult decît în celelalte părți ale podișului.

Depresiunea Bahna, situată în marginea de sud-vest a Podișului Mehedinți, este orientată de la nord-est spre sud-vest, ca și depresiunea Baia de Aramă — Cireșu. De aceea poate fi considerată ca o continuare a acesteia. Dar Depresiunea Bahnei este legată de Depresiunea Orșovei, care limitează Podișul Mehedinți în extremitatea sa de sud-vest, aproape constituind un golf al acesteia. Ca urmare, unii cercetători vorbesc de o singură depresiune Ogradena—Bahna (N. Popescu,

1968). Are aspectul unui mic culoar lung de 9 km și lat de 2,5 — 3 km. Limita vestică este formată de un abrupt de circa 100 m, care se poate urmări dinspre Defileul Dunării, pe dreapta Bahnei, până la dealul Foai-e-n Fir, iar de aici spre est până în dreptul satului Bahna. Spre est limita o formează riul Bahna, care în unele locuri pare a intra în partea estică a podișului. Această depresiune are un aspect pronunțat deluros; în cuprinsul ei înălțimile oscilează între 175 și 250 m, iar fundul văilor este abia la 55 — 75 m. Relieful acestei depresiuni este sculptat în formațiuni terțiare care acoperă aici rocile metamorfice. Partea inferioară a povirnișurilor este destul de repede, amintind în multe locuri de munte. În schimb, culmile sînt boltite larg, astfel încît ele au putut fi folosite pentru agricultură, pășune și fineață.

Partea estică a podișului, dinspre Piemontul Motrului, are o lățime aproape constantă de 7 — 8 km și ocupă aproximativ jumătate din suprafața întregului podiș. Deși relieful este mult mai uniform decît în cealaltă jumătate (ceea ce justifică pe deplin numele de podiș) are, totuși, o fragmentare relativ accentuată, ca o urmare a adîncirii recente a văilor într-o suprafață veche, ondulată larg sau aproape plană pe unele locuri. Aceste poduri au dimensiuni variate: lungimea de la 1 — 2 la peste 10 km, iar lățimea în jur de 1 km, fără să lipsească locurile unde ea trece de 2 — 3 km (la vest de satul Dilma).

În cuprinsul acestei părți se pot deosebi două unități: una — Dealul Mare — Dilma —, care se întinde de la Motru pînă la Coșuștea și afluentul său de pe dreapta, Criva, și alta — Nevăț — Chiciora —, extinsă spre sud-vest, pînă la Dunăre (fig. 55).

În prima unitate, Dealul Mare — Dilma, înălțimile cele mai mari, de 600 — 615 m, se găsesc către ulucul din interiorul podișului, de unde scad treptat spre sud-est pînă la 400 sau chiar 350 m, înălțime de la care se coboară în depresiunea de contact Comănești — Halinga.

Către ulucul depresionar, de-o parte și de alta a Coșuștei, sînt cornetele cele mai mari din tot podișul: Cornetul Cerboanii și Cornetul Babelor. Văile mai importante sînt orientate de la nord-vest spre sud-est. Cîteva dintre acestea nu au obîrșie, ele fiind deschise spre ulucul depresionar. Așa sînt văile Rîie-nilor, Împărțitoarei, Jghibinei și altele. Dar cazul cel mai interesant este acela al văii Pistrîței, care, foarte adîncită în tot lungul său, de la Pistrîța are fundul înclinat spre

Bulba. Podurile sînt despădurite și folosite pentru agricultură, pajiște și pentru așezări, iar povirnișurile sînt acoperite de pădure. Drumurile urmăresc cu precădere culmile, dar nu evită nici firul văilor.

Unitatea următoare, Nevăț — Chiciora, limitată de văile Crivei și Coșuștei în nord și Clișvățului și Topolniței în sud, ajunge la înălțimi de peste 700 m, în virfurile Nevăț 715 m și Chiciora 723 m, situate la 3 — 4 km de marginea dinspre ulucul depresionar; dar înălțimea generală a dealurilor dintre văile amintite trece de 600 m pe toată latura de vest, de unde scade spre marginea estică la 400 m și chiar mai puțin. Între Balta și Prosăc, Topolnița curge chiar pe lingă marginea acestei unități, dar pe la est de Cornetul Bălții, înscris în șirul cornetelor de la nord.

De la Topolnița pînă la Dunăre, relieful se aseamănă cu cel dintre Motru și Coșuștea. Înălțimile cele mai mari se găsesc pe stînga văii Bahnei, culminînd cu Matorățul 630 m, de unde scad spre sud-est, ajungînd în jur de 300 m la vest de Breznița-Ocol. În capătul sudic al podișului, se înalță Dealul Vărănic de 409 m, asemănător ca peisaj cu cornetele din partea de mijloc a podișului.

Apele principale sînt orientate tot de la nord-vest spre sud-est și toate au văi adînci și strîmte, cu povirnișuri repezi, adevărate chei sau defilee. Ceva mai mult: Topolnița, al doilea riu ca mărime care traversează podișul (după Coșuștea) și care, de la Balta pînă la Prosăc, curge de la nord spre sud, merge pe cale subterană, de la gura peșterii Topolniței de la Cireșu pînă la Prosăc, distanța de circa 700 m. Aici carstul are un rol însemnat în peisaj, în timp ce în latura dinspre Depresiunea Comănești-Halinga se impun în peisaj versanții atacați de eroziunea torențială. La Pirlage este o arie apreciabilă de pornituri, ceea ce reprezintă o raritate în cuprinsul podișului.

Trăsătura esențială a jumătății estice a podișului este dată, așadar, de contrastul izbitor dintre culmile netezi sau ușor ondulate și povirnișurile repezi ale văilor adînci și strîmte, care despart podurile. Această însușire are urmări însemnate pentru viața omului și pentru modul de folosire a terenului. Culmile, odinioară acoperite de pădure de gorun, sînt acum aproape în întregime despădurite. Locul pădurii l-au luat culturile agricole, livezile, pajiștile întinse și din loc în loc satele. Tot de-a lungul culmilor trec și drumurile principale care fac legătura între satele din ulucul Baia de Aramă-Cireșu (și chiar

de dincolo de acesta) cu Depresiunea Comănești — Halinga și cu Drobeta Turnu-Severin. Abia recent s-au construit drumuri forestiere de-a lungul Coșuștei și Bahnei, care schimbă întrucâtva modul de circulație. Pe unele văi importante, cum e aceea a Topolnicei, abia de se poate strecura o potecă de picior pe anumite porțiuni, practicabilă numai în anumite perioade din an. Povirnișurile sînt acoperite aproape în întregime de pădure. Impresionează prin masivitatea pădurii mai ales partea dinspre Dunăre, ca dealurile din bazinele Jidoștei și Bahnei inferioare, unde relieful are caractere foarte apropiate de acelea ale munților. Singura vale, pe care se găsește un sat, este aceea a Pistrîței, constituind un caz aparte.

3.2. Relieful carstic

Prezența calcarelor face ca relieful carstic, cu formele și fenomenele caracteristice, să ocupe un loc însemnat în peisajul regiunii, atrăgînd de mult atenția cercetătorilor (Emm. de Martonne, 1907; I. Vintilescu, 1940; I. Ilie, 1969; V. Decu și colab., 1975 etc.). Formele care se impun mai întîi în peisaj sînt *cornetele*¹, înălțimi izolate cu înfățișarea unor acoperișuri de șuri uriașe, care se înșiră la est de ulucul Baia de Aramă—Cireșu, între Busești și Sfodea: Cornetul Cerboanii, Cornetul Babelor și Cornetul Bălții. Acestea sînt sculptate în calcarele din flancul nord-vestic al anticlinalului asimetric din lungul podișului, constituind martori de eroziune de interes deosebit, care domină împrejurimile cu șesuri întinse, sculptate, în parte, tot în calcar, în flancul estic al anticlinalului, cum este cazul la Cîmpul Peșterii de la Baltă sau la Busești. Însemnătatea acestor cornete a fost semnalată de Emm. de Martonne (1907, p. 127), care le-a comparat cu monadnock-urile din America de Nord.

Privind de aproape, la cornetele mai mari se observă o evidentă asimetrie: povirnișul de sud-est, săpat în capul stratelor, este

mai abrupt decît cel nord-vestic, care corespunde în general feței stratelor. Acest caracter este mai pronunțat la Cornetul Bălții decît la celelalte.

Pe lîngă aceste cornete mari, care domină șesurile podișului sînt și cornete mai mici, în Depresiunea Baia de Aramă—Cireșu sau în prelungirea acesteia spre sud-vest, numite „cornetele”, ca acelea de la Gornovița și Nadanova. Șirul acestor cornete mai mici (în general, martori de eroziune din nivelul cel mai întîns al podișului) este mult mai lung, el putîndu-se observa aproape în tot lungul Depresiunii Baia de Aramă—Cireșu, sau în vecinătatea acesteia și chiar în prelungirea ei spre sud-vest pînă la Dunăre. Se impun cu deosebire „cornetelele” de la Ponoare, Nadanova, Gornovița, Sfodea și Jupânești¹.

Alte forme carstice care dau peisajului o notă aparte, îndeosebi în partea centrală a podișului, sînt „luncile”, șesuri aluviale întinse, de-a lungul Coșuștei, în sus de Cernavir, și Topolnicei în sus de Balta, late de peste 1 km pe unele locuri, care „au înfățișarea unor mici dar veritabile polii” cum a observat Emm. de Martonne (1907, p. 128). Pe lîngă aceste „lunci” cu întindere mare și drum șerpuit sînt și altele mai mici între Balta și Cireșu (ca lunca Ponorăului și a Jupâneștilor) și între Baia de Aramă și Busești, îndeosebi la Lacul Turcului și la Zaton. Interesant este faptul că, spre deosebire de poliile din Iugoslavia, care sînt mult mai întinse și care sînt sculptate numai în calcare, „luncile” din Podișul Mehedinți au partea superioară sculptată în roci sedimentare insolubile și mai ales în cristalinel pinzei getice.

Apele care au modelat aceste lunci au un debit variabil: în perioadele de uscăciune îndelungată se pierd în aluviuni, chiar și apele riurilor mai mari ca Topolnița și Coșuștea. În schimb, în perioadele cu multă umezeală, mai ales primăvara și după mari ploi torențiale, apele se revarsă, acoperind suprafețe foarte mari din aceste lunci, formînd chiar lacuri temporare ca Lacul Turcului și Zatonul de la Ponoare, lacul de la Gornovița și lacul de la Balta, de unde și numele satului. Apele Zatonului și ale Lacului Turcului se scurg numai pe cale subterană spre Bulba. Tot pe cale subterană se scurg și apele micilor bazine închise dintre Balta și Cireșu. În schimb, la lacul de la Gornovița are loc o difluență: o parte din apele care vin aici, din marginea de nord-

¹ „Cornet” în gralul localnicilor înseamnă tufăriș în care domină cornul (*Cornus mas*), vegetație caracteristică reliefului format pe calcare, cu sol subțire și bogat în schelet calcaros, sau numai local, în lapiezuri și fisuri. Din acest motiv, localnicii din satele de la marginea podișului dinspre munte (Costești, Prejna, Izverna, Obirșia) numesc *cornet* și partea inferioară a povirnișului de sud-est al Munților Mehedinți, sculptată tot în calcare, care are aceeași vegetație.

¹ Localnicii spun „Supânești”.

vest a podișului, formînd izvorul principal al Topolnicei, trec din lac pe cale subterană, pe sub Cornetul Babelor, în Coșuștea, pe cînd cea mai mare parte a apei curge spre Balta¹. Interesant, chiar impresionant, este faptul că și riul Topolnița intră pe cale subterană la peștera de la Cireșu și iese la Prosăc, după o cale subterană de circa 700 m (I. Vintilescu, 1941, Pl. I A, B).

O altă formă carstică, deosebită prin dimensiunile sale, care se impune în peisaj este podul natural de la Ponoare. Dolinele sînt destul de răspîndite, în unele locuri înșirate de-a lungul unor văi seci, cum este cazul la Ponoare. La Cornetul, lângă satul Gornovița, dolina se află la nivelul luncii, ceea ce face ca în perioadele umede, cînd nivelul freatic este ridicat, să fie plină de apă.

În carstul mehedintean sînt și multe „sodolouri”, văi seci (la Gornovița și Busești), dar sînt și izvoare carstice, ca cele de pe Bulba și de la Izverna. Unele dintre acestea au avut o importanță mare în viața localnicilor, avînd un debit mare și mai ales o temperatură constantă².

În calcarele din podiș sînt și numeroase peșteri. Dintre acestea, cele mai cunoscute sînt Peștera Topolnicei, care este una dintre cele mai mari din țară, avînd o lungime de peste 22 km, Peștera lui Epuran, amîndouă rezervații naturale, ca și altele de mai mică însemnătate. Lapiezurile se găsesc peste tot unde calcarul se află la suprafață sau acoperit de un strat subțire de sol. Unele dintre acestea sînt umplute cu material argilos, de culoare roșie. Dimensiunile și formele lor sînt dintre cele mai variate. Lapiezurile și dolinele se găsesc și în partea de sud-est a podișului, pe dealul Vărănic.

3.3. Clima și apele

Trăsătura cea mai importantă a climei Podișului Mehedinți constă în caracterul ei mai

¹ Recent localnicii au săpat un canal, ca apa să meargă spre Topolnița, să nu se mai formeze lacul din care apa trece în Coșuștea, spre a împiedica inundarea unei însemnate părți a luncii.

² Iarna, cînd apele celorlalte piraie îngheață din cauza gerului, nu mai mergeau nici morile de pe ele; în schimb, cele de lângă izvoarele carstice nu sufereau de pe urma gerului. Vara, în perioadele de secetă cînd apa piraiei cu izvoare superficiale scade sau chiar dispăre, încetau și morile din lungul lor, pe cînd izvoarele carstice au debit mare aproape totdeauna, ceea ce face ca și în acest caz să meargă morile, la care veneau și localnicii satelor mai îndepărtate.

blind decît în alte regiuni ale țării ca urmare a influențelor submediteraneene, ca și a unor condiții create de ansamblul orografic. Aici au loc, în tot timpul anului și cu deosebire în perioada rece, invazii ale maselor de aer tropical-maritim, mai umede și mai calde, de origine mediteraneeană și oceanică. Media anuală a temperaturii aerului este de 11.7°C la Drobeta-Turnu Severin. Uneori aceasta atinge valori și mai mari (13°C, în anul 1918), dar sub influența aerului rece continental poate scădea cu circa 2°C (9.9°C, în anul 1933). În funcție de altitudine și poziție, media anuală a temperaturii aerului în anumite părți ale podișului are valori diferite. Astfel, în partea nordică (Baia de Aramă) aceasta atinge 9°C.

Temperatura aerului în luna cea mai rece a anului, ianuarie, la stația Drobeta-Turnu Severin, aflată lângă marginea de sud-est a podișului, este de numai -1.2°C. Ianuarie este singura lună cu temperatura medie negativă din partea sudică a podișului; în partea nordică a acestuia media lunii ianuarie coboară la -2°C (-2.3°C).

Verile sînt însoțite și călduroase, trei luni pe an (iunie, iulie și august) fiind cu temperaturi medii mai mari de 20°C, iar luna cea mai călduroasă, iulie, înregistrează o temperatură medie de peste 23°C în partea sudică a podișului și de peste 20° (20.3°C) în partea de nord, la Baia de Aramă. Uneori invaziile de aer tropical determină creșterea temperaturii aerului la 35° - 40°C. Ca urmare, aici temperatura aerului înregistrează valori dintre cele mai ridicate din țară (stația Drobeta-Turnu-Severin 40.9°C la 17 august 1952 și 38.5°C la Baia de Aramă la 27.VII. 1900).

Datorită frecvenței mai mari a invaziilor de aer din sud-vest, ca și a celor de origine oceanică din vest, pe rama estică a podișului au loc procese de fohnizare a aerului ca urmare a încălzirii adiabatice după trecerea barajului orografic.

În general, precipitațiile sînt bogate, menținîndu-se ridicate deseori și în perioada caldă a anului, încît raportul dintre sumele semestriale de precipitații (din perioada rece și caldă a anului) este aproape 1/1 (Baia de Aramă 466,8 mm în semestrul cald, 345,1 mm în semestrul rece). Specificul acestor influențe este subliniat și de prezența celor două maxime: primul la sfîrșitul primăverii și începutul verii (ca urmare a circulației vestice) și al doilea la sfîrșitul toamnei (în noiembrie), cînd cantitățile lunare de precipitații sînt aproape egale (cuprinse între 75 și > 110 mm).

În partea sudică a podișului precipitațiile lichide predomină tot timpul anului. Aici, în timpul iernii, ninsorile sînt mai rare, frecvente fiind precipitațiile sub formă de lapoviță. Prima ninsoare se înregistrează, în medie, la 12.XII, iar ultima la 8.IV la Drobeta-Turnu Severin. În părțile nordică și centrală ninsorile sînt destul de abundente, și de aceea în perioada de iarnă drumurile devin impracticabile pentru transportul auto. Cantitatea anuală de precipitații crește din sud spre nord de la sub 700 mm (674 la Drobeta-Turnu Severin) la peste 900 mm (905 mm la Baia de Aramă).

Podișul Mehedinți, mărginit la sud de Dunăre, iar la nord de Motru, este traversat de două ape mai mari: Coșuștea și Topolnița. Coșuștea, care la obirșie formează chiar limita dintre munți și podiș, după ce își schimbă de cîteva ori direcția prin depresiunea de la Nadanova, se îndreaptă spre sud-est menținându-și această direcție pînă la Ilovăț, unde iese din podiș. În partea superioară are mai multe izvoare carstice, dintre care cel mai mare se află la Izverna. La Cernavîrf primește o parte din apele Topolniței, care intră în ponorul lacului de la Gornovița. Afluenții săi mai importanți sînt Lăpușnicul, pe stînga și Criva, pe dreapta. Valea Coșuștei, de la poala munților și pînă la Cernavîrf este largă, dar aici ea se îngustează brusc și se menține astfel pînă la ieșirea din podiș. Pe unele locuri are chiar înfățișare de chei (avale de Cernavîrf).

Topolnița, cu obirșia în Muntele Băia, la nord-vest de satul Costești, are cursul superior orientat tot de la vest spre est ca și Coșuștea, dar ajungînd în Depresiunea Baia de Aramă — Cireșu se îndreaptă spre sud. Ea menține această direcție pînă la Prosăc, curgînd mai întîi pe o vale largă, pînă la Balta, apoi pe o vale îngustă, pe unele locuri cu aspect de chei, pînă la Peștera de la Cireșu, iar mai departe pe un drum subteran pînă la Prosăc. De aici pînă la ieșirea din podiș curge spre sud-est, pe o vale îngustă ca și a Coșuștei și aproape paralelă cu aceasta, sculptată în roci metamorfice. Topolnița are afluenți puțini și mici. Interesant este faptul că în cursul său mijlociu, de la Balta la Prosăc, are afluenți numai pe partea dreaptă.

În partea de nord-est a podișului, singurele ape mai de seamă sînt Brebina și Bulba, amîndouă afluențe ale Motrului. Brebina, care își are obirșia în Munții Mehedinți, este ceva mai mare; valea sa e relativ asi-

metrică, cu pîrînișul drept mai abrupt decît cel stîng. Bulba are un bazin aparent foarte mic și o lungime neînsemnată, dar cu numeroase izvoare cu debit mare, ceea ce face ca bazinul său hidrografic real să cuprindă întregul spațiu dintre limita de est a bazinului Coșuștei și cea de sud a bazinului Brebinei. Spre Bulba vin toate apele din bazinul hidrografic al Zatonului, al Lacului Turcului și altele mai mici.

În partea de sud, Bahna („Vodița Mare” în graiul localnicilor) este singura apă care curge de la nord spre sud, pe o vale săpată în roci metamorfice. Bazinul său hidrografic este pronunțat asimetric: destul de întins pe dreapta, de unde primește mai mulți afluenți (Camăna, Grădeșnița, Topolova, Racovățul, Țarova etc.) și foarte restrîns pe stînga.

Sogăția de ape din podiș este reflectată de scurgerea medie specifică care are valori între 7 și 20 l/s. km², în funcție de altitudine. Valorile cele mai mari se constată pe culmile înalte din partea de nord-est a podișului. Primăvara se scurge 40 — 50% din cantitatea de apă anuală, vara circa 30 — 35%, în părțile mai înalte și 20 — 30% în cele joase. Toamna este anotimpul cel mai secetos, cu numai 10 — 15%, pe cînd iarna se scurg 20 — 25% din volumul anual. La topirea zăpezilor, din cauza invaziilor de aer cald au loc deseori viituri. Ca „tip de regim de scurgere”, în podiș se pot deosebi două categorii de riuri: riuri cu scurgere superficială normală, cu ape mari primăvara-vara, dar cu viituri care pot avea loc tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice; riuri care trec prin arii carstice și care nu mai respectă legile normale ale mersului fenomenelor hidrologice, rețeaua superficială nefiind totdeauna în acord deplin cu cea subterană, iar debitul acestora este mult mai constant în decursul anului.

3.4. Solurile, învelișul vegetal și fauna

Solurile. Caracterele Podișului Mehedinți asemănătoare munților scunzi, determinate în primul rînd de constituția geologică și de particularitățile morfometrice, se răsfrîng puternic în însușirile și răspîndirea solurilor, ca și în modul de folosire (fig. 56). În partea nord-vestică a podișului, unde predomină rocile metamorfice, se află soluri brune acide scheletice cu profil relativ

scurt, sub 0,5 m pe areale întinse. În unele locuri, la solurile brune acide se constată chiar o nuanță roșcată datorită bogăției în oxizi de fier. Aceleași soluri se găsesc și în partea de sud-est a podișului pe roci metamorfice, granitice și sedimentare silicioase. Numai în sudul podișului se găsesc soluri brune scheletice, cu slab caracter argilo-iluvial chiar pe roci metamorfice.

Pe povirnișurile repezi, în lungul văilor Topolniței (avale de ieșirea din peșteră),

telor Pirlage, Gornovița, Ponoare, sînt porțiuni de teren cu soluri brune cu-mezobazice în diferite stadii de evoluție, iar pe marne bogate în carbonați s-au dezvoltat soluri pseudorendzinice. Pe calcare se găsesc rendzine negre, rendzine roșii¹ sau numai roca golașă pe întinderi mari, cu material de sol rendzinic numai în lapiezuri și fisuri.

La poala celor mai multe dintre povirnișurile cornetelor se găsesc soluri brune luvice, formate pe un material luto-argilos de cu-




Fig. 5 6. Profil complex prin Podișul Mehedinți. 1, Granit; 2, rocă metamorfică; 3, gresii și conglomerate fine, silicioase; 4, calcare; 5, șisturi argiloase și grezoase fine; 6, sedimente terțiare; 7, aluviuni recente; 8, sol brun acid; 9, sol brun luvic; 10, rendzine; 11, sol aluvial; 12, vegetație de stîncărie; 13, pădure de fag, rar brad; 14, pădure de fag; 15, tufăriș; 16, pajiște; 17, pajiște de luncă; 18, șibleac; 19, pădure de gorun; 20, culturi agricole; 21, „conac”, adăpost pentru ședere temporară la muncă sau păstorit; 22, livadă.

Bahnei, Coșuștei (avale de satul Cernavirf), ca și pe văile altor riuri mai mici, solurile se prezintă sub forma unui mozaic, de la cele tinere pînă la cele brune scheletice cu profil scurt, cu mull și chiar moder, iar pe unele locuri apar grohotișuri și roca la zi acoperită cu mușchi sau licheni.

Pe rocile sedimentare de pe unele dealuri din ulucul depresionar intern se găsesc soluri brune și soluri brune luvice, cu profil scurt și cu scheletul relativ friabil. La solurile formate pe șisturi argiloase se constată o nuanță roșcată în partea mijlocie și inferioară a profilului.

În marginea de est și sud-est a podișului, în vecinătatea ulucului depresionar Halinga-Comănești, pe formațiuni sedimentare miocene sînt soluri brune luvice și soluri luvice mai mult sau mai puțin erodate, pe alocuri pînă la rocă (în împrejurimile satului Bobaița). În schimb, pe formațiunile argilomarnoase, care apar în împrejurimile sa-

loare roșie. Aceste soluri au orizontul B de culoare roșie, mai slabă în partea superioară și mai intensă în cea inferioară în apropierea calcarelor². Pe serpentine, în partea de nord a podișului, îndeosebi la sud de riul Brebina, lângă satul Gornovița, ca și în alte părți, se găsesc soluri negre scheletice cu profil scurt, asemănător cu rendzinele. Solurile aluviale din lunci, în cea mai mare parte sînt supuse proceselor de gleizare, astfel că apar soluri gleice și de mlaștină (în lunca Topolniței la Balta, în lunca Coșuștei, amunte de Cernavirf).

¹ Acestea sînt alcătuite dintr-un amestec de material argilos roșcat, rezidual, cu sfîrșimături de calcar.

² Aceste soluri, care au un pronunțat colorit roșcat, sînt trecute pe multe hărți pedologice, în mod impropriu, ca „terra rossa”, deoarece luturile argiloase roșii de pe calcare și din apropierea acestora — roca mamă a acestor soluri — sînt formate în alte condiții climatice; condițiile climatice actuale sînt favorabile solurilor brune luvice.

Solurile au suferit transformări profunde sub influența îndelungată a activității omului. Astfel, pe povișurile sudice în partea de nord-vest a podișului, după despădurire, terenurile au fost lăsate pentru pajiști sau mai ales folosite pentru culturi agricole (porumb, grâu, secară, ovăz, cartofi, pomi fructiferi).

În urma lucrărilor agricole s-au produs o degradare și o sărăcire a solurilor favorizate atât de relief, cât și de textura nisipoasă a materialului mineral. O situație asemănătoare este și în partea de est-sud-est a podișului, atât la solurile formate pe roci metamorfice, cât și la cele formate pe sisturi sedimentare, pe care nu se dezvoltă decât pajiști sărăcioase.

Solurile sînt favorabile pentru agricultură doar în partea inferioară a povișurilor, unde au grosime mai mare, și în părțile mai drenate ale luncilor.

Vegetația. Aceleași caractere fizice de munți scunzi și de dealuri se reflectă vizibil și în covorul vegetal al podișului care se încadrează în etajul nemoral, subetajul alternanței pădurilor de fag și de gorun. Prezența climatului cu vădite influențe submediteraneene, altitudinea în medie 500 — 600 m, relieful cu suprafețe netezite, apropierea de Peninsula Balcanică, constituția litologică (cu prezența pe suprafețe destul de întinse a calcarelor), ca și trecutul fitoistoric bogat al acestui teritoriu, au influențat puternic structura floristică și cenotică a vegetației. În partea sudică și sud-vestică a podișului, pe suprafețe apreciabile se dezvoltă păduri submediteraneene de stejar pufos (*Quercus pubescens*, *Q. virgiliana*), de cer și gîrniță (*Q. cerris*, *Q. frainetto*), de cărpiniță (*Carpinus orientalis*), de gorun balcanic (*Q. dalechampii*) cu simbovină (*Celtis australis*) și nuc (*Juglans regia*), sau cu alun turcesc (*Corylus colurna*) (Dealul Duhovna, Dealul Vărănic, Dealul Oglănicului, versantul dunărean etc.).

Pădurile de fag sînt formate din fagul balcanic (*Fagus sylvatica* ssp. *moesiaca*). Pe întregul podiș, îndeosebi pe calcare (cornețele de la Ponoare, Cornetul Babelor, Cornetul Cerboanii, apoi Cornetul Băltii și Cornetul Jupâneștilor, ca și pe văile Motru-lui Sec, Lupșei, Coșuștei și Topolnicei) se dezvoltă tufărișuri de tip submediteranean, așa-numitele sibleacuri constituite din complexe de elemente submediteraneene, carpato-balcanice și sud-europene, termofile, ca: mojdrean (*Fraxinus ornus*), cărpiniță, liliac

(*Syringa vulgaris*), corn (*Cornus mas*), scumpie (*Cotinus coggygia*), salbă rîcoasă (*Euonymus verrucosus*), dirmox (*Viburnum lantana*), lemn ciînesc (*Ligustrum vulgare*), nuc (*Juglans regia*) etc. Elementele sudice submediteraneene (ilirice, moesice, balcanice) abundă și în compoziția floristică a pajiștilor, ca și în grupările vegetale de pe stîncării. Sînt de remarcat pajiștile de sadină (*Chrysosopogon gryllus*), care în trecut ocupau suprafețe mult mai întinse.

În prezent au rămas bine reprezentate numai în porțiunea sudică; în părțile centrală și nordică se găsesc numai în petice mici sau în compoziția pajiștilor derivate. Localnicii au folosit și folosesc și în prezent această plantă pentru confecționarea perilor de scînduri. Destul de răspîndite sînt și pajiștile formate din *Danthonia provincialis*, *Dasypyrum villosum*, *Hordelymus asper*, *Vulpia myuros*, *Festuca dalmatica* etc. — elemente sudice termofile (Ana Cucu—Popova, 1970; N. Roman 1974).

Covorul vegetal din Podișul Mehedinți, ca urmare a populării permanente din timpuri preistorice, a suferit schimbări mari atât ca suprafață, cât și ca structură și compoziție (fig. 60). Pădurile au fost defrișate pe suprafețe întinse (peste 40%), iar locul lor a fost luat de pajiști și terenuri cultivate, astfel că pe alocuri este greu de restabilit covorul vegetal natural. Păgetele sînt încă bine dezvoltate în partea nord-vestică, unde ocupă nu numai versanții văilor, ci și coamele dealurilor. Pe unele văi (Motru Sec, Lupșa, Brebina) în aceste păduri, se găsește diseminat nucul (*Juglans regia*), îndeosebi în partea inferioară a versanților.

Pe versanții calcaroși de la contactul podișului cu munții de la vest se dezvoltă păduri de fag cu elemente termofile: alun turcesc, mojdrean, liliac, lemn ciînesc (Dealul Gorganu, muntele Drăghiceanu, la obîrșia văii Lupșei). Pe alocuri, în urma tăierii acestor păduri în trecutul îndepărtat, au apărut tufărișuri de mojdrean cu corn, liliac, lemn ciînesc și exemplare rare de nuc sau alun turcesc.

În partea nord-estică se dezvoltă păduri de gorun cu jugastru, mojdrean și liliac sau, pe alocuri, de gorun cu ienupăr arborescent și ghimpe (*Ruscus aculeatus*), cum este pădurea de pe valea Mănăstirii. De asemenea, în locul pădurilor defrișate sînt larg dezvoltate tufărișurile de ienupăr și grupări de ferigă (*Pteridium aquilinum*) (pe interfluviul dintre văile Lupșei și Brebinei). Pajiștile sînt alcătuite din asociații de *Festuca rubra*, *Agrostis*

tenuis, iar pe solurile negre scheletice de *Festuca rupicola* cu diverse ierburi xerofile.

Pădurile s-au păstrat mai bine în vestul, nord-vestul și nord-estul podișului, iar în ulucul depresionar din mijlocul acestei unități vegetația a fost foarte puternic modificată de către om. Pădurile au fost defrișate pe mari suprafețe, iar pajiștile sînt folosite îndeosebi ca fînețe (fig. 60). Structura fînețelor se modifică mereu, deoarece, după o perioadă de aproximativ 7 — 8 ani, sînt arate și folosite pentru cultivarea cerealelor sau a cartofului. Pădurile au rămas numai pe versanții puternic înclinați și sînt alcătuite din fag în părțile umbrite și din gorun în părțile superioare, însoțite, ale versanților. Se remarcă o mare diversitate și o productivitate ridicată a pajiștilor din această parte a podișului. În compoziția lor predomină *Koeleria macrantha* cu *Festuca rubra*, *Agrostis tenuis*, *Briza media* etc., cu numeroase specii din alte familii și leguminoase.

Prezența largă a suprafețelor calcaroase conferă covorului vegetal o nuanță sudică. Pe acestea se dezvoltă păduri de fag cu elemente termofile și tufărișuri de tip submediteranean.

În partea estică a podișului, vegetația pădurilor s-a păstrat destul de bine. Cele mai extinse păduri erau pe valea Coșuștei și a afluenților săi, care, odată cu construirea drumului forestier, au fost în parte defrișate, locul lor fiind luat de plantații tinere de molid și pin negru.

Se remarcă pădurile de fag cu brad pe valea Crivei și a Lăpușnicului (afluenții Coșuștei), pădurea de pin negru de Banat de pe valea Borovățului (afluent al Topolniței), iar în partea sud-sud-vestică, pădurile de stejar pufos, cărpiniță și pădurile de tei (pe valea Oglănicului). Pe valea Topolniței și pe versantul dunărean se dezvoltă păduri cu simbovină (*Celtis australis*).

Fauna. Particularitatea faunei din Podișul Mehedinți constă în prezența numeroaselor elemente faunistice de diferite origini, îndeosebi a celor sudice.

Existînd o diversitate mare de medii de viață pe o suprafață relativ restrînsă se găsesc animale specifice în egală măsură regiunilor de munte, de deal, de lunci etc. (C. Drăgescu, 1971). Dintre reptile, o notă aparte dau două specii mediteraneene: *Vipera ammodytes ammodytes* (vipera cu corn), care preferă suprafețele calcaroase, și *Testudo hermanni hermanni* (broasca țestoasă de uscat), localizată mai ales în regiunile cu tufărișuri și

pămînt afinat și liziera pădurilor din sudul și estul podișului.

Populații numeroase au și șerpii *Coronella austriaca* (șarpele de alun) și *Natrix natrix* (șarpele de casă). Mai rar pot fi întîlniți *Elaphe longissima* (șarpele de pădure), element sud-european și *Coluber jugularis caspius*, element pontic, xerotermofil de silvostepă.

Între șopîrle se remarcă în primul rînd, datorită efectivelor lor bogate, forma submediteraneană a șopîrlei de ziduri *Lacerta muralis maculiventris* și gușterul (*Lacerta viridis*), element european, iar prin raritatea lor *Lacerta taurica*, element balcano-pontic și *L. praticola*, element caucazo-pontic.

Dintre batracieni aici trăiește broasca rioasă cafenie (*Bufo bufo*), tritonul (*Triturus vulgaris*) și salamandra (*Salamandra salamandra*).

În partea sud-vestică a podișului sînt răspîndite termitele (*Reticulitermes lucifugus*), specie mediteraneană-pontică, iar pe calcare se găsește reprezentantul cel mai nordic al scorpionilor (*Euscorpium carpathicus*), de dimensiuni mici, dar veninos.

În pădurile de fag din partea nordică și nord-vestică, ca și pe văile Coșuștei și afluenților ei, trăiește ursul (*Ursus arctos*), animal specific pădurilor de munte. Tot în pădurile de fag și de gorun trăiesc veverița (*Sciurus vulgaris*), jderul (*Martes martes*), viezurele (*Meles meles*), căprioara (*Capreolus capreolus*), pîrșul mare (*Glis glis*), pîrșul de alun (*Muscardinus avellanarius*), pîrșul cu coadă stufoasă (*Dryomys nitedula*) și, mai rar, lupul (*Canis lupus*).

Dintre păsări specifice pentru făgete sînt ierunca (*Tetrastes bonasia*), fisa de pădure (*Anthus trivialis*), sturzul de vîsc (*Turdus viscivorus*), gaița (*Garrulus glandarius*), țicleanul (*Sitta europaea*), cojoaica de pădure (*Certhia familiaris*), măcăleandru (*Erithacus rubecula*), ca și răpitoarele de zi — uliul găinilor (*Accipiter gentilis*), șorecarul (*Buteo buteo*), acvila țipătoare mică (*Aquila pomarina*) sau răpitoare de noapte — ciuhurezul mic (*Syrinx aluco*) etc.

Dintre animalele cu valoare cinegetică, prezintă interes mistrețul, căprioara, vulpea, vidra, iepurele, jderul, veverița, iar dintre păsări, potîrnichea (*Perdix perdix*).

3.5. Rezervațiile naturale

Originalitatea cadrului natural din Podișul Mehedinți, cu o foarte mare varietate de manifestări a factorilor fizico-geografici, a făcut ca în cuprinsul lui, pe o suprafață relativ restrânsă, să fie declarate nu mai puțin de 17 rezervații naturale (fig. 60).

Este semnificativ faptul că din 31 de rezervații din județul Mehedinți mai mult de jumătate se află în cuprinsul podișului, oglindind varietatea și diversitatea condițiilor naturale de aici.

Majoritatea rezervațiilor fac parte din categoria celor botanice. În cadrul lor sînt ocrotite diferite plante rare, endemice sau relictare. Dar și în cele forestiere și complexe există obiective botanice ca și în împrejurimile celor speologice și paleontologice, reflectînd bogăția și diversitatea covorului vegetal din podiș.

Rezervația complexul carstic de la Ponoare include cîmpuri cu lapiezuri, lacul temporar Zăton, peștera și o arcadă de calcar denumită Pod natural, sau, cum îi spun localnicii, „Podul lui Dumnezeu”, peste care trece șoseaua ce leagă Baia de Aramă cu localitățile din podiș (fig. 57). Pe suprafețele calcaroase se găsesc diferite plante rare, cum sînt *Acnatherum calamagrostis*, *Carlina utzka*, *Cirsium acaule* etc., ca și reptile sudice *Vipera ammodytes*, *Testudo hermanni*, *Lacerta viridis* etc.

Rezervația complexă Peștera Topolnicei și împrejurimile ei este cunoscută prin peștera care se evidențiază prin lungimea galeriilor ca a doua după mărime din țară (22 km). Dar nu numai peștera cu numeroase galerii și podoabe subterane prezintă interes științific și turistic, ci și împrejurimile ei, prin forme carstice originale, acoperite de vegetație cu diferite plante sudice.

Pe versanții stîncosi se dezvoltă plante saxicole, formînd asociații cu *Sesleria rigida*, *Semprevivum marmoreum*, *S. heuffeli*, *Alyssum pulvinare*, *Allium flavum*, *Seseli rigidum* etc., iar în tufărișurile de liliac deasupra locului denumit „Gaura lui Ciocîrdie” se găsesc numeroase exemplare de lala pestriță (*Fritillaria montana*), monument al naturii.

În partea nordică a peșterii Topolnicea, la circa 600 m spre sud-est de satul Jupânești, pe cursul pîrului Ponorăț, se găsește *rezervația speologică Peștera lui Epuran*. Ea a fost creată prin acțiunea combinată a apelor Ponorățului și, probabil, ale Topolnicei. Este

considerată una dintre cele mai frumoase peșteri din țară.

Rezervația forestieră Pădurea Borovăț se află pe versantul stîng al văii Borovățului afluent al riului Topolnicea. Ea cuprinde pădurea de pin negru de Banat (*Pinus nigra* ssp. *banatica*).

Pe interfluviul dintre Bahna și Vodița, pe locul numit Dealul Duhovna, se dezvoltă pădurea de gorun cu alun turcesc (*Corylus colurna*), relict terțiar, constituită rezervație forestieră pentru raritatea și însemnătatea științifică a acestor arborete.

În rezervația *Cornetul Băii și Valea Mănăstirii*, la nord de Baia de Aramă, este ocrotită pădurea de gorun cu *Ruscus aculeatus* și *Juniperus communis* arborescent.

În *rezervația botanică Gura Văii — Vîrcioara* sînt protejate diferite elemente rare, ca *Prangos carinata*, *Minuartia hirsuta* ssp. *falcata*, *Rubus severinensis*, *Stipa danu, ialis*, *Convolvulus cantabrica*, *Onobrychis alba*, *Celtis australis* etc.

Rezervația botanică Dealul și Valea Oglănicului are diferite rarități floristice și endemisme, ca *Tulipa hungarica* var. *undulatifolia*, *Gladiolus illyricus*, *Paeonia daurica*, *Stipa eriocaulis*, *Chrysopogon gryllus* etc. Tot aici se găsesc numeroase exemplare de reptile rare, ca vipera cu corn și broasca țestoasă de uscat.

Rezervațiile botanice Cornetele Babelor, Cerboarii, Băltii, Piatra Încălecată, ca și Dealul Vărănic sînt cunoscute prin dezvoltarea ecosistemelor de tip submediteranean.

Rezervațiile Cheile Coșuștei și Cheile Topolnicei, care s-au format în porțiunile unde apele Coșuștei și Topolnicei străbat benzile de calcar, se remarcă prin relief pitoresc și prezența asociațiilor vegetale cu numeroase rarități floristice.

Rezervația botanică Pădurea cu liliac de la Ponoare este una din cele mai cunoscute prin serbările de liliac ce au loc în fiecare primăvară aici și este renumită prin dezvoltarea luxuriantă a liliacului, alături de alți arbuști, cum sînt cornul, cărpinița, mojdreanul și altele.

Rezervația paleontologică Bahna — Ilovița, în partea sud-vestică a podișului, include puncte fosilifere de o însemnătate științifică deosebită, iar în împrejurimile ei se găsesc rarități floristice, ca *Celtis australis*, cărpiniță, mojdrean și altele.



Fig. 57. Podul natural de la Ponoare (foto V. Sencu).

3.6. Populația și așezările

Avînd condiții favorabile locuirii, Podișul Mehedinți reprezintă un loc propice păstrării și perpetuării elementului autohton. Descoperirile arheologice din localitățile Seliștea, Isverna, Turtaba, Bobaița, Bîlvănești etc. confirmă cu prisosință că regiunea a fost populată permanent din preistorie, cu o continuitate de locuire pînă în vremurile noastre.

Documentele cartografice din ultimele secole (Harta stolnicului Cantacuzino din 1700, a lui Fr. Schwantz din 1723, C. M. Roth din 1771, Bawer din 1781, Specht din 1790, Hatov din 1828 și hărțile ruse din 1835 și 1853) dovedesc această intensă locuire și largă răspindire a așezărilor. În general, cele mai multe dintre satele formate anterior secolului XVIII se găsesc și astăzi în același loc, dar unele au dispărut (Vodița Mare, Țarovățul, Ciorcovița, Clicevăț etc.), urmele

lor păstrându-se în toponimia locală. O parte a satelor din Podișul Mehedinți sînt formate din populație venită de peste Carpați. Numeroși cercetători au semnalat trecerea în secolele anterioare din Transilvania a unei populații care a înființat sate noi sau s-a alipit satelor existente. Cei mai mulți care au venit de peste Carpați au fost ungureni (crescători de oi). Așa se explică formarea satului de ungureni Titerlești în secolul XVIII, ca și prezența acestora în alte sate, ca Brebina, Bratilov, Mărășești etc. Perioada de mai mare siguranță istorică din secolul XIX a contribuit la creșterea numărului locuitorilor și la formarea unor sate prin roirea populației din vetrele matecă spre locurile libere sau cu fertilitate ridicată. În această perioadă, întinse suprafețe cu păduri au fost defrișate pentru a face loc pășunilor și culturilor agricole, locuri în care s-au construit gospodării cu folosire sezonieră (conace). Acestea au o mare răspîndire pe interfluviile dintre riurile Lupșa și Brebina, pe dealurile Paharnicul, Gorunu, Ocheanu — din nordul podișului, ca și în ulucul depresionar dintre Mălărișca și Cireșu.

Ulterior, în a doua parte a secolului XIX și începutul secolului XX, satele podișului au cunoscut alte modificări: au devenit mai mari, au coborît de pe coastele dealurilor în văi, iar din locurile retrase au ieșit spre spații largi. În acest fel au apărut satele: Moisești, Godeanu, Valea Ursului, Bobaița, Ludu, Gărdăneasa, Brînzani, Răiculești etc. Unele au găsit locuri pe versanții domoli cu expunere sudică, iar altele în mici largiri depresionare (Firizu, Gura Văii etc.). Așa se explică de ce poziția actuală a celor mai multe așezări nu corespunde cu aria de răspîndire a acestora de pînă la sfîrșitul secolului XVIII. Satele Drăghești, Săliște, Turtaba, Isverna din bazinul Coșuștei erau risipite mai sus, pe fețele dealurilor. Aceeași situație s-a petrecut și cu multe din așezările din bazinele Bahnei și Topolnicei. Există dovezi certe care arată schimbările de vetre survenite fie prin migrare treptată, fie prin părăsire. Dacă multe așezări au o vechime de 5 — 6 secole în actuala vatră (Bahna, Ilovița, Costești, Prejna, Isverna etc.), sînt unele a căror vatră nu mai corespunde cu cea inițială: Buicani, Brînzani, Gărdăneasa, Moisești, Negrușa, Dîlma etc. Acestea și-au organizat vetre noi cu 100 — 200 de ani în urmă.

Analiza evoluției numerice a populației arată sporul redus al populației, ca urmare a unui ritm de creștere mic față de alte regiuni

ale țării. Mai mult chiar, în ultimele decenii ale secolului nostru, se constată o scădere a populației, prin deplasări spre ariile mai industrializate (bazinul carbonifer al Motrului, Depresiunea Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara etc.) datorită fertilității reduse a solului și resurselor naturale limitate.

Disponibilitățile forței de muncă puse în evidență de deplasările acesteia spre alte regiuni ale țării nu se datorează sporului natural care în ultimii ani a fost sub 5‰, iar în unele așezări chiar mai mic (Cireșu, Godeanu, Podeni, Ponoarele), ci posibilităților reduse de încadrare a forței de muncă pe plan local. De aceea și în prezent se menține un flux încă puternic de plecări la lucru spre alte centre. Numai după anul 1966 au plecat între 5 — 15% din locuitorii comunelor: Isverna, Ponoarele, Balta, Ilovița, Cireșu, Bîlvănești, Godeanu și chiar între 15 și 25%, din comuna Obîrșia Cloșani.

Ca urmare a acestor deplasări, numai în intervalul 1956 — 1985 populația comunelor Podeni, Bîlvănești, Godeanu, Isverna, Balta etc. a scăzut cu 150 pînă la 500 locuitori. În satul Balta numărul locuitorilor a scăzut de la 1 304 în 1912 la 820 în 1966 și 655 în 1977. În această mobilitate teritorială a populației sînt antrenați îndeosebi bărbații și mai ales cei tineri, generînd pentru localitățile de unde au plecat un adevărat proces de „feminizare” și îmbătrînire. Recensămîntul din 1977 arată că un număr tot mai mare de comune a înregistrat ponderi ridicate ale populației feminine (Podeni, 54,5%, Cireșu 55,8%, Bîlvănești 54%, Godeanu 55,0% etc.).

Analizînd structura populației pe grupe de vîrstă, rezultă că populația Podișului Mehedinți prezintă o pronunțată tendință de îmbătrînire. Astfel, raportul dintre populația de peste 60 de ani și cea sub 30 de ani, care, la nivelul țării, era în 1977 de 0,35 (cu puțin sub limita considerată echilibrată 0,40), se ridică în cadrul Podișului Mehedinți la 0,55. Densitatea populației este de 32,2 loc./km², valoare mult sub media pe țară (93 loc./km²).

Cele mai mari densități de populație se înscriu în regiunile de contact.

Evoluția variabilă a fenomenelor demografice, pe fondul caracteristicilor fizico-geografice și social-economice, generează diferențieri în repartitia teritorială a populației. Astfel se disting comune cu densități sub 20 loc./km² (Obîrșia Cloșani), altele cu densități cuprinse între 20 și 40 loc./km² (Balta,




Fig. 58. Relieful și distribuția așezărilor din Podișul Mehedinți. 1, Podiș, a, cu aspect de poduri ondulate larg sau netede, b, cu aspect deluros; 2, cornete (martori de eroziune); 3, depresiuni, culoare depresionare; 4, luncă (polie); 5, peșteră; 6, baraj; 7, așezări cu funcții agricole; 8, așezări cu alte funcții.

Ilovăț, Cireșu, Isverna, Bîlvănești, Godeanu, Podeni), comune cu densități peste 40 loc./km² (Ponoarele).

Cele peste 70 de sate ale podișului au mărimi diferite (fig. 58): 40% din numărul total al așezărilor au între 250 și 500 locuitori, 25%

între 100 și 250 locuitori, 23% între 500 și 1 000 locuitori, 7% au peste 1 000 locuitori etc. În partea estică a podișului au o largă răspindire satele cu un număr mic de locuitori (Șiroca 397 locuitori; Marga 163 locuitori; Păunești 360 locuitori; Ludu 121

locuitori; Băluța 171 locuitori; Brînzani 115 locuitori etc.), în timp ce la contactul cu muntele s-au dezvoltat și sate mai mari cuprinse între 500 și 1 000 locuitori (Balta 655 locuitori, Isverna 909 locuitori, Obîrșia Cloșani 871 locuitori etc.), altele care depășesc 1 000 locuitori (Podeni 1 131 locuitori). În acest teritoriu sînt localizate și sate foarte mici, formate din cîteva grupări de gospodării Giurgiani 104 locuitori; Delureni 97; Valea Ursului 110; Răiculești 120; Buicani 91 locuitori etc.). În general, satele mici sînt răspîndite pe pîrînișurile și pe interfluviile mai înalte din partea de nord și nord-est a podișului. Cele mai mari sate s-au dezvoltat în lungul văilor și la contactul dintre diferite regiuni, acolo unde condițiile fizico-și economico-geografice au fost mai favorabile vieții umane. Cele mai multe așezări rurale sînt dispuse pe văi și versanți însoriți (Nadanova, Isverna, Cernavîrf, Balta, Sfodea, Drăghești etc.), altele pe văi (Prejna, Giurgiani, Schitu Topolnicei etc.), pe culme și versant (Godeanu, Călineștii de Sus, Busești etc.), pe versanți (Gornovița, Marga, Pîrlage, Costești etc.) și mai puține pe culme (Păunești, Bîlvănești).

Distribuția „însirată” a majorității gospodăriilor sătenești a fost condiționată, în bună măsură, de văile adînci care fragmentează podișul, de liniile de contact dintre lunci și versanți înclinați, dintre bazinele de depresiune și relieful înalt. Dificultățile de circulație transversală din cauza fragmentării reliefului și concentrarea căilor de comunicație în lungul văilor au influențat în mare măsură distribuirea liniară a gospodăriilor la multe așezări. De aceea, cele mai multe sate au o formă liniară, unele dintre ele înșirate, în diferite locuri pe o lungime de 3 pînă la 5 km (Bahna, Ilovița, Balta, Podeni, Nadanova, etc.). Satele s-au extins în lungul rîurilor pe măsură ce s-au făcut despăduriri pentru construcții de mori, pive, locuințe sau culturi agricole. Așezările cu populația cea mai numeroasă (Balta, Costești, Prejna, Gornovița, Podeni, Gornenți etc.) s-au dezvoltat în bazinul Topolnicei și al Coșuștei, unde terenul este mult mai fertil în comparație cu alte locuri din Podișul Mehedinți. Spre deosebire de aceste locuri, unde s-au dezvoltat așezări mari și densitatea populației este ceva mai ridicată, în partea nordică-estică a podișului, în sectorul Dealului Mare, unde relieful este mult mai fragmentat și cu numeroase forme

carstice, satele sînt mici și densitatea populației scăzută. Aici, numai satele Gărdăneasa și Busești depășesc cu puțin 200 de locuitori, celelalte avînd un număr redus de locuitori (Băluța, Brînzani, Ludu, Răiculești etc.).

Satele cele mai mici se găsesc în locuri cu accesibilitate anevoioasă (Pîrlagele, Cernavîrf), pe văi strîmte (Firizu), pe umeri de terasă (Gornenți), pe fețe accidentate ale dealurilor (Biriacu, Turtaba, Valea Ursului) etc. La multe din ele se constată, îndeosebi în ultimele decenii, scăderi ale populației cu mult mai mari decît în satele situate în locuri mai puțin izolate (fig. 58).

În locurile largi, pe culmile netezite și pe versanții domoli (unde astăzi întîlnim numeroase sate, ca în bazinele Topolnicei și Coșuștei), cîndva se găseau numai locuințe cu folosire sezonieră (conace) ale locuitorilor din așezările situate la poala muntelui (Isverna, Săliște, Podeni, Gornenți etc.). Mulți locuitori din unele sate ale podișului (îndeosebi cele din sectorul vestic) au și astăzi a doua locuință — sălașul sau conacul — situată, în afara vetrei, în mijlocul unor petice de terenuri agricole. Aceste gospodării nu sînt prea departe de așezările permanente și permit o deplasare aproape zilnică a populației din sate la conace, unde cresc vite și cultivă terenul. Cele mai multe conace se află în hotarul satelor Balta, Isverna, Podeni, Godeanu, Obîrșia Cloșani, Motru Sec, Orzești etc. Se constată că multe familii din sat s-au fixat, cu timpul, definitiv la conac, unde și-au organizat gospodării permanente.

Cele mai multe locuințe cu folosire sezonieră (conace) sînt dispersate pe mari suprafețe între satele Balta, Mălărișca și Cireșu din Podișul Mehedinți, îndeosebi în terenurile cu fînețe și cultivate.

În general, în Podișul Mehedinți predomină tipul de sat răsirat, dezvoltat mai ales pe văi și în lungul drumurilor. Între gospodării sînt incluse suprafețe relativ mari de terenuri agricole (pomicole, fînețe, culturi cerealiere etc.). Puține sînt satele cu tendințe de adunare (Balta, Cireșu, Gornovița, Prejna, Costești etc.). Densitatea caselor în vatră este foarte mică la majoritatea satelor (4—6 case la hectar și chiar sub 4). Numai în Baia de Aramă, Balta, Podeni, Godeanu, Ilovița, Negrușa etc. se înregistrează o densitate mai mare a gospodăriilor în vatră.

3.7. Activitățile economice

Ocupația de bază a locuitorilor din satele Podișului Mehedinți este creșterea animalelor, cultura pomilor fructiferi și lucrul la pădure. Pădurile ocupă aproape 50% din suprafața podișului, iar pășunile și fânețele ocupă 54,3% din terenurile agricole extinzându-se pe mari suprafețe în toate așezările (fig. 60). Specificul economic, la cea mai mare parte a așeză-

rele-Mărășești, la cele de cărbune din bazinul Motrului, sau se ocupă cu fabricarea varului pe plan local în satele Dilbocița, Ponoarele, Motru Sec, Bunoaica, Nadanova etc.).

Sursele de trai ale multor locuitori din comunele Podeni, Ilovița, Cireșu, Isverna, Balta etc. sînt completate prin muncile sezoniere, pe care acestea le efectuează la pădure în centrele forestiere Matorăt, Olanu, Duhomna — Virciorova Veche (județul Mehedinți), Iardastița-Vale, Toplet (județul Caraș-Se-




Fig. 59. Aspect din partea centrală a Podișului Mehedinți, în apropiere de Păunești, la sud-vest de Cireșu (foto V. Sencu).

rilor omenesti, este dat de agricultură, completată de economia forestieră (fig. 59).

Terenurile agricole se extind pe aproape 45% din suprafața podișului (pomicole și mai puțin cele cerealiere). Creșterea animalelor (70% ovine și 18% cornute mari din totalul efectivului de animale) se practică prin păstorit sedentar, păstoritul local din hotarul satului și îndeosebi prin cel pendulator din ariile cu conace aflate în podiș sau în Munții Mehedinți din apropiere.

Creșterea vitelor, cultura cerealelor (limitată) și economia forestieră constituie principalele surse de venit ale locuitorilor. O parte din locuitori practică și diferite meșteșuguri (dogărie, zidărie, olărie etc.), iar unii lucrează la exploatarea de cupru de la Ponoa-

verin), Făget, Lipova (județul Arad) unde aceștia sînt folosiți la „fasonat cu drujba”, la „corhănit”, la „împingerea bustenilor cu țapinul” etc.

Asemănător acestor munci sezoniere sînt și cele pe care aceștia le efectuează la ferme agricole pentru cules porumb sau vie (în județul Caraș-Severin), la coasă, în Banat la Poiana Mărului, Ohaba Bistra, Tîrnova, Caransebeș, Teregoва etc.

Podișul Mehedinți constituie sub toate aspectele social-economice o regiune de tranziție, între economia montană din nord și vest și cea a Piemontului Getic din est. În general, după structura modului de folosință a terenului, se evidențiază caracterul pronunțat agrar al regiunii (fig. 60).




Fig. 60. Modul de folosință a terenului din Podișul Mehedinți. 1, Pădure; 2, tufăriș; 3, pajiște; 4, pajiște și culturi agricole; 5, vie; 6, livadă; 7, așezare; 8, drum; 9, hidrocentrala „Porțile de Fier”.

Pe teritoriul satelor: Obîrșia Cloșani, Go-deanu, Isverna, Seliște, Giurgiani, Gornenți, Podeni, Negrușa, predomină suprafețele împădurite, în proporție de peste 60%. Principalele bazine de exploatare forestieră, mai ales foioase, sînt Bahna și Coșuștea superioară,

unde tăierile de păduri sînt înlesnite de prezența drumurilor forestiere de pe văile Bahnei, Coșuștei și afluenților lor din amunte. Aceste bazine de exploatare forestieră sînt mari furnizoare de lemn pentru combinatul de prelucrare a lemnului și combinatul de celuloză

din Drobeta-Turnu Severin. Din terenurile acoperite cu păduri se valorifică fructele de pădure și alte produse: zmeură, mure, coarne, ciuperci, etc. cu largă întrebuințare în industria alimentară.

Pe terenurile arabile care ocupă 39% din terenurile agricole se cultivă grâu și porumb, dar producțiile medii sînt mici (650 — 700 kg/ha și respectiv 700 — 750 kg/ha) dar de pe terenurile cu fineață din luncile rîurilor se recoltează în medie 1 600 — 1 900 kg/ha. Alături de aceste culturi, în jurul conacelor și gospodăriilor din sat, se mai cultivă legume și cartofi pe 2,1% și respectiv 4,1% din terenurile împreună cu cele de pășuni ale satelor Obîrșia Cloșani, Isverna, Prejna, Costești, Gornenți, Podeni, Negrușa, Mălărișca etc. reprezintă principala bază furajeră pentru creșterea animalelor din regiune și chiar pentru cele din Cîmpia Blahniței (Cujmir, Salcia, Oprișor etc.) — care vin anual pentru pășunat în aceste locuri. Și în prezent suprafețele mari de pășuni și finețe din acest sector al podișului asigură dezvoltarea unei economii pastorale, cu vechi tradiții.


Căile de comunicații sînt slab dezvoltate. Excepție face drumul de interes județean Baia de Aramă — Ponoarele — Balta — Godeanu — Bîlvănești spre Drobeta-Turnu Severin, a cărui prezență are urmări pozitive atît asupra evoluției satelor, cît și asupra posibilităților de valorificare turistică a acestei regiuni carstice cu atracții naturale de însemnătate națională. Localizarea multor sate în condiții grele de relief (Valea Ursului, Cracu Muntelui, Buicani, Bîrșiacu, Băluța, Gornovița, Jupînești etc.) face ca legăturile, în unele ierni, să fie timp de 3 — 4 luni foarte greoaie.

Multitudinea obiectivelor turistice ale Podișului Mehedinți (obiective naturale, istorice

și sociale) reprezintă o parte a așa-numitei „regiuni turistice a Porților de Fier.” Partea nordică a Podișului Mehedinți este polarizată de orașul Baia de Aramă și comuna Ponoarele, situate în locuri cu legături ușoare și scurte spre obiectivele din apropiere. Aici se află complexul carstic de la Ponoarele, păduri cu liliac (Ponoare, Obîrșia Cloșani, Nadanova, Balta), unde se organizează sărbătoarea anuală a liliacului, o mare bogăție de elemente etnografice (tipuri tradiționale de locuințe, mori de apă, biserici, portul popular, obiceiurile etc.).

În arealul carstic din ulucul depresionar Baia de Aramă — Bahna se află podul natural de la Ponoarele, unicat european, lacul carstic Zăton, Peștera Ponoarele, Peștera Epuran, Peștera Topolnița (a doua ca mărime din țară) și inegalabilele chei ale Coșuștei și Topolniței.

Orașul Baia de Aramă se află pe valea Bulbei, într-o mică depresiune. Localitatea este semnalată încă din perioada domniei lui Mircea cel Bătrîn (sec. XIV) prin minele de aramă din împrejurimi. Poziția sa în cadrul podișului cu numeroasele atracții turistice din apropiere și din oraș (Bustul lui Tudor Vladimirescu, biserica monument istoric din 1699 — 1703 etc.) îi conferă calitatea de centru turistic. Populația orașului este de 5 604 locuitori (în 1992). Localitatea dispune doar de unități ale industriei locale (industria mică și artizanală) și de industria extractivă a cuprului, o îndeletnicire altădată înfloritoare. Valențele turistice ale orașului Baia de Aramă au crescut mult și prin posibilitățile ce le oferă în asigurarea „sejurului” pentru turiștii ce străbat podișul, urmare firească a distanțelor mici față de punctele de recepție. În acest sens, din anul 1983, s-a construit un han turistic care are o capacitate de 55 de locuri de cazare.



SUBCARPAȚII

4.1. Caracterele generale

4.1.1. Poziția și limitele

În gama largă a treptelor, regiunilor și tipurilor de relief, Subcarpații alcătuiesc un sistem morfologic aparte, cu poziție de tranziție între Carpați și celelalte unități din vorlandul acestora, avînd ca trăsătură principală asocierea depresiunilor largi, pe alocuri adevărate șesuri ce amintesc de cîmpii, cu masivele deluroase detașate parcă din relieful munților scunzi. Varietatea unică a reliefului a stimulat atenția cercetătorilor și continua preocupare de definire a conținutului geografic al sistemului subcarpatic, începînd chiar cu studiile de la începutul secolului (L. Mrazec, 1901; Emm. de Martonne, 1907; Gh. M. Murgoci, 1908), continuînd cu cele din deceniile următoare (M. David, 1932; N. Al. Rădulescu, 1937; N. Popp, 1939) și ajungînd la cele recente cuprinse fie în monografiile geomorfologice regionale (L. Badea, 1967 a; Al. Roșu, 1967; H. Grumăzescu, 1973; C. Brînduș, 1981), fie în studii mai restrînse de adîncire a cunoașterii anumitor aspecte (D. Bălțeanu, 1983). În prezent este unanim admis că Subcarpații alcătuiesc o unitate de relief distinctă, pericarpatică, a cărei fizionomie este dată de alternanța de dealuri și depresiuni corespunzînd unor structuri geologice neuniform tectonizate, o continuare periferică a structurii carpatice.

Urmărind raporturile dintre Subcarpați și Carpați se observă că acestea sînt relativ simple în cazul Subcarpaților Moldovei, unde migrația spre est a geosinclinalului carpatic a făcut ca avanfosa subcarpatică să cores-

pundă cu periferia estică a geosinclinalului, iar cutele să fie o continuitate recentă a celor din Carpați. Ca urmare, contactul Subcarpaților cu munții este dat de flancul estic, răsturnat, al cutelor flișului paleogen și corespund unei denivelări de 150—250 m, jalonată de un aliniament de localități: Vinători-Neamț, Agapia, Bălțătești, Almaș, Piatra Neamț, Tazlău, Moinești, Berzunți, Oituz.


Mult mai complicat este contactul structural cu Podișul Moldovei. Și aici caracterul acestei limite este impus tot de cadrul genetic respectiv. Formațiunile de molasă miocene ale avanfosei sînt revărsate peste planul de falii precarpatice de-a lungul căruia extremitatea vestică a soclului podișului este căzut în trepte sub depozitele avanfosei. Mascarea limitei tectonice a fost amplificată și de transgresiunea sarmatică care a înaintat peste cutele marginale ale molasei subcarpatice. Înălțarea ulterioară a întregului edificiu carpatic și subcarpatic a antrenat și aceste terminații vestice ale fundamentului platformei pe care le-a redresat într-o structură monoclinală accentuată. Ca urmare, diferența de altitudine dintre înălțimile aparținînd avanfosei precarpatice și cele din podiș, ca și existența culoarului larg al Siretului au permis fixarea limitei Subcarpaților pe latura vestică a respectivului culoar. Uneori, prezența formațiunilor sarmațiene a fost luată drept argument principal de includere a acestor înălțimi la Podișul Moldovei, dar sarmațianul de aici a fost supus evenimentelor tectonice specifice Subcarpaților și deformată odată cu ridicarea cutelor ascunse pe care se sprijină (V. Băcăuanu și colab., 1980). Este o situație de altfel asemănătoare cu cea din Subcarpații Pra-

hovei sau Subcarpații Getici, unde o mare parte a formațiunilor sedimentare tectonizate nu sînt decît o continuare a celor din regiunile exterioare.

La sud de valea Trotușului, în Subcarpații de la Curbură, flișul paleogen a înaintat peste miocenul subcarpatic, dar marginea acestuia înserisă în relief printr-o denivelare pronunțată oferă posibilitatea de trasare a limitei dintre munte și Subcarpați pe un

în domeniul subcarpatic a pîntenilor paleogeni (de Homoriciu și de Văleni). În același timp, însă, intercalarea cuvetelor miocene, între aceste prelungiri paleogene și contrastul structural și litologic pe care îl prezintă flișul cretacic carpatic, are darul de a evidenția foarte clar limita dintre cele două unități vecine pe aliniamentul localităților Chiojdu, Bătrîni, Cerașu, Măneciu, Petricea, Șotrile, Comarnic. Spre exterior, dea-

Fig. 61. Subcarpații și unitățile geografice vecine; 1, Dealuri subcarpatice; 2, arii depresionare; 3, unități muntoase; 4, unități piemontane și de podiș; 5, unități de cîmpie.



aliniaament marcat de localitățile Soveja, Tulnici, Nereju Mic. Spre exterior, contactul Subcarpaților cu Cîmpia Siretului își schimbă mult caracterele față de ceea ce este la nord de Trotuș. Contrastul mare de altitudine dintre dealurile Vrancei și Cîmpia Siretului diferențiază net cele două unități, dar limita dintre ele nu este atît de netă ca urmare a interpunerii glacisului Cîmpiei piemontane a Rimnicului (fig. 61).

Între Slănic și Buzău contactul își păstrează aceleași caractere, dar între Buzău și Prahova raporturile Subcarpaților cu Carpații sînt complicate prin pătrunderea

lurile cutate miocene vin în contact direct cu cîmpiile de subsidență ale Săratei și Gherghiței, astfel că limita este marcată de un abrupt.

La vest de Prahova, pînă la Dîmbovița, întregul complex al formațiunilor de fliș paleogen aparține domeniului subcarpatic și se extinde mult spre nord, așternîndu-se și peste latura sudică a depozitelor cretaceice, pe care pînă acum le găsisem numai în Carpați.

Contactul cu cîmpia piemontană este ceva mai complicat prin înaintarea spre nord a cîmpiilor subcolinare ale Prahovei și

Ialomiței, asemenea unor golfuri, ceea ce dă un caracter mai sinuos limitei respective, care rămâne, totuși, tranșantă.

La vest de Dimbovița, Subcarpații Getici vin în contact direct cu masivele muntoase cristaline, iar formațiunile sedimentare din care sînt constituiți nu mai aparțin geosinclinalului carpatic, ci Depresiunii Getice, apărută de-a lungul marginii Carpaților Meridionali ca urmare a afundării laturii lor sudice și a căderii părții nordice a Platformei Moesice în fața orogenului carpatic. Sedimentarea acestei depresiuni a avut un caracter unitar și numai evoluția ulterioară, cu tectonizarea laturii dinspre Carpați a putut să detașeze Subcarpații de Piemontul Getic de la sud. De aici rezultă că structura subcarpatică nu mai apare ca o continuitate periferică a celei montane, ci este rezultatul ecoului indirect prin care înălțările tectonice recente ale Carpaților s-au făcut simțite pe latura sedimentară vecină a Depresiunii Getice. Dar, și în cazul Subcarpaților Getici, raporturile cu unitățile vecine sînt departe de a fi uniforme. Din acest punct de vedere se disting cel puțin trei sectoare diferite. Între Dimbovița și Topolog formațiunile sedimentare se sprijină direct pe cristalinelul carpatic, vechiul plan de talii marginale fiind, cu unele excepții (Depresiunea Cimpulung Muscel, Depresiunea Nucșoara), inactiv. De aceea, contactul este mai mult de natură litologică decît tectonică și corespunde șirului de depresiuni de eroziune Brădet, Aref, Sălătruc. Structura dominant monoclinală a formațiunilor sedimentare explică și slaba delimitare a mușcelor față de podișul din sud, trecerea fiind numai de natură morfologică. Singura excepție o reprezintă sectorul Cimpulungului, unde ridicarea Masivului Iezer-Păpușa și reactivarea faliei marginale carpatice a creat condiții pentru o tectonizare a depozitelor paleogen-miocene. În regiunea Oltului, raportul dintre Subcarpați și munți se menține aproximativ asemănător. Ca urmare, contactul dintre cele două unități este marcat tot de depresiuni de eroziune diferențială, ca: Jiblea-Călimănești, Muereasca, Băile Olănești, Cheia. Aici apare, însă, fenomenul de tectonizare prin diapirism care a amplificat structurile și le-a dat un caracter tipic subcarpatic, fără însă a detașa net unitatea respectivă de piemontul din sud.

La vest de Bistrița Vilcii, raportul Subcarpaților cu Carpații capătă alte caractere puse în evidență de existența ulucului de

presionar subcarpatic, ceea ce a dus la o foarte clară delimitare a celor două unități. În schimb, raportul cu piemontul de la sud rămîne la fel de șters, marcat de largiri de eroziune, dovedind apartenența genetică a ambelor unități la aceeași mare regiune pericarpatică (fig. 61).

4.1.2. Alcătuirea geologică, geneza și evoluția reliefului

Avanfosa Precarpatică, conturată încă de la începutul terțiarului, a jucat fie rolul unui spațiu de acumulare și migrare spre est a geosinclinalului carpatic, ca în cazul Subcarpaților Moldovei și în parte a celor de la Curbură, fie pe acela numai de bazin de depunere ca în cazul Subcarpaților Getici. În primul caz, depozitele avansei au fost asociate într-o masă structurală unitară cu a Carpaților, pe cînd în cel de-al doilea caz, frământările tectonice din munți s-au reflectat numai indirect și mai tîrziu, abstracție făcînd unele accidente structurale mai vechi (ca Dealul Mățău, Dealul Săcelului).

Prezența într-un sondaj de adîncime, la Stilpeni, în afara limitei sudice a Subcarpaților, a unor formațiuni cretacice de natură flișoidă și a unor accidente structurale demonstrează continuarea orogenului carpatic în acest compartiment scufundat și acoperirea lui cu formațiuni paleogene, prezente pe latura nordică a Depresiunii Getice și pe elina sudică a Coziei.

Mai puțin clar apare începutul conturării Avansei Precarpatice aparținînd Subcarpaților Orientali, dar se pare că este sincron cu individualizarea unității de Tarcău, către sfîrșitul paleogenului. Depozitele eocene (strate de Biserici și gresii de Lucăcești) și oligocene (sisturi disodilice și gresie de Kliwa) se întîlnesc pe latura estică a avansei în culmile Pleșului și Pietriciciei, numai sub forma unor blocuri, ceea ce arată că prezența lor aici este legată de șariajul conglomeratelor miocene în care au fost prinse. În timpul orogenezei s-a produs o înălțare generală a Depresiunii Getice, ceea ce s-a materializat și printr-o regresiune și instalarea unui regim lagunar în care s-au depus gresii și marne cu gips, corespondente saliferului inferior din Subcarpații Orientali. În avanfosa Subcarpaților Orientali, molasa miocenă se continuă cu saliferul inferior reprezentat prin breccii argiloase cu intercalații de sare gemă, argile cu gips. Masivele de sare de la Băltătești, Tazlău, Tirgu Ocna

constituiau o dovadă a prezenței formațiunilor respective. Această largă răspindire a depozitelor salifere dovedește existența unui foarte extins regim lagunar, consecință a aceleiași orogeneze savice care și aici a înălțat întregul edificiu depresionar (fig. 62).

Conglomeratele și gresiile burdigaliene marchează o puternică transgresiune atît în Depresiunea Getică (mai ales în partea estică, cu maximum de extensiune în regiunea Rîului Doamnei), cît și în avanfosa Subcarpaților Orientali, unde conglomeratele din axul anticlinalelor Pleșului și Pietricicăi conțin fragmente remaniate de șisturi verzi, o dovadă concretă a existenței, în apropiere, pe fundul Depresiunii Precarpatice, a cordilierelor de șisturi verzi în continuitatea celor din Dobrogea (fig. 62 A, B, C).

Linia care a urmat după această transgresiune a permis ca, în continuare, în Depresiunea Getică conglomeratele să treacă treptat în gresii și marno-argile helvețiene, iar în avanfosa Subcarpaților Orientali să se depună pachete foarte groase (pînă la 2 000 m) de gresii în alternanță cu nisipuri. Amploarea răspîndirii acestui etaj în Subcarpații Orientali este demonstrată și de faptul că el formează umplutura de suprafață a sinclinalelor atît în Subcarpații Moldovei, cît și în cei ai Vrancei (fig. 62 C, D). La vest de valea Buzăului, helvețianul apare îndeosebi în axele cutelor diapire subcarpatice.

Regimul de liniște din helvețian pare a se fi continuat și la începuturile tortonianului, fapt ce a permis depunerea unui orizont de marne și tufuri dacitice, răspîndit mai ales în regiunea Oltului. Apariția tufurilor este dovada unei activități vulcanice, iar răspîndirea lor în regiunea Oltului și la Curbură vine să argumenteze legătura mării extracarpatice cu Bazinul Transilvaniei (D. Ciupagea, M. Paucă, Tr. Ichim, 1970). Acestui mediu marin i-a urmat unul lagunar, ceea ce a permis depunerea saliferului superior (reprezentat în general prin brecii, gresii calcaroase, gipsuri, marne etc.), care stă la baza masivelor de sare din Moldova, a simburilor de diapire din Subcarpații Buzăului, Prahovei, Ialomiței, ca și a structurilor din regiunea Oltului sau mai la vest (Săcelu). Apariția mediului lagunar, către tortonianul mediu, a fost consecința înălțărilor din timpul orogenezei stirice tirzii, care a dus la schițarea unora din cutele subcarpatice. Concomitent, prin aceeași înălțare, apele din avanfosa Subcarpaților Mol-

dovei au fost împinse spre platforma din est și la sud de falia Trotușului, deschizîndu-se cu aceasta ciclul schițării cutelor subcarpatice și a depunerii molasei exterioare (sau superioare în cazul Subcarpaților de la Curbură și a celor Getici). A urmat transgresiunea sarmațiană care la nord de valea Trotușului a pătruns în domeniul subcarpatic numai izolat pe culoarele de astăzi ale marilor văi. În schimb, în sud și mai ales la vest de valea Rîmnei, formațiunile acestui etaj se extind mult către munte, ajungînd în Subcarpații Olteniei pînă pe prisma carpatică (fig. 62 A).

Diversitatea de facies a depozitelor sarmatice este consecință atît a poziției lor morfologice, cît și a frământărilor tectonice din orogenezele moldavă și attică. În Subcarpații Getici se observă un sarmațian inferior alcătuit din brecii, marne nisipoase, nisipuri și pietrișuri bine cimentate, cu blocuri rulate. Pe alocuri, în jurul unor înălțimi ele sînt înlocuite cu calcare recifale (Schela). În continuare urmează formațiuni (basarabian superior—kersonian), alcătuite predominant din nisipuri, pietrișuri, conglomerate etc. La contactul cu muntele acestea capătă o dezvoltare mare, avînd un caracter transgresiv, pentru ca spre sud, locul lor să fie luat, treptat, de nisipuri cu intercalații de marne albicioase. În anticlinalul Săcel—Tîrgu Jiu (ca și în Subcarpații Vîlcii), sarmațianul inferior are un caracter recifal ce trece apoi în nisipuri și marne cu intercalații de concrețiuni grezoase.

În avanfosa orientală, la sud de valea Trotușului, sarmațianul este reprezentat spre exterior prin marne sau nisipuri și prin pietrișuri către munte. Pe cutele schițate apar calcare organogene, care, la rîndul lor, sînt acoperite de conglomerate și calcare oolitice (Dealul Ciolanu, Dealul Istriței etc.). A doua parte a sarmațianului corespunde cu o transgresiune (mișcările attic), ale cărei depozite oculesc cutele anticlinale, dar umplu frecvent cuvetele și sinclinalale.

Evenimentele orogenice moldave au fost determinante pentru edificarea Subcarpaților. Se presupune că din această fază, pentru Subcarpații Moldovei și latura internă a Vrancei, a început ciclul continental de sculptare a reliefului subcarpatic. Eroziunea puternică exercitată de riurile carpatice a avut ca efect depunerea unei întinse cuverturi de prundișuri din Carpați și pînă în Podișul Moldovei (M. David, 1932), formînd un întins piemont sarmatic (C. Martiniuc,




Fig. 62. Profile morfostructurale transversale prin Subcarpații. A, în Subcarpații Gorjului; B, în Subcarpații Buzăului; C, în Subcarpații Vrancei; D, în Subcarpații Tazlăului. 1, Pleistocen; 2, romanian; 3, dacian; 4, pontian; 5, meofian; 6, sațnațian (a), basarabian-meofian (b); 7, helvețian; 8, burdigalian; 9, flis paleogen; 10, flis crețacic; 11, micașisturi; 12, gnaise; 13, falii.

1946). La vest de valea Buzăului caracterul structural s-a complicat prin accentuarea cutelor paleogene și prin schițarea boltirilor (uncle diapire), ceea ce a permis instalarea unor recifi sau depuneri grosiere. Apare astfel frecvent un relief insular înconjurat de apele sarmatice care invadaseră cuvetele. Dincolo de Argeș, marea sarmatică și-a împins țărmurile spre marginea munților, acoperind cu sedimente groase relieful anterior format. Excepție fac aici cutele anticlinale ușor schițate din Subcarpații Getici (Slătioara, Ciocadia, Săcelu). Materialul vulcanic (blocurile andezitice) din sarmațianul Vrancei dovedește continuarea activității vulcanice din Carpați sau poate chiar a unor erupții locale ale căror urme nu s-au mai păstrat până astăzi.

Formațiunile pliocene care au urmat perioadei atât de agitată tectonic din timpurile miocenului trădează, în general, o mare liniște. Astfel, meotianul, prin depozitele sale din argile, indică un regim de apă liniștită, dulce, care va deveni pentru un timp salmastră (cu depuneri de gresii și calcare) apoi, din nou, dulceol. Depozitele respective sînt dispuse într-un vast monoclin pe latura externă a Subcarpaților Vrancei, în cuvete și pe flancurile anticlinalelor din Subcarpații Buzăului, Prahovei, Ialomiței și din Subcarpații Olteniei, sau în continuitatea sarmațianului pe monoclinul Muscelor. Aceeași litologie dominant marno-argilooasă alcătuiește succesiv și restul depozitelor pliocenului mediu și superior, numai că limita lor nordică s-a depărtat treptat de Carpați.

Odată cu sfîrșitul pliocenului și începutul cuaternarului se fac simțite mișcările valahe prin ridicarea masivelor muntoase, paralel cu reactivarea unor vechi fracturi și accentuarea structurilor din Subcarpați. Dar efectul cel mai important al acestui eveniment tectonic îl constituie înviorarea puternică a eroziunii care avea să ducă la formarea cuverturii piemontane din Vrancea pînă dincolo de valea Motrului. Latura externă a Subcarpaților Vrancei s-a înălțat puternic, ducînd pietrișurile piemontane la aproape 1 000 m altitudine absolută. Amploarea depunerilor va dura mult timp, paralel cu accentuarea și înălțarea cutelor subcarpatice în care sînt incluse și pietrișurile de Cîndești. Acum a avut loc cea mai puternică ridicare în bloc a Carpaților și căderea de-a lungul fracturii marginale a molasei subcarpatice, implicit amplificarea structurilor

subcarpatice. Prin reactivarea sistemelor de falii au fost puse în evidență areale de subsidență, iar unde acestea au rămas sudate (în cazul Muscelor, în partea externă a Subcarpaților Vrancei) molasa a făcut corp comun fie cu bordura montană, fie cu partea internă a Subcarpaților. Ca urmare, în locul unei structuri de cute evidente, în acest caz apar slabe tendințe de ondulare a unui monoclin ce a resimțit tectonizarea carpatică mai degrabă printr-o redresare, pe alocuri pînă la verticală, a stratelor și apariția unor fracturi locale (Corbi—Nucșoara, Brădet).

Cu aceste evenimente tectonice mult diversificate regional, începe o nouă fază de denudare puternică, stimulată de diferența de altitudine creată între Subcarpații înălțați și ariile de vorland, ca și de apariția unor areale de subsidență. Denudarea va duce în final la exhumarea reliefului de sub cuvertura piemontană și, concomitent, la remanierea depozitelor în partea periferică a piemonturilor încă în formare (L. Badea, 1983). În general, se poate presupune că această situație corespunde și primei modificări majore a configurației rețelei de văi. De la orientarea dominant consecventă și transversală structurii subcarpatice văile au căpătat un caracter mixt cu sectoare de cursuri subsecvente, longitudinale, urmînd mai ales sinclinalele depresionare (Motru, Gilort, Olteț, Luncavăț, Bistrița etc.). Accentuarea subsidenței din Cîmpia Siretului și adîncirea permanentă a unor riuri majore, transversale, ca Bistrița, Trotuș, Putna, Buzău, favorizează dezvoltarea cursurilor longitudinale, subordonate acestora care drenează depresiunile subcarpatice: Cracău, Tazlău, Cașin, Năruja, Zăbala, Nișcov, Cricovu Sărat etc.

Retragerea lacului cuaternar și coborîrea nivelului de bază au creat condiții pentru înaintarea regresivă a obîrșiei riurilor din Piemontul Getic și captarea unor cursuri longitudinale subcarpatice (Cerna, Tăria, Olteț, Gilort, Bistrița, probabil Teleajen etc.), impunînd rețelei hidrografice adîncirea pe direcțiile actuale. Ca urmare, în nivelul inițial al depresiunilor, rămas suspendat ca o treaptă înaltă, sînt săpate terase, ajungîndu-se la apariția actualei trepte joase a depresiunilor și culoarelor de vale.

Depresiunea precarpatică, cadrul genetic al Subcarpaților, a funcționat, pînă la exondare, ca un vast domeniu de acumulare a molasei, ceea ce a creat condiții pentru

formarea unor importante zăcămintе, pe cît de variate, pe atît de larg răsîndite. Dacă în cazul minereurilor nu avem de-a face decît cu existența unor lentile și cuiburi de zăcămintе de sulf la Pucioasa (judetul Dîmbovița) în formațiuni paleogene și la Vărbilău (judetul Prahova) în depozite miocene, cu totul alta este situația în privința combustibililor minerali. Aici se găsesc cele mai importante zăcămintе de petrol și gaze din țară, prezente în aproape toate formațiunile molasei, începînd cu oligocenul și încheind cu pliocenul, cu maximum de extensiune în meotian.

Corelația dintre cele mai bogate zăcămintе și structurile diapire permit conturarea unor aliniamente începînd din zona internă (cu diapirism accentuat), către cea externă (cu diapirism incipient): Buștenari — Runcu, Cîmpina, Ocnița, Berca — Arbănași, urmează apoi aliniamentul: Boldești, Podenii Vechi, Țintea, Moreni; urmat de: Sărata, Ceptura, Urlați; sau și mai în exterior: Brazi, Mănești — Vlădeni. Acestor structuri asociate diapirismului se adaugă cele din Subcarpații Getici: Băbeni (Vilcea); Țicleni, Bîlteni, Brădiceni etc. (Gorj).

Nu mai puțin importante sînt zăcămintele de cărbuni, care, deși sînt reprezentate prin cărbuni inferiori (lignit), prin extensiunea lor se înscriu în economia țării ca o resursă de mare importanță energetică. Răsîndirea lor este strîns legată de depozitele sedimentare aparținînd pliocenului superior, în strate intercalate cu grosimi diferite. Reținem în acest sens zăcămintele de la Tismana, Rovinari, Cucești, Albani, Berbești, Golești. La est de Dîmbovița, deși mai restrîns, zăcămintele de lignit apar mai ales în bazinul Pucioasa, Șotînga, Filipăștii de Pădure și la Ceptura. Gama resurselor subsolului este completată de zăcămintele de sare (Băltătești, Borlești, Tazlău, Valea Sării, Minzălești — Lopătari, Slănic, Ocele Mari, Govora), de gips (Cerașu, Măneciu-Ungureni, Poiana Vărbilău, Stănești — Corbeni etc.), izvoare sulfuroase (Pucioasa, Govora), diatomită (Pătîrlage) etc.

4.1.3. Aspectele orografice și diviziunile regionale

Prin caracterile mai ales de ordin genetic (natura rocilor, vîrsta, stilul tectonic) ce țin de continuitatea structurilor carpatice în cel mai nou val orogenic sau numai de reflec-

țarea lor în relief, Subcarpații au fost divizați în două unități mari: Subcarpații Orientali și Subcarpații Getici, separate de valea Dîmboviței. Dar diferențierile în egală măsură tectonice, de evoluție și mai ales morfologice, în care este implicată reflectarea în relief a constituției geologice, stadiul de modelare și funcționalitatea formelor de relief (cu deosebire asociațiilor de forme) au determinat individualizarea a trei unități: Subcarpații Getici, Subcarpații de la Curbură și Subcarpații Moldovei.

A. Subcarpații Getici, situați între Dîmbovița și Motru, corespund părții nordice mai mult sau mai puțin tectonizate a Depresiunii Getice. În funcție de gradul de tectonizare, de exprimarea mai mult sau mai puțin clară a structurii în relief, ea și de raporturile cu unitatea muntoasă se pot separa trei diviziuni geografice: Subcarpații Gorjului, Subcarpații Vîlcii și Muscelele Arieșului.

Subcarpații Gorjului, situați între Motru și Oltet, se caracterizează prin modul relativ uniform de asociere și de dispunere a dealurilor și depresiunilor pe aliniamente paralele cu marginea Carpaților, prin corespondența reliefului cu marile linii structurale. Falia marginală carpatică, reactivată în pliocen și cuaternar, se reflectă în relief printr-un evident abrupt tectonic ca limită între munți și Subcarpați și a contribuit la accentuarea sinclinalului corespunzător depresiunii de sub munte. Cutele dinspre Olt, înmănunchate în Măgura Slătioarei, se desfac în apropierea Gilortului, sub forma a trei linii structurale. Aceste cute se atenuază treptat spre vest pînă la dispariție în apropierea văii Motrului, fapt ce se reflectă și în diminuarea altitudinii reliefului.

Evoluția Subcarpaților Gorjului s-a desfășurat sub influența ariilor neotectonice regionale, corespunzătoare bombării axiale din Măgura Slătioarei și subsidenței din Depresiunea Tîrgu Jiu. Depresiunea de sub munte este dominată de abruptul muntelui, contrastînd cu netezimea vetrei depresiunilor, cu excepția porțiunii dintre Gilort și Jiu, unde predomină gruiurile piemontane prelungi. Primul șir al dealurilor (de la est la vest, dealurile Seciului 598 m; Miței 543 m, Ciocadiei 417 m, Dealul Tîrgului 348 m, Dealurile Brădicenilor 377 m, Dealul Sporești 404 m) delimitează tot atît de clar, spre nord, ulucul depresionar intracolinar Cărbunești — Scoarța — Tîrgu Jiu — Cilnic, fără a putea spune același lucru de al doilea șir




Fig. 63. Depresiunea Celeiului la Padeș, în extremitatea vestică a Subcarpaților Gorjului (foto V. Sencu).

de dealuri subcarpatice (Dealul lui Bran 333 m, Dealul Șomănești sau Vîrțu).

Depresiunea Subcarpatică are altitudini care cresc în general de la vest (200 m) spre est (400 m). Datorită lărgirii văilor actuale, adîncite în treapta inițială a ulucului depresionar, a apărut o serie de depresiuni secundare locale: Celci, Tismana, Peștișani, Rânceu, Stănești, Bumbesci, Cărpiniș, Novaci (fig. 63).

Dealurile subcarpatice interne sînt mult mai joase la vest de Jiu decît la est. Acestea din urmă formează un adevărat masiv deluros unitar (străbătut de văi strîmte), iar cele din vest, cu excepția Dealului Sporești și Dealului Negoști, sînt fărîmîțate și despărțite de văi largi, adevărate culcare depresionare. Deformările teraselor (pe Gilort, Jiu, Bistrița și Tismana) la traversarea acestui șir de dealuri, precum și caracterul de

antecedentă al celorlalte văi mai mici (Amaradia, Blahnița etc.) trădează existența unor mișcări tectonice de înălțare pleistocene și holocene.

Ulucul depresionar intercolinar prezintă la rîndul său două trepte: una înaltă, corespunzătoare șeilor alcătuită din vechile albiu, parțial longitudinală, ale rîurilor principale, iar cea joasă, actuală, se confundă cu luncele și terasele inferioare ale acestor rîuri.

Al doilea șir al dealurilor subcarpatice (externe) sînt reprezentate prin Dealul Bran, cu altitudine absolută de numai 333 m, și Dealul Șomăneștilor, ambele retezate de eroziunea fluvială cuaternară și recent înălțate.

Subcarpații Vileii, desfășurați între Olteț și Topolog, reprezintă partea cea mai complicată structural și cea mai variată morfologic din întreaga unitate a Subcarpaților Getici. În afară de repartitia structurii cutate (pînă la cîte diapire) și a unui contact cu munții mai variat, însăși evoluția cuaternară — dependentă în întregime de nivelul de bază dat de Olt și de manifestarea diferențiată a neotectonicii (L. Badea, D. Bălțeanu, 1978), cu foarte importante remanieri ale rețelei de văi (L. Badea, 1967) —, a decurs în condiții diferite. Faptul se reflectă în îmbinarea caracterelor de muscele (între Topolog și Rîul Olănești) cu cele de dealuri subcarpatice propriu-zise, înscrise pe structură cutată. Deși există o întreagă rețea de depresiuni dispersate între dealuri, se observă, totuși, anumite culoare (condiționate în primul rînd litologic), despărțite de șiruri de dealuri, înscrise pe roci mai rezistente.

Între Rîul Olănești și Topolog, la contactul cu muntele, apare culoarul depresionar Băile Olănești—Muereasca—Călimănești—Berislăvești—Sălătruc. La vest de Rîul Olănești, culmile carpatice se continuă spre sud cu cele subcarpatice și numai la vest de Bistrița Vileii se desfășoară depresiunea subcarpatică propriu-zisă de contact și de natură tectonică. Dealurile de la sud se înscriu în aliniamente, în conformitate cu fișile de formațiuni dispuse mai mult sau mai puțin paralele cu marginea munților. Gradul de prelucrare și varietatea reliefului sînt mai pronunțate decît în Muscele și cu toate că ariile depresionare nu sînt precis conturate (mai ales prin lărgirea considerabilă a văilor convergente către Olt), se pun în evidență suficient de clar două, chiar trei aliniamente de lărgiri și șei cu aceeași orien-

tare generală est—vest. Complicațiile morfologice sînt și de natură tectonică pentru că acestea sînt evident înscrise în relief: culele cu sare din sectorul Oțele Mari—Govora, anticlinahul Măgurii Slăticiara, aria de afundare Băbeni etc. Latura sudică a dealurilor subcarpatice de la vest de Olănești se înscrie pe o structură monoclină foarte bine scoasă în relief de aliniamentele de cîeste diminuate treptat de la nord la sud, pe măsura apropierii de marginea piemontului.

Muscelele Argeșului, cuprinse între Topolog și Dîmbovița, se înscriu predominant pe formațiuni monoclinale paleogene și miocene, dar sînt departe de a avea un relief uniform. În partea de est, la contactul cu muntele, se înscrie depresiunea Cîmpulung—Bughea—Brăția, apoi un șir de dealuri paralele cu muntele ce urmăresc un anticlinal miocen: Mățău (1 017 m), Ciuha (750 m) și Ciocanu (885 m), cu caracter tipic subcarpatice. La vest de valea Brăției se desfășoară muscelele propriu-zise. Pragul de conglomerate burdigaliene, marcat de înălțimi deluroase de peste 900 m (Piscul Măgurii, Muchea Pleșilor), se interpoaze între Depresiunea Cîmpulungului (ca un adevărat pînten prelungit din Carpați) și muscelele subcarpatice din vest. În sudul acestui prag, depresiunile Berevoești, Slănic alcătuiesc capătul estic al „Culoarului celor șapte muscele” (V. Mihăilescu, 1966), ce se află între Subcarpați în nord și Piemontul Cîndești și Gruierile Argeșului în sud. Mai la vest, culoarul se continuă la altitudini de 400—600 m (pe șei) cu depresiunile Domnești, Mușătești, Curtea de Argeș, dominate către sud de un aliniament de cîeste.

Între acest culoar și șirul de depresiuni formate la contactul cu muntele (Nucșoara pe Rîul Doamnei, Brădet pe Vîlsan, Arcu pe Argeș și Sălătruc pe Topolog) apare un aliniament de înălțimi deluroase, despărțite unele de altele de văile amintite: Toaca 897 m (între Rîul Doamnei și Vîlsan), Chi-ciura 1 218 m (între Vîlsan și Argeș) și Dealul Tamaș 1 103 m — Dealul Cioara 1 043 m (între Argeș și Topolog). De remarcă că în partea centrală a acestor dealuri apare încă un aliniament de lărgiri care formează un șir median de depresiuni în cadrul Muscelor (Corbi, Brăduleț, Oești, Cicănești, Șuici).

B. Subcarpații de la Curbură, situați într-o regiune cu intensitate mare a manifestărilor neotectonice în vecinătatea ariei de afundare din nord-estul Cîmpiei Române și cu o complexitate geologică accentuată, oferă un

peisaj geomorfologic divers și mai complicat. Contactul direct cu Cimpia Siretului accentuează diferența de nivel și individualitatea acestui relief subcarpatic. Aici se asociază mai multe fragmente de ulucuri depresionare și șiruri de dealuri intercalate, dispuse paralel. În general, cele interne, de lângă munte, sînt mai vechi (miocene, paleogene și chiar cretacice), iar cele externe mio-pliocene. Se remarcă apoi o fragmentare transversală accentuată, urmare directă a mișcărilor de subsidență din cîmpie și a înălțărilor din Carpați. La creșterea gradului de complexitate morfologică un rol important îl are apariția diapirismului și pătrunderea flișului carpatic în molasa neogenă. Diferențierile morfologice mari permit individualizarea a trei subunități: Subcarpații Prahovei, Subcarpații Buzăului și Subcarpații Vrancei.

Subcarpații Prahovei vin în contact cu formațiunile cretacice carpatice și prezintă o anumită zonalitate morfostructurală. În nord, o fișie de întrepătrundere a formațiunilor neozoice cu cele cretacice pe care se înscrie un șir de largiri și mici depresiuni submontane (Bărbulețu, Rîul Alb, Pietroșița, Bezdead, Breaza, Brebu, Aluniș, Slănic), ca și dealurile de la sud (Bărbulețu 860 m și Comani 846 m; Dealul Giurcului 840 m; Mercani 749 m; Sultanu 849 m; Măceșu 815 m). La sud, urmează o fișie paleogen—miocenă care corespunde cu depresiunile Pietrari, Vulcana, Pucioasa, Vișnești, Brebu, Cosminele, Vălenii de Munte, dominate de alt șir de masive deluroase: Dealul Stînii 693 m; Malurii 615 m; Plaiul Roncii 645 m; Măgura 654 m. Aceasta se continuă cu o fișie miocen—pliocenă pe care se înscrie un alt șir de depresiuni și largiri ca cele de la Glodeni, Ocița, Valea Lungă, Cimpina, Cosminele, Vilcănești, Mislea, Podeni. În sud ele sînt dominate de culmi deluroase scunde, unele prelungi, cu înălțimi sub 600 m, dar care se individualizează foarte clar: Dealurile Ociței, Dealurile Filipeștilor, Dealurile Doftăneștilor, Dealurile Bucovului. Foarte bine se conturează ulucul Mislea—Podeni (conturat la est în Subcarpații Buzăului spre Singeru), limitat de măgurile izolate de la nord de Băicoi, Tîntea și Păulești și de Dealurile Bucovului.

Subcarpații Buzăului reprezintă sectorul cel mai dezvoltat și puternic tectonizat ca și Subcarpații Prahovei. Complexitatea sa este consecința pătrunderii în domeniul subcar-

patic a flișului paleogen (prin pîntenii de Homorîciu și de Văleni, între care se intercalează cuvete miocene), apariției cutelor diapire și accentuării varietății litologice în care rocile mai rezistente (conglomerate, calcare) dau masivitate formelor principale. Alternanța lăsarilor și bombărilor axiale ale cutelor amplifică complexitatea morfologică și, mai mult ca în altă parte a Subcarpaților, apar inversiuni de relief. Deși paralelismul depresiunilor și dealurilor cu marginea munților se păstrează, dispunerea lor în șiruri continue este, totuși, mai puțin evidentă. În plus, pătrunderea flișului paleogen face să apară o fișie de interferență între Carpați și Subcarpați, caracterizată prin prezența unor cute strînse și o masivitate pronunțată a reliefului (L. Badea, Gh. Niculescu, 1964; Gh. Niculescu, 1971, 1974).

Între Teleajen și Slănicul Buzăului se disting trei fișii morfostructurale, foarte clar exprimate chiar în caracterele de detaliu ale reliefului (L. Badea, Gh. Niculescu, 1964). Către munte, la vest de Buzău, se pune în evidență modul de pătrundere a flișului paleogen și separarea pîntenului de Văleni de Munte prin Depresiunea Draja—Chiojd. Mai la sud urmează fișa structurilor mio-pliocene, extinsă mult spre sud și dedublăată la vest de Buzău prin culmea Istriței care închide spre sud depresiunile Singerului și Nișcovului, aparținînd de cea de a treia fișie, aceea a structurilor pliocene, în care raporturile dintre structură și formele principale sînt mai clar exprimate.

Subcarpații Vrancei se întind între Slănicul Buzăului și Trotuș. Latura lor internă este constituită din formațiuni miocene cutate iar cea externă din depozite sarmato-pliocene dispuse monocinal, la care se adaugă pietrișurile fluvio-lacustre villafranchiene. Lipsa unei structuri cutate în latura externă a îndemnat pe unii autori să pună sub semnul întrebării includerea ei la Subcarpați, dar deranjarea tectonică a sedimentelor (ajunse pînă la o poziție aproape verticală), exprimată în relief prin înălțimi ca Măgura Odobeștilor, nu este în favoarea unei astfel de interpretări. În general, și aici ies în evidență foarte bine treptele de relief corespunzătoare a două faze de evoluție specifice Subcarpaților. Prima corespunde formării ulucului depresionar înalt (500—700 m), la contactul cu flișul paleogen. A doua este reprezentată prin sculptarea șirului de depresiuni Soveja, Năruja, Nereju, în cuprinsul ulucului. În nord și sud (unde sînt loca-

izate depresiunile Soveja și Nereju) dimensiunile ulucului sînt restrinse la 5—6 km. În partea centrală, adică în Depresiunea Vrancei propriu-zisă, corespunzătoare bazinei Putnei, eroziunea a înlăturat în mare parte depozitele de flis, lărgind depresiunea pînă la 8—10 km. La est de aceste depresiuni se desfășoară primul șir de dealuri subcarpatice a căror complexitate este datorată atașării la culele miocene, strînse, a monoclinului sarmato-pliocen ce alcătuiește întreaga parte externă a Subcarpaților Vrancei (H. Grumăzescu, 1973). Ca urmare, în vest vom întîlni un aliniament de dealuri corespunzătoare unei structuri cutate (aparținînd frecvent unor sinclinale suspendate) — Răchitașul Mare 867 m, Răchitașul Mic 892 m, Ghergheleu 849 m, Răiuț 960 m, Gurbăneasa 923 m, Gîrbova 979 m, Roșu 944 m — dublate spre est de înălțimile dezvoltate pe structură monoclină: Scaune 766 m, Dealul Hagiului 650 m, Virful Lacului 824 m. Mai la est apare al doilea culoar depresionar (depresiunile Cimpuri, Vidra, Mera, Dumitrești) cu altitudini de 500—650 m, săpat în strate monoclinale. Datorită fragmentării, dominant transversale a apărut o adevărată succesiune de culmi perpendiculare pe direcția culoarului depresionar. Șirul de înălțimi estice (Momîia 630 m, Măgura Odobesti 996 m, Deleanu 694 m) sînt tivite de un întins glacis ce se pierde treptat în cîmpie.

C. Subcarpații Moldovei, alcătuiți de roci miocene, se înfățișează într-o varietate morfologică mai accentuată numai în partea sudică, adică acolo unde la structura miocenă se adaugă unele petice pliocene. Structura subcarpatică miocenă se continuă și la nord de valea Moldovei sub sarmațianul monoclin al Podișului Sucevei, dar într-o fișie mult prea îngustă și fără efecte în relief. De aceea, valea Moldovei este luată ca limită de nord a reliefului subcarpatice. Spre sud, limita acestei unități este considerată valea Trotușului, cu toate că Depresiunea Cașinului este sculptată pe dreapta Trotușului în dauna Subcarpaților Vrancei. Această parte a Subcarpaților are un relief mult mai simplu — de fapt mai evoluat — față de celelalte părți ale Subcarpaților, datorită alcătuirii dintr-un singur uluc depresionar, la contactul cu munții, dominat către est de un șir de dealuri, mai mult sau mai puțin fragmentat. Morfologia de detaliu permite separarea a două subunități. În nord, Subcarpații Neamțului au drept caracteristică principală dis-

punerea piezișă, între marginea Carpaților și culoarul Moldovei, atît a Depresiunii Neamțului, cît și a culmii Pleșu—Boiștea de la est.

Depresiunea funcționează ca o arie de convergență și de descărcare hidrografică. Șaua Crăcăoanilor face trecerea spre Subcarpații Bistriței sau ai Cracăului. Depresiunea Cracău-Bistrița este drenată longitudinal de cele două riuri și corespunde unui larg sinclineriu, avînd o lungime de aproximativ 50 km și o lățime medie de 20 km. Terasale Bistriței, foarte bine dezvoltate, ca și ale Cracăului, alcătuiesc un relief în trepte căzute spre cele două riuri.

Curmăturile existente atît în Subcarpații Neamțului, cît și în ai Bistriței corespund probabil unei faze mai vechi, anterioare ultimelor înălțări ale cutelor și punerii în evidență a subsidenței din Cîmpia Siretului. Accentuarea mișcărilor de subsidență a determinat orientarea cu precădere a riurilor către sud și deci părăsirea în parte a traseelor transversale. Drenajul longitudinal a fost favorizat și de structură, văile principale înseriindu-se în lungul depresiunii sinclinale. La sud de Bistrița, Subcarpații Trotușului sau ai Tazlăului se continuă cu același stil de relief, avînd o singură culme deluroasă, tivită către valea Siretului de un tăpșan piemontan, care încheie ulucul depresionar Tazlău—Cașin. Aici este o corespondență totală între morfologie și structură. Depresiunea subcarpatică (legată prin șaua Căramidăriei cu Depresiunea Bistriței) corespunde unui sinclineriu miocen încălecat de flisul paleogen; în est, Culmea Pietricăii corespunde unui anticlinoriu ce se revarsă ușor peste formațiunile sarmațiene ale Platformei Moldovenești.

Ulucul depresionar, lung de peste 70 km, se menține la o altitudine de 400—500 m și are un relief colinar, mai înalt către nord și la contactul cu munții și cu Culmea Petricică, ceea ce-i dă aspectul de covată uriașă. Văile mult adîncite au către margini, în dealuri, versanți abrupti, care, în condițiile prezenței marelui, favorizează deplasările de teren. În partea centrală, valea largă a Tazlăului este mărginită de 5—7 terase (între 5 și 140 m altitudine relativă). La sud de Trotuș, Depresiunea Cașin apare ca un „golf” al lărgirii Trotușului, mărginit la est de Dealul Oușor, primul dintre seria de dealuri a Subcarpaților Vrancei. Culmea Pietricică este o continuare a Culmei Pleșului ca poziție geografică și ca structură geologică (aceleași conglomerate cu fragmente

de şisturi verzi, burdigaliene). Pe mai mult de 35 km lungime, ea se menține la 600—650 m altitudine, atingând 740 m în vârful Capăta.

4.1.4. Clima

Particularitățile parametrilor climatici în regiunea subcarpatică depind de o serie de factori generali, ca radiația globală și circulația maselor de aer și locali, poziția geografică în raport cu unitățile vecine, altitudinea, orientarea versanților etc.

Radiația solară globală anuală prezintă diferențieri în cuprinsul Subcarpaților, fiind de 121,78 kcal/cm² la Tirgu Jiu, în Subcarpații Getici, de 122,9 kcal/cm² la Valea Călugărească, în Subcarpații de la Curbură (unde intervin și procese foehnale), de 115,86 kcal/cm² la Bacău și de 113,19 kcal/cm² la Fălticeni.

Valorile puțin mai mici înregistrate în Subcarpații Getici de la vest de Olt sînt în concordanță cu frecvența aici, mai mare, a maselor de aer mai umede, generate de ciclonii mediteraneeni care produc innourări mai accentuate, îndeosebi în sezonul rece.

Cel mai mare număr anual de ore de strălucire a Soarelui se înregistrează în Subcarpații de la Curbură (2 153,1 la Valea Călugărească, 2 155,9 la Rîmnicu Sărat, 2 072,1 la Odobesti) ca urmare a apariției proceselor foehnale. În general, însă, cu excepțiile amintite, Subcarpații se caracterizează prin valori anuale puțin diferențiate, avînd între 2 050 și 2 070 de ore de strălucire a Soarelui, (2 051,9 la Tirgu Jiu, 2 066,1 la Cîmpulung, 2 057,1 la Tirgu Oena), cu o ușoară creștere în Subcarpații de la Curbură (O. Neacșa, C. Popovici, 1969).

Circulația maselor de aer prezintă, de asemenea, deosebiri importante. Iarna, de exemplu, în timp ce Subcarpații Getici sînt sub influența maselor de aer cald și umed provenite din ciclonii mediteraneeni, Subcarpații Moldovei se găsesc mai mult sub influența aerului uscat și rece provenit din anticicloul nord-uralian. Procesele de convecție termică și de frontogeneză sînt mai frecvente în Subcarpații Getici și în ai Moldovei și mult mai rare în cei de la Curbură, unde apar manifestări ale ciclonilor retrograzi (N. I. Bordei, 1972).

Regimul termic prezintă mari fluctuații diurne, lunare, anotimpuale și anuale, în strînsă dependență cu durata de strălucire a Soarelui și cu frecvența maselor de aer

din vest sau din est, umede sau uscate, reci sau calde. Astfel, în Subcarpații Getici, în timpul invaziilor de aer polar din spre nord, aerul rece, după escaladarea munților, trece peste ulucul depresionar subcarpatic, venind în contact doar cu părțile mai înalte ale Subcarpaților.

Nu același lucru se întîmplă în Subcarpații Moldovei care iau contact direct cu masele de aer rece de origine siberiană și, ca urmare, temperatura aerului este mai scăzută în timpul regimului anticiclonic cu 5 pînă la 10°C, față de Subcarpații Getici.

Temperaturile medii anuale sînt, la vest de Olt, de 10.2°C la Tirgu Jiu, 10.4°C la Rîmnicu Vilcea și 10.1°C la Govora, valori destul de ridicate (mai ales dacă se ține seama și de altitudinea stațiilor), datorate persistenței aerului cald de origine mediteraneană, îndeosebi în semestrul rece. Ca o particularitate a acestei regiuni trebuie menționată și apariția calcarelor pe marginea dinspre Subcarpați a munților, ceea ce contribuie la mărirea cu 2—3°C a temperaturilor în spațiul microclimatic (Gh. Neamu, 1974). Valorile termice medii anuale sînt mai coborîte cu 1—2°C în Subcarpații de la est de Olt față de cei de la vest, ca urmare atît a altitudinii lor mai mari cît și a depărțării de centrul bariciclu de influență din Marea Mediterană.

Subcarpații de la Curbură apar ca o discontinuitate termică prin apariția celor mai ridicate valori medii anuale ale temperaturii aerului, îndeosebi pe latura externă (11°C la Valea Călugărească, 11.3°C la Pietroasele, 10.7°C la Istria). Aceste valori, care sînt egale celor mai mari temperaturi medii anuale din țară (înregistrate la Mangalia și Drobeta-Turnu Severin) trebuie puse pe seama influenței foehnului, îndeosebi în anotimpul de primăvară (Octavia Bogdan și colab., 1974) și a ciclonilor retrograzi, mai ales toamna (N. I. Bordei, 1972; Ecaterina Ion Bordei, 1983). Persistența, în Subcarpații Moldovei, a regimului anticiclonic în semestrul rece, cu însenări frecvente, contribuie la apariția unor temperaturi medii anuale mai mici cu 2°C față de cele din Subcarpații Getici și cu aproape 3°C față de Subcarpații de la Curbură.

Particularitățile termice ale Subcarpaților sînt și mai bine evidențiate de distribuirea anotimpuală a radiației solare și a duratei de strălucire a Soarelui. Astfel, primăvara, strălucirea Soarelui depășește 520 de ore în Subcarpații de la Curbură (523,1 ore la

Valea Călugărească) și în Culoarul Siretului (523,5 ore la Bacău) și este mai redusă în Subcarpații Getici și în partea de nord a Subcarpaților Moldovei, unde înnoirările sînt mai persistente. În acest anotimp temperaturile medii lunare înregistrează variații mari de la o lună la alta. Între martie și aprilie creșterile sînt de circa 5°C în Subcarpații Getici, de circa 6°C în cei de la Curbură și de circa 7°C în Subcarpații Moldovei. Creșterile accentuate din Subcarpații Moldovei sînt datorate înseninarilor persistente ce caracterizează regimul anticiclonic în luna martie, cu valori foarte mici ale mediilor lunare (1.9°C la Piatra Neamț, 2.9°C la Țirgu Ocna, 2.0°C la Bacău) și cu valori medii mai omogene în aprilie (9.1°C la Piatra Neamț, 9.8°C la Țirgu Ocna, 9.7°C la Bacău). Între lunile aprilie și mai creșterile sînt mult mai constante, diferențele fiind în medie de 5°C. Încălzirile din luna aprilie de la Curbură sînt datorate prezenței foehnului care încălzește aerul, îndeosebi în spațiul microclimatic, ceea ce duce la înregistrarea unor valori medii zilnice mai mari cu 3–5°C, în comparație cu cele din aceeași lună și aceleași zile din Subcarpații Moldovei. În Subcarpații Getici, în luna martie pătunderile de aer cald din sud și din vest devin mult mai frecvente față de lunile precedente.

Vara este călduroasă în Subcarpații de la vest de Olt, valorile medii în iulie fiind cuprinse între 20 și 22°C, și mult mai răcoroasă în Muscele, cu valori medii de 17.9°C la Bîlcești și 18.3°C la Cîmpulung. Cele mai mari valori medii în luna iulie se înregistrează în Subcarpații de la Curbură (22.3°C atît la Istria, cît și la Pietroasele). În Subcarpații Moldovei, regimul termic este mai moderat vara, cu valori medii, în iulie, cuprinse între 19°C la Piatra Neamț și 20.4°C la Țirgu Ocna. De altfel, acest lucru iese și mai mult în evidență cînd se compară valorile maxime absolute lunare: 37.5°C în mai și iunie, 38.5°C în iulie, 39°C în august la Țirgu Jiu și 33.2°C în mai, 34.5°C în iunie, 37.8°C în iulie, 38.6°C în august la Piatra Neamț, diferența între valorile maxime fiind de 5–6°C. Verile călduroase de la Curbură se datoresc insolației crescute. La Valea Călugărească se înregistrează, în iulie, aproape 300 de ore de strălucire a Soarelui (298,7). În aceeași lună, în vecinătatea Subcarpaților Moldovei, la Fălticeni, se înregistrează doar 265,1 ore.

Toamna temperaturile medii depășesc 11°C, arătînd un anotimp călduros în întreaga unitate subcarpatică. În luna septembrie cele mai ridicate valori se înregistrează în Subcarpații de la Curbură (Pietroasele 17.9°C, Valea Călugărească 17.7°C, Istria 17.5°C). În același interval, în Muscelele Argeșului valorile sînt cu 3–4°C mai mici (Cîmpulung 13.7°C, Bîlcești 13.6°C, Voinești 14.7°C iar în Subcarpații Moldovei, de asemenea, mai coborîte cu 2–3°C (Tulnici 14.4°C, Piatra Neamț 14.9°C, Bacău 15.4°C).

Temperaturile medii mai ridicate de la vest de Olt sînt datorate predominării circulației sudice, îndeosebi în prima jumătate a lunii octombrie. În Subcarpații de la Curbură, foehnul produce înseninarî persistente, ceea ce face ca valorile din timpul zilei să ajungă sau chiar să depășească 20°C.

Iarna debutează în decembrie cu temperaturi pozitive în Subcarpații Getici și ai Buzăului și cu temperaturi negative în celelalte sectoare. În ianuarie valorile medii scad la –4.3°C la Piatra Neamț, iar în Subcarpații Getici și cei de la Curbură se mențin la –2.5°C. Inversiunile termice, prezente cu preponderență în ianuarie și februarie, contribuie la încălzirea regiunii subcarpatice cu 1–2°C, în medie, în aceste luni, în comparație cu Cîmpia Română. În acest fel se explică mediile lunare pozitive din luna februarie de la Govora, Călimănești, Voinești, Valea Călugărească și Pietroasele. În Subcarpații Moldovei, invaziile de aer rece, specifice anticiclonului nord-uralian, continuă și în februarie, înregistrîndu-se medii de –2.4°C la Bacău și –2.2°C la Piatra Neamț, valori mai scăzute decît cele înregistrate în ianuarie la Baia de Aramă sau la Rîmnicu Vîlcea¹.

Nebulozitatea în Subcarpații Getici (la vest de Olt) și în Subcarpații Moldovei (la nord de Bistrița) are valori destul de crescute, variînd între 5,5 și 6 zecimi. În celelalte sectoare nebulozitatea medie anuală oscilează între 5 și 5,5 zecimi, coborînd chiar sub 5 zecimi în regiunea Subcarpaților de la Curbură, unde înseninarîle sînt mai persistente datorită prezenței foehnului.

¹ Poziția geografică locală a unor stații meteorologice, cum ar fi cea de la Cîmpulung (Muscel) (într-o depresiune înconjurată de dealuri), contribuie la înregistrarea unor temperaturi minime foarte coborîte (doar în lunile iulie și august temperatura minimă absolută n-a coborît sub 0°C). De exemplu, dacă în luna aprilie la Rîmnicu Vîlcea minimă extremă a înregistrat –4,0°C, la Cîmpulung a fost de –14°C.

Umezeala relativă prezintă, de asemenea, variații importante, fiind mai mare în Subcarpații Getici (72% la Tg. Jiu, 67% la Rm. Vilcea) și în partea de nord a Subcarpaților Moldovei (72% la Fălticeni, 68% la Piatra Neamț) și mai mică în Subcarpații Moldovei de la sud de Bistrița (63% la Tg. Oena).

Precipitațiile atmosferice au cantități mai mari în Subcarpații Getici, cu valori ce pot

Lunile de vară și de la începutul toamnei se caracterizează printr-o activitate ciclonică mai redusă. Astfel, în timp de 5 ani (1970—1975), Oltenia a fost afectată doar de cinci ori de ciclone în iulie și de patru ori în august. În Moldova, în aceleași luni și în aceeași perioadă s-au înregistrat doar jumătate din numărul de situații ciclonale din cele petrecute în Oltenia. Cea mai mare frecvență o au ciclonele provenite din sud-vest




Fig. 64. Cantitățile medii anuale și lunare de precipitații atmosferice (în mm) la câteva stații meteorologice din Subcarpați.

atinge 1 006 mm la Apa Neagră, 1 092 mm la Arefu și mai mici cu 200—300 mm în Subcarpații de la Curbură și în ai Moldovei (635 mm la Nehoiu, 664 mm la Pătirlagele, 597 mm la Odobești, 650 mm la Tulnici) (fig. 64). Cea mai mare cantitate a precipitațiilor care cad în Subcarpații de la vest de Olt se datorește circulației intense a depresiunilor barice care pătrund în regiunile noastre, urmînd o traiectorie ce unește Marea Baltică cu Marea Neagră. Aceste depresiuni aduc un aer puternic umezit, de origine oceanică. Lunile cu cea mai frecventă activitate ciclonică sînt cele de la începutul primăverii (martie-aprilie) și de la sfîrșitul toamnei (octombrie—noiembrie).

tul și sudul teritoriului țării, precum și ciclonele care provin din deplasarea către nord-est a ariilor depresionare din sudul Mării Adriatice.

Căderile abundente de precipitații din lunile de vară ale anilor 1969, 1972, 1975, în Subcarpații de la Curbură au fost determinate de ciclonele retrograzi (ciclonele mediteraneene care suferă inițial o deplasare spre Marea Neagră și apoi o întoarcere, în cerc, prin sud-estul teritoriului țării noastre), specifice semestrului cald.

Apariția celui de-al doilea maxim de precipitații, specific sud-vestului țării, este datorat, în cea mai mare măsură, ciclonele mediteraneene. În unii ani precipitațiile




Fig. 65. Climograme Walther—Lieth la o serie de stații meteorologice caracteristice. 1, Temperatura medie lunară; 2, precipitații medii lunare la scara 1/2; 3, precipitații medii lunare la scara 1/3; 4, perioade secetoase; 5, perioade de uscăciune.

înregistrate în noiembrie și decembrie depășesc cantitativ pe cele acumulate în mai-iunie, cum se observă la Apa Neagră și Tismana (fig. 64). Analiza cantităților medii multi-
anuale arată o distribuție normală, cantitățile înregistrate în primul maxim (în mai-iunie) depășesc pe cele din cel de-al doilea maxim de toamnă (104 mm în mai, 93 mm în iunie, 90 mm în octombrie, 85 mm în noiembrie la Baia de Aramă și 98 mm în mai, 102 mm în iunie, 91 mm în octombrie, 85 mm în noiembrie la Tismana). La est de Olt al doilea maxim de precipitații de toamnă nu se mai înregistrează (fig. 64).

Maximele în 24 de ore indică valori foarte mari în Subcarpații Getici și pe latura internă a Subcarpaților de la Curbură (162,2 mm la Balta pe 30.VII.1969, 154,2 mm la Apa Neagră pe 30.VII.1969, 277,5 mm la Chiojd pe 2.VII.1975, 225,1 mm la Cerașu la aceeași dată). În ziua de 2 iulie 1975 în Subcarpații de la Curbură s-a produs cea

mai puternică ploaie torențială din întreaga perioadă de observații¹.

La Curtea de Argeș, în ziua de 7 iulie 1889 au căzut 204,6 mm în 20 de minute (102 mm/min. m²). O intensitate foarte mare s-a înregistrat și în timpul ploii din 30.VIII.1941 la Tîrgu Jiu, când într-un interval de 6 minute au căzut 33,5 mm cu o intensitate de 5,60 mm/min. m².

În raporturile stabilite între precipitații și temperatură pe climogramele Walther-Lieth se constată că atât în Subcarpații Olteniei, cât și în Muscelele Argeșului perioadele de secetă durează foarte puțin, fiind întâlnite doar în lunile august și septembrie. Datorită temperaturilor mai coborâte din

¹ La Pătîrlagele, ploaia a început pe 1 iulie la ora 10 cu o intensitate foarte mică. La ora 16, intensitatea devenise medie și a crescut de la 5 mm/m² în 2 ore (16–18) la 10 mm/m² în 50 de minute (18–19). Între orele 19 și 24 s-au acumulat încă 30 mm/m². În timpul nopții ploaia a scăzut ca intensitate pentru ca în ziua de 2 iulie de la ora 11 să reînceapă cu o intensitate deosebită. În 20 de minute (între 11,40 și 12,00) s-au înregistrat 60 mm/m² cu o intensitate de 2,5 mm/min. m².

timpul verii, aceeași situație se întâlnește și în Subcarpații Moldovei. La curbură, fenomenele de secetă se manifestă încă din luna iulie, fiind accentuate în august, cînd pot să apară și fenomene de uscăciune. La Pătrîlagele seceta se face simțită în lunile iulie, august, septembrie și în primele două decade din octombrie, iar perioada de uscăciune se manifestă în septembrie și în prima jumătate a lunii octombrie. Fenomenele mai accentuate de secetă și uscăciune de aici sînt în strînsă corelație cu stagnarea aerului tropical, cald și uscat, pe o perioadă mai îndelungată, în aceste luni, în Bărăgan și în Subcarpații de la Curbură (fig. 65).

În unii ani, în anumite situații sinoptice, între Depresiunea Petroșani și Tirgu Jiu, ca și între depresiunile Sibiului și Jiblea—Călmănești se creează diferențe termice apreciabile. În aceste condiții pot apărea scurgeri de aer dinspre aria mai rece situată la nord spre aria mai caldă, cu intensificări de vînt care pot produce doborîturi de păduri (cazuri semnalate în cîteva rînduri la Stănești-Gorj și Robești în defileul Oltului).

La Tirgu Jiu, Rîmnicu Vilcea, Cîmpulung, Drăgășani, Bacău și Roman unde stațiile meteorologice sînt amplasate în văi cu orientarea generală nord-sud, frecvența predominantă a vîntului este cea imprimată de culoarul văilor, adică din spre nord spre sud. Canalizările vîntului pe culoare de presiune iese și mai clar în evidență la Tirgu Ocna, unde înșeuarea spre Depresiunea Brașovului mărește frecvența din această direcție pînă la o treime din total (la Tirgu Ocna, frecvența din vest este de 33,9%).

Viteza medie a vîntului diferă de la un sector la altul, dar nu în toate cazurile viteza mai mare coincide cu frecvența maximă. De exemplu, la Cîmpulung cea mai mare viteză medie apare din direcția nord-est (4,2 m/s), dar frecvența maximă este din nord (20,8%). La Piatra Neamț frecvența maximă este din nord-vest, iar viteza medie cea mai mare din direcția vest (3,8 m/s). Pe anotimpuri, viteze mai mari ale vîntului se înregistrează în Subcarpații Moldovei, unde iarna Crivățul are viteze pînă la 6—8 m/s.

În ansamblul lor, Subcarpații se încadrează în etajul climatic de deal cu un potențial favorabil atît sub raport termic (în acest etaj contrastele termice lipsesc), cît și sub raportul precipitațiilor atmosferice suficiente pentru necesarul de apă al plantelor de cultură.

4.1.5. Rețeaua hidrografică

Relieful regiunii subcarpatice este fragmentat de două tipuri de riuri. Pe de o parte, sînt riurile mari, alohtone, care își au izvoarele în regiunea de munte și care doar trec prin această unitate de relief. Ele au un regim de scurgere deja format, încît aportul de ape din regiunea subcarpatică nu le poate modifica substanțial caracteristicile hidrologice formate în cursul superior. În această categorie intră Jiul, Oltul cu Topologul și Oltețul, Argeșul cu Dimbovița, Ialomița cu Prahova și Teleajenul, ca și Buzăul, Trotușul și Bistrița. Pe de altă parte, sînt riurile autohtone, cum sînt, Amaradia de Jiu, Cîlnicul afluent al Gilortului, Rîul Alb afluent al Dimboviței, Bizdidețul afluent al Ialomiței, Mislea al Teleajenului, Cricovul Sărat al Prahovei, Nișcovul, Slănicul și Cîlnăul, afluenți ai Buzăului etc. cu bazinele dezvoltate integral sau în cea mai mare parte în regiunea subcarpatică. Sînt în general riuri mici, atît ca suprafața a bazinului, cît și ca debite de apă și lungime, regimul lor de scurgere prezentînd o serie de particularități determinate de condițiile specifice regiunii subcarpatice (fig. 66).

Direcția cursurilor este predominant nord-sud în cazul Subcarpaților Getici și nord-vest-sud-est în cazul celor de la Curbură și în Subcarpații Moldovei. Fiînd alcătuiți în roci ușor iriabile, cu o tectonică activă și cu o structură variată, orientarea, forma și panta văilor sînt, de asemenea, diferite de la un loc la altul. Densitatea medie a rețelei hidrografice pentru întreaga regiune este de 0,4—0,5 km/km², local însă valorile pot fi de 0,8—0,9 km/km², dar dacă se consideră și rețeaua elementară de cursuri, densitatea de drenaj ajunge la valori cuprinse între 4 și 6 km/km².

În raport cu factorii genetici și în special cu condițiile climatice, regimul scurgerii apelor are, în general, aceleași caracteristici pentru întreaga regiune subcarpatică, cu mici nuanțe de diferențiere de la o subunitate la alta. Gradul mare de fragmentare a reliefului a determinat o accentuare a pantelor de scurgere care, în condițiile unor soluri cu textură predominant argilooasă, determină un răspuns rapid al bazinelor hidrografice la ploile torențiale și la topirea zăpezilor. Ca urmare, viiturile se formează repede și sînt scurte, dar cu amplitudine și cu putere mare de eroziune și transport.

Din analiza hidrografelor debitelor medii zilnice, pe ani caracteristici, la o serie de stații reprezentative, se observă în toate cazurile existența unei perioade cu ape mari de primăvară, provenite predominant din topirea zăpezilor în lunile februarie și martie și a uneia în intervalul aprilie-iunie datorită ploilor de primăvară și de vară. Urmează perioada apelor mici de vară-toamnă, când se realizează și cel mai mic volum al scurgerii, și cea de la sfârșitul toamnei cu o ușoară creștere a debitelor de apă. Existența acestor faze caracteristice ale scurgerii nu exclude însă posibilitatea apa-

riției viiturilor în orice perioadă din an datorită ploilor torențiale. Neuniformitatea scurgerii se poate observa atât din aspectul hidrografului debitelor, cât și din raportul dintre cele mai mari și cele mai mici debite medii anuale pe perioada de observații. Pe întregul spațiu subcarpatic, acest coeficient variază între 7 și 20, ceea ce dovedește că cel mai mare debit mediu anual poate depăși de 20 de ori valoarea celui mai mic.

În Subcarpații Getici și ai Curburii, cel mai mare volum al scurgerii se realizează în lunile martie și aprilie, iar în cei ai Moldovei în lunile aprilie și mai. Astfel, în




Fig. 66. Tipurile de regim ale râurilor și apele minerale din Subcarpați. 1, Râuri cu ape mari de primăvară și viituri de vară și iarnă, alimentare pluvială între 40–60%; 2, ape mari de primăvară-iarnă și viituri de vară, alimentare nivo pluvială; 3, ape mari de primăvară și viituri de vară și iarnă, alimentare nivo pluvială; 4, ape mari de primăvară și viituri de vară și de toamnă cu alimentare pluvială de peste 60%; 5, ape minerale sulfuroase; 6, sulfatate; 7, clorurate; 8, iodurate; 9, ape oligominerale. A, Amenajarea Oltului în arealul Subcarpaților. B, Amenajarea Bistriței.

Subcarpații Gorjului, pentru riul Tismana la Godinești, cel mai mare volum din scurgerea anuală se realizează în luna aprilie (13,5%) și în luna martie (12,7%). Pentru bazinul Cricovului, lunii martie îi revine deja un procent de 14,4%, în timp ce lunile aprilie și mai nu realizează decât 13,2% fiecare. În cazul riului Olnău, la Potirnichești, cel mai mare volum al scurgerii medii lunare apare în luna martie, care participă cu 16,2% la realizarea volumului anual, după care urmează luna mai cu 14%, februarie cu 13,5% etc. Mai la nord însă, în Subcarpații Moldovei, în cazul bazinului Cracău, 18,9% din volumul scurgerii se realizează în luna mai și 18%, respectiv, 15,3% în lunile iunie și aprilie, luna martie avînd o pondere mai mică (8%).

Cea mai mică parte din scurgerea medie anuală se realizează în lunile septembrie și octombrie pentru Subcarpații Getici și ai Curburii și în ianuarie și februarie pentru Subcarpații Moldovei. Pentru riul Tismana, cel mai mic volum al scurgerii s-a realizat în 38% din cazuri, în luna septembrie, iar pentru Cricov, afluent al Ialomitei și Slanie, al Buzăului, în 44% din cazuri în aceeași lună. Urmează ca pondere, în toate cazurile, luna octombrie. Pentru riul Cracău, în 50% din cazuri, cel mai mic volum al scurgerii s-a înregistrat în luna ianuarie. Aceasta dovedește că în Subcarpații Moldovei sînt mai frecvente debitele minime de iarnă.

Din repartitia scurgerii apei, pe anotimpuri, se constată că pentru regiunea subcarpatică primăvara se realizează 40—50% din scurgerea anuală. În raport cu ponderea anotimpurilor, se deosebesc două tipuri de repartitie. În tot spațiul de la Motru pînă la Bistrița, există succesiunea: primăvară, vară, iarnă, toamnă. La nord de acest rîu, toamna are încă o pondere mai mare ca iarna.

Ca sinteză a variației caracteristicilor hidrologice, se diferențiază mai multe subtipuri de regim. Astfel, în Subcarpații Getici sînt specifice apele mari de primăvară-iarnă și viiturile de vară, alimentarea subterană deține pînă la 60%, iar cea superficială este preponderent nivopluvială în sud-vest și sud și pluvionivală în rest. La est de o linie care unește Băile Olănești, la nord și Popești pe Luncavăț, la sud, pînă la valea Putnei este un subtip de regim diferențiat de la partea internă la cea externă a Subcarpaților (fig. 66). Spre interior, la contactul cu

muntele sînt mai frecvente (60—70%) apele mari de primăvară și viiturile de vară și iarnă cu alimentarea pluvială între 40 și 60%. La exterior spre contactul cu cîmpia, pe lîngă caracteristicile menționate se remarcă și o sporire a aportului din alimentarea nivopluvială (I. Ujvári, 1972). În Subcarpații Moldovei predomină apele mari de primăvară și viiturile de vară și de toamnă cu alimentarea pluvială de peste 60% și alimentarea subterană moderată (fig. 66).

Scurgerea medie, ca indicator sintetic al bogăției de ape, este legată de ansamblul factorilor fizico-geografici și descrește de la sud-vest spre nord-est. Astfel, dacă de la Dunăre pînă la Dimbovița scurgerea medie variază, în funcție de altitudine, între 4 și 8 l/s. km², de la Dimbovița pînă la Șușița limitele de variație sînt cuprinse între 2 și 8 l/s. km². La nord însă de această limită se observă o ușoară scădere a scurgerii medii la valori cuprinse între 2 și 5 l/s. km² (*Rîurile României*, 1971). Din acest punct de vedere, diferența dintre Subcarpații Moldovei și cei Getici este evidentă. De exemplu, un bazin hidrografic cu altitudinea medie de 800 m are în Subcarpații Moldovei o scurgere medie specifică de 8 l/s. km² în timp ce în Subcarpații Getici are 13 l/s. km². La contactul Subcarpaților de la vest de Jiu cu masivele calcaroase din nordul Olteniei, apar o serie de izvoare carstice foarte bogate, care au fost captate și folosite la alimentarea cu apă a orașelor Craiova, Tîrgu Jiu și a unor comune de pe traseul conductelor.

Scurgerea maximă rezultă în urma ploilor torențiale sau din suprapunerea ploilor de primăvară cu topirea zăpezilor. Analizînd numărul debitelor maxime de origine pluvială sau mixtă se constată că pe spațiul subcarpatic situația se modifică de la sud-vest spre nord-est. Dacă în bazinul Jiului, în 64% din cazuri debitele maxime au fost provocate de ploi, în spațiul dintre Olteț și Rîmnic procentul acestora a crescut la 70%, iar în continuare spre nord ajunge la 76%. În același timp scade ponderea debitelor maxime de proveniență mixtă de la 36% în Subcarpații Getici la 24% în cei ai Moldovei.

Formarea scurgerii maxime în Subcarpații este favorizată și de soluri, care au frecvent o textură argiloasă sau luto-argiloasă, de gradul mare de fragmentare a reliefului, de densitatea de drenaj cu valori maxime de pînă la 4—5 km/km² și de gradul redus de

împădurire, ca urmare a intervenției omului. Cel mai concludent exemplu de formare și de transmitere a undelor de viitură a fost semnalat în luna iulie 1975, când întreaga regiune subcarpatică din sud a înregistrat cele mai mari debite de apă. Producerea viiturilor s-a deplasat de la vest spre est proporțional cu înaintarea frontului atmosferic cu precipitații maxime. Astfel, la 1 iulie viituri puternice s-au produs pe riurile mici din bazinul Jiului, cu efecte catastrofale în bazinul Motrului și pe Tismana; Săhodol, Amaradia și Gilort. Treptat, s-au produs viituri pe arterele hidrografice din bazinele Olteului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Prahovei, Teleajenului, Cricovului Sărat și Buzăului. O contribuție importantă la formarea acestor viituri au avut-o debitele de apă aduse de arterele hidrografice mici din regiunea subcarpatică. De exemplu, viitura formată și propagată de-a lungul Prahovei pe 3—4 iulie 1975, în special pe sectorul aferent regiunii subcarpatice, a rupt în mai multe locuri drumul național (DN 1) și calea ferată, a distrus și subminat câteva poduri și a afectat mai multe unități industriale. Pe Cricovul Sărat s-a înregistrat o viitură cu o amplitudine neobișnuită pentru acest bazin, nivelul apelor crescând în unele secțiuni cu aproape 5 m. Viituri la fel de puternice s-au înregistrat pe toate pârâiele care drenează flancul sudic al dealurilor Istriței, ca: Tohăneanca, Năianca, Pietroasa și Sărata.

Scurgerea minimă este foarte mult influențată de constituția litologică care, în regiunea subcarpatică este eterogenă, rocile permeabile favorizând procesele de infiltrare, iar cele impermeabile scurgerea de suprafață. Rocile puternic tectonizate și structurile geologice nu favorizează existența pinzelor subterane bogate care să asigure o alimentare subterană în perioadele cu deficit de umiditate, din care cauză sint frecvente fenomenele de secare la bazine cu suprafețe până la 100—200 km².

Atât pentru riurile alohtone, cât și pentru cele autohtone, cele mai mici debite se înregistrează în perioada de vară-toamnă ca urmare a precipitațiilor foarte reduse din intervalul august-septembrie și a temperaturilor încă ridicate care mențin o evaporare mare în bazinele de recepție. A doua perioadă cu debite minime este cea de iarnă, când precipitațiile sint stocate la suprafața solului sub formă de zăpadă.

Urmărind în principal cursurile autohtone, remarcăm debite minime absolute foarte mici chiar la bazine cu suprafețe până la 500 km². De exemplu, Cricovul la stația Bălțița a avut minima absolută de 0,005 m³/s în luna septembrie 1964, în timp ce riul Slănic la stația Cernătești a secăt în perioada de vară a anului 1965. În cazul riului Cîlnău la stația Potîrnichești, cu o suprafață de bazin de 193 km², se constată în fiecare an în perioada de vară-toamnă și de iarnă. Debitele de diluție (minime lunare cu asigurarea de 95%) au valori mai mari (0,5—1 l/s. km²) în Subcarpații Getici și mai mici (0,3—0,5 l/s. km²) în ai Moldovei.

Iscurgera aluviunilor este favorizată pe lângă variația bruscă a debitelor, de alternanța stratelor ușor friabile cu cele impermeabile, de structura cutată și puternic faliată, de solurile mediu sau intens erodate, de gradul mare de fragmentare a reliefului, de gradul redus de împădurire și de intervenția a omului. Toate acestea fac ca în comparație cu alte regiuni din țară, Subcarpații să prezinte o predispoziție maximă la eroziunea de suprafață și în adâncime. Un alt factor important îl constituie regimul pluviometric, cu ploi de scurtă durată și de intensitate mare care dau naștere la viituri cu putere mare de eroziune și transport. În cazul scurgerii de aluviuni din regiunea subcarpatică, efectele intervenției omului în peisaj au avut urmări imediate. De exemplu, datorită intenselor acțiuni de despădurire de la sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX, în Subcarpații de la Curbură, ca și în alte părți ale Subcarpaților s-au accelerat mult procesele de eroziune cu intensitate excesivă în regiunea Vrancei, în special în perimetrele: Vidră, Vizantea, Soveja, Tulnici, Năruja și Milcov; în bazinul mijlociu al Buzăului și Rîmnicului, în Subcarpații din bazinul Jiului (în special pe culmea despărțitoare dintre Jiu și Oltet) și din bazinele Argeșului și Ialomiței (C. Diaconu, 1971).

Riurile care fragmentează Subcarpații de la Curbură dintre Buzău și Cîlnău au cea mai mare turbiditate din țară, depășind 25 000 g/m³. În continuare, între Cîlnău și Rimna, valorile sint, de asemenea, mari, fiind cuprinse între 5 000 și 25 000 g/m³. De la acest nucleu al turbidității maxime valorile scad spre vest în limite de la 1 000 la 5 000 g/m³, dar spre nord scăderea este mai rapidă, între Trotuș și Bistrița ajungînd

de la 1 000 la 2 500 g/m³ și între Bistrița și Moldova între 500 și 1 000 g/m³.

Turbiditatea râurilor autohtone din Subcarpații de la Curbură are cele mai ridicate valori din țară. Rîul Cîlnău, la stația Potîrchinești, atinge 47 200 g/m³, iar Slănicul, la Cernătești, 31 200 g/m³ (la valori medii multianuale). În timpul viiturilor, pe aceste râuri, scurgerea aluviunilor în suspensie ajunge la valori impresionante. La o viitură medie, de exemplu, produsă pe pîrîul Valea Muscelului, afluent pe dreapta al Buzăului la Pătîrlagele, s-au măsurat în iulie 1972 471,5 kg/m³.

Debitele medii specifice de aluviuni în suspensie sînt, de asemenea, edificatoare pentru spațiul geografic al Subcarpaților în general și al celor de la Curbură în special. Astfel, pentru Cîlnău la Potîrnichești scurgerea medie specifică de aluviuni are cea mai mare valoare din țară, fiind de 55,4 t/ha. an, iar pentru Slănic la Cernătești de 39,6 t/ha. an. Valori de 9—12 t/ha. an se înregistrează și pentru râurile Rîmnic, Rîmna, Putna, Milcov, în sectoarele aferente regiunii subcarpatice. La nord de Trotuș scurgerea medie specifică de aluviuni scade brusc la 1—2,5 t/ha. an, și numai în Subcarpații Neamțului valorile cresc din nou la 2,5—5 t/ha. an. De la Buzău spre vest, în toată regiunea subcarpatică, scurgerea medie specifică are valori cuprinse între 10 și 25 t/ha. an și numai local mai mici (între 5 și 10 t/ha. an (C. Diaconu, 1971)).

Gradul de mineralizare plasează apele de suprafață în grupa apelor bicarbonatate cu mineralizare cuprinsă între 200 și 500 mg/l. Excepție fac arterele care trec prin formațiunile salifere, ale căror ape clorurate au o mineralizare de peste 1 000 mg/l. Pe măsură însă ce apar noi afluenți, apele se diluează și mineralizarea scade la valori între 500 și 1 000 mg/l și chiar mai puțin. Structura variată a formațiunilor geologice de la un loc la altul, gradul mare de tectonizare și de falie fac ca și pînzele de apă subterane să fie locale și cu debite mici. Chiar și apele freatice au o repartitie neuniformă și nu pot fi folosite decît local la alimentarea cu apă prin fîntîni. Acestea sînt mai abundente și au un regim mai constant în depozitele aluvionare de terasă sau de luncă din lungul principalelor artere hidrografice decît în alte depozite. Un rol deosebit îl au izvoarele minerale, între care o pondere foarte mare o au cele clorurate legate în primul rînd de

masivele sau de formațiunile salifere. Urmează apoi ca frecvență izvoarele sulfuroase, cele sulfatate, iodurate sau oligominerale.

Apele de adîncime sînt întîlnite în cele mai multe cazuri sub formă de ape de zăcămint în cazul formațiunilor petrolifere sau ca ape minerale clorurate, sulfuroase, iodurate sau oligominerale. Multe izvoare minerale și ape de adîncime sînt captate și folosite în scopuri curative în stațiunile balneoclimaterice din regiunea subcarpatică (Govora, Olănești, Călimănești, Căciulata, Pucioasa, Vulcana Băi, Ocnița, Sărata Monteoru etc. (fig. 66)).

O problemă importantă pentru Subcarpați o constituie utilizarea și gospodărirea resurselor de apă în raport cu necesitățile socioeconomice ale regiunii. Avîndu-se în vedere neuniformitatea scurgerii apei în timp, se pune problema reținerii apelor din perioadele cu exces și folosirea lor în cele în care scurgerea devine deficitară. Acest lucru s-a realizat pe arterele mari care traversează regiunea, cum sînt Bistrița, Ialomița, Argeșul, Oltul și Jiul, fiind în studiu Buzăul și alte râuri mai mici. Sînt astfel demne de remarcă lacurile de acumulare de pe Olt (Călimănești, Dăești, Rîmnicu Vilcea, Rîureni, Govora, Băbeni) (fig. 66A), de pe Argeș (Oești, Cerbureni, Valea Iașului), de pe Ialomița (Pucioasa), și acumulările Piatra Neamț, Reconstrucția, Racova, Gîrleni și Lilieci de pe Bistrița din Subcarpații Moldovei (fig. 66B). Toate aceste lacuri au fost construite în scopuri hidroenergetice, pentru atenuarea undelor de viitură și pentru asigurarea cu apă potabilă sau industrială, avînd și funcția piscicolă sau de agrement. Una dintre cele mai importante probleme care apar în exploatarea optimă a acestor lacuri este rata mare de colmatare și de reducere a volumului util, ca urmare a cantităților mari de aluviuni în suspensie, în prezent efectuîndu-se intense studii pentru diminuarea acestui proces. Din cauza volumului mare de aluviuni antrenate pe arterele de scurgere, construirea lacurilor de acumulare, atît pe râurile care traversează regiunea, cît și pe cele autohtone nu este recomandată. În cazul în care se dorește totuși, astfel de acumulări este necesar să se adopte soluții tehnice care să permită ca în perioada viiturilor apele să aibă posibilitatea să se scurgă nestîngherite, urmînd ca

acumularea lor, în aceste lacuri de mică capacitate, să se facă numai în perioada apelor medii și mici când volumele de aluviuni sint reduse. În felul acesta durata vieții lacurilor ar putea fi mult mărită. În plus, se impune ca în cadrul bazinelor hidrografice să se adopte măsuri eficiente de amenajare în primul rînd a versanților și a organismelor torențiale, care sint principalele surse de aluviuni.

4.1.6. Vegetația

În funcție de amplitudinea relativ redusă a înălțimilor, Subcarpații se încadrează în cea mai mare parte numai în limitele a două subetaje ale etajului nemoral: subetajul pădurilor de gorun, care ocupă în general partea lor externă, cu altitudini reduse, și subetajul pădurilor de fag, caracteristic dealurilor mai înalte. La contactul acestora se formează o întinsă zonă de interferență, în care pădurile de gorun în amestec cu fagul alternează cu gorunete (dezvoltate îndeosebi pe versanți însoriți, bine drenați) și cu făgete (care ocupă mai ales versanții umbriți). Densitatea mare a fragmentării reliefului determină o accentuare a efectelor expoziției și a gradului de umbrire a versanților în distribuția generală a covorului vegetal.

Pădurile. Limita între subetajul pădurilor și gorun și cel al pădurilor de fag se poate trasa, în general, la circa 600–700 m altitudine, însă pe văi și pe versanții umbriți pădurile de fag coboară pînă spre marginea Subcarpaților și chiar în regiunile piemontane și de podiș. În același timp, gorunul urcă, pe alocuri, pe versanții însoriți, pînă la contactul cu muntele. Trebuie avut în vedere și faptul că distribuția actuală a vegetației forestiere nu reflectă numai efectul condițiilor naturale ci și pe cel al activității antropice. În general gorunetele, situate pe versanți însoriți și pe terenuri slab și mediu înclinate, cu soluri eutrofe, au fost înlocuite cu culturi agricole, vii, livezi, pașiști secundare, în proporție mai mare decît făgetele, situate pe terenuri mai puțin favorabile pentru utilizarea agricolă.

Larga desfășurare latitudinală, corelată cu diversele influențe climatice și fitogeografice, imprimă unele diferențieri teritoriale. Astfel, în Subcarpații Gorjului, la altitudini coborîte, alături de gorunete, se dezvoltă și cerete, girnițete și amestecuri de cer cu gorun, iar în dealurile mai înalte predomină

gorunetele, pentru ca făgetele să ocupe numai suprafețe restrinse. La limita inferioară a Subcarpaților de la Curbură, local, pătrund arborete de girniță. Spre nord ponderea fagulii crește, iar în Subcarpații Moldovei, la nord de Bistrița, gorunul nu mai apare decît cu totul local (de exemplu, pe Dealul Filioru de lingă Văratec).

Dintre speciile de amestec au o mare răspîndire carpenul (*Carpinus betulus*) și teiul (*Tilia cordata*, *T. tomentosa*), adesea sub influența degradării antropice formîndu-se șleauri complexe de gorun, cer, carpen și tei, făgeto-cărpinete sau cărpinete aproape pure. Destul de frecvent în aceste păduri se găsește cireșul (*Prunus avium*), frasinul (*Fraxinus excelsior*), jugastrul (*Acer campestre*). Mai rar se întîlnesc sorbul (*Sorbus torminalis*), scorușul (*Sorbus domestica*, *S. aucuparia* var. *lanuginosa*), mărul pădureț (*Malus sylvestris*), la altitudini mai mari uneori și bradul (*Abies alba*), de exemplu în partea internă a Subcarpaților Vrancei. Datorită faptului că vegetația forestieră s-a conservat îndeosebi în stațiuni nefavorabile, pe soluri sărace, superficiale, acide, o pondere mare o au gorunetele și făgetele acidofile, cu *Luzula luzuloides*, *Veronica officinalis*, *Orthilia secunda*, uneori chiar cu afin (*Vaccinium myrtillus*) și merișor (*V. vitis idaea*) și gorunetele cu *Carex pilosa* sau *Poa nemoralis*. În condiții mai favorabile, pe soluri eutrofe, pătura ierbacee a pădurilor subcarpatice este însă foarte bogată și variată, în făgete predominînd flora de mull (*Asperula odorata*, *Salvia glutinosa*, *Lamium galeobdolon*), și uneori crucea voinicului (*Hepatica transsilvanica*), iar în gorunete *Melica uniflora*, *Potentilla micrantha*.

În depresiunile subcarpatice și interdeluroase și pe terasele largi ale riurilor condițiile naturale favorizează dezvoltarea pădurilor de stejar (*Quercus robur*) sau de amestec de stejar cu alte foioase. Deoarece aceste terenuri sint în general favorabile pentru culturi agricole, pădurile au fost, în cea mai mare parte, defrișate, păstrîndu-se numai ici-colo mici pîlcuri sau exemplare izolate de stejar. Totuși în cîteva locuri s-au mai păstrat și păduri compacte, constituint unele dintre cele mai reprezentative stejărete din țară, ocrotite ca rezervații naturale (Vinători-Neamț în Depresiunea Neamțului, Dumbra-va Tismanei în Depresiunea Subcarpatică a Olteniei) sau incluse în parcuri dendrologice (Hemeiuș în județul Bacău). Păduri de stejar se mai întîlnesc și pe terasele Telca-

jenului la sud de Vălenii de Munte, pe dealurile Podenilor în Subcarpații Prahovei, în Depresiunea Nișcovului. În lungul văilor și pe unii versanți afectați de alunecări, cu soluri reavene, sint păduri de anin (*Alnus glutinosa* și mai rar *A. incana*), cu pătură ierbacee abundentă. Adesea aninii sint menținuți în stadiul de lăstăriș, datorită tăierii frecvente a crengilor. În luncile inundabile sint zăvoaie de plop și de salcie cu numeroase specii însoțitoare higrofile și mezohigrofile. Pe versanții erodați, pe soluri scheletice (indeosebi pe gresii silicioase) se află pîlcuri de mestecăn (*Betula pendula*) cu consistență scăzută. O mare extensiune o au și plantațiile de salcim și de pin, indeosebi pe terenurile în pantă, degradate în trecut. De exemplu, plantații compacte de salcim ocupă acum vechile bazine torențiale ale văilor Tătarului și Băiasca de la Aldeni (la nord de Buzău), Dealul Străjiștea din Subcarpații Prahovei, numeroase ogașe din Subcarpații Getici. Plantațiile de pin sint bine reprezentate pe toată întinderea Subcarpaților, printre arboretele mai compacte numărîndu-se cele din Subcarpații Vrancei, ai Buzăului (la Pănătău, Piatra Corbului, pe Valea Muscelului etc.), cele din bazinul Ialomiței de la Pietroșița și Moroeni. Pe alunecările de teren, în funcție de caracterul lor uscat sau umed, s-au făcut plantații de salcim, pin, anin, frasin.

Vegetația mezoxerofilă și xerofilă. Pe latura externă a Subcarpaților de la Curbură, expusă atît influențelor fitogeografice estice, continentale, cît și celor sudice, mediteraneene, vegetația prezintă o mare complexitate. Începînd din capătul vestic al Dealului Istrița și pînă în bazinul Cîlnăului, au o pondere ridicată în diferite asociații vegetale speciile cu caracter xerofil-termofil, indeosebi pe solurile scheletice, pe roci cu rarități floristice. Se întîlnesc aici și o serie de rarități floristice, ca de exemplu *Agropyron brandzae* ssp. *ciliatum* și *Cleistogenes bulgarica* pe Stîncă Tohanilor (marcînd legături floristice cu Dobrogea), gîrdurarița (*Nitaria schobleri*), element est-continental, la Piclele, în unica stațiune din țară, la limita vestică a arealului său mondial.

În bazinele Slănicului și Cîlnăului, ca și în Depresiunea Piclelor, ponderea elementelor xerofile este atît de ridicată, încît se poate chiar vorbi de o pătrundere a zonei de silvostepă ca un mic golf în domeniul dealurilor subcarpatice, pînă la circa 350—400 m altitudine (V. Ciocirlan, 1969). Aici,

pe suprafețe relativ mari, se dezvoltă asociații ierboase în care domină colilia (*Stipa tirsa*) și negara (*Stipa capillata*), însoțite de specii tipice de silvostepă, ca *Centaurea orientalis*, *Phlomis pungens* ș.a., alternînd cu asociații de *Festuca valesiaca* (fig. 67). Local se întîlnesc și pîlcuri de pir crestat (*Agropyron cristatum*). Caracterul zonal al acestor asociații este confirmat de răspîndirea lor pe versanții cu diferite orientări și înclinări și pe culmi întinse, slab vălurite. De asemenea au o mare răspîndire pădurile de stejar pufos (*Quercus pubescens*, *Q. virgiliana*) și de cîrpiniță (*Carpinus orientalis*), atît în bazinul inferior al Slănicului, cît și în bazinul Nișcovului, în Depresiunea Piclelor și pe Dealul Istrița la nord-est de Sărata—Monteoru. De obicei în aceste păduri sint frecvente și alte specii termofile, ca arțarul tătăresc (*Acer tataricum*), scumpia (*Cotinus coggygia*), mojdreanul (*Fraginus ornus*), în bazinul Slănicului și stejarul brumăriu (*Quercus pedunculiflora*).

Pe versanții însoriți, în condiții de drenaj bun (versanți înclinați, cu sol superficial, pe roci permeabile și bogate în carbonați), asociațiile xerofile pătrund mult în etajul nemoral. De exemplu, în Subcarpații Buzăului, pîlcuri de *Quercus pubescens* se întîlnesc pînă în apropiere de contactul cu muntele (la nord de Pătirlagele și lîngă Brăiești). Ochiuri de vegetație cu caracter de silvostepă se mai întîlnesc pe alocuri și pe latura estică a Subcarpaților. În partea de sud a Depresiunii Tazlăului, pe Dealul Perchiu, se află pîlcuri de *Stipa capillata* și *S. tirsa* și pădure de stejar pufos cu scumpie în subarboret. Asociații de *Stipa capillata* cu *S. tirsa* și diverse specii xerofile se întîlnesc și în apropiere de Piatra Neamț, pe Dealul Vulpiei și pe o frunte de terasă lîngă Dumbrava Roșie. Printre speciile însoțitoare cu caracter subtermofil se remarcă ruscuța de primăvară (*Adonis vernalis*), iar la Dumbrava Roșie zmeoaia (*Seseli hippomarathrum*) în unica stațiune certă din țară.

În fișa de interferență dintre zona de silvostepă și subetajul gorunului apar amestecuri complexe de gorun, stejar pufos și diverse specii hibride de *Quercus* și gorunete cu elemente termofile (mojdrean, corn) în subarboret. Tot în cadrul acestei tranziții, adesea, pe versanții însoriți, se află arborate de stejar pufos, iar pe cei umbriți gorunete. Pe suprafețe restrînse în Subcarpații Buzăului pe virfuri însorite, se întîlnesc și tufărișuri de liliac: la Cernătești, în cîteva




Fig. 67. Răspîndirea unor elemente floristice xero-termofile în Subcarpați: 1, Stejar pufos (*Quercus pubescens*, *Q. nigiliana*); 2, colilie (*Stipa tirsia*, *S. lessingiana*); 3, liliac (*Syringa vulgaris*); 4, *Seseli hippomarathrum*; 5, *Agropyron brandzae* ssp. *ciliatum*; 6, cireel (*Ephedra distachya*); 7, gârdurărița (*Nitraria schoberi*).

puncte, pe Dealul Botanu la Piatra cu Liliacei și în apropiere de Berca pe Muchia cu Liliac (fig. 67).

Pajiștile naturale secundare. Pe suprafețe mari vegetația forestieră a fost înlocuită cu pajiști utilizate ca pășuni și fînețe, care în alcătuirea lor floristică reflectă interacțiunea condițiilor zonale cu particularitățile edafice și topoclimatice locale. Marile diferențe în ce privește orientarea versanților, însușirile fizico-chimice ale solurilor, grosimea stratului de sol, compoziția rocii de bază etc. determină variații sensibile ale compoziției floristice pe suprafețe restrînse, adesea formîndu-se mozaicuri și complexe de asociații de pajiști. Un element de bază al acestor variații îl constituie regimul scurgerii pe versant, în corelație cu distribuția pe pantă a materialelor deluvio-colviale. Ca urmare, pe fondul general mezofil se dezvoltă o gamă largă de asociații mezo-higrofile și chiar higrofile, pe terenurile umbrite, slab drenate, cu substrat argilos impermeabil și pe terenurile afectate de alunecări. În schimb pe versanții înșoriți, bine drenati, cu sol scheletic, pe roci permeabile, sînt asociații mezoxerofile și chiar xerofile. Sub influența degradării antropice, îndeosebi a intensificării proceselor de eroziune, asociațiile xerofile au luat o mare extensiune în sectoarele cu climă mai uscată, îndeosebi pe latura de est și de sud-est a Subcarpaților, unde se constată chiar o extindere secundară a pajiștilor de silvostepă în domeniul pădurilor de foioase (N. Donița, N. Roman, 1976).

Atît în subetajul pădurilor de fag, cît și în subetajul gorunetelor, cea mai mare răspîndire o au pajiștile colinare de iarbă vîntului (*Agrostis tenuis*) cu păiuș roșu (*Festuca rubra*) și pajiștile de *Agrostis tenuis* cu diverse specii mezofile și mezoxerofile, care reflectă îndeosebi efectul condițiilor pedoclimatice zonale. Printre cele mai frecvente specii însoțitoare se numără *Cynosurus cristatus*, *Holcus lanatus*, *Briza media*, *Anthoxanthum odoratum*, *Festuca pratensis*, *Trifolium pratense*, *T. montanum*, *Achillea millefolium*, *Lotus corniculatus*. *Agrostis tenuis* apare dominant, codominant sau subordonat și în alte tipuri de pajiști larg răspîndite în dealurile și depresiunile subcarpatice. Pe terenuri cu umiditate suficientă, pe soluri eutrofe, adesea și pe versanții afectați de alunecări vechi, stabilizate, ca și în depresiuni și lunci bine drenate se află asociații de *Agrostis tenuis* cu *Festuca pratensis* sau

de *Festuca pratensis* cu diverse specii mezofile sau chiar mezohigrofile, utilizate în genere ca fînețe. Pe versanți însoșiți, bine drenați, sînt frecvente pajiștile de *Agrostis tenuis*, în care este codominantă sau subdominantă *Festuca rupicola*, și pajiștile de *Festuca rupicola* cu diverse însoțitoare mezofile și mezoxerofile; dintre acestea în partea de est și de sud-est a Subcarpaților sînt o serie de specii continentale și pontice, pe cînd în Subcarpații Getici apar numeroase specii submediteraneene.

Pe versanți slab înclinați, în dealurile Buzăului, Vrancei și unele depresiuni (de exemplu, în Depresiunea Tîrgu Jiu—Cîmpu Mare, în Depresiunea Tazlăului) se întîlnesc local pajiști de iarbă de sadînă (*Chrysopogon gryllus*), specie eurasiatic-submediteraneană, de obicei însoțită de *Agrostis tenuis* și diverse specii mezofile. În livezi și pe terenuri relativ bătătorite se dezvoltă frecvent pajiști de *Lolium perenne*. Pe suprafețe mici, pe soluri sărace și umede, în dealurile subcarpatice înalte, în apropiere de contactul cu muntele, se întîlnesc și pajiști de țăpoșică (*Nardus stricta*).

Pe versanți ușcați, la altitudini mici, pe expoziții sudice, sud-vestice, estice și sud-estice, se întîlnesc și pajiști de *Festuca valesiaca*, în general cu numeroase însoțitoare xerofile și mezoxerofile, ca *Onobrychis viciifolia*, *Medicago falcata*, *Doryenium herbaceum*. Pe soluri pseudorendzinice superficiale și pe stîncării de gresii, pe mici suprafețe se află pileuri de coada iepurelui (*Sesleria heuffleriana*) — de exemplu în Subcarpații Buzăului în apropiere de Pătîrlage și în bazinul Slănicului, în bazinul Dîmboviței la Cetățeni etc.

Ca urmare a erodării solurilor, datorită pășunatului excesiv sau utilizării neadecvate pentru agricultură, au luat o mare extindere pajiștile degradate de bărboasă (*Botriochloa ischaemum*), în general cu puține specii însoțitoare. Local, pe versanți puternic înclinați, însoșiți, pe soluri bogate în carbonați, rendzinice etc., se întîlnesc și pileuri de *Carex humilis*, de pir (*Agropyron repens*, *A. intermedium*), iar pe versanți relativ umbriți, *Brachypodium pinnatum*. Alteori, de exemplu în Subcarpații dintre Dîmbovița și Ialomița, pe versanți însoșiți, între 750 și 900 m altitudine, *Carex humilis* se asociază cu *Brachypodium pinnatum* (M. C. Dumitru, 1979).

Pe terenuri reavene-umede din depresiuni și lunci se dezvoltă numeroase asociații

mezohigrofile și higrofile cu caracter azonal (de *Agrostis stolonifera*, *A. canina*, *Poa trivialis*, diferite specii de *Carex* etc.). În locurile relativ uscate din lunci și depresiuni adesea se formează asociații de *Poa pratensis* ssp. *angustifolia*.

Alte tipuri de vegetație. O formațiune vegetală deosebit de răspîdită în dealurile subcarpatice, ca urmare a particularităților litologice corelate cu o intensă presiune antropică, o constituie tufărișurile degradate. Cătina (*Hippophaë rhamnoides*), localizată inițial pe cuestele cu sol superficial și rocă la zi săpate în roci bogate în carbonați (gresii, marne), a invadat terenurile afectate de procese de eroziune, îndeosebi în Subcarpații Buzăului și Subcarpații Vrancei. Cătina este frecventă și în lungul văilor Prahovei, Ialomiței și Dîmboviței. Pe ogașe și ravene, ca și pe versanți cu soluri tinere, neevoluate, se dezvoltă adesea și tufărișuri de păducel (*Crataegus monogyna*), porumbar (*Prunus spinosa*), măceș (*Rosa canina*), lemn ciinesc (*Ligustrum vulgare*), uneori și cătină, iar în partea de sud-est a Subcarpaților, dracilă (*Berberis vulgaris*). De asemenea pe versanți erodați, la marginea pădurilor sau sub formă de pileuri în pășuni, apar tufărișuri scunde de drob (*Cytisus nigricans*, *C. leucotrichus*).

Insular, îndeosebi în Subcarpații de la Curbură și în Subcarpații Prahovei, se întîlnește o vegetație caracteristică de sărătură, de la plante slab halofile pînă la ochiuri de vegetație puternic halofilă (*Puccinellia distans*, *Trifolium fragiferum*, *Artemisia maritima*, *Salicornia europaea*).

Deși în ansamblu regiunea subcarpatică nu este favorabilă formării înmlăștinirilor, în situații particulare se întîlnesc și interesante complexe de vegetație de mlaștină, cum ar fi lacul Manta, pe interfluviul dintre Bîsca Chiojdului și Buzău, sau Lacul cu Ochiu din bazinul Vilsanului (îngă Stroiști) — printre puținele locuri din țară unde apar, la sud de Carpați, sfagnete cu roua cerului (*Drosera rotundifolia*).

Efecte ale transformării antropice a vegetației asupra caracteristicilor mediului geografic. Deși vegetația naturală ocupă încă suprafețe întinse în Subcarpații, majoritatea asociațiilor vegetale au fost puternic transformate ca urmare a activității antropice. Modificările importante ale structurii și compoziției floristice au dus adesea la scăderea potențialului productiv al covorului vegetal,

ca și la diminuarea efectelor de protecție a solului.

Ca urmare a intervenției antropice accentuate, în prezent arealul pădurilor este mult diminuat și fragmentat. Pădurile care se mai păstrează sînt poienite sau prezintă o densitate mare a arborilor, datorită regenerării haotice din lăstari, ca urmare a exploatarei în regim de crîng (tăieri rase la intervale de circa 30 de ani).

Procesul de xerofitizare a vegetației ca urmare a intensificării eroziunii a dus de asemenea la scăderea biomasei și a valorii furajere a unor asociații de pajiste.

În majoritatea pajistilor folosite ca pășuni și pe terenurile afectate de alunecări de mare amploare se constată pătrunderea masivă a unor plante ruderaie (de exemplu, diferite specii de *Euphorbia*, *Cirsium arvense*, *Salvia nemorosa*, *S. verticillata*, *Cardaria draba*, *Sisymbrium officinale*, *Descurainia sophia* ș.a.). În văi și pe marginea drumurilor se formează adesea asociații ruderaie compacte sau tufărișuri cu participarea abundentă a unor specii ruderaie, ca *Dipsacus laciniatus*, *Inula helenium*, *Arctium lappa*, *Sambucus ebulus*; în locuri mai uscate *Reseda luteola*.

Pe de altă parte, pe mari suprafețe, vegetația naturală (pajisti secundare utilizate în general ca finete) se asociază cu cea cultivată (pomi fructiferi). Plantațiile forestiere cu esențe diferite de cele caracteristice etajelor de vegetație în care se încadrează Subcarpații au contribuit de asemenea la modificarea aspectului natural al peisajului.

Gospodărirea rațională a pădurilor, lucrările de împădurire cu esențe autohtone adecvate, măsurile susținute de ameliorare a pajistilor și de combatere a eroziunii pot constitui elemente importante de restabilire a potențialului productiv al covorului vegetal, în conformitate cu posibilitățile oferite de condițiile naturale destul de favorabile din regiunea subcarpatică.

4.1.7. Fauna

Principală caracteristică faunistică a Subcarpaților este marea eterogenitate taxonomică și ecologică a elementelor constitutive, aici coexistînd numeroase specii cu efective bogate, dar foarte puține aparținînd numai acestei unități de relief. Situația se datorește atît faptului că o serie de biotopi comuni în regiunile joase sau înalte ale țării se întîlnesc și aici, cît și orientării transversale a văilor

(considerate „canale ecologice”), care favorizează pătrunderea și deplasarea în ambele sensuri ale unor elemente de munte sau de cîmpie. Slaba stabilitate a speciilor în această unitate de relief se remarcă nu numai sub aspect fenologic, după numărul mare al speciilor migratoare, dar și din punct de vedere spațial, pe verticală, după frecvența speciilor cu o largă răspîndire altitudinală.

Unele specii găsesc aici condiții de viață (căldură și hrană) apropiate de optimul lor ecologic, dezvoltîndu-și mai bine populațiile comparativ cu cele de la cîmpie sau de la munte. Astfel, deși se întîlnesc pe aproape toate treptele de relief ale României în Subcarpați au efective mai bogate nevertebratele *Ena obscura*, *Popula muscorum*, *Jaminia tridens*, *Zonitoides nitidus* (gasteropode) *Pardosa wagleri* (araneae), *Epinephele jurtina*, *Satyris circe*, *S. dryas*, *Lasiomnata megaera*, *Agapetes pandora*, *Erebica aethiops mesorubra* (lepidoptere), *Mutilla europaea saltensis*, *Bombus sorroensis* (himenoptere), *Tapinoma erraticum*, *Aphaenogaster subterranea*, *Dolichoderus quadripunctatus*, *Formica cunicularia*, *F. rufibarbis*, *F. gagaster*, *F. cinerea*, *Camponotus aethiops* (formicide), *Poecilimon thoracicus* (orthoptere), *Lygus partensis*, *Phytocoris vandalicum* (heteroptere), *Aphis medicaginis*, *Arctosiphon pisum* (homoptere), *Cantharis livida*, *Strangalia septempunctata*, *Apion apricans*, *Phytonomus variabilis*, *Sitona lineatus*, *Polydrossus sericeus*, *Pterostichus vulgaris* (coleoptere). Aceiași situație o prezintă și vertebratele *Martes foina* (jderul de piatră), *Glis glis* (pișul mare), *Sciurus vulgaris* (veverița), *Apodemus flavicollis* (șoarecele gulerat), *Falco vespertinus* (șoimulețul de seară), *Picus canus* (ciocănitoarea verzuie), *Muscicapa striata* (muscarul sur), *Turdus philomelos* (sturzul cîntător), *Columba palumbus* (porumbelul gulerat).

Din punct de vedere zoogeografic, majoritatea speciilor au o răspîndire europeană și central-europeană, mai puține sudice și estice, ultimele două grupe găsindu-se în special în Subcarpații Getici și în Subcarpații Moldovei.

Se poate afirma că în Subcarpați există o faună destul de variată atît ca repartiție geografică, cît și ca ecologie, a cărei amprentă a fost accentuată și de dezechilibrele provocate de activitățile umane, mai evidente aici decît la munte. Ele constau, mai ales, din modificarea comunităților dendrofile și împingerea unora dintre constituenții lor la




Fig. 68. Elemente faunistice cu valoare zoogeografică deosebită : 1, Melcii *Lehmania horezia* ; 2, *Leroceras jackeli* (endemite) ; 3, lăcusta *Pocilimon thoracicus* (limita estică) ; 4, scorpionul *Euscorpius carpathicus* (enclavă) ; 5, aspretele *Romanychtys valsanicola* (exemplare izolate) ; 6, dreptea mare *Apus melba* (specie recent pătrunsă) ; 7, nisiparnița *Sabanejewia romanica*.

altitudini mai înalte, concomitent cu expansiunea unor animale de cîmpie. Este cunoscută, de exemplu, retragerea ieruncii (*Testudo bonasia*) spre pădurile montane compacte și înaintarea dinspre cîmpie, în terenurile deschise de la deal (pajiști, terenuri agricole), a speciilor *Lacerta agilis* (șopîrla de cîmp), *Perdix perdix* (potîrnichea), *Alauda arvensis* (ciocîrlia de cîmp), *Saxicola rubetra* (mărăcinarul striat) și a fluturelui *Cledeobia moldavica*.

Prin livezi pot fi văzute *Phoenicurus phoenicurus* (codroșul de grădină), *Sturnus vulgaris* (graurul), *Parus major* (pițigoiul mare), *P. lugubris* (pițigoiul de livadă). Atît livezile, dar mai ales plantațiile de pin din Subcarpați au favorizat expansiunea și stabilirea și aici a sturzii de iarnă sau cocosarul (*Turdus pilaris*).

Pe văi s-au infiltrat unele specii, cum sînt *Coturnix coturnix* (prepelita), *Galerida cristata* (ciocîrlanul moțat), considerate forme de avangardă ale faunei de cîmpie sau au pătruns o serie de elemente faunistice sudice, semnalate recent în fauna României, ca *Emberiza cirrus* (presura bîrboasă) și *Apus melba* (dreptea mare).

Referitor la speciile sudice, trebuie adăugat faptul că pentru foarte multe dintre ele Subcarpații Getici reprezintă limita nordică a arealului lor, culmile Carpaților fiind un obstacol de neînvins (atît datorită înălțimii, cit și a unor factori de mediu), fenomen observat la fluturele *Perisomena caecigena*, melcul *Deroceras absoloni*, lăcusta *Conocephalus hastatus* etc.

O particularitate a faunei subcarpatice este și aceea că tabloul taxonomic și populațional sîrăcește în elemente meridionale (mediteraneene, balcanice) pe măsură ce se

înaintează dinspre vest spre nord-est, unele specii nedepășind bazinul Oltului : *Testudo hermanni hermanni* (broasca țestoasă de uscat), *Vipera ammodytes* (vipera cu corn) dintre reptile, *Pocilimon thoracicus* dintre ortoptere etc. Doar în Subcarpații de la Curbură există cîteva enclave cu stațiuni relict ale unor elemente mediteraneene, ca *Euscorpius carpathicus* (scorpionul), în care populațiile au rămas probabil din perioada xerotermă a holocenului mediu (fig. 68).

Analizate din punctul de vedere al stabilității, se constată predominarea formelor migratoare, precum și a celor care efectuează deplasări sezoniere importante, fenomen marcant mai ales la avifaună. Astfel, în timpul iernii vine ca oaspete de iarnă păsărarul (*Accipiter nisus*), iar vara apar gaia brună (*Milvus migrans*), viesparul (*Pernis apivorus*) etc.

De la altitudini mai mari, în sezonul hiernal coboară *Pyrrhula pyrrhula* (căldărașul), *Buteo buteo* (șorecarul comun), *Dryocopus martius* (ciocănitoarea neagră), *Eri-thacus rubecula* (măcăleandru), *Troglodytes troglodytes* (pănțarușul), *Tringa hypoleucos* (fluierarul de munte), iar în sezonul estival urcă cineparul (*Carduelis canabina*) etc. În Subcarpații Getici, s-a observat că în iernile aspre coboară chiar și brumărița (*Prunella modularis*) și codroșul de munte (*Phoenicurus ochruros*).

Deplasări zilnice pe verticală, în căutarea hranei, efectuează *Garrulus glandarius* (gaița), precum și toate răpitoarele.

În acest fel se realizează un schimb permanent de indivizi între formațiunile faunistice montane, subcarpatice, de dealuri și de cîmpie, determinînd configurații biocenotice divergente, cu o arhitectonică struc-

turală îmbogățită în specii de cimpie (care ocupă nișele părăsite de elementele montane sau pe cele create de om prin transformarea mediului) în teritoriile mai joase și în cele cu expunere sudică și cu numeroase elemente montane în teritoriile mai înalte sau în cele cu expunere nordică.

Cu toată această mare diversitate zootaxonomică, ecologică și genetică, Subcarpații nu sînt lipsiți de unele elemente faunistice particulare. Astfel, sub acțiunea unor factori fizico-geografici locali, s-au dezvoltat și perpetuat cîteva specii noi, endemice, cu arealul limitat numai la această unitate de relief, ca *Lekmania horezia*, *Deroceras jakeli* (gasteropode), *Pseudocoila luteicornis*, *Charips rufus* (himenoptere), *Dicampa silvicola* (diptere), *Antispalus bilobus* (diptere), *Romanosoma oltenica* (diplopoide), *Acerentomon rostratum* (protur), *Melanothrips knechteli* — în Subcarpații Getici; *Phanerotomella flava*, *Charips flavipes*, *Gronotoma ionescui* (himenoptere), *Haplothrips clavicornis* — în Subcarpații Buzăului și Teleajenului; *Carabus antipai* (coleoptere), *Argana moldavica* (gasteropode), *Phloeothrips bacauensis* (tisanoptere) — în Subcarpații Moldovei.

Cîteva endemisme au limitele extreme ale arealelor în afara granițelor acestei unități geografice, fiind prezente și în Cimpia Română, ca *Kleidotoma fusca*, *K. coxalis* (himenoptere), sau în Carpați, cum este *Carabus alutensis* (coleoptere), trăind similitudinea condițiilor de viață din unii biotopi, precum și anumite legături paleogeografice ale celor trei mari unități de relief.

Cu totul excepțional, în unii biotopi conservativi au supraviețuit organisme care au persistat în pofida unor condiții de viață (climatice, în special) cu totul potrivnice, rămînînd cantonate azi doar în cîteva puncte care indică o anumită situație ecologică. Se cunoaște astfel că *Ferrissia wautieri*, gasteropod relict într-o stațiune din Subcarpații Teleajenului, are adaptări pentru un climat mai cald ca cel actual al regiunii.

În condițiile speciale ale unor biotopi, asociațiile faunistice subcarpatice cuprind și unele rarități excepționale pentru fauna României, cum este pasărea *Hippolais pallida* (frunzărița cenușie), fluturile *Phytometra cheiranti* etc. Dacă acestea sînt rare datorită potențialului lor redus de înmulțire sau a factorilor de mediu mai puțin propice dezvoltării lor, sînt alte animale care și-au restrîns arealul și și-au diminuat efectivele

în urma acțiunilor antropice. Pentru salvarea lor de la dispariție s-au luat măsuri de protecție, fiind declarate monumente ale naturii și ocrotite de lege. În Subcarpați se întîlnesc (unele numai accidental) *Bubo bubo* (bufnița), *Corvus corax* (corbul), *Tichodroma muraria* (fluturașul de stîncă), *Aquila pomarina* (acvila tipătoare mică), *Lynx lynx* (rîsul) și *Testudo hermanni hermanni* (broasca țestoasă de uscat).

În ceea ce privește fauna acvatică, aceasta se îmbogățește considerabil (comparativ cu cea de munte), paralel cu diversificarea substratului, hranei și atenuarea variațiilor regimului termic, aici întîlnindu-se atît specii de munte, cît și de dealuri.

La nevertebrate s-a constatat (îndeosebi în riurile mari) o tranziție faunistică bruscă de la munte la deal, în sensul reducerii importanței trichopterelor și efemerelor, concomitent cu creșterea valorii altor grupe ca: odonatele, izopodele, nematodele și hirundineele. Unele grupe sînt reprezentate prin specii ecologic-vicariante. Astfel, la planarii *Oreobia alpina* este înlocuită de *Dugesia groenlandica*.

La vertebrate, crește numărul formelor euriterme. În riurile mai mici din Subcarpații Getici ihtiiofauna este dominată de lipan (*Thymallus thymallus*) și moioagă (*Barbus meridionalis petenyi*), în Subcarpații de la Curbură de lipan, moioagă și clean (*Leuciscus cephalus*), iar în Subcarpații Moldovei de clean și scobar (*Chondrostoma nasus*). În majoritatea riurilor mari, frecvența cea mai mare o are scobarul, cu excepția Bistriței în care predomină mreana (*Barbus barbus*). În repezișuri, la vaduri, trăiește porcușorul de vad (*Gobio uranoscopus*). În unele riuri mai mici, dacă condițiile de viață nu sînt cele mai bune (curs lent, porțiuni nisipoase și milcose, variații mari ale temperaturii apei), dominantă devine moioaga (*Barbus meridionalis petenyi*).

În afara acestor pești, care dau nota caracteristică ihtiocenozelor, există și alte specii care contribuie la constituirea comunităților respective. Unele coboară din amunte și de aceea se întîlnesc doar în porțiunile riurilor cu apă mai limpede și mai oxigenată, ca *Phoxinus phoxinus* (boiștean), *Noemacheilus barbatulus* (grindel) și *Cottus gobio* (zglăvoaca). Altele pătrund în zona subcarpatică a riurilor din regiunile joase și de aceea sînt mai frecvente în avale, ca *Alburnoides bipunctatus* (beldiță), *Gobio gobio* (porcușor), *Barbus barbus* (mreana), precum și

Leuciscus leuciscus (clean mic), acesta în Subcarpații Olteniei.

În Rîul Vilsan coboară din sectorul lacului Vișan—Brădetu (singura porțiune de riu din țară unde se mai găsește) exemplare izolate de *Romanychthys valsanicola* (asprete), paleoendemism cu valoare relictară, care în trecutul apropiat se găsea și în câteva sectoare carpatice și subcarpatice ale Rîului Doamnei și Argeșului, din care a dispărut datorită transformării radicale a biotopilor acestora.

Semnificația biogeografică a acestui pește este deosebit de mare, întrucît arată unicitatea acestui biotop, precum și vechimea paleogenă a faunei respective.

Un alt element valoros din punct de vedere științific este și *Sabanejewia romanica* (nisi-parnița), endemism românesc cantonat și în râurile din Subcarpații de la vest de Dimbovița.

Dintre batracieni, trăiește (îndeosebi în timpul reproducerii) în pîraie, râuri și în apele stagnante, *Bombina variegata* (buhaiul de baltă cu burta galbenă), *Rana temporaria* (broasca roșie de munte) și *Triturus alpestris* (tritonul de munte). În câteva locuri din Subcarpații Moldovei coabitează și *Triturus montandoni* (sălămizdra carpatică), cel mai important endemism al Carpaților Orientali.

Pe lângă râuri, de unde își procură o mare parte de hrană, au o frecvență ridicată și în câteva păsări, ca *Motacilla alba* (codobatura), *M. flava* (codobatura galbenă), *Charadrius dubius* (prundărașul gulerat mic), iar pe lângă pîraie *Motacilla cinerea* (codobatura de munte), *Cinclus aquaticus* (pescărelul negru) etc.

Condițiile naturale atît de diverse ale Subcarpaților au făcut posibilă și prezența unui contingent numeros de animale valoroase sub aspect economic. O însemnătate deosebită prezintă speciile de interes cinegetic, dintre care populații mai bogate pe întreg cuprinsul dealurilor subcarpatice au căprioara (*Capreolus capreolus*), iepurele (*Lepus europaeus*), mistrețul (*Sus scropha*), jderii (*Martes martes*, *M. foina*), vulpea (*Vulpes vulpes*) etc.

A început să fie tot mai frecvent, în urma măsurilor de protecție, ursul (*Ursus arctos*), care își extinde arealul din zonele de munte unde se retrăsese ca urmare a vînații intensive.

În ultimul timp, pentru ocuparea unor nișe ecologice libere au fost colonizate și

cîteva specii de vînat apreciate pentru carnea și blana lor, ca fazanul (*Phaseanus colchicus*) în majoritatea Subcarpaților, lopătarul (*Dama dama*) în Subcarpații Vîlcii, Buzăului și Vrancei, muflonul (*Ovis musimon*) în Subcarpații Vîlcii și Buzăului, lapinul (*Oryctolagus cuniculus*) în Subcarpații Vîlcii etc.

4.1.8. Solurile

În briul dealurilor subcarpatice sînt condiții pedogenetice favorabile solurilor brune-mezobazice, brune luvice și luvisolurilor albice și, într-o măsură mai mică, la limita superioară, spre munte, pentru soluri brune acide, iar spre cîmpie și spre Podișul Moldovei, pentru soluri cenușii și chiar cernoziomuri cambice. Dar condițiile locale, de relief, de rocă, de umezeală, de topoclimă, de vîrstă a reliefului și de procese modelatoare, caracteristice acestei regiuni, fac ca aici să fie un mozaic de soluri dintre cele mai variate, atît ca mod de alcătuire, cît și ca areale, așa cum nu mai găsim nici în regiunea muntoasă, și nici în cîmpie sau în podișurile de la exteriorul Subcarpaților, ca de altfel nici în celelalte regiuni ale țării.

În unele părți, cu relief monoton și cu o alcătuire uniformă, cum este cazul unei bune părți din Subcarpații Olteniei, din Subcarpații Moldovei, din bazinul Teleajenului și mai ales al Nișcovului, se găsesc soluri evoluat și uniforme pe întinderi mari. Pe vechile șesuri aluviale, ca și pe resturile de piemonturi sau glacisuri de acumulare, unde erau în genere „dumbrăvi”, păduri de stejar (*Quercus robur*), din care mai sînt încă mulți martori, apar de regulă soluri brune luvice pseudogleizate pînă la pseudogleice. În unele arii lipsite de drenaj se găsesc chiar petice mlăștinoase, pe cînd în altele, cu drenaj bun și cu influențe climatice mai pronunțate dinspre munte, se găsesc soluri brune acide formate pe orizonturile superioare ale unor luvisoluri albice. Exemple grăitoare în acest sens se găsesc pe unele terase vechi din partea de sud-vest a Depresiunii Cîmpulung și la sud-vest de aceasta.

Pe multe dintre pîrînișurile nordice ale dealurilor subcarpatice, sculptate în roci neutre sau acide, se formează soluri brune acide sau se constată trecerea de la soluri brune luvice la soluri brune acide caracteristice pădurii de fag cu afin. Cu totul local, aceste soluri apar, chiar și sub pădurea

bătrână de gorun cu afin, cum este cazul pe unele înălțimi din Subcarpații Moldovei, din Subcarpații de la Curbură și chiar mai spre vest. În partea joasă a Subcarpaților, de la Prahova pînă la Buzău, pe povîrnișuri întinse și cu înclinare relativ mică, sub 10—15°, se găsesc soluri brune relativ humifere, cu un colorit roșcat, ceea ce a făcut pe unii cercetători să le considere soluri brune roșcate; se pare, însă, că e vorba mai degrabă de un sol fosil, cu rol de rocă mumă pentru solul actual, care e un sol brun și brun luvic. În marginea de nord-est a Subcarpaților Buzăului (la nord de riul Buzău), se face contactul între soluri negre clinomorfe, mai mult sau mai puțin evoluat, și soluri pseudorendzinice și cernoziomurile cambice, cu înfățișare relativ apropiată, încît limita se poate pune cu multă greutate. Mai departe, spre nord, în partea de jos a Subcarpaților Moldovei, se găsesc soluri cenușii și soluri brune luvice.

Pe relieful sculptat în sedimente marnoase, unde rolul principal în modelare îl au deplasările de teren și unde relieful este în genere depresionar și cu o înfățișare monotonă, sînt soluri intrazonale, determinate fie de rocă (pseudorendzine și chiar rendzine), fie de umezeală (soluri humicogleice), fie atît de umezeală, cît și de rocă (soluri negre clinomorfe). Exemple grăitoare în această privință sînt în Depresiunea Drajna—Chiojd, în partea de est a Depresiunii Cîmpulungului, precum și în partea de sud și în vestul părții centrale a Depresiunii Tazlăului. Pe arii mai mici, dar destul de numeroase, solurile intrazonale se întîlnesc în Subcarpații de la Curbură, și din ce în ce mai rar la vest de Teleajen.

În jurul ivirilor de sare sau în lungul pîrîiașelor cu conținut bogat de săruri — oglindit și în toponime, ca Murătoarea, Saramura, Sărățel, Slănic ș.a. — apar și sărături, dar numai pe arii mici; aceasta cu deosebire de la Buzău spre est-nord-est, pînă dincolo de Slănicul Buzăului și în Depresiunea Vrancea.

Pe relieful sculptat în roci argiloase, sărace în carbonați, în multe locuri în alternanță cu nisipuri, la care se mai adaugă local chiar pietrișuri, se găsesc soluri brune și mai ales brune luvice, pe locurile drenate, și soluri gleice sau mlăștinoase în locurile cu exces de umezeală, dar acestea ocupă suprafețe mult mai mici. Între solurile cu drenaj bun și cele cu exces de umezeală, sînt soluri cu caractere intermediare.

Evoluția solurilor de pe povîrnișurile supuse deplasărilor este adesea întreruptă și chiar schimbată, ca urmare a modificării condițiilor de drenaj în care a ajuns materialul deplasat; în unele locuri se ajunge chiar la inversări: soluri formate în condiții de drenaj bun ajung în locuri cu exces de umezeală și invers. Exemple grăitoare în această privință sînt în Depresiunea Policiori, în ulucul Drajna—Chiojd, ca și în alte depresiuni sculptate în roci argilo-marnoase. Dar există și locuri pe povîrnișuri, fie pe pornituri vechi, fie pe roca în loc, unde se găsesc soluri brune provenite din pseudorendzine degradate sau din soluri negre clinomorfe. E drept că acestea sînt foarte rare, căci pe povîrnișurile sculptate în astfel de roci domină de obicei solurile tinere sau chiar regosolurile, din cauza instabilității terenului. Pe porniturile tinere există porțiuni cu soluri vechi, evoluat înainte de plecarea materialului din locul de obîrșie. Există, însă, și cazuri de soluri suprapuse (2—3 sau chiar mai multe) la poala povîrnișurilor repezi, ca urmare a deplasării de pe povîrniș, a solurilor formate succesiv, anumite părți ale povîrnișului rămînînd din cînd în cînd fără sol.

În regiunile cu relief accidentat, aflat într-un stadiu de pronunțată tinerețe, sculptat în sedimente relativ tari, variate cu alcătuire și structură, cum e cazul Subcarpaților de la Curbură, este o mare varietate de soluri atît ca tip genetic, cît și ca stadiu de evoluție, variînd mult pe suprafețe foarte mici. Astfel, pe culmile sculptate în roci tari, calcaroase, cum e cazul în Dealurile Istriței, sînt rendzine în diferite stadii de evoluție, de la rendzine tinere, scheletice, pînă la rendzine degradate, care evoluează spre soluri brune de pădure relativ humifere. Soluri relativ asemănătoare rendzinelor, formate pe pietrișuri aluviale calcaroase, se găsesc și pe agestrul Prahovei.

Pe lîngă rendzinele tipice, formate pe calcare, soluri asemănătoare, dar cu profil scurt și cu areal mai mic, se găsesc pe tufuri vulcanice și pe gips, roci care apar, de regulă în cuprinsul sau în vecinătatea formațiunilor marnoase ca în Depresiunea Drajna—Chiojd. Pe culmile săpate în roci grezoase sau în pietrișuri, în genere sărace în carbonați, sînt litosoluri de la care se trece la soluri brune acide scheletice, pe povîrnișurile umbrite dinspre nord, și brune luvice pe povîrnișurile sudice, ca de exemplu dealurile dintre Buzău și Bisca Chiojdului. Pe

cuestele săpate în roci marnoase apar regosoluri și soluri tinere pseudorendzinice și negre clinomorfe. Pe cele săpate în roci argiloase și nisipoase sînt regosoluri, roca la zi sau soluri mai bine formate, brune eu-mezobazice sau brune acide, îndeosebi în partea de sus a povîrnișului, iar în partea inferioară, regosoluri, soluri brune eu-mezobazice tinere și soluri cu exces de umezeală. Cuestele de pe stînga Lopatnei, de pe dreapta Buzăului, în jos de Viperești, și pe dreapta Bîstei Chiojdului, în jos de Olari, constituie exemple grăitoare.

Solurile foarte tinere, regosolurile și roca la zi ocupă întinderi destul de mari. Areele cele mai întinse se găsesc în Subcarpații dintre Teleajen și Slănicul Buzăului, cu deosebire în bazinele Lopatnei și Cricovului Sărat; și în bazinele Sibiciului, Bălăneșei, Sărățelului și Slănicului, din bazinul Buzăului, apoi în bazinul Putnei din Vrancea, al Doftanei și al Prahovei din Subcarpații Munteniei; dar ele nu lipsesc nici din ceilalți Subcarpați, numai că nu ocupă suprafețe atît de întinse.

Pe șesurile aluviale tinere, destul de întinse la unele riuri, ca Jiul, Oltul, Buzăul, Trotușul, Bistrița și altele, sînt soluri aluviale în diferite stadii de evoluție, de la protosoluri aluviale pînă la solurile zonale sau azonale spre care evoluează, adică soluri brune eu-mezobazice, soluri cenușii, soluri gleice sau humicogleice ș.a. Însușirile acestor soluri sînt variate, depinzînd, pe de o parte, de însușirile fizico-chimice pe care le are materialul de obîrșie și, pe de altă parte, de condițiile pedogenetice în care a ajuns materialul adus de ape și de stadiul de evoluție a solului. Un loc deosebit îl ocupă solurile formate pe materialul coluvial marnos, care au un colorit negricios și care evoluează spre soluri brune închise, negricioase. Ele se găsesc pe terase, alături de soluri brune luvice.

Starea naturală a solurilor a suferit modificări ca urmare a activității omului, care a adus modificări atît solului, cît și unora dintre factorii pedogenetici. Astfel, cea mai mare parte a solurilor din Subcarpați, formate în condiții de climă și de vegetație de pădure, se găsesc acum fie sub pajiste, fie sub diferite culturi agricole; îndeosebi pe șesul teraselor și pe povîrnișurile cu înclinare mai mică și mai bine însorite. Unele dintre acestea au fost despădurite de timpuriu (cum sînt povîrnișurile dealurilor dinspre cîmpie), iar altele la sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX.

Urme ale unei activități agricole intense, pe suprafețe părăsite în prezent sînt numeroase, ca de exemplu „agroterasele”, vechi haturi înălțate, ca urmare a modului de arare a terenului; apoi toponimele și altele. Nume ca „Dealul Viei”, unde nu se mai cultivă via, arată că acolo a fost vie în trecut. Cu toate că se lucra cu unelte primare, slabe și cu tracțiune animală sau chiar cu sapa, solul de pe suprafețe întinse a fost erodat în diferite grade (mai puternic pe povîrnișuri), ajungîndu-se la rocă pe întinderi mari. În unele regiuni, ca în Subcarpații Vrancei și în Subcarpații Buzăului, degradarea este foarte puternică. S-a afirmat de multe ori că degradarea a fost cauzată de exploatarea pădurilor. Fără a nega înriurirea dăunătoare a acestor acțiuni asupra solului nu trebuie scăpat din vedere că elementul hotărîtor a fost echilibrul precar al povîrnișurilor. Relieful sculptat în genere în roci friabile are un caracter de pronunțată tinerețe. De aceea, intervenții foarte mici au avut urmări mari. Chiar numai pășcutul intens pe anumite povîrnișuri, sau trecerile repetate prin unele locuri au dat naștere unor torenți dintre cei mai impresionanți.

În ultima vreme, folosindu-se tracțiunea mecanică și unelte puternice, solul a fost răscolit tot mai adînc și mai ades. Îndeosebi „desfundarea”, aratul adînc, cu pluguri mari pentru plantat vie; răscolește solul pe toată grosimea lui, sfărîmîndu-l și inversîndu-l. Pe unele arii, unde solul este subțire, se scoate la suprafață chiar și roca pe care s-a format solul. În acest fel, omul ușurează deslănțuirea proceselor de eroziune. În unele locuri eroziunea a dus chiar la degradarea solurilor de pe podul teraselor, de la poala povîrnișurilor, ca urmare a depunerii materialului adus de pe povîrniș, care poate avea însușiri total diferite de acelea ale solului pe care-l acoperă. Astfel, peste soluri fertile, cum sînt șesurile teraselor Buzăului, este adus de pe povîrniș pietriș sau nisip lipsit de substanțe nutritive, sau chiar marnă cu săruri.

Terenurile cu solurile cele mai bune, de pe terase și de pe povîrnișurile sudice, domoale și însorite, sînt folosite pentru agricultură. Sînt cultivate îndeosebi cereale, pomi, viță de vie și în multe cazuri chiar culturi mixte. Vița de vie ocupă suprafețe foarte întinse în marginea dinspre cîmpie îndeosebi de la Teleajen spre est pînă la Buzău și apoi spre nord-est pînă aproape de Trotuș. Se cunosc cazuri cînd pe suprafețe

destul de mari, lucrările agricole de care are nevoie via au dus și duc în continuare la degradarea solurilor, aproape pretutindeni pe povișurile cu podgorii. Terenurile mai puțin favorabile agriculturii sînt acoperite de pajști și de pădure. O parte însemnată a suprafețelor acoperite de pajști au fost folosite în trecut și pentru agricultură (cereale, cartofi etc., și mai ales pomi). Chiar acum, pe unele suprafețe de pajști sînt cultivați și pomi. Pădurea ocupă, în genere, suprafețele cele mai puțin favorabile, povișuri repezi, supuse eroziunii, sau „dosuri”. Așa sînt Subcarpații dintre Teleajen și Dîmbovița și mai ales cei de la apus de Brăția. Pădurea ocupa pînă de curînd, și mai ocupă încă, cea mai mare parte a unor vechi șesuri aluviale din depresiunile subcarpatice cu soluri foarte umede, pseudogleice podzolite sau brune luvice pseudogleizate puternic; aceasta mai ales în depresiunile subcarpatice ale Gorjului. Pe unele dintre acestea s-au plantat recent pomi sau se încearcă alte culturi. Pentru a avea rezultatele scontate se impun lucrări de ameliorare a acestor soluri, drenarea și îngrășarea lor. Pădurea ocupă terenuri mai bune numai în vechile „braniști” ale mănăstirilor, ca de exemplu în partea de est a ulucului depresionar Singer—Gura Nișcovului și pe rama nordică a acestui uluc, pe Dealurile Ciolanului.

Pe suprafețele cu soluri erodate puternic și foarte puternic, care sînt destul de mari în unele sectoare, cum este cazul de la Buzău spre răsărit pînă în Vrancea, s-au făcut și sînt în curs diferite lucrări de ameliorare. Astfel, pe povișurile erodate s-au plantat rășinoase (pin, molid și brad), salcîm și alte specii de foioase. În unele locuri însă nu s-a ținut seamă nici de însușirile solului sau rocii și nici de cerințele speciilor plantate (s-au plantat rășinoase, îndeosebi pin, pe povișuri sculptate în marne cu săruri) și, ca urmare, plantațiile acestea au fost în mare parte compromise.

4.1.9. Populația și așezările

Subcarpații s-au înscris, încă din vechime, ca una dintre cele mai intens populate regiuni ale României. În această privință este elocvent faptul că, deși ei ocupă numai 6,9% din teritoriul României, în arealul lor trăiește aproape 10% din populația țării. Poziția geografică favorabilă, între munți și podiș sau cîmpie și propriile lor resurse de sol și

subsol au dus la o dezvoltare timpurie a vieții social-economice, mult amplificată cu cît ne apropiem de vremurile actuale. Pe plan regional, Subcarpații se diferențiază sub aspect antropogeografic printr-o serie de trăsături care se deosebesc în cuprinsul lor prin utilizarea terenului, modul de organizare a vieții social-economice (în cea mai mare parte de factură rurală), prin mărirea, structura, textura și funcțiile așezărilor etc.

Prin structura geografică complexă și prin bogăția și marea varietate a resurselor naturale, Subcarpații se remarcă printr-un vechi și ridicat grad de umanizare a peisajului. Folosirii din vechime a resurselor solului (păduri, pășuni, finețe etc.) și a sării de la Ocnele Mari (județul Vâlcea), Slănic (județul Prahova) și Tirgu Ocna (județul Bacău) li se adaugă, relativ recent, utilizarea unor importante bogății de subsol: țiței, gaze, cărbuni, ape minerale, materiale de construcții etc. Aceste activități au exercitat o influență permanentă asupra repartiției, evoluției și structurii populației, ajungîndu-se la o mare diversitate de forme în profil teritorial.

În cuprinsul și în apropierea imediată a Subcarpaților, descoperirile arheologice au scos la iveală urme materiale care atestă prezența omului și, în general, locuirea străveche și continuă a acestui spațiu. Vestigii materiale din neoliticul inferior (aparținînd culturii Criș) și mijlociu (cultura Boian) au fost descoperite în Subcarpații de la Curbură și în cei ai Moldovei. Din neoliticul superior, urme ale culturii Sălcuța, s-au găsit în Subcarpații Gorjului și ai Vîlcii, în Muscelele Argeșului și în vestul Subcarpaților de la Curbură. De asemenea, s-au găsit numeroase vestigii arheologice din epoca bronzului mijlociu și tîrziu în Subcarpații Getici (culturile Verbicioara și Tei), în Subcarpații Buzăului și ai Vrancei (culturile Monteoru și Tei) și în Subcarpații Moldovei (culturile Monteoru și Costișa), (R. Florescu și colab., 1980). Din antichitate s-au descoperit urme de cetăți din timpul geților și dacilor la Piatra Neamț (Petrodava) și Piatra Șoimului (județul Neamț), la Cîndești, Cîrlomănești, Pietroasele (județul Buzău), la Gura Vîtioarei (județul Prahova), Cetățeni (județul Argeș), Ocnița (Buridava) (județul Vâlcea), Polovragi, Rășina (județul Gorj). Urme de așezări și necropole geto-dace au fost găsite la Birsești și Bontăești (județul Vrancea), Drajna

de Sus (*Ramidava*) Vadu Săpat (județul Prahova), Curtea de Argeș, Cepari, Tigveni (județul Argeș), Cozia, Rîureni, Ocnele Mari, Băile Govora, Ferigile, Vaideeni (județul Vilcea), Drăgoești, Telești (județul Gorj). Tezaure monetare geto-dace, podoabe și vase de argint au fost descoperite la Răcoasa, Clipicești, Dumbrăveni (județul Vrancea), Coada Malului (județul Prahova), Jiblea (județul Vilcea), Adîncea (județul Dîmbovița), Poiana (județul Gorj).

Vestigii arheologice aparținînd epocii romane (sec. II—III) sînt mult mai numeroase și mai variate (așezări daco-romane, castre, orașe fortificate, drumuri, exploatări miniere, băi etc.). Sînt de menționat aici cele care însoțesc drumurile din lungul apelor sau care traversează pasurile carpatice, ca de exemplu în lungul Jiului (Bumbești—Jiu), al Oltului (*Arutela*—Bivolari; Rădăci-nești—Jiblea; *Castra Traiana*—Sîmbotin; *Buridava*—Ocnița), cel care leagă orașul Pi-tești cu Branul (*Jidava*) etc., cele din lungul Teleajenului (Drajna de Sus), Buzăului (Cio-lanu), Rîmniceului (Oratia) etc. Din secolele IV—X, cele mai multe urme de viață au fost descoperite în Subcarpații Buzăului (la Slon, Chiojdu, Berca, Sărata Monteoru etc.) și Subcarpații Prahovei (la Gornet Cricov, Bozieni, Vadu Săpat etc.), unde și astăzi peisajul se evidențiază printr-un grad înalt de utilizare a resurselor și printr-o mai mare aglomerare a populației, decît în alte părți ale Subcarpaților.

Toate aceste mărturii dovedesc capacita-tea intens icumenică a acestui spațiu geo-grafic, unde populația, atrasă de multiplele posibilități de trai, a cunoscut un proces de aglomerare continuu. Această locuire stră-veche explică și faptul că în prezent în Sub-carpați există o densitate mult mai mare de populație decît în alte regiuni ale țării și o valorificare mult mai intensă a resurselor naturale. Ariile depresionare, care au oferit condiții favorabile pentru viață, sînt mai populate decît dealurile subcarpatice, care și în prezent sînt acoperite în mare parte cu păduri și pășuni. Aici s-a dezvoltat din timpuri îndepărtate o economie variată și de aici porneau drumuri pe care se transpor-tau produse exploatare în diferite locuri ale regiunii: drumul sării, drumul păcurii, dru-mul vîrărilor, drumul găzarilor etc. Pe aceste drumuri se făcea un intens schimb de pro-duse între munte, deal și cîmpie.

Pînă la jumătatea veacului XIX, docu-mentele cartografice consemnează existența

celor mai mari sate în Subcarpați, o regiune mai bine populată decît cîmpia pînă spre sfîrșitul secolului XIX. Așezările de la contactul cu regiunea muntoasă au folosit în mod complementar, mai mult și mai lesne decît altele, resursele celor două unități geografice. Pentru multe porțiuni subcar-patice, satele de sub munte sînt mai vechi decît cele din cuprinsul Subcarpaților (I. Conea, 1932 a, p. 5). Legătura strînsă a Sub-carpaților cu Carpații este pusă în evidență și de localizarea moșilor sătești, care, de forma unor fișii relativ înguste, s-au desfășurat din preajma vetrelor, de la poalele munților, și pînă departe pe crestele ace-s-tora.

Dezvoltarea vieții social-economice, în general, și a agriculturii, în special, au dus de-a lungul secolelor la modificări însemnate ale peisajului original al Subcarpaților. Pă-durea a fost defrișată și înlocuită pe supra-fețe mari cu terenuri agricole, terenuri con-struite, drumuri etc.

Bogăția mare din trecut a pădurii, cu un rol de bază și în continuitatea populării acestui spațiu, precum și utilizarea acesteia, devenită tradițională, este bine reflectată în toponimie. Există aici peste 70 de sate (3,5% din totalul satelor regiunii subcar-patice), ale căror denumiri desemnează această bogăție¹.

Rețeaua hidrografică a avut un rol polari-zator în localizarea așezărilor și în aglome-

¹ Ele provin de la nume de arbori ca: *Măceșu* (orașul Tîrgu Cărbunești) și *Stejarul* (comuna Roșia de Amaradia), județul Gorj, *Teiu* (comuna Galicea), județul Vilcea, *Brăduleț*, județul Argeș, *Mesteacăn* (comuna Văleni-Dîmbovița, *Cornu de Jos*, *Cornu de Sus* (comuna Cornu) județul Prahova, *Plopu* (comuna Gura Calîței), județul Vrancea, *Corni*, județul Bacău etc.; de la asociații de arbori ca: *Aluniș*, *Frăsinet* (orașul Breaza) și *Făgetu*, (comuna Gura Vitioarei), județul Prahova, *Ulmet* (comuna Vîrfuri), județul Dîmbovița, *Cornet* (comuna Poduri), județul Bacău, *Crîng* (comuna Pătîrlagele), județul Buzău; sau de la cele care definesc locuitorii din preajma pădurii, ca: *Pădurenii* (comuna Timboești), *Pădurenii* (comuna Jariștea), județul Vrancea, *Pădurenii* (comuna Tisău), județul Buzău, *Pădurețu* (comuna Băbeni), județul Vilcea etc.

Oiconimele care, prin denumirea lor, surprind sau amintesc acțiunea, procesul îndelungat de despădurire (secolele XV—XIX), ca și tehnicile folosite pentru de-frîșarea pădurii sînt, de asemenea, numeroase. Din totalul de aproape 2000 de sate subcarpatice 2,5% au denumiri care sînt legate de acest proces de înlocuire a pădurii: *Arsuri* (comuna Schela), *Dumbrava* (comuna Drăguțești), *Poienari* (comuna Bumbești-Pițic), *Seciurile* (comuna Roșia de Amaradia) și *Runcu*, județul Gorj, *Jariștea*, județul Vrancea, *Poienițele* (comuna Chiojdu), județul Buzău, *Poiana Negustorului* (comuna Blăgești), județul Bacău etc.

rarea populației pe anumite spații și în structura rețelei de așezări omenestii. Văile râurilor mari, ca și ale multora din cele mici reprezintă tot atâtea șiruri sau culoare de așezări. În lungul lor s-au instalat și principale artere de circulație, spre a face

zona de contact cu Cîmpia Română și Piemontul Getic s-au dezvoltat orașele: Rovinari (declarat oraș în 1981), Tâceni, Tîrgu Cărbunestii, Curtea de Argeș, Moreni, Cîmpina, Băicoi, Plopeni, Boldești-Scăeni. Din cele 31 de orașe, 11 se află la regiunea de




Fig. 69. Repartiția și mărimea așezărilor urbane din Subcarpați. A, Evoluția populației orașelor (1912—1989).

legătura cu regiunile de munte, pe de o parte, și cu cele de podiș și cîmpie, pe de altă parte.

Limitele antropogeografice ale Subcarpaților spre munte și spre podiș și cîmpie sînt marcate în peisaj prin numeroase așezări mari, multe din ele de factură urbană. Astfel, limita dinspre munte este bine pusă în evidență, pe lângă numeroase așezări rurale mari, și de orașele: Bumbești-Jiu (oraș din 1989), Novaci, Horezu, Băile Olănești, Călimănești, Cîmpulung, Comarnic, Slănic, Tîrgu Oena, Moinești, Piatra Neamț. La

contact cu muntele, alte 9 la contactul cu podișul și cîmpia și 11 în cuprinsul Subcarpaților (fig. 69).

Valorificarea din cele mai vechi timpuri a unor resurse de sol și subsol și exploatarea mai recentă a altora au dus la apariția unei rețele urbane cu caractere distincte în privința evoluției demografice și urbanistice și a funcțiilor social-economice.

După numărul de locuitori, orașele subcarpatice sînt foarte diferite, variînd de la 3 000 de locuitori (Băile Govora) la peste 100 000 de locuitori (municipiul Piatra Neamț)

În anul 1989, cele mai multe (24) aveau sub 25 000 de locuitori, din care 11 sub 10 000 de locuitori (Băile Govora, Ocnele Mari, Băile Olănești, Țicleni, Horezu, Novaci, Plopeni, Fieni, Tîrgu Cărbunestî, Slănic, Călimănești); trei aveau între 25 000 și 50 000 de locuitori (Cîmpulung, Cîmpina și Curtea de Argeș), două între 50 000—100 000 de locuitori (municipiile Tîrgu Jiu și Onești și două (municipiile Piatra Neamț și Rîmnicu Vilcea) de peste 100 000 de locuitori (fig. 69 A). Toate orașele, fără nici o excepție, își datorează apariția și dezvoltarea pentru o lungă perioadă de timp, valorificării industriale a unor resurse din regiune. De exemplu, orașele Ocnele Mari, Tîrgu Ocna și Slănic, își leagă geneza și evoluția ulterioară de exploatarea sării, Băile Govora, Băile Olănești, Călimănești, Pucioasa, de utilizarea izvoarelor minerale în scopuri terapeutice, Piatra Neamț, Rîmnicu Vilcea, Curtea de Argeș, Novaci de exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului și valorificarea comercială a unor produse locale, Moinești, Băicoi, Moreni, Cîmpina, Plopeni, Țicleni de industria petrolieră, Rovinari de cea carboniferă, orașele Comarnic și Fieni de prelucrarea industrială a unor materiale de construcție, Vălenii de Munte, Breaza, Buhuși etc. de prelucrarea industrială a unor materii prime locale etc. În acest sens, este de remarcat legătura strînsă dintre răspîndirea unor resurse și localizarea centrelor urbane. Cele mai multe orașe se află în sectoarele subcarpatice cu însemnate resurse de subsol. Așa este cazul Subcarpaților Prahovei (Teleajen—Dîmbovița) cu bogate resurse de petrol, unde se găsesc 11 orașe și al Subcarpaților Vileii (Olt—Luncavăț) cu sare, izvoare minerale etc., cu șase orașe (fig. 69).

Evoluția populației. La începutul secolului XX (în anul 1912), populația totală a Subcarpaților a fost de 1 298 900 de locuitori, din care 80,4% locuia la sate și numai 19,6% la orașe. Evoluția numerică ulterioară a populației totale a înregistrat un spor continuu, ajungînd în anul 1985 la 2 210 400 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de 9,6‰. Față de această creștere medie anuală, numărul de locuitori înregistrează sporuri diferite atît pe medii, cit și pe ani și regiuni. Astfel, creșterea medie anuală a populației urbane a fost de 30,3‰, pe cînd cea rurală de numai 3,4‰.

La recensămîntul din anul 1966 populația Subcarpaților se ridicase la 1 965 500 de locuitori, din care 72,0% trăia în mediul rural și 28,0% în cel urban. Creșterea medie anuală a populației între 1912 și 1966 a fost de 9,5‰. În mediul urban aceasta s-a ridicat la 21,7‰, iar în cel rural numai la 6,5‰.

Între recensămintele dintre anii 1966 și 1977, sporul absolut a fost de 162 300 de locuitori (7,5‰ în medie anual), din care 155 400 reprezintă creșterea populației urbane (25,5‰) și numai 6 900 a celei rurale (0,4‰).

Din 1977 pînă în 1985 populația totală a sporit, în medie anual, cu 5,5‰ (cea urbană cu 21,9‰, pe cînd cea rurală înregistrează o scădere de 2,6‰). În anul 1985 populația rurală reprezenta 63,0%, iar cea urbană 37,0%.

Există mari diferențe în privința evoluției și repartiției în teritoriu a populației pe cele trei mari diviziuni subcarpatice. Cea mai mare parte a populației se găsea, la începutul secolului, ca și astăzi, în Subcarpații de la Curbură, ponderea acesteia scăzînd însă de la 43,4% în 1912 la 37,0% în 1985. Faptul se explică, în primul rînd, prin extensiunea lor mai mare și aglomerarea mai de timpuriu a populației aici, ca urmare a valorificării unor resurse de subsol. Urmează Subcarpații Getici cu 31,6% și apoi Subcarpații Moldovei cu 31,4%.

Populația din Subcarpații de la Curbură trăiește însă în proporție de numai 27,0% în mediul urban, pe cînd în Subcarpații Getici populația urbană ajunge la 45%, iar în cei ai Moldovei la 40,7%. În Subcarpații de la Curbură sînt orașe mici, cu creșteri reduse de locuitori (Plopeni, Slănic, Fieni etc.), pe cînd în Subcarpații Getici sînt unele orașe cu peste 90 000 de locuitori (Tîrgu Jiu), iar în cei ai Moldovei și Getici chiar cu peste 100 000 de locuitori (Piatra Neamț respectiv Rîmnicu Vilcea), care au atras continuu populația din regiunile înconjurătoare. Sporul populației urbane se realizează, în cea mai mare parte, pe seama populației rurale și are ca rezultat o scădere a populației într-o serie de așezări rurale subcarpatice. Chiar populația unor orașe mici se deplasează spre altele mari, cu activități urbane în plină dezvoltare. Așa sînt orașele Ocnele Mari, de unde populația se deplasează spre municipiul Rîmnicu Vilcea, Novaci și Tîrgu Cărbunestî, cu populație ce migrează spre municipiul Tîrgu Jiu etc.

Tabelul nr. 2


Populația totală, urbană și rurală (1912–1935), pe cele trei principale subdiviziuni subcarpatice

		A N I I							
		1 9 1 2		1 9 6 6		1 9 7 7		1 9 8 5	
		cifre absolute	%	cifre absolute	%	cifre absolute	%	cifre absolute	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subcarpații Moldovei	Total	342 600	100,0	604 200	100,0	670 700	100,0	695 300	100,0
	urban	84 200	24,6	195 900	32,4	247 000	36,8	282 700	40,7
	rural	258 400	75,5	408 300	67,6	423 700	63,2	412 600	59,3
Subcarpații de la Curbură	Total	559 800	100,0	791 500	100,0	826 500	100,0	817 900	100,0
	urban	78 400	14,0	171 800	21,6	210 700	25,5	221 700	27,0
	rural	481 400	86,0	619 700	78,4	615 800	74,5	596 200	73,0
Subcarpații Getici	Total	396 500	100,0	569 800	100,0	630 600	100,0	697 200	100,0
	urban	92 200	23,3	186 100	32,7	251 500	39,9	313 400	45,0
	rural	304 300	76,7	383 700	67,3	379 100	60,1	383 800	55,0
Subcarpați (Total)	Total	1 298 900	100,0	1 965 500	100,0	2 127 800	100,0	2 200 400	100,0
	urban	254 800	19,6	553 800	28,0	709 200	33,3	817 800	37,0
	rural	1 044 100	80,4	1 411 700	72,0	1 418 600	66,7	1 392 600	63,0

Densitatea populației. Plecărilor unei părți a populației de la sate spre orașe au dus la modificări însemnate în evoluția numerică a locuitorilor unor așezări, în structura populației pe sexe, în structura pe grupe de vîrstă, în evoluția sporului natural, în densitatea populației în teritoriu etc. Încă de la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului XX, Subcarpații se remarcă, în ansamblu, printr-o densitate mare de populație (79,5 loc./km²) comparativ cu cea pe țară (53,8 loc./km²). Există, însă, diferențieri în repartitie la nivelul unităților geografice și mai ales la cel al comunelor. Cea mai mare densitate a populației în 1912 s-a înregistrat în Subcarpații de la Curbură (84,6 loc./km²), după care urmează Subcarpații Getici (83,1 loc./km²) și cei ai Moldovei (68,3 loc./km²). Față de aceste densități medii pe cele trei mari unități subcarpatice, în anul 1912 se întâlneau și areale cu densități de populație mult mai mari, cuprinse între 100 și 150 loc./km², ca de exemplu în Subcarpații Prahovei, unde se dezvoltase industria de exploatare și prelucrare a țiteiului, sau cu

valori sub 50 loc./km², caracteristice îndeosebi Subcarpaților Vrancei (fig. 70A). Dezvoltarea social-economică în continuare a Subcarpaților a dus la o creștere a populației cu peste 911 500 de locuitori și la schimbări importante în repartitia în teritoriu a locuitorilor. Densitatea medie a populației a sporit cu peste 56 loc./km², ajungînd în prezent la circa 136 loc./km². Cea mai densă populație se înregistrează acum în Subcarpații Getici (148,3 loc./km²) și Subcarpații Moldovei (138,7 loc./km²). În schimb Subcarpații de la Curbură, care la începutul secolului dețineau primul loc în privința densității medii de locuitori pe km², au o densitate mai mică (125,2 loc./km²) (fig. 70B). Aceste modificări sînt rezultatul valorificării intensive a resurselor subsolului (petrol și cărbune) din Subcarpații Getici și cei ai Moldovei începînd cu a doua jumătate a secolului XX și dezvoltării unor puternice ramuri industriale în principalele centre urbane din cuprinsul lor (Tîrgu Jiu, Rîmnicu Vilcea, Onești, Piatra Neamț etc.), care au

Fig. 70. Densitatea populației din Subcarpați (loc./km²) în 1912 (A) și în 1985 (B).



atras un număr însemnat de locuitori din alte regiuni.

Densitatea așezărilor. Subcarpații se remarcă și printr-o mare densitate a așezărilor (12,2 așezări/100 km²), în comparație cu celelalte regiuni și cu media pe țară (5,6 așezări/100 km²). Cea mai densă rețea de așezări se întâlnește în Subcarpații Getici (14,4/100 km²), iar cea mai rară în Subcarpații Moldovei (8,0/100 km²).

În Subcarpații Getici există o densitate mare a așezărilor în teritoriu, dar cele mai multe dintre acestea (83%) au sub 1 000 de locuitori, în schimb în Subcarpații Moldovei, unde densitatea este mică, peste 44% din așezări depășesc 1 000 de locuitori. În toată regiunea subcarpatică predomină așezările sub 500 de locuitori, în unele părți acestea reprezentând mai mult de jumătate din numărul lor, ca de exemplu în Subcarpații Buzăului (59,4%), în Subcarpații Vilcei (55,6%) etc. Sînt însă și unele părți, ca

de exemplu în Subcarpații Moldovei, unde un număr însemnat de așezări (33%) au între 1 000 și 2 500 de locuitori, majoritatea dintre acestea situate pe văile Bistriței și Trotușului (tabelul nr. 3). Foarte puține sate din Subcarpații (șapte în total) depășesc 5 000 de locuitori: Săvinești, Podoleni, Zărnești, Faraoani și Oituz din Subcarpații Moldovei, Păunești și Telega din Subcarpații de la Curbură. În toate aceste așezări cu peste 5 000 de locuitori, ca de altfel și în altele mai mici, s-au dezvoltat diferite ramuri industriale, dintre care unele cu importante ponderi în economia națională (industria chimică la Săvinești).

Tipurile funcționale de așezări. Cu resurse naturale bogate și variate, satul, factorul principal de continuitate în organizarea vieții social-economice, este unul dintre elementele cele mai caracteristice ale peisajului geografic subcarpatic, care a manifestat o mare putere de adaptare la condițiile

Tabelul nr. 3

Mărimea aşezărilor după numărul locuitorilor

	Total		sub 500		500 — 1 000		1 000 — 1 500		1 500 — 2 500		2 500 — 5 000 şi peste	
	număr	%	număr	%	număr	%	număr	%	număr	%	număr	%
Subcarpaţii Getici	679	100	335	49,3	227	33,4	69	10,2	38	5,6	10	1,5
Subcarpaţii de la Curbură	916	100,0	426	46,5	258	28,2	122	13,3	69	7,5	41	4,5
Subcarpaţii Moldovei	400	100,0	115	28,8	111	27,8	65	16,2	67	16,7	42	10,5
Total general	1995	100,0	876	43,9	596	29,8	256	12,8	174	8,7	93	4,8

mediului geografic, dovedind capacitate deosebită în crearea şi perpetuarea valorilor de cultură materială şi spirituală ale poporului român. Practicarea îndelungată a agriculturii cu două subramuri devenite tradiţionale, creşterea animalelor şi cultura pomilor fructiferi, alături de alţi factori, cum ar fi bogăţia pădurii din cuprinsul sau din apropierea lor, explică marea stabilitate teritorială a vetrelor săteşti. Mai mult decât în oricare altă parte a ţării, satul subcarpatic românesc este expresia unei vechi sinteze social-teritoriale, rezultată din legătura milenară şi multilaterală a populaţiei cu mediul său geografic. Ca urmare a acestei adaptări active şi continue, populaţia a transformat permanent peisajul natural original, prin defrişări, desteleniri etc., vetrele şi moşile săteşti luind astfel mărimi, forme, structuri, texturi şi funcţii foarte diferite.

Satul subcarpatic a îndeplinit şi îndeplineşte încă funcţii dominante agricole. Creşterea animalelor mari şi a ovinelor, asociată cu culturi agricole şi pomi fructiferi, au fost practicate aici de milenii. Creşterea animalelor nu era numai o sursă principală de hrană, ci şi una pentru îmbrăcăminte şi confecţionarea unor obiecte casnice. Există dovezi arheologice şi documente istorice care atestă existenţa multor instalaţii industriale ţărăneşti acţionate de apă (mori, pive, joagăre etc.) pe Jiu şi Gilort, pe Argeş şi Ialomiţa, pe Buzău, Rîmnic, Putna, Trotuş şi Bistriţa (*Atlas. Republica Socialistă România, 1972—1979*, Edit. Academiei, pl. VII—4). Astfel de instalaţii sînt astăzi tot

mai rare, fiind scoase din uz (unele păstrate în muzee etnografice).

Principale tipuri funcţionale de aşezări rurale din Subcarpaţi sînt aşezările agricole cu mai multe subtipuri. De exemplu, aşezările cerealier-pomicole şi de creşterea animalelor sînt predominante în Subcarpaţii Gorjului şi Vîlcii, iar cele pomicole¹ şi de creşterea animalelor sînt caracteristice Muscelor Argeşului, Subcarpaţilor Ialomiţei, Prahovei şi Buzăului. Satele cerealiere, de creşterea animalelor şi cultura cartofului au răspîndire mai mare în Subcarpaţii Moldovei.

În partea central-vestică a Subcarpaţilor de la Curbură, aproximativ între văile Slănicului (de Buzău) şi Dimboviţei, în tot mai multe aşezări au apărut activităţi industriale legate de extracţia cărbunelui, ţiteiului, gazelor de sondă, a unor materiale de construcţii etc., care au făcut ca unele dintre aşezările agricole să se transforme în aşezări agroindustriale. Caracterul agricol este dat de obicei de producţia pomicolă, multe din satele subcarpatice fiind renumite în acest sens. Sînt cunoscute astfel prin suprafeţele mari de livezi şi prin producţia

¹ Ca străveche activitate a locuitorilor regiunii subcarpatice, pomicultura este reflectată şi astăzi prin numeroase toponime (oicnime) ca: Pruneşti (comuna Albeni), judeţul Gorj, Livadia (Băile Olăneşti), Cireşu (com. Stroceşti) judeţul Vîlcea, Nucşoara (com. Nucşoara) şi Merişani, judeţul Argeş, Merişoru (com. Virfuri) judeţul Dimboviţa, Nucet (com. Chiojdeanca şi com. Gornet), Nucşoara de Sus şi Nucşoara de Jos (com. Poseşti), Rachieri (com. Valea Călugărească) judeţul Prahova, Plaiul Nucului (com. Lopătari), Ogrăzile (com. Merei), Pruneni (com. Zărneşti), judeţul Buzău, Lojniţa (com. Chiojdeni) şi Livada (com. Mera), judeţul Vrancea etc.

realizată așezări ca : Păușești-Măglași, Bunești, Muereasca, Milcoiu, Cepari, Șuici din Subcarpații Vilcii, Voinești, Dragomirești, Mănești, Buciumeni etc. din Subcarpații Ialomiței, Posești, Șoimari, Starchiojd, Drajna etc. din cei ai Prahovei, Păltineni, Sibiciu, Pătirlagele, Cislău, Scorțoasa, Cozieni, Buda din Subcarpații Buzăului, Chiojdieni și Dumitrești din cei ai Vrancei etc. Spre exteriorul Subcarpaților de la Curbură, la contactul cu Cîmpia Română, s-au dezvoltat numeroase sate cu profil viticol : Păunești, Ruginești, Cotești, Budești, Jariștea, Cîrligele, Fitionești, Movilița etc.

Este de remarcă că pentru întreaga regiune subcarpatică se înregistrează o creștere a numărului de sate cu profil agroindustrial ca urmare a exploatării resurselor subsolului și valorificării materiilor prime locale. Din această categorie fac parte : Albeni, Bustuchin, Bîlteni, Baia de Fier din Subcarpații Gorjului, Berbești, Alunu, Băbeni, Vaideeni din Subcarpații Vilcii, Arefu, Nucșoara, Berevoești, Jugur, Poienarii de Muscel, Boteni etc. din Muscelele Argeșului, Șotînga, Mărgineanca, Mănești, Fînta, Gura Șuții, Aninoasa, Doicești, Răzvad, Ocnîța, Voinești, Moroeni, Ceptura, Filipeștii de Pădure, Florești, Podeni, Telega, Păulești etc. din Subcarpații Prahovei, Berca, Arbănași, Beceni, Pătirlagele, Scorțoasa, Tisău etc. din cei ai Buzăului, Solonț, Balcani, Pirjol, Berești, Tazlău, Cașin, Căiuți, Răcăciuni, Roznov, Zănești, Răcova, Gîrleni, Crăcăoani, Costișa, Gîrcina etc. din Subcarpații Moldovei.

Este de remarcă în cadrul satelor cu profil predominant agricol din apropierea marilor centre urbane (Piatra Neamț, Rîmnicu Vilcea, Tîrgu Jiu), tendința de schimbare, de adaptare a structurii culturilor agricole tradiționale cu culturi legumicole, plante de nutreț, subarbuști pentru fructe etc. în concordanță cu cerințele tot mai mari de produse agroalimentare proaspete.

Alături de aceste tipuri funcționale de așezări, caracteristice vieții rurale subcarpatice actuale, mai există unele sate agricole care au și alte funcții, ca de exemplu funcții balneoclimaterice sau turistice. Așa sînt stațiunile balneare Săcelu, Pietrari și Costești din Subcarpații Getici, Vulcana Băi și Sărata Monteoru din Subcarpații de la Curbură, Băltătești din Subcarpații Moldovei, stațiunea climaterică Soveja din Subcarpații Vrancei, sau localitățile turistice

Berca, Pielele, Beciu, Măgura din Subcarpații Buzăului etc.

Ca repartitie geografică, cele mai multe așezări au evoluat în lungul rîurilor principale (Jiu, Olt, Argeș, Dimbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Rîmnice, Putna, Trotuș, Bistrița etc.) și a afluenților lor care sînt însoțite de tot atîtea artere de circulație. Văile rîurilor, contactul luncilor cu terasele, sau al acestora cu interfluviile, au constituit locurile cele mai favorabile apariției și evoluției vetrelor satești. Structura răsfrîată, caracteristică satului subcarpatic și în general regiunilor deluroase, nu reflectă în toate cazurile numai caracterul fragmentat al reliefului, ci în mare parte și specificul social-economic, forma de utilizare a resurselor solului. Folosirea îndelungată, în devălmășie, a terenurilor a făcut ca gospodăriile să nu aibă tendințe de îngrămădire, de adunare, ci de risipire, pentru a avea acces mai lesnicios la pădure și la apă (H. H. Stahl, 1959). În prezent, îndesirea populației, perimetrarea vetrelor, ca și amplasarea a numeroase dotări tehnico-edilitare etc. au dus la un proces general de adunare a gospodăriilor în cuprinsul vetrelor.

În Subcarpați se întîlnește o foarte mare varietate a formei, structurii și texturii vetrelor. De la formele de poligoane neregulate cu structuri adunate sau cu structuri răsfrîtate și chiar risipite, la formele areolare, alungite, liniare, tentaculare, polinucleare etc. Deși există o mare diversitate, totuși se pot deosebi cîteva tipuri de structuri și forme caracteristice celor trei principale subdiviziuni subcarpatice. Astfel, satul adunat, cu formă poligonală neregulată sau areolară și cu textură, în parte, ordonată este răspîndit în Subcarpații Ialomiței (Pucheni, Bărbulețu, Runcu, Brănești, Ocnîța, Glodeni, Măgura, Talea etc.), în Subcarpații Prahovei (Măneciu, Izvoarele, Homoriciu, Teisani, Slon, Brebu, Doftana, Telega, Scorțeni, Cocorăștii Mislii etc.) și în depresiunile din Subcarpații Moldovei (Răucești, Oglinzi, Vinători-Neamț, Grumăzești, Ghindăoani, Tirpești etc. din Depresiunea Neamțului, Bodești, Ștefan cel Mare, Mărginevi, Roznov, Podoleni, Cîndești din Depresiunea Cracău-Bistrița, Deleni, Drăgulești, Helegiu, Scorțeni etc. din Depresiunea Tazlău-Cașin). Pe areale mai restrînse, astfel de sate s-au dezvoltat și la contactul Subcarpaților de la Curbură cu Cîmpia Română (Străoane, Jariștea, Budești, Timboești,

Merci, Breaza etc.), în unele lărgiri ale văilor unor riuri (Pîrscov și Pătîrlagele pe Buzău, Mănești, Tătărani, Priboiu pe Dimbovița, Boteni pe Argeșul, Păușești-Măglași pe Rîul Olăneștilor, Bogdănești, Mihăiești pe Olt, Băbeni la confluența Bistriței Vilcene cu Oltul etc.).

Satul adunat, de tip liniar, dezvoltat în lungul rîurilor pe lungimi de mai mulți kilometri este specific Subcarpaților Gorjului. Așa sînt satele Bîlțișoara, Runcu, Sănătești, Arcani, Cîmpofeni, Stolojani, Găvănești pe Jaleș, Tetila, Curtișoară, Iezureni pe Jiu etc. Satul liniar este răspîndit și în vestul Subcarpaților Vilcii, dar aici nu mai este așa de mult extins în lungul rîurilor, ca cele gorjene. Așa sînt de exemplu satele: Cucești, Bogdănești, Cîrstănești, Oțeșani, Mănăilești (pe Luncavăț) etc. Sate liniare s-au dezvoltat și în Muscelele Argeșului (Mălureni, Stroești, Vîlsănești pe Vîlsan, Dîr-mănești, Petrești, Costești, Leicești etc. pe Rîul Doamnei), Bezdead, Costișata pe Bezdead, afluent al Ialomiței, Mărgăriți, Vintilă Vodă pe Slănicul Buzăului etc.

Satul poligonal cu structură răsfrîntă și cu textură neordonată este răspîndit aproape peste tot în Subcarpații Getici și cei de la Curbură. O frecvență mai mare se observă în Subcarpații Buzăului (satele comunelor Bisoca, Lopătari, Mînzălești etc.), în nord-estul Subcarpaților Vilcii (satele comunelor Muereasca, Runcu, Golești etc.) și în Subcarpații Vrancei.

Unele așezări rurale din Subcarpați, ca și din întreaga țară, datorită dezvoltării lor social-economice, ca urmare a exploatării și valorificării resurselor economice locale, construirii unor unități industriale (care au atras forță de muncă din împrejurimi), social-culturale și edilitare au fost decretate după anul 1950 centre urbane: Onești Comarnic, Plopeni, Boldești-Scăeni, Băicoi, Fieni, Băile Olănești, Horezu, Novaci, Tîrgu Cărbunești, Țicleni, Rovinari și Bumbesti Jiu. Pe lângă acestea și alte localități rurale au aspect urban. Printre acestea se numără Helegiu, Tîrgu Trotuș, Răcăciuni, Nicolae Bălcescu din Subcarpații Moldovei, Vidra, Pătîrlagele, Berca, Beceni, Filipești Tîrg, Voinești, Pietroșița din Subcarpații de la Curbură și Băbeni, Vaideeni, Săcelu din Subcarpații Getici.

4.1.10. Agricultura

Subcarpații pot fi considerați o regiune de tranziție între economia agricolă montană și cea a regiunilor piemontane și de cîmpie învecinate. Diferențierea reliefului într-o adevărată rețea de depresiuni (foarte variate ca dimensiuni și particularități morfologice) și masive deluroase accentuat fragmentate și supuse unei denudări actuale active a determinat dispersia și folosirea foarte diferențiată a terenurilor agricole. În văile largi și depresiunile joase, cu terase întinse predomină culturile de porumb și cartofi îmbinate cu livezi. Dealurile sînt un domeniu al pădurilor de foioase, al pășunilor, fînețelor și livezilor, dar nu lipsese nici culturile de porumb și cartofi. La contactul cu cîmpia, și anume pe versanții sudici și estici ai dealurilor Istriței și Bucovelului, pe culmile joase ale Piemontului Blăjanilor și Piemontului Odobeștilor, condițiile pedoclimatice sînt deosebit de favorabile pentru cultura viței de vie, astfel că aici s-au dezvoltat unele dintre cele mai renumite podgorii. Bogăția în fructe și struguri a permis crearea de unități importante de producere a rachiurilor (Horezu, Rîmnicu Vilcea, Curtea de Argeș, Pucioasa, Tohani, Pătîrlagele etc.) și a unor unități industriale și centre de prelucrare primară a fructelor (Rîmnicu Vilcea, Curtea de Argeș, Tîrgu Jiu, Pucioasa, Pătîrlagele, Pîrscov, Bumbesti-Pițic, Mihăiești, Cislău, Vintilă Vodă, Vidra etc.), precum și a numeroase centre de vinificație (Valea Călugărească, Pietroasele, Săhăteni, Ceptura, Tohani, Costești, Odobești, Panciu etc.). Prin cerințele mereu sporite ale acestor unități, cultura pomilor fructiferi și a viței de vie s-a extins, producția a sporit și sortimentele s-au îmbunătățit.

Centrele urbane și rurale cu activități industriale din Subcarpați, ca și cele urbane din imediata vecinătate (Ploiești, Buzău, Focșani etc.) influențează cu precădere structura culturilor de cîmp și creșterea animalelor, spre satisfacerea necesităților de aprovizionare cu produse agroalimentare.

Ca urmare a varietății condițiilor morfologice și pedoclimatice, repartiția geografică a suprafeței agricole prezintă caracter foarte variate, aproape de la o subunitate la alta, dar prezența pe suprafețe însemnate a pășunilor și fînețelor naturale a favorizat dezvoltarea creșterii animalelor, una din cele

mai vechi ocupații ale populației din toată regiunea submontană. După 1948 au fost efectuate pe suprafețe întinse lucrări de combatere a eroziunii, de ameliorare a terenurilor degradate, de terasare pentru plantarea viței de vie și a pomilor fructiferi, de îmbunătățire a pășunilor și a finețelor, adică de extindere a suprafețelor și de ridicare a

(37%), livezile și pepinierele pomicele cu 95 300 ha (10%), viile și pepinierele viticole cu circa 50 400 ha (5,4% din agricol) (fig. 71A).

Suprafața arabilă este preponderentă, dar și celelalte categorii de folosință agricolă dețin valori ridicate, comparativ cu alte regiuni, consecință a condițiilor naturale, care




Fig. 71. Suprafața arabilă (% din suprafața agricolă). A, Structura suprafeței agricole: 1, terenuri arabile; 2, pășuni naturale; 3, finețe naturale; 4, vii; 5, livezi. B, Structura terenului arabil: 1, cereale pentru boabe; 2, plante pentru nutreț; 3, cartofi, pepeni, legume; 4, plante industriale; 5, alte culturi.

productivității acestora. În prezent, suprafața agricolă, care totalizează circa 930 850 ha, ocupă 57% din suprafața totală a Subcarpaților. Predominante sînt terenurile arabile care se întind pe mai mult de 440 000 ha (circa 47% din agricol), după care urmează pășunile și finețele naturale cu 344 000 ha

favorizează dezvoltarea unei agriculturi complexe.

Suprafața arabilă este predominantă în câteva depresiuni subcarpatice (Depresiunea Neamț, Depresiunea Tîrgu Jiu), unde deține peste 60% din terenul agricol, dar în general se menține între 20 și 60% în celelalte de-

presiuni. Cele mai mici valori apar în depresiunile dintre Slănic și Buzău, în depresiunile intracolinare din Subcarpații de la Curbură și în Muscelele Argeșului, adică acolo unde relieful este mai puternic fragmentat (fig. 71).

Cerealele pentru boabe (329 000 ha) dețin cele mai întinse suprafețe din terenul arabil (64%) (fig. 71B). Dintre acestea porumbul ocupă primul loc, condițiile pedoclimatice fiind mult mai favorabile dezvoltării lui în comparație cu păioasele care se cultivă pe circa 34% din terenul arabil.

Porumbul are cea mai mare răspîndire (peste 95% din arabil) în depresiunile subcarpatice și intracolinare din Subcarpații de la Curbură. Frecvența mai mică a porumbului în depresiunile Tîrgu Jiu, Tazlău (40–60% din arabil) și Cracău (20–40%) se explică prin structura variată a terenului; alături de porumb apar, în luncă, legumele și pe terase, grîul.

Grîul și secara se cultivă pe suprafețe mai întinse pe terasele înalte din lungul văilor principale, dar condițiile pedoclimatice sînt puțin favorabile, astfel că producțiile medii la hectar nu depășesc 2 000 kg. Orzul și orzoaica sînt mai răspîndite în Subcarpații Neamțului, Tazlăului, Prahovei și Getici, unde cernoziomurile levigate slab și moderate, regimul termic și pluviometric le favorizează dezvoltarea.

Un loc însemnat în terenul arabil îl dețin plantele de nutreț. Acestea se cultivă îndeosebi în Subcarpații Moldovei, în Muscelele Argeșului, în Depresiunea Tîrgu Jiu, în depresiunile intracolinare dintre Șușița și Teleajen și în ariile din împrejurimile orașelor. Între plantele de nutreț predomină trifoiul (36%) și lucerna (32%).

Suprafețe mult mai mici sînt ocupate de cartofi (24 000 ha), legume (13 000 ha), plante industriale (18 000 ha), leguminoase pentru boabe (5 300 ha) etc.

Cultura cartofului este mai răspîndită în Muscelele Argeșului, în Subcarpații Prahovei și în Subcarpații Neamțului. Legumele se cultivă îndeosebi pe solurile aluviale, luto-nisipoase și pe cele lăcoviștite, în diferite grade de înțelenire. Sînt conturate cîteva bazine legumicole, ca de exemplu bazinul Jiului, unde se cultivă îndeosebi ceapă (16% din totalul suprafeței cultivate cu legume), tomate (13,6%) și varză (12,3%), bazinul Bistriței, unde tomatele ocupă 24,6% din suprafața cultivată cu legume, iar ceapa 20,5%. În vestul Subcarpaților legumele sînt

puțin reprezentate, cu excepția unor arii din lungul Oltului, Prahovei, Buzăului și Putnei.


Din suprafața cultivată cu plante industriale, inul pentru fibră ocupă peste 39%, sfecla de zahăr în jur de 35% și cînepa pentru fuior 12%. Inul are o răspîndire mai mare în depresiunile Neamțului și Tazlăului, ca și în cele dintre Rîmnice și Teleajen, unde cernoziomurile degradate și climatul mai răcoros oferă condiții favorabile de dezvoltare. În privința sfeclei de zahăr, Subcarpații Moldovei dețin 90% din suprafața cultivată în toată regiunea subcarpatică.

Între culturile de leguminoase pentru boabe predomină fasolea (50%), cultivată cu precădere pe terenurile din lungul apelor. Mazărea și soia dețin, fiecare, aproximativ 15% din terenurile ocupate cu leguminoase și au o răspîndire mai mare în Depresiunea Cracău–Bistrița, Depresiunea Tazlăului (soia), în depresiunile intracolinare dintre Rîmnice și Slănic și în Depresiunea Tîrgu Jiu (mazărea).

Cultura vitei de vie este o îndeletnicire veche în Subcarpați și practic, în raport cu particularitățile locale ale condițiilor pedoclimatice, se întîlnește în aproape toată regiunea, dar cu precădere în Subcarpații de la Curbură și în partea vestică a Subcarpaților Getici. Cele mai întinse suprafețe viticole (ocupînd între 20 și 40% din terenul agricol) se găsesc pe versantul meridional al dealurilor Istriței și Bucovelului și la exteriorul Subcarpaților dintre Rîmnice și Șușița, acolo unde, de fapt, s-au dezvoltat unele dintre cele mai importante podgorii ale României (fig. 72B).

Podgoria Dealul Mare–Istrița, extinsă pe versanții dealurilor cu același nume, inclusiv pe glacisul dintre Teleajen și Buzău, însumează circa 25 000 ha, dintre care 19 000 ha în Subcarpați. Viile dau îndeosebi vinuri roșii: Cabernet Sauvignon și Merlot, în centrul viticol Valea Călugărească, vinuri aromate obținute din tămîioasă și vinuri fine demiseci, Grasa de Pietroasele. Se cultivă și soiuri de masă, cu precădere Muscat Hamburg la Breaza și Năeni și Afuz Ali în restul podgoriei. În continuare, podgoriile din Subcarpații de la Curbură s-au extins atît pe dealuri, cît și în cîmpie. Așa sînt Podgoria Rîmniceului, care se caracterizează prin predominarea soiurilor pentru vinuri roșii de masă, curente, vinuri superioare albe (Riesling italian, Fetească albă) și roșii (Fetească neagră). Stru-

Fig. 72. Răspîndirea livezilor (A) și a viilor (B), în Subcarpați (% din suprafața agricolă). A', Structura culturilor pomiceole: 1, pruni; 2, meri; 3, peri; 4, cireși și vișini; 5, alte specii.



gurii de masă (Muscat Hamburg) dețin, de asemenea, un loc important. Podgoria Cotești se caracterizează, ca și podgoria Rîmniceului, prin predominarea soiurilor de struguri pentru vinuri roșii de masă, curențe, vinuri albe superioare (Riesling italian, Fetească albă) și roșii (Fetească neagră, Pinot noir). Produce și struguri de masă (Chasselas doré, Muscat Hamburg). În Podgoria Odobești (circa 5.500 ha) predomină soiurile producătoare de vinuri albe de masă, curențe și superioare (Fetească albă și Riesling italian). O pondere însemnată dețin și strugurii de masă, soiurile Coarna albă și neagră, Chasselas doré și Muscat Hamburg. Podgoria Panciu se remarcă prin cantitatea mare de struguri de masă, în cadrul căroră, soiul Chasselas doré este predominant, urmat fiind de Coarna albă, Coarna neagră și Muscat Hamburg. Dintre soiurile pentru vinuri albe, superioare

de masă mai răspîndite sînt Fetească albă, Riesling italian și Muscat Ottonel.

Cultura pomilor fructiferi, o ocupație de tradiție, împreună cu creșterea animalelor, contribuie la definirea specificului producției agricole din această regiune (fig. 72). Cele mai întinse suprafețe cu pomi fructiferi sînt în Subcarpații dintre Gilort și Rînnic, unde se mențin la peste 10% din terenul agricol. În locurile cu cele mai prielnice condiții naturale s-au conturat cîteva bazine pomicole, în care cea mai mare parte (între 47% și 65%) o deține prunul (fig. 72A). Bazinul pomicol al Vilcei, extins între Olteț și Topolog, cuprinde o suprafață de circa 18.600 ha, din care livezele de pruni ocupă circa 65%, iar cele de meri peste 25%. Bazinul Argeșului, cu o suprafață de circa 17.200 ha, se întinde între Topolog și Dimbovița, iar bazinul Ialomiței, extins între Dimbovița și Cricov, însumează circa 8.300 ha. Bazinul Teleajenului însumează o supra-

față de circa 18 000 ha, iar bazinul Buzău—Râmnic de 15 700 ha. În ultimii ani, în toate bazinele, s-au extins livezile de meri, care în prezent ocupă între 20 și 33% din suprafețele acestora. De asemenea, părul deține între 3 și 6% din aceste suprafețe, iar în proporții mult mai reduse, cireșul și vișinul (între 1,5 și 4,6%), nucul etc.

Pe latura exterioară a Subcarpaților dintre Trotuș și Teleajen și în Depresiunea Cracău—Bistrița, pășunile și fânețele naturale ocupă suprafețe mult mai reduse (sub 20% din terenul agricol), fapt explicat, în primul caz, prin extinderea culturii viței de vie, iar în cel de-al doilea, prin aceea a culturilor de cîmp (fig. 73).





Fig. 73. Pășunile și fânețele naturale din Subcarpați (% din suprafața agricolă). A, Structura bazei furajere.

Pășunile și fânețele naturale, care dețin 37% din terenul agricol, ocupă suprafețe mai întinse în Subcarpații Prahovei, ai Gorjului, ai Buzăului și în Muscelele Argeșului, unde pe anumite areale ajung la 60—80% din suprafața agricolă. În depresiunile dintre Slănicul Buzăului și Puțna chiar depășesc aceste valori. Pe latura externă a Subcarpaților și în depresiunile intracolinare dintre Teleajen și Buzău și în Subcarpații Vilcii, acestea au o întindere mai scăzută, ca urmare a valorificării mai de timpuriu a terenurilor prin plantații de pomi fructiferi.

Creșterea animalelor are un rol important în procesul de dezvoltare a agriculturii, în crearea unui volum mare de produse alimentare și de materii prime pentru industria ușoară. În repartitia geografică a creșterii animalelor se observă diferențieri în funcție de posibilitățile locale de furajare, care influențează, în mod direct, dezvoltarea raseilor (fig. 73A).

Dintre animale, cele mai răspândite sînt ovinele care se cresc atît pe baza pășunilor și fânețelor naturale din Subcarpați, cît și a celor din munte. În repartitia geografică a efectivului ovin, se observă diferențieri pe

Fig. 74. Densitatea ovinelor (A) și a bovinelor (B) în Subcarpați (capete la 100 ha teren agricol).



unitățile de relief. Astfel, în depresiunile subcarpatice dintre Trotuș și Prahova și în Muscelele Argeșului, sînt densități de peste 200 de capete la 100 hectare agricol. În depresiunile intracolinare dintre Zăbrăuț și Teleajen densitatea este de peste 150 de capete la 100 ha agricol (fig. 74A). Aceasta se datorește unei tradiții străvechi și îmbunătățirii speciilor în favoarea celor care se adaptează condițiilor locale. Bovinele ajung la cele mai mari densități (60–80 și chiar peste 80 de capete la 100 ha agricol) în Subcarpații dintre Prahova și Gilort, în depresiunile intracolinare dintre Putna și Rîmnic și în Depresiunea Cracău—Bistrița (fig. 74B). Tradiția în practicarea creșterii bovinelor în aceste arii și condițiile favorabile pentru extinderea culturilor furajere explică numărul mai mare de bovine în Subcarpați și îndeosebi în depresiunile Tîrgu Jiu, Cracău—Bistrița

și Tazlău. Porcinele sînt mai răspîndite în depresiunile Cracău—Bistrița și Tazlău și în interiorul Subcarpaților dintre Trotuș și Teleajen. Densitățile la 100 ha arabil sînt relativ mici (între 20 și 60 capete) și se explică prin deficitul de cereale care intră în hrana de bază a porcilor.

În general, Subcarpații reprezintă o regiune agricolă bazată pe trei ramuri economice — pomicultura, viticultura și creșterea animalelor. Acest fapt este reflectat clar de proporția ridicată a ramurilor respective deținută din totalul pe țară: 26,7% din suprafața pomicolă, 16,4% din cea viticolă, 8,8% din efectivul ovin, 7,4% din cel bovin etc.

4.1.11. Industria

Subcarpații concentrează 10% din populația țării, ocupă 6,9% din suprafață și participă cu peste 7% la realizarea producției

industriale naționale. Dezvoltarea industriei de aici este determinată de condițiile și resursele naturale existente, de gradul de populare și valorificare economică, de condițiile istorice de formare a sistemelor teritoriale industriale, de legăturile economice intra- și extrazonale și de specificul structurii teritoriale a așezărilor.

Rolul deosebit al Subcarpaților în ansamblul economiei naționale derivă, pe lângă potențialul propriu, din poziția geografică specifică, cu valențe de complementaritate, la contactul cu regiunile de munte și de câmpie, care favorizează schimbul de produse și legăturile de cooperare în cadrul industriei.

Factorul hotărâtor, din punct de vedere genetic, în dezvoltarea industriei îl constituie prezența unor variate și bogate resurse naturale de subsol, forestiere, agricole și hidroenergetice care au fost puse în valoare în a doua jumătate a secolului XX. Aproape 3/4 din producția industrială din Subcarpați se realizează în ramurile bazate pe valorificarea și prelucrarea resurselor naturale, în timp ce la nivelul țării asemenea ramuri totalizează doar 3/5.

Structura geologică cu formațiuni sedimentare, puternic tectonizate, a dus la acumularea unor importante zăcăminte de țiței, cărbune, sare, roci de construcție etc. Dintre acestea, sarea, cunoscută și exploatată din cele mai vechi timpuri, a fost multă vreme unul din principalele produse de export ale țării.

Aflată în cutele diapire, sarea este prezentă în mod deosebit, în Subcarpații Vîlcii, Subcarpații de la Curbură (Slănic, Telega, Glodeni) și în cei ai Moldovei (Tîrgu Oena, Băltătești, Moinești, Piatra Neamț, Cașin ș.a.), unde se găsește și zăcăminte de săruri potasice (Solonț, Tazlău, Borlești). Utilizată în trecut doar ca aliment, ulterior, sarea a devenit o importantă materie primă pentru industria chimică.

Prezența rocilor silicioase, a nisipurilor și gresiilor moi a făcut să apară în secolul XVII unele fabrici de sticlă la Brănești, Vulcana, Șotînga ș.a., iar cea a calcarelor a dus la specializarea unor sate, mai ales din Subcarpații Gorjului și Muscelele Argeșului, în prepararea varului.

Bogatele resurse forestiere (circa 7% din suprafața totală a pădurilor țării) au contribuit la dezvoltarea meșteșugurilor sătești și ulterior a industriei de prelucrare a lemnului.

Deși cunoscut încă din secolul XV, cînd se comercializa sub formă de păcură, țițeiul este valorificat în scopuri industriale de abia spre finele secolului trecut, cînd începe exploatarea zăcămintelor dintre văile Buzăului și Dimboviței (Runcu, Cîmpina, Oenița, Boldești, Moreni, Mărgineni, Răzvad, Ani noasa, Berca, Beceni etc.) și a celor din Subcarpații Moldovei (Tazlău, Moinești, Tețcani, Tîrgu Trotuș, Cașin ș.a.). În anii postbelici au fost puse în evidență zăcămintele noi în Subcarpații Gorjului (Bîlteni, Țicleni, Bărbătești, Tîrgu Jiu) și în cei ai Vîlcii (Băbeni, Alunu, Românești). Zăcămintelor de țiței li se adaugă prezența celor de gaze naturale, sub formă de metan sau în asociere cu țițeiul.

De asemenea a început și valorificarea zăcămintelor de lignit din Muscelele Argeșului (Berevoiești, Godeni, Poienari, Jugur, Boteni) și din Subcarpații Ialomiței (Mărginanca, Șotînga, Ceptura).

În Subcarpații Getici, la Rovinari, Roșia-Jiu, Cicani, Tismana, Cucești, Alunu, Albeni au fost introduse în circuitul economic mari rezerve de lignit utilizat în scopuri energetice (peste 40% din producția de lignit a țării).

În prima jumătate a secolului XX industria era reprezentată în Subcarpați prin extracția țițeiului și a cărbunelui, cea a exploatării și prelucrării primare a lemnului, a celulozei și hîrtiei, materialelor de construcție (var, ciment). Dintre celelalte ramuri mai dezvoltate erau industria textilă și a confecțiilor. Activitățile industriale erau localizate în principal pe văile Ialomiței, Prahovei și Teleajenului, ca și pe valea Bistriței în Moldova.

În prezent structura de ramură a industriei subcarpatice se caracterizează prin predominarea industriei chimice și a construcțiilor de mașini, alături de ramurile energetice care dețin circa 3/5 din întreaga producție globală industrială. La nivelul țării industria subcarpatică se evidențiază prin aportul industriei chimice și a energiei electrice (cu cîte 1/5 fiecare din ramura respectivă), industria extractivă (1/7), a lemnului și a confecțiilor (cîte 1/10).

Structura de ramură a industriei poate fi prezentată în formă generalizată. În acest caz pot fi evidențiate: A) Complexul energetic (industria combustibililor și energia electrică); B) Complexul construcțiilor de mașini; C) Complexul ramurilor furnizoare

de materii prime și materiale (industria chimică, metalurgia feroasă, materialele de construcții, exploatarea și prelucrarea lemnului ș.a.) și D). Complexul ramurilor producătoare de bunuri de consum (industria ușoară și alimentară). Structura acestor complexe la nivelul unității subcarpatice și a celor trei subunități principale este redată în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Structura industriei din Subcarpați pe complexele de ramuri

	Subcarpați	Subcarpații Getici	Subcarpații de la Curbură	Subcarpații Moldovei
Total industrie	100	100	100	100
din care:				
A. Complexul energetic	14.0	13.6	9.1	18.3
B. Complexul construcțiilor de mașini	19.7	25.2	24.8	11.0
C. Complexul ramurilor producătoare de materii prime și materiale	41.5	38.1	36.4	47.9
D. Complexul ramurilor producătoare de bunuri de consum	22.2	20.8	25.2	22.3
E. Alte ramuri	2.6	2.3	4.5	0.5

A. — *Complexul energetic* deține o pondere însemnată la nivelul țării: circa 14% prin industria extractivă a combustibililor și peste 1/5 prin producția de energie electrică. Deși în Subcarpați existau importante resurse energetice (lignit, petrol și hidroenergie), acestea erau puțin valorificate în trecut. Singura centrală electrică mai importantă înainte de cel de-al doilea război mondial, era termocentrala Schitu Golești (Argeș). În următorii ani au fost construite termocentralele Doicești (1955), Borzești (1963), Govora și Rogojel pe Jiu în apropiere de Rovinari, una dintre cele mai mari termocentrale din țară (1 720 MW). Valorificarea resurselor hidroenergetice s-a realizat prin punerea în funcțiune a hidrocentralelor de putere mică și medie pe râurile Bistrița, Argeș și Olt. Resursele de apă permit construirea de noi hidrocentrale, îndeosebi pe râurile mici.

Producția de energie electrică este realizată în principal de termocentralele electrice (4/5 din puterea totală instalată din Subcarpați). Cele mai mari termocentrale din această zonă, Rogojel și Borzești, amplasate în bazinul carbonifer al Olteniei și

respectiv în cadrul complexului chimic de pe valea Trotușului, au o contribuție importantă la sistemul energetic național.

B. — *Complexul construcțiilor de mașini*, care deține circa 1/5 din valoarea producției globale a industriei Subcarpaților, reprezintă o ramură cu totul nouă în Subcarpați, situată pe locul doi după industria chimică.

Această ramură asigură pe de o parte necesitățile regiunii subcarpatice în utilaje pentru industria extractivă și chimică, iar pe de altă parte se evidențiază la nivel național prin producția de autoturisme utilitare (Cimpulung) și produse electronice și electrotehnice (Curtea de Argeș), alături de fabrica mecanică de precizie din Breaza, fabrica de becuri din Fieni, ca și întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare Tîrgu Jiu.

Repartiția teritorială a industriei construcțiilor de mașini este relativ dispersă. Această ramură este dezvoltată în Cîmpina, Cimpulung, Piatra Neamț, Rîmnicu Vîlcea și Tîrgu Jiu, dar și în alte centre urbane mai mici, ca Breaza, Curtea de Argeș, Onești, Moreni, Bumbesti-Jiu sau chiar rurale (Schitu Golești, Doicești etc.).

C. — *Complexul ramurilor producătoare de materii prime și materiale*, cu o structură formată din șase ramuri, deține peste 2/5 din valoarea producției globale a regiunii subcarpatice. Dintre acestea industriile chimică, de exploatare și prelucrare a lemnului sînt ramuri cu o pondere însemnată la scara economiei naționale.

Asigurînd mai mult de 1/5 din producția globală a ramurii pe țară, industria chimică

inexistentă în trecut, cu excepția modestei fabrici de anvelope de la Florești (județul Prahova) se dezvoltă după anul 1950 prin construirea de combinate chimice și petrochimice la Govora, Râmnicu Vâlcea, Onești, Săvinești și Piatra Neamț. Amplasarea acestor combinate în Subcarpați a fost determinată de prezența materiilor prime (sare, țiței, gaze), a energiei electrice și termice ca și a apei.

Structura industriei chimice este diversificată, de la produsele clorosodice, acidul sulfuric și îngrășămintele chimice până la masele plastice, firele și fibrele sintetice, cauciucul sintetic și prelucrarea produselor finite.

La baza acestei ramuri stau centrele de extracție a sării de la Ocnele Mari (județul Vâlcea) și Tîrgu Ocna (județul Bacău), ale țițeiului și gazelor de sondă din numeroasele puncte răspindite în mai toți Subcarpații, cu excepția Muscelor Argeșului și a

Subcarpaților Vrancei. Gazul metan, altă materie primă de bază, provine din Transilvania.

În cadrul chimiei de bază produsele clorosodice se obțin la Govora (județul Vâlcea) și Onești, îngrășămintele azotoase la Roznov (județul Neamț) (fig. 75). Masele plastice se produc la Râmnicu Vâlcea și Onești (de asemenea, centru al producției de cauciuc sintetic), iar firele și fibrele sintetice la Săvinești (județul Neamț) și combinatul din Cîmpulung (județul Argeș).

Tot în cadrul industriei chimice trebuie menționate combinatul pentru articole tehnice din cauciuc din Tîrgu Jiu și întreprinderile de utilaj chimic de la Râmnicu Vâlcea, Moreni și Onești.

Industria chimică din Subcarpați se caracterizează printr-o concentrare teritorială pe trei platforme (Piatra Neamț, Onești și Râmnicu Vâlcea).




Fig. 75. Combinatul de produse sodice de la Govora (foto C. P. B.).

Ramură de veche tradiție bazată pe prezența unor întinse masive forestiere (aproape 40% din suprafața totală a zonei și 7% din suprafața forestieră a țării), *industria de exploatare și prelucrare a lemnului*, limitată, în trecut, mai mult la producția de cherestea se diversifică în anii postbelici prin prelucrarea superioară a lemnului în combinatele de la Tîrgu Jiu și Rîmnicu Vilcea.

Structura teritorială a ramurii este dominată la bază de numeroasele puncte de exploatare și prelucrare a lemnului trimis la fabricile de cherestea din Rîșca (județul Suceava), Roznov, Tazlău, Piatra Neamț (județul Neamț), Căiuți, Onești (județul Bacău), Măneciu, Cîmpina (județul Prahova), Domnești (județul Argeș), Băbeni, Horezu (județul Vilcea), Baia de Fier, Novaci (județul Gorj) ș.a. În cadrul unităților de prelucrare a lemnului se produc furnire, placaje, plăci aglomerate și fibrolemnoase, mobilă și alte produse din lemn. Ca ramură complementară este prezentă producția de celuloză și hirtie la Piatra Neamț și Boldești-Scăeni.

Industria materialelor de construcții a sticlei, porțelanului și faianței, bazată pe prezența unor resurse bogate, este reprezentată prin producția cimentului, a varului, a materialelor refractare și a azbocimentului și mai puțin a prefabricatelor, a sticlei și porțelanului.

În Subcarpații Getici și cei de la Curbură se găsesc numeroase cariere de extracție a pietrii de var și centre producătoare de var. La Doicești, Comarnic, Berca, Piatra Neamț funcționează unități specializate în produse refractare și ceramice, iar la Tîrgu Jiu (pe baza calcarului de la Suseni și Runcu), Cîmpulung (calcarele de la Mateiaș și argila de Stoenești) și Fieni (calcarele de Lespezi și gresiile calcaroase de Moroeni) funcționează unități cu ciclu complet (ciment, var, ipsos, azbociment). Cele trei unități concentrează 2/3 din producția materialelor de construcții din Subcarpați.

Pe baza nisipurilor de la Vălenii de Munte s-a dezvoltat întreprinderea de geamuri de la Boldești-Scăeni. Sticla se produce de asemenea la Tîrgu Jiu. La Curtea de Argeș este construită o fabrică de porțelan.

D. — *Complexul ramurilor producătoare de bunuri de consum*, cu peste 1/5 din valoarea producției globale a industriei din Subcarpați, este format din ramuri tradiționale cu

ponderea principală în economia antebelică a unității.

Industria textilă, determinantă pentru profilul unor centre ca Buhuși, Pucioasa, Păulești (județul Prahova) sau ca ramură complementară pentru ocuparea mîinii de lucru feminine în centre ca Tîrgu Jiu, Cîmpina, Onești ș.a. este reprezentată prin întreprinderi de mărime mijlocie și mică, fără a forma concentrări teritoriale mai importante.

Prelucrarea primară a materiilor prime se realizează la topitorii de in și cîneapă de la Cornu Luncii (județul Suceava), Pîrscov (județul Buzău), filaturile de lînă de la Cetățeni (județul Argeș), Beceni și Pătîrlagele (județul Buzău), cea de bumbac de la Moinesti sau de mătase artificială la Vălenii de Munte.

La Pucioasa, Păulești (județul Prahova) și Buhuși funcționează întreprinderi integrate (filatură și țesătorie), iar în centrele mai mari, întreprinderi de tricotaje (Piatra Neamț) sau de confecții (Curtea de Argeș, Onești, Rîmnicu Vilcea, Tîrgu Jiu, Cîmpina ș.a.). Centrele Tismana (județul Gorj), Breaza, Comarnic și Pietroșița (județul Dîmbovița) sînt cunoscute pentru confecțiile de artă populară.

Ramura pielăriei și încălțămintei este slab dezvoltată, fiind reprezentată prin întreprinderea de încălțămintă de la Rîmnicu Vilcea.

Industria alimentară, prin resursele de care dispune îndeosebi în direcția creșterii animalelor pe baza întinselor pășuni și fînețe, a pomiculturii (circa 27% din suprafața pe țară) și viticulturii (17%), are mari posibilități de dezvoltare în toată regiunea subcarpatică a țării. În prezent structura ramurii este limitată în principal, la stadiile primare de prelucrare a produselor (conserve de fructe, brînzeturi, băuturi etc.).

Prelucrarea fructelor este mai dezvoltată în Subcarpații de la Curbură și Subcarpații Getici, unde se găsesc centrele Pătîrlagele și Pîrscov în județul Buzău, Rîureni în județul Vilcea, Pucioasa în județul Dîmbovița și Vălenii de Munte în județul Prahova. Prelucrarea laptelui pentru brînzeturi s-a dezvoltat de timpuriu în unele centre din zonele cu tradiție în creșterea ovinelor (Novaci, Horezu, Curtea de Argeș, Vălenii de Munte), iar în ultima vreme și în orașe mai mari ca Tîrgu Jiu, Rîmnicu Vilcea, Piatra Neamț.

Prin specificul structurii economiei, bazate în principal pe valorificarea resurselor naturale proprii, Subcarpații se constituie într-o unitate teritorială care a generat unele legături de schimb (aprovizionare cu materii prime, semifabricate și produse finite, cooperare tehnologică) cu celelalte unități ale complexului unitar al economiei naționale. Dezvoltarea industriei mici va permite intensificarea utilizării resurselor naturale locale.

Forma dominantă de grupare teritorială a industriei este aceea a „axelor industriale” dezvoltate în lungul văilor principale ce traversează Subcarpații. Aceste axe concentrează peste 3/4 din producția industrială. Constituirea lor a fost favorizată de existența unor căi rutiere și feroviare paralele, la care se adaugă liniile electrice de înaltă tensiune, conductele de gaze și țiței și prezența centrelor urbane mai importante. Unele „axe” (pe văile Prahovei, Teleajenului și Ialomiței) erau, în mare parte, formate în perioada antebelică, altele (pe văile Trotușului, Bistriței, Oltului și Jiului) s-au constituit în a doua jumătate a secolului XX. Prezența acestor axe determină și orientarea principalelor legături economice ale regiunii subcarpatice cu cele învecinate.

Alături de aceste grupări teritoriale predominante, care includ un număr relativ mic de centre, dar de importanță majoră, restul industriei subcarpatice se caracterizează printr-un grad ridicat de dispersare, fenomen specific industriei extractive, exploatării forestiere și unor faze primare ale industriei alimentare.

În ansamblu, pe cele trei mari subunități ale Subcarpaților, industria este repartizată în ponderi relativ egale, cu o ușoară predominare în Subcarpații Moldovei.

Structura ierarhică a centrelor industriale este dominată de 11 centre mai importante care concentrează circa 7/10 din totalul producției industriale. Alături de centre industriale mai vechi (Cîmpina, Moreni, Pucioasa, Boldești-Scăeni ș.a.), o dezvoltare industrială au înregistrat orașele Piatra Neamț, Rîmnicu Vilcea, Tirgu Jiu, Onești, Cîmpulung, Curtea de Argeș, fapt reflectat și în creșterea numărului lor de locuitori. Cu toate acestea, cu puține excepții, structura pe ramuri a acestor centre este încă insuficient diversificată. Astfel, construcțiile de mașini dețin circa 4/5 din producția industrială a orașului Cîmpulung și 3/5 din cea a orașului Cîmpina. Industria

textilă are o pondere de peste 90% din structura orașelor Buhuși și Pucioasa. De asemenea, industria chimică deține circa 1/2 din producția unor centre urbane ca Rîmnicu Vilcea, Onești, Piatra Neamț. Se impune crearea în continuare a unei structuri de ramură care să țină seama în mai mare măsură nu numai de prezența resurselor naturale, ci și de poziția economico-geografică a acestor centre la nivelul țării și de folosirea cât mai rațională a forței de muncă.

Dezvoltarea industriei din Subcarpați s-a reflectat profund în peisajul regiunii. Crearea unor ramuri industriale a dus la dezvoltarea orașelor Piatra Neamț, Rîmnicu Vilcea, care și-au sporit populația între anii 1948 și 1985 de 4,0 pînă la 5,4 ori, la apariția unor orașe noi, dintre care a municipiului Onești.

Dezvoltarea industriei în centrele menționate și în alte centre a provocat mutații în structura pe ramuri a populației active din mediul rural, alături de pătrunderea tot mai accentuată a acesteia în mediul urban. Astfel, unele așezări sînt legate direct de principalele centre urbane prin forța de muncă navetistă, prefigurînd formarea sistemelor locale de așezări.

Intensificarea activității industriale ridică însă probleme privind menținerea calității mediului înconjurător. Acțiunea industriei asupra mediului înconjurător se manifestă sub diferite forme, din care cele mai puternice se datoresc industriei extractive și industriei chimice, care modifică structura solului, calitatea apei și compoziția aerului. Acțiunea poluantă a acestor activități și a altora impune construirea unor instalații speciale pentru epurarea apelor reziduale, purificarea aerului, captarea gazelor etc.

În actuala structură economică, principalele probleme ale dezvoltării în perspectivă a industriei subcarpatice sînt legate, în principal, de valorificarea resurselor animale și vegetale în cadrul industriei alimentare, construirea de noi obiective industriale în orașele mici, care să valorifice îndeosebi materiile prime locale și intensificarea legăturilor de cooperare la nivelul zonei subcarpatice.

4.1.12. Căile de comunicație

Prin poziția geografică între munte și cîmpie, Subcarpații constituie o regiune de tranziție, cu o economie bazată atît pe

resurse naturale proprii (țifei, lignit, sare, gips, fructe, struguri etc.), cit și pe resurse provenind din regiunea muntoasă și din cea de câmpie. Aceasta a generat numeroase legături de producție. Popularea străveche și intensă a Subcarpaților a dus la apariția timpurie a unor activități umane, legate mai ales de valorificarea resurselor locale și de unele vechi meșteșuguri (olărit, prelucrarea primară a lemnului, dogărie, fabricarea sticlei etc.). Produsele obținute erau transportate și în alte regiuni pentru a fi vândute sau date în schimbul altora tot atât de necesare vieții. O parte din produsele destinate schimbului constituiau obiectul exportului. În acest scop se parcurgeau distanțe mari, până la numeroasele schele și vaduri de la Dunăre. Așa au apărut cunoscutele drumuri ale „sării”, „cerii”, „mierii”, „păcurii” etc., folosite secole de-a rândul. Cele mai importante drumuri de legătură între Țara Românească, Transilvania și Moldova, considerate în secolele trecute ca „oficiale”, însoțeau, de regulă, firul principalelor văi transcarpatice sau treceau prin pasurile cele mai ușor accesibile. Toate traversau Subcarpații, având în cuprinsul lor puncte de sprijin: cel ce trecea prin pasul Vilcan ajungea la Țirgu Jiu, cel de pe Olt, la Râmnicu Vilcea, iar ramificația sa, prin Țara Loviștei, ajungea la Curtea de Argeș și Pitești.

Drumurile care porneau de la Brașov, traversând Carpații și Subcarpații, urmăreau patru văi importante: valea Dimboviței pe la Rucăr—Cîmpulung (de unde se ramifica spre Curtea de Argeș—Râmnicu Vilcea, spre Pitești—Slatina și spre Țirgoviste—București), valea Prahovei, coborînd pînă la Cîmpina (unde se bifurca spre Țirgoviste și spre București), valea Teleajenului de la Cheia pe la Vălenii de Munte (spre Ploiești, Țirgșor și Gherghița), valea Buzăului pînă la Buzău și mai departe spre Dunăre.

Drumuri importante legau Transilvania și de Moldova, remarcîndu-se cele care traversau lanțul carpatic prin pasul Oituz către Adjud (drumul Brașovului), sau cel de pe valea Trotușului, prin pasul Ghimeș către Bacău. Toate se legau cu drumul Liovlui care, de la Suceava, cobora spre sud pe valea Siretului.

Odată cu intensificarea producției agricole, meșteșugărești și manufacturiere din secolele XVIII—XIX și cu modernizarea economiei din secolele XIX—XX, nevoia circulației mărfurilor s-a amplificat. Acest fapt a determinat creșterea gradului de

întreținere a drumurilor rutiere existente, ca și modernizarea și construirea de căi noi. Rețeaua actuală de drumuri (cu o densitate mai mare în Subcarpații dintre Motru și Buzău) taie transversal Subcarpații (în lungul văilor principale), dar, pe lîngă această orientare generală transversală, există și drumuri longitudinale, cum este cazul drumului Baia de Aramă—Țirgu Jiu—Râmnicu Vilcea—Curtea de Argeș—Cîmpulung din Subcarpații Getici, și drumurile Țirgu Neamț—Piatra Neamț și Bacău—Onești din Subcarpații Moldovei.

La sfîrșitul secolului XIX în Subcarpați au început să se construiască căi ferate, care au legat Principatele Române de Transilvania. Acestea au urmat, în mare, tot văile principale, dublînd căile rutiere. Cea mai importantă cale ferată care traversează regiunea subcarpatică, Ploiești—Brașov, a fost dată în funcțiune în anul 1879, iar porțiunea Cîmpina—Brașov a fost dublată încă din anii 1939—1941. Ea reprezintă prima magistrală electrificată din România (15 februarie 1969).

Legătura feroviară de pe valea Oltului s-a realizat la sfîrșitul secolului trecut, porțiunea Râmnicu Vilcea—Rîu Vadului (circa 58 km) dîndu-se în exploatare în anul 1896. Calea ferată Fîlîși—Țirgu Cărbunești—Țirgu Jiu s-a dat în folosință în anul 1888, iar secțiunea Țirgu Jiu—Bumbesci-Jiu (de numai 16 km) s-a dat în circulație abia în anul 1916. În Subcarpații Moldovei, linia Adjud—Țirgu Oena a fost dată în circulație în 1884, iar restul ei, pînă la Palanca, a fost finalizată în aprilie 1899. În anul 1900 s-a construit și calea ferată Moinești—Comănești.

Datorită configurației geografice, în cuprinsul Subcarpaților s-au format numai două noduri feroviare (Țirgu Jiu și Comănești), nodurile feroviare importante aflîndu-se în exteriorul Subcarpaților.

Căile ferate principale din Subcarpați fac parte din trama radiară a rețelei feroviare naționale, care, prin intermediul nodurilor feroviare din exterior, mijlocesc legătura între magistralele feroviare inelare intra- și extracarpatice. Pe lîngă acestea, s-au dezvoltat și linii secundare, care traversează Subcarpații (Nehoiășu—Buzău), unele avînd cap de linie chiar în cuprinsul lor (Țirgu Jiu—Rogojel—Fîlîși; Țirgu Cărbunești—Albeni; Băbeni—Berbești; Curtea de Argeș—Pitești; Argeșel—Cîmpulung—Golești; Pietroșița—Țirgoviste; Fîlîpeștii de Pădure—Moreni—I. L. Caragiale; Slănic—Ploiești; Măneciu—

Ploiești; Comănești—Moinesti) și care servesc în principal traficul local. Noua linie Pașcani—Tirgu Neamț înlesnește legătura feroviară între Depresiunea Neamțului și valea Siretului, iar linia ferată Râmnicu Vilcea—Vilcele, aflată în construcție, va scurta considerabil legătura Râmnicu Vilcea—Pitești—București.

În procesul general de dezvoltare și modernizare a transporturilor din țara noastră, căile de comunicație din Subcarpați au cunoscut transformări importante, atât prin îmbunătățirea structurii drumurilor, care au fost lărgite, consolidate și modernizate, cât și prin mărirea gradului de mecanizare în stațiile de cale ferată și extinderea tracțiunii electrice.

Cuprinzând sectoare cu economie aflată în diferite grade de dezvoltare, Subcarpații cunosc fluxuri importante de trafic feroviar și rutier local, care oglindesc specificul economiei regiunilor respective. Dezvoltarea industriei în unele regiuni axate pe văile Bistriței, Trotușului, Prahovei, Oltului și Jiului etc. a influențat pozitiv structura și volumul traficului de mărfuri, care s-au adaptat nevoilor specifice ale ramurilor industriale. Legăturile economice s-au amplificat atât pe linia aprovizionării cu materii prime, combustibili și forță de muncă, cât și pe linia desfacerii produselor finite. Folosirea materiilor prime locale sau din regiunile învecinate (țifei, gaze naturale, cărbune, sare, diferite substanțe minerale, lemn, produse pomicole, viticole, animaliere etc.), în unități industriale din cuprinsul Subcarpaților sau din apropiere au creat fluxuri însemnate în circulația mărfurilor.

În traficul feroviar de mărfuri o mare pondere deține transportul cărbunelui exploatat în bazinele carbonifere subcarpatice și în unitățile vecine și utilizat în cea mai mare parte în termocentralele de la Rogojel, Turceni, Ișalnița, Doicești, Comănești și Borzești. Sarea este transportată prin sale ducte de la Ocelele Mari și Tirgu Ocna la combinatele de produse clorosodice din apropiere de la Govora și respectiv, Onești.

În cadrul industriei chimice, ramură reprezentată în Subcarpați și regiunea imediat învecinată prin unitățile de la Râmnicu Vilcea, Pitești, Tîrgoviște, Brazi, Ploiești, Valea Călugărească, Onești, Râznov, Săvinești etc. s-a creat o rețea de legături economice, care generează fluxuri continue de transport.

În industria lemnului se evidențiază o circulație generală dinspre regiunea montană, producătoare de masă lemnoasă, către unitățile de prelucrare, situate cu precădere în Subcarpați. În paralel, se creează trafic de mărfuri finite (mobilă, binală etc.) către centrele consumatoare.

Cea mai mare parte a transporturilor din Subcarpați se efectuează pe văile principale transcarpatice. Pe valea Prahovei se realizează cel mai intens trafic de mărfuri, transportându-se mai ales minereuri feroase (provenite din import) și fier vechi către centrele siderurgice din Transilvania (Hunedoara, Călan, Brașov, Cîmpia Turzii), petrol provenit din Subcarpații Sudici, cherestea, lemn de foc și materiale de construcții din regiunea muntoasă către județele sudice, precum și cereale provenite din cîmpie către județele transilvănene. Un alt traseu mult solicitat este cel din lungul văii Jiului, dominat de transportul de cărbune și în mai mică măsură de lemn și produse din lemn, apoi valea Oltului, precum și valea Trotușului, în special pentru produsele petroliere și cărbunele din regiune, lemn, produse de carieră, cereale etc.

Rolul major pe care dezvoltarea economiei l-a avut în stimularea traficului de mărfuri, în amplificarea și diversificarea lui, i s-a adăugat și intrarea în circuitul turistic a diverse regiuni geografice din Subcarpați.

4.1.13. Potențialul turistic

Subcarpații, alături de Carpați și de litoralul Mării Negre, reprezintă prin varietatea peisajelor geografice, prin bogăția resurselor naturale și intensitatea vieții umane, care s-a desfășurat aici de-a lungul secolelor, una din regiunile țării cu un ridicat potențial turistic. Frumusețea formelor de relief (unele din ele unice în țară), condițiile climatice și manifestarea unor fenomene deosebite ale naturii (vulcani noroioși, focuri vii etc.), numărul mare de izvoare minerale, stațiunile balneoclimaterice și climaterice, monumentele istorice, de cultură și artă datînd din cele mai vechi timpuri, dezvoltarea în ultimele decenii a multor localități (care au devenit și importante centre de interes turistic, prin arhitectura lor și baza economică de care dispun), folclorul și specificul etnografic local fac ca Subcarpații să atragă în fiecare an un număr tot mai mare de turiști din toate colțurile țării.

Formele de relief, acoperite intens de vegetație și abundența izvoarelor minerale, care dau cadrului natural un pitoresc aparte, precum și climatul favorabil curei de aer și de odihnă au fost folosite de om din cele mai vechi timpuri. Organizarea timpurie a vieții umane în Subcarpați este reflectată prin existența, în diferitele locuri, a numeroase vestigii și monumente istorice, a unor importante monumente de cultură și de artă, care oglindesc continuitatea poporului român pe aceste meleaguri de la nașterea sa până astăzi. Prin valoarea lor istorică, culturală și științifică și prin poziția în teritoriu, fiind așezate în unele din cele mai pitorești locuri din Subcarpați, acestea reprezintă obiective turistice de importanță majoră, cunoscute nu numai de turiști din țară, ci și de cei de peste hotare.

Izvoarele minerale (unele din ele folosite încă de pe vremea romanilor) din Subcarpații Gorjului, din Valea Oltului, Subcarpații Prahovei și Subcarpații Moldovei, compoziția aerului, altitudinea reliefului, varietatea și bogăția speciilor vegetale, au favorizat dezvoltarea în anumite locuri a unor stațiuni balneoclimaterice și climaterice renumite în tratarea unor afecțiuni și refacerea capacității de muncă a organismului omenesc. Sunt cunoscute în acest sens stațiunile balneoclimaterice Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ocenele Mari din Subcarpații Vîlcii, Săcelu și Țicleni din județul Gorj, Pucioasa din județul Dimbovița, Slănic din județul Prahova, Slănic Moldova din județul Bacău, Băltătești din județul Neamț etc. În majoritatea locurilor unde s-au descoperit importante resurse de ape minerale — carbogazoase, clorosodice, bicarbonatate, feruginoase, calceice, iodurate etc. — au fost construite instalații pentru băi și amenajate stabilimente pentru cură, necesare tratării diferitelor boli. Mai sînt însă multe izvoare minerale care ar putea fi captate și valorificate pe plan local.

În Subcarpați există, pe lângă centrele umane cu profil balneoclimateric, multe localități cu un climat deosebit pentru refacere și odihnă, situate în zone pitorești, unde în tot timpul anului, un număr mare de oameni își petrec concediul de odihnă. În această categorie intră orașele Rîmniceu Vîlcea, Cîmpulung, Vălenii de Munte, Piatra Neamț, Tîrgu Neamț, Breaza, Novaci, Horezu, stațiunea climaterică Soveja din Vrancea etc. De asemenea, o serie de sate din depresiunile subcarpatice și de la con-

tactul dealurilor cu munții, renumite prin arhitectura construcțiilor lor, prin obiceiurile, folclorul local, specificul etnografic și economic, au devenit centre de atracție turistică și ca urmare, în interiorul sau în apropierea lor, s-au construit campinguri, moteluri și popasuri turistice, care oferă condiții de cazare și recreere a turiștilor ce vizitează aceste locuri. Cazarea, în multe din aceste localități, este asigurată și de populația locală. Așa sînt: Tismana, Runcu și Polovragi (județul Gorj), Vaideeni, Costești, Măldărești (județul Vîlcea), Arefu și Domnești (județul Argeș), Malu cu Flori, Pietroșița și Voinești (județul Dimbovița), Cislău, Pătirlagele și Bisoca (județul Buzău), multe din satele Depresiunii Vrancei (Nereju, Năruja, Tulnici, Cîmpuri, Răcoasa, Paltin etc.), precum și o parte din satele de pe văile Trotușului, Tazlăului și Bistriței din Subcarpații Moldovei.

Istoria neamului românesc este păstrată în Subcarpați — așa cum s-a spus — prin monumente istorice și opere de artă, care se găsesc răspindite în multe locuri (sate și orașe) din cuprinsul lor. Sînt renumite prin frescele, arhitectura și documentele pe care le posedă mănăstirile Tismana (secolul XIV) și Polovragi (secolul XVII) situate în depresiunile cu același nume din județul Gorj, Horezu (ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu), Bistrița, Arnota (zidită de Matei Basarab — 1633) și Govora (cu tipografia lui Matei Basarab — 1640) din județul Vîlcea. Orașul domnesc Curtea de Argeș înscrie o întreagă epocă din istoria poporului român, de pe vremea cînd domnii Țării Românești și-au avut aici reședința. Vechea curte domnească, biserica domnească (cel mai vechi monument istoric păstrat în întregime în formă originală), mănăstirea Curtea de Argeș (ctitorie a lui Neagoe Basarab — secolul XIV) etc. sînt concludente în acest sens. În continuare se mai pot cita din acest domeniu mănăstirile Ciolani (secolul XVI) din Subcarpații Buzăului, Mera (secolul XVII) și Soveja (secolul XVII) din Vrancea, grupul de mănăstiri din județul Neamț (Neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare — 1497, Agapia secolul XVI, Văratec etc.), Cetatea Neamțului, clădită de cavalerii teutoni în secolul XIV și restaurată de Ștefan cel Mare etc. În cadrul acestor monumente istorice sînt organizate muzee cu exponate care prezintă cultura, arta și întreaga dezvoltare a poporului român de-a lungul secolelor. De asemenea, în multe orașe (Tîrgu

Jiu, Rîmnicu Vilcea, Cîmpulung, Curtea de Argeș, Cîmpina, Vălenii de Munte, Onești, Tîrgu Ocna, Buhuși, Piatra Neamț, Tîrgu Neamț etc.) și chiar în sate s-au deschis muzee care înfățișează trecutul istoric al poporului român, obiceiurile, dezvoltarea social-culturală și vechile îndeletniciri ale oamenilor care au trăit întotdeauna pe aceste meleaguri. La acestea se adaugă o serie de construcții vechi, ce se păstrează în multe sate din Subcarpați. Ele oglindesc arhitectura epocii în care au fost construite și specificul locului în care au fost ridicate. Pe plan local au fost organizate muzee în aer liber cu profil etnografic. Cula (din secolul XVIII) și muzeele satului în aer liber de la Curtisoara — Gorj și Bujoreni, precum și culele de la Măldărești (cu muzeu de istorie și etnografie) din județul Vilcea fac parte dintre acestea.

În Subcarpați, la Tîrgu Jiu, au fost expuse în aer liber opere ale lui Constantin Brîncuși: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii, capodopere ale geniului omenesc. În Subcarpații Buzăului, pe Dealul Măgura, în apropierea mănăstirii Ciolanu a luat ființă, din 1970, un muzeu de sculptură modernă în aer liber. În Subcarpații Gorjului, la Săcelu, primele asemenea exponate au fost lucrate în cursul anului 1981. Toate satele din Subcarpați au importanță turistică. Fiecare localitate atrage prin obiceiurile oamenilor, prin specificul etnografic, prin îndeletnicirile locuitorilor, prin stilul construcțiilor și funcția economică. Țesăturile de Tismana (Gorj), ceramica de Horezu (Vilcea), sculpturile în lemn din Subcarpații Buzăului de la Bisoca, Lopătari, Vintilă Vodă etc. sînt căutate de turiști.

O atracție deosebită pentru turiști o reprezintă obiectivele naturale, unele din ele unicate în țară, declarate monumente ale naturii sau transformate în parcuri și rezervații naturale: Muntele de Sare de la Slănic (Prahova), Vulcanii Noroioși din Subcarpații Buzăului, Focurile Vii din județul Vrancea, rezervația de castani de la Tismana județul Gorj, rezervația geologică de la Albești și parcul dendrologic de la Mihăiești, județul Argeș, parcul dendrologic de la Dofteana, județul Bacău sînt numai cîteva din mulțimea de obiective naturale care dau frumusețea turistică a Subcarpaților.

Construcțiile hidrotehnice, captările de ape, lacurile de baraj de pe Motru, Jiu, Olt,

Argeș, Trotuș, Bistrița și alte riuri au adus importante modificări în teritoriu și au creat condiții pentru transformarea multor locuri din apropiere în zone de agrement și odihnă.

Toate locurile și obiectivele de interes turistic sînt puse în legătură printr-o rețea deasă de căi de comunicație (drumuri și căi ferate) care merge în lungul apelor sau traversează dealurile și depresiunile dintr-o parte în alta a lor. Principalele văi care coboară din Carpați și traversează Subcarpații (Jiul, Oltul, Argeșul, Dîmbovița, Prahova, Buzăul, Trotușul, Bistrița etc.), în lungul cărora se află un număr mare de obiective turistice, sînt însoțite de drumuri modernizate. Din acestea se ramifică în toate direcțiile alte drumuri (multe modernizate) care pătrund pe văile secundare sau merg pe culmea dealurilor pînă în zona muntoasă. Acestea fac ca accesul la toate obiectivele turistice din zonă să se facă destul de ușor. O deosebită importanță turistică o are drumul care traversează Subcarpații Olteniei de la Olt pînă la Dunăre și care trece prin cele mai pitorești locuri din această parte a țării, valorificată turistic îndeosebi în a doua jumătate a secolului XX. Căile de comunicație accesibile, numărul mare de obiective turistice și varietatea lor fac ca Subcarpații să atragă turiști de toate vîrstele.

În Subcarpați sînt încă multe locuri care așteaptă să fie mult mai intens valorificate turistic. Subcarpații se înfățișează în prezent, în totalitatea lor, prin peisaje, obiective turistice naturale și umane și dezvoltare economică, ca una din zonele turistice complexe ale țării.

4.2. Unitățile regionale

4.2.1. Subcarpații Getici

4.2.1.1. Caracterele generale

Pe măsura adîncirii cunoașterii regiunii deluroase dintre Motru și Dîmbovița s-a conturat tot mai clar ideea existenței unei unități subcarpatice bine individualizate (deși uneori a fost pusă la îndoială), corespunzînd laturii nordice a depresiunii din fața Carpaților Meridionali, umplută cu sedimente terțiare deranjate tectonic, dar cu mult mai puțin decît în Subcarpații de la est de Dîmbovița. Chiar dacă unele porțiuni sînt

foarte slab afectate tectonic (ca cele dintre Dimbovița și Argeș, dintre Olt și valea râului Olănești, dintre Bistrița Vilcii și Olteț, la sud de Măgura Slătioarei) nu înseamnă că acest relief nu are aceeași geneză și aceeași evoluție și nu se încadrează în stilul specific subcarpatic, desgropat în cea mai mare parte în cuaternar de sub acoperitura piemontană și sculptat diferențiat sub influența mișcărilor neotectonice și a variațiilor litologice. Aici găsim aceeași mobilitate a reliefului și aceleași raporturi între structură și formele principale, același mod de fragmentare și de dispunere a formelor pozitive și negative. Și aici există și se pune în evidență același mod de asociere a formelor ca urmare a evoluției lor pe compartimente tectonice și pe bazine hidrografice, trăsătură generală proprie tuturor regiunilor tinere supuse unei denudări violente și în mod special propriu Subcarpaților, cu consecințe directe asupra caracterelor principale ale peisajului, asupra dinamicii structurilor fizico-geografice și potențialului de utilizare.

Individualitatea Subcarpaților Getici este pusă în evidență și argumentată (mai ales prin cercetările detaliate din Subcarpații de la vest de Olt), cu toate că limitele lor morfologice dinspre nord și contactul cu piemontul de la sud sînt mai puțin clare decît limitele Subcarpaților de la Curbură și ai Moldovei.

De la Motru pînă aproape de Olt contactul cu munții este tranșant, dar mai la est (începînd chiar de la Bistrița Vilcii) raporturile dintre cele două unități se schimbă. Lipsa unei denivelări tectonice a făcut ca între munți și Subcarpați să se mențină o legătură directă și o anumită continuitate a culmilor muntoase cu cele subcarpatice. Local au fost sculptate depresiuni de contact care îndeplinesc aceleași funcții ca Depresiunea Subcarpatică de la vest de Bistrița Vilcii, dar sînt departe de a se constitui într-un culoar depresionar continuu spre a materializa mai clar diferența dintre cele două unități. Atît sînt de apropiate caracterele și de strînse legăturile între munți și muscele, încît între Topolog și Bratîa se poate vorbi chiar de o fișie de interferență carpato-subcarpatică.

Limita sudică, dinspre Piemontul Getic, este mai puțin evidentă și pe alocuri chiar destul de dificil de precizat ca urmare a unității de evoluție a reliefului subcarpatic și piemontan, atît în faza constituirii pie-

montului, cît și în aceea a sculptării cuaternare.

Luîndu-se drept argument principal pentru fixarea limitei de sud cele mai nordice resturi ale acoperiturii piemontane care în mare parte corespund cu cele mai înalte puncte ale piemontului (prin asocierea acoperiturii piemontane cu nisipuri romaniene mai rezistente la eroziune), se observă că aceasta are un mers în zig-zag, cu deplasări spre sud în dreptul văilor principale și înaintări spre nord pe interfluvii, urmărind, în general, cuesta prin care piemontul se termină spre nord.

Succesiunea formațiunilor sedimentare terțiare în fișii mai mult sau mai puțin regulate, evident diferențiate ca rezistență și comportare la eroziune, avea să se reflecte direct într-o anumită zonalitate a formelor principale de relief, adică a culoarelor depresionare și a șirurilor de dealuri, paralele cu marginea muntelui și transversale pe rețeaua văilor principale, cele care, fără excepție străbat Subcarpații Getici de la nord la sud venind din munte. Chiar sub marginea muntelui au fost sculptate depresiunile subcarpatice, formînd — cu înterruperi locale — un șir prelungit din marginea Podișului Mehedinți pînă la Dimbovița. Culoarul depresionar subcarpatic dintre Motru și Bistrița Vilcii, cu întinsele lui șesuri aluviale ocupate de sate mari, bine încheiate, înconjurate de ogoare și livezi, multe legate de munte prin activitățile predominant pastorale sau forestiere, reprezintă partea cea mai bine dezvoltată și tipică, cea care dă însăși trăsătura principală a regiunii subcarpatice. Între Tismana și Tărlia are loc o dublare a culoarului subcarpatic prin așa-numitele depresiuni intracolinare cu dezvoltare maximă în Depresiunea Tirgu Jiu—Cărbunești, un adevărat fragment de cîmpie în ansamblul reliefului deluros subcarpatic. Între ele, lăsînd porți largi de legătură, se înscrie „dîmbul orografic” al primului șir de dealuri subcarpatice, din ce în ce mai înalte și mai extinse, în raport cu depresiunile, cu cît înaintează spre est.

Între Bistrița Vilcii și Olt culoarul subcarpatic nu mai reprezintă o individualitate, dar rolul său este preluat de lărgirile locale deschise larg spre sud, de-a lungul văilor principale și care sînt legate între ele prin șei largi pentru a schița două șiruri: Pietreni — Bărbătești — Dobriceni — Zmeurătu — Păușești Măglași, continuată de-a lungul râului Olănești pînă la Olt și dublată cu

lărgirile de la Pietrari—Stoenesti—Bunești; al doilea șir, vîrit sub munte, Băile Olănești—Muereasca—Călimănești, continuat la est de Olt cu depresiunea largă Jiblea—Berislăvești. La est de Topolog depresiunile sînt încă și mai puțin clar individualizate, arătînd o mai accentuată dispersare între muscele, dar fără a fi vorba de dispariția legăturilor dintre ele și a funcțiilor umane specifice subcarpatice. Lărgirea de la Sălătruc, de pe Topolog, se leagă cu cea de la Arefu—Căpățineni și în continuare, cu cea de la Brădet și Corbi (pe Riul Doamnei). La sud, un al doilea șir de mici depresiuni îl dublează pe cel din nord și chiar îl continuă spre Depresiunea Cîmpulungului: de la Șuici (de pe Topolog) se prelungește pe la Albești și de-a lungul Văii Iașului, la Robaia, pe Vilsan, Domnești, pe Riul Doamnei, Berevoiești, pe Bratia, de unde se face legătura cu lărgirea de la Godeni, de pe Bughea, și în continuare cu Depresiunea Cîmpulungului.

Prezența, modul de distribuire, extinderea și aspectul depresiunilor determină unele dintre trăsăturile principale ale regiunii subcarpatice pentru că acestea arată stadiul de evoluție a regiunii. În cuprinsul lor sînt fixate așezările și căile de legătură longitudinală, paralele cu marginea munților; din ele pornesc drumurile către munții de la nord și tot ele reprezintă ariile cele mai puternic transformate antropic. Înfățișarea dealurilor care limitează și separă depresiunile se schimbă vizibil (ca și la depresiuni) de la vest la est: crește masivitatea și înălțimea (350—500 m între Motru și Jiu, 450—600 m între Jiu și Olteț, 600—750 între Olteț și Olt, cu excepția a trei înălțimi care depășesc cu cîțiva metri 750 m, 700—900 m între Topolog și Olt, peste 900 m între Topolog și Dimbovița) cu consecințe directe asupra intensității energiei reliefului și proceselor de versant (implicit asupra proporției degradărilor); se mărește gradul de împădurire și proporțional se reduce suprafața terenurilor agricole și în special a celor cultivate.

Întreg spațiul subcarpatic getic, permanent bine populat, prezintă o densitate ridicată a populației și a așezărilor, aici întîlnindu-se areale cu unele dintre cele mai ridicate valori ale densității așezărilor (în Subcarpații Vilcii și în Muscelele Argeșului). Satele sînt diferențiate ca mărime după locul de amplasare a vetrei: mai mari cele situate pe terasele și glacisurile din depresiuni și

din văile largi, mai mici cele de pe versanții și culmile dealurilor, acestea din urmă avînd gospodăriile răsfirate și chiar risipite (mai numeroase între Olt și Dimbovița).

Transformarea economiei a produs schimbări în structura economică a Subcarpaților Getici (dominată anterior de activitățile agricole) prin dezvoltarea unor activități industriale bazate pe valorificarea resurselor locale: extragerea petrolului și a cărbunilor energetici și utilizarea lor în termocentrale, valorificarea resurselor hidroenergetice (pe Tismana, Olt, Argeș), exploatarea și prelucrarea chimică a zăcămintelor de sare, exploatarea și prelucrarea lemnului (inclusiv din regiunea muntoasă alăturată), fabricarea materialelor de construcție, industrializarea fructelor și a produselor animale.

Modificări s-au înregistrat și în domeniul economiei agrare prin dezvoltarea cu precădere a celor două ramuri tradiționale — pomicultura și creșterea animalelor. Subcarpații Getici reprezintă o unitate în care pădurile, pășunile și finetele naturale dețin suprafețe mai mari decît terenurile cultivate (din care o mare parte sînt ocupate de livezi). Pomicultura s-a dezvoltat pe seama plantațiilor de soiuri selecționate iar creșterea animalelor continuînd o ocupație străveche, tradițională, utilizează, în egală măsură, pășunile și finetele din munte ca și cele din Subcarpați. În ansamblu, Subcarpații Getici, priviți sub raport economic, se dezvoltă ca o regiune pomicolă și de creștere a animalelor, cu o industrie extractivă și prelucrătoare bazată pe resursele proprii. Diferențierea regională și locală a condițiilor fizico-geografice și în egală măsură a celor economice arată că nu poate fi vorba de o uniformitate a peisajului și de modificarea lui antropică în aceleași limite. Punerea în evidență a varietății regionale este o problemă de cercetare complexă detaliată.

Dacă studiile publicate pînă acum pentru Subcarpații din Oltenia au adus suficiente precizări pentru definirea trăsăturilor, stabilirea raporturilor cu celelalte unități și a diviziunilor, inclusiv complexitatea de constituție și funcțională, pentru Subcarpații dintre Olt și Dimbovița în mult mai redusă măsură s-a ajuns la cunoașterea particularităților geografice și a argumentării delimitărilor și definirii subdiviziunilor. Tocmai din această cauză se pare că s-au exprimat mai multe opinii în privința desprinderii și delimitării unor subdiviziuni ca părți cu

trăsături diferite care vin să definească varietatea în primul rând morfologică a Subcarpaților Getici. Cele mai multe din părerile exprimate sînt de acord cu separarea a trei subdiviziuni: una între Motru și Olteț (sau Cerna Oltețului) — Subcarpații Gorjului, avînd ca punct sau arie de convergență Depresiunea Tirgu Jiu; a doua, între Olteț și Topolog — Subcarpații Vîlcii, pentru care valea subcarpatică a Oltului constituie o veritabilă axă de convergență (în cuprinsul căroră se diferențiază două sectoare despăr-

Mai clar decît în oricare altă parte a Subcarpaților, relieful este format din depresiuni și dealuri dispuse în două șiruri continue, paralele cu latura sudică a munților. Alternanța culoarelor depresionare, larg extinse, cu cele deluroase, bine individualizate, coborîrea generală a înălțimilor de la est spre vest, ca și de la nord la sud, și dependența de același nivel de bază local dat de valea Jiului sînt caracteristicile morfologice principale reflectate evident în peisajul regiunii. Prin particularitățile lor morfo-




Fig. 76. Subdiviziunile Subcarpaților Getici.

țite de Bistrița Vîlcii) și, cea de-a treia, între Topolog și Dimbovița, cunoscută sub numele de Muscelele Argeșului, nume care reflectă caracterile geografice de ansamblu diferite de cele ale Subcarpaților de la vest de Topolog (fig. 76). La rîndul său, fiecare dintre cele trei diviziuni poate fi împărțită în subsectoare cu anumite particularități de constituție și de utilizare a căror punere în evidență contribuie, pe de o parte, la diferențierea analitică a fiecărui sector și a diversității geografice a Subcarpaților Getici, iar pe de altă parte la precizarea sumei de trăsături specifice acestei unități subcarpatice (fig. 76).

4.2.1.2. Subcarpații Gorjului

Subcarpații Gorjului, cuprinși între valea Oltețului la est și cea a Motrului la vest, s-au dezvoltat pe formațiuni miocene și pliocene sub marginea munților Parîngului și Vilcanului, dominați de treapta Gornoviței, aici la 650—850 m altitudine absolută. În sud se continuă cu piemonturile Motrului și Oltețului, iar în vest și nord-vest cu Podișul Mehedinți.

logice Subcarpații Gorjului au atras atenția și au constituit obiectul unor preocupări încă de la sfîrșitul secolului trecut și primii ani ai secolului nostru (L. Mrazec, 1901; Emm. de Martonne, 1902, 1907; Gh. M. Murgoci, 1908), iar în deceniile următoare particularitățile lor au fost puse în evidență fie în lucrări de sinteză (I. Popescu-Voitești, 1935; *Monografia geografică a R. P. Române*, 1960; V. Mihăilescu 1966), fie în lucrări de analiză regională (L. Badea, 1967a, 1971; Al. Roșu, 1967).

Coborîrea generală a reliefului de la est la vest, datorată afundării structurilor geologice în aceeași direcție, face ca altitudinea absolută de 614 m din apropierea Oltețului să ajungă la 500 m în apropierea Gilortului și la 450—350 m de o parte și de alta a văii Jiului. Adîncimea fragmentării reliefului are valori, în general, între 100 și 150 m, dar în unele locuri din culoarul depresionar de sub munte și din depresiunile intracolinare, aceasta coboară sub 50 m. Depresiunea Tirgu Jiu înregistrează aproape pe toată întinderea ei altitudini de 180—200 m, iar energia de relief este proprie cîmpiilor joase de acumulare fluvială (0—20 m). Pornind

de la aria depresionară a Jiului, spre vest și mai ales spre est, depresiunile ca și dealurile, în egală măsură, au altitudini mai mari, iar fragmentarea reliefului — ca adîncime și densitate — crește în aceleași direcții, dar fără a ajunge la valorile întîlnite în Subcarpații Vilcii. De remarcat că energia reliefului are valori asemănătoare sau chiar mai mici decît partea nordică, vecină, a piemontului de la sud.

Este, așadar, un relief deluros domol a cărui evoluție mai înaintată a depins de aria de afundare din Depresiunea Tirgu Jiu care, tot timpul pleistocenului, ca și în prezent, a funcționat ca arie de convergență a rețelei hidrografice.

Structurile cutate din partea sudică a Subcarpaților Gorjului, în special dintre Jiu și Olteț conțin petrol, iar formațiunile pliocene, zăcămintele de lignit. Lignitul se exploatează în bazinul Tismanei și de-a lungul Jiului (bazinul Rovinari), strate care se continuă spre sud în Piemontul Getic și în bazinul Cîlnicului, la Albeni. Adîncimea redusă la care se află cărbunele a permis exploatarea acestuia, în unele locuri, în carieră. Cărbunele este utilizat în cea mai mare parte la termocentralele de la Rogojel (1 720 MW) și Turceni (fig. 78).

Petrolul, deși semnalat la începutul secolului XX de Gh. Munteanu-Murgoci, a fost totuși exploatat numai după 1950, cînd s-au descoperit importante orizonturi productive în regiunea Bîlteni—Tîceni. În prezent, petrolul se extrage și în sud-estul orașului Tirgu Jiu, în dealurile interne dintre Amara și Blahnița și în est, în dealurile Bechenilor și Cîrligeilor. În aceleași areale se exploatează și gazele de sondă.

În Subcarpații Gorjului se valorifică și argila refractară la Vîezuroiu, în apropierea orașului Bumbesti-Jiu, ca și materialul aluvionar din lungul rîurilor.

Subcarpații Gorjului dispun de bogate surse de apă: riuri cu caracter permanent, ape freatice și izvoare care apar, la tot pasul, la contactul culoarului depresionar cu muntele. Izvoarele de la Runcu și Izvarna—Costeni, cu debite mari, au fost captate pentru alimentarea cu apă a orașelor Tirgu Jiu, Craiova și a localităților Moi, Roșia-Jiu, Bîlteni, Tîntăreni, Ișalnița etc.

Cele mai importante riuri din Subcarpații Gorjului sînt Jiul și Gilortul, spre care converg toate apele ce vin din munte. Toate traversează Depresiunea Subcarpatică și dealurile de la sud prin văi largi, adevărate

culoare depresionare, prin care se face o legătură directă între depresiunea de sub munte și depresiunea intracolinară.

Toate văile sînt însoțite de terase, chiar foarte larg dezvoltate sub influența aceluiași fenomen de ușoară afundare de la sud de Tirgu Jiu. De-a lungul Gilortului au fost puse în evidență opt nivele (L. Badea, 1967a), dar care scad pe Jiu la șase nivele (Al. Roșu, 1967), iar pe Motru la cinci nivele.

Marea extensiune a depresiunilor cu terase foarte largi, începînd de la contactul Subcarpaților cu muntele, a favorizat dezvoltarea a numeroase așezări. Ele urmăresc cu fidelitate, atît contactele dintre relieful înalt și ariile depresionare (în special munte — Depresiunea Subcarpatică), cît și culoarele transversale ale văilor (I. Conea, 1932a). Dovezi de locuire, datînd din paleolitic, s-au descoperit la Baia de Fier și Borosteni. Din perioada Daciei romane există urme de castre (Bumbesti-Jiu, Vîrtu), terme (Săcelu), drumuri și exploatare miniere (Baia de Fier). Permanentă locuire din perioada romană este atestată de descoperirile arheologice de la Bumbesti-Jiu (sec. VI), Borosteni, Suseni (secolele IX, X). *Diploma Ioaniților* din 1247 confirmă că acest teritoriu făcea parte din cnezatul lui Litovoi, unul dintre nucleele politice în formarea unității politice și social-economice a Țării Românești.

Prima mențiune documentară (1385) se referă la mănăstirea Tismana și la satele Tismana și Runcu aservite acesteia. Tot în secolul XIV mai sînt menționate satele Vinăta și Pocruia. Pînă în secolul XVIII, în documentele istorice mai sînt citate 159 de așezări, majoritatea situate la contactul Subcarpaților cu muntele și în lungul văilor principale (fig. 77). Secolul XIX marchează o intensificare a procesului de populare, care s-a făcut și prin continuarea migrației unor locuitori din Transilvania, generate cu precădere de păstoritul transhumant. Această mișcare pendulatorie „...între „patria de vară” a munților și „patria de iarnă” a sesurilor și luncilor periferice” (Ion Conea, 1939, p. 51) a avut loc secole de-a rîndul. În deplasările lor oierii străbăteau în fiecare an Subcarpații care, prin avantajele oferite, au stimulat dorința de stabilire definitivă sub poala muntelui. Gorjul „...cel așezat sub munții cei mai ușor de trecut, cu cel mai intens păstorit pe munții din nordu-i, cu cele mai multe și mai vechi drumuri transcarpatice, în unitate politică cu Hațegul de




Fig. 77. Casă tradițională din Gorj — Curtișoara (foto C. P. B.).

pe vremea lui Litovoi... a fost cel ce a primit cea mai multă populație descălecată de dincolo” (Ion Conea, 1939, p. 55).

Intensa umanizare a Subcarpaților Gorjului a fost favorizată și de o climă blândă, ca și de adăpostul format de bariera naturală a munților Parîngului și Vilcanului din nord. Climatul blînd se explică și prin predominarea circulației maselor de aer sudice, sud-vestice și vestice care determină contraste termice în anotimpul rece mult mai mici decît în estul țării și un calm atmosferic care depășește 50% din timp. Influența acestor mase de aer este mai puternic resimțită în ulucul depresionar (cu deosebire în partea vestică a acestuia), atît în ceea ce

privește regimul termic, care este moderat, cît și al precipitațiilor, care sînt mai abundente. Astfel, temperatura medie anuală înregistrează în vest (la Baia de Aramă) 9.2°C, la Tirgu Jiu crește la 10.2°C, iar în est (la Novaci), coboară din nou la 9.3°C. Iarna temperaturile sînt mai ridicate în vestul ulucului depresionar cu 0.3°C (în luna ianuarie), iar vara mai coborîte cu 1.1°C (în luna august), decît în estul acestuia. Precipitațiile medii anuale sînt mai abundente la Tismana (925 mm) decît la Novaci (863 mm) și bineînțeles în partea sudică a Subcarpaților. Din distribuirea sezonieră se observă apariția celui de-al doilea maxim de precipitații de toamnă (în lunile octombrie

și noiembrie), mai bine evidențiat al Tismana decât la Novaci.

Regimul climatic este într-o mare măsură influențat și de factorii geografici locali. De exemplu, suprafețele calcaroase de la poalele Munților Vilcan, avînd un albedo mare, determină creșterea temperaturii în acest spațiu, mai ales vara. Datorită acestui fapt, dar și adăpostului, văile transversale pe direcția maselor de aer reci din est au un topoclimat favorabil existenței, îndeosebi pe versanții adăpostiți, a unei vegetații termofile formată din castan dulce (mai răspîndit la Tismana, Pocruia, Izvarna etc.), liliac sălbatic, iasomie, mojdrean, viță de vie sălbatică etc. (Ana Popova, Cristina Șanta-Muică, 1975).

Depresiunile intracolinare au un regim climatic cu un caracter ușor excesiv, evidențiat prin temperaturi medii anuale ceva mai ridicate (10.2°C la Tîrgu Jiu), primveri mai calde (în iulie—august depășind 20°C) și prim ierni cu minime mai pronunțate (datorate și inversiunilor de temperatură). Iarna, în unele zile, temperatura în depresiune este mai coborîtă decît pe dealuri sau la munte și se înregistrează oscilații mari în decurs de 24 de ore. Inversiunile de temperatură favorizează și apariția timpurie a înghețului (la Tîrgu Jiu, 20 sept.) și dispariția lui tîrzie (la 20 mai). În Depresiunea Subcarpatică anual cad în jur de 750 mm de precipitații, cantitate inferioară celor înregistrate atît la Tismana, cît și la Novaci. Datorită calmului atmosferic, peste 70% din vînturile care bat în Tîrgu Jiu și circa 50% din cele înregistrate pe dealuri nu depășesc 1 m/s.

Condițiile climatice sînt, în general, favorabile dezvoltării culturilor agricole, dar predominanța solurilor cu fertilitate naturală redusă (soluri brune podzolite, argilo-iluviale, podzolice, pseudorendzinice, regosoluri etc.) influențează asupra producțiilor. Aceste soluri s-au format sub pădurile de fag și gorun care odinioară ocupau cea mai mare parte a Subcarpaților Gorjului. În prezent pădurile se întîlnesc pe dealurile înalte și la contactul culoarului depresionar cu muntele. Depresiunile sînt, aproape în totalitate, folosite ca terenuri agricole. Masive forestiere importante se găsesc, însă, în regiunea de munte, acolo unde se întinde teritoriul comunelor de la poalele munților. O parte a populației din așezările de sub munte (Bilta, Biltișoara, Runcu, Peștișani,

Bumbești-Jiu, Crasna etc.) lucrează în bazinele forestiere Motru Sec, Tismana, Bistrița, Bîlta, Sohodol, Șușița Seacă, Gilort, Olteț etc. Agricultură, al cărei specific este dat de creșterea animalelor, pomicultură și cultura cerealelor, a fost din cele mai vechi timpuri ocupația de bază a populației.

În anii postbelici în agricultură au avut loc unele transformări ca urmare a unor lucrări de îmbunătățiri funciare (împăduriri, terasări pentru plantări de viță de vie și pomi fructiferi, amenajări ale pășunilor și finețelor naturale slab productive). Totodată s-au executat lucrări hidrotehnice și ameliorative, între care construcția complexului hidroameliorativ din aria de convergență Ceaureu—Rovinari, care a permis punerea în valoare a unor importante resurse carbonifere, a scos de sub influența viiturilor întinse suprafețe. Lucrări de amenajare pentru irigații și de combatere a eroziunii solurilor s-au făcut pe raza comunelor Cilnic, Telești, Urdari, Fărcăsești, în perimetrul orașului Tîrgu Cărbunești, iar îndiguiri pe Bistrița, Jiu și Gilort.

În Subcarpații Gorjului suprafața agricolă însuma (în 1985) circa 166 000 ha, din care pășunile și finețele naturale 93 600 ha (56,3%), terenul arabil 62 900 ha (37,9%), livezile 7 000 ha (4,2%), viile 2 600 ha (1,6%).

În culoarul subcarpatic predomină pășunile și finețele naturale (66,5%, în 1985, din suprafața agricolă), iar în depresiunile intracolinare pășunile și finețele naturale ocupă suprafețe mai mici decît terenul arabil (40,1% din suprafața agricolă față de 53,1%). Cele mai mari suprafețe de teren arabil le dețin comunele Dănești, Bălești, Albeni, Prigoria și orașele Tîrgu Jiu și Tîrgu Cărbunești (între 4 600 și 2 900 ha), după care urmează comunele Scoarța (3 100 ha), Benghești—Ciocadia, Crasna, Prigoria, Tismana (2 500—2 000 ha) (fig. 78).

Suprafețele arabile sînt cultivate mai mult cu cereale și îndeosebi cu porumb (32 600 ha, circa 52% din terenul arabil). Cele mai mari suprafețe cultivate cu porumb (între 1 000—2 000 ha) se întîlnesc în așezările din depresiunile intracolinare. Grîul și secara, cultivate pe circa 1 200 ha, ocupă îndeosebi terasele și cîmpurile deschise de pe interfluvii. În cele mai multe așezări (exceptînd Tîrgu Cărbunești, Scoarța, Dănești, Bălești) suprafețele cultivate cu grîu și secară nu depășesc 500 ha, iar în unele




Fig. 78. Utilizarea terenurilor și resursele minerale utile din Subcarpații Gorjului. 1, Terenuri arabile; 2, șduni și fînețe; 3, vii; 4, vii și livezi; 5, livezi; 6, terenuri legumicole; 7, păduri; 8, așezări omenești; 9, petrol; 10, gaze naturale; 11, lignit; 12, argilă; 13, balastiere; 14, izvoare minerale; 15, termocentrală; 16, hidrocentrală; 17, căi ferate; 18, drumuri. A, Structura producției globale industriale pe principalele ramuri. 1, Energia electrică; 2, cărbune; 3, petrol; 4, construcții de mașini, prelucrarea metalelor; 5, chimie; 6, materiale de construcție; 7, exploatarea și prelucrarea lemnului; 8, sticlă, porțelan, faianță; 9, confecții; 10, alimentară; 11, alte ramuri.

(Novaci, Turcinești, Padeș, Runcu, Tismana) nici 50 ha.

Între celelalte culturi sînt de menționat cartofii și legumele (circa 3 900 ha) cultivate pe solurile aluvionare din lunci și în depresiunile intracolinare pe solurile podzolite. Legumele sînt răspîndite în luncile Jiului, Șușitei, Sohodolului, Jaleșului, Bistriței, pe solurile aluviale luto-nisipoase și lăcoviștite, cu o umiditate relativ ridicată și pînza freatică la mică adîncime. În aceste areale s-au format cîteva bazine legumicole: bazinul Jiului cel mai extins (Tîrgu Jiu, Iași-Gorj, Cîrbești, Drăguțești, Moi, Roșia-Jiu), bazele Șușitei (Bălești, Ceauru, Tămășești), Jaleșului (Cornești, Arcani), Amaradiei (Budienei, Dănești), Bistriței (Telești) etc.

Vița de vie, cu o veche tradiție în Subcarpații Gorjului, găsind condiții prielnice de dezvoltare s-a extins mai mult în sectorul dintre Jiu și Olteț. Cele mai mari suprafețe se întîlnesc în Bălănești (circa 320 ha), Runcu (230 ha), Tîrgu Jiu, Bumbești-Jiu, Crasna, Scoarța, Telești, Tismana (între 100 și 150 ha) etc.

Cultura pomilor fructiferi, și aceasta tradițională, ocupă suprafețe mai mari pe Dealul Tîrgului (Tîrgu Jiu) și pe raza comunelor Scoarța, Peștișani, Bălești, Săcelu, Alimpești etc. Cele mai extinse livezi de pomi fructiferi se găsesc în Scoarța (775 ha), Peștișani (700), Săcelu (660), Tîrgu Jiu, Bălești, Tîrgu Cărbunestî, Alimpești (între 600 și 400 ha). Nota caracteristică a livezilor o dă prunul și mărul (88% din totalul speciilor) (fig. 78). Un rol deosebit de important pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii îl are stațiunea de cercetări pomiviticole de la Tîrgu Jiu care, prin crearea de soiuri adecvate condițiilor pedoclimatice locale, a contribuit la obținerea unor producții sporite.

Creșterea animalelor, una din cele mai vechi ocupații ale populației, era bazată în trecut mai mult pe pășunile și fînețele naturale din Subcarpați și pe cele din plaiurile și golurile de munte. În anii postbelici, baza furajeră a fost mărită ca urmare a fertilizării și curățirii terenurilor cu pășuni și fînețe naturale, ca și a cultivării pe supra-

fețe mai întinse a plantelor de nutreț și a cerealelor. În anul 1985 baza furajeră a Subcarpaților Gorjului totaliza circa 95 750 ha, din care 68 750 pășuni, 24 800 ha fețe naturale, 2 200 ha plante de nutreț.

Oile (însușind 186 000 de capete în 1986) sînt mai răspindite în așezările din depresiunile de sub munte (Novaci, Crasna, Tismana, Baia de Fier etc.). La Tîrgu Jiu și Tîrgu Cărbunești sînt ferme specializate în cadrul întreprinderilor agricole de stat. Densitatea medie a oilor este de 111 capete la 100 ha teren agricol.

Bovinele se cresc în număr mai mare tot în așezările cu suprafețe întinse de pășuni și fețe naturale (Crasna, Tismana, Runcu etc.) sau cu culturi de plante furajere (Scoața); de asemenea sînt răspindite și pe raza administrativă a orașelor Tîrgu Jiu, Tîrgu Cărbunești, Novaci. Densitatea bovinelor la 100 ha teren agricol este de 43 de capete.

Porcinele, a căror bază furajeră o formează cerealele și nutrețurile concentrate, însumează 113 000 de capete. Ele se cresc mai ales în îngrășătorii și ferme zootehnice și mai puțin în gospodăriile populației. Îngrășătoria de la Curtișoara, de la nord de Tîrgu Jiu, și ferma pentru creșterea tineretului porcilor de la Bumbești-Jiu dețin circa 40% din totalul porcinelor din Subcarpații Gorjului. Păsările (circa 1,7 milioane) se cresc în număr mare în unele unități avicole (Scoața, Dănești, Tîrgu Cărbunești), dar mai ales în fermele întreprinderii avicole construită la sud-est de Tîrgu Jiu.

Disponind de o bogată și variată floră meliferă, Subcarpații Gorjului oferă condiții de dezvoltare a apiculturii, practică în gospodăriile populației.

În trecut marea majoritate a populației era ocupată în agricultură, dar proporția acesteia a scăzut continuu (de la circa 89% în 1948, la circa 30% în 1985), ca urmare a creșterii pronunțate a populației ocupate în ramurile neagricole și cu deosebire în industrie și construcții. Între ramurile industriale se remarcă industria carboniferă (cu circa 35 000 persoane care lucrează în bazinul carbonifer al Gorjului), industria energiei electrice și termice, a construcțiilor de mașini, materialelor de construcții, prelucrării lemnului și industria alimentară care la un loc,

dețin 84% din producția globală industrială a Subcarpaților Gorjului (fig. 78A).

Necesarul continuu sporit de forță de muncă din ramurile neagricole a fost asigurat de cei veniți din alte localități. Pe baza migrațiilor definitive și a sporului natural (cu valori apropiate de media țării), populația totală a înregistrat o creștere continuă. La începutul secolului XX (1912), Subcarpații Gorjului aveau 149 500 de locuitori, în anul 1948 circa 156 900, pentru ca în 1986 să depășească 241 000. Creșterea medie anuală a fost de numai 3,3‰ de locuitori în prima jumătate a secolului XX, în timp ce după 1948 sporul a fost de 15,0‰ locuitori. O creștere mai însemnată a înregistrat populația urbană, pe de o parte, datorită migrațiilor definitive ale populației rurale, iar pe de altă parte, prin includerea în categoria orașelor în 1968 a localităților Novaci, Tîrgu Cărbunești, Țicleni, în 1981 a centrului minier Rovinari (oraș nou construit), iar în 1989 a comunei Bumbești-Jiu. Populația urbană însumează peste 124 500 de locuitori și deține circa 52,0% din populația totală (față de 13,3% în 1948) (fig. 79A).

În contrast cu populația urbană, populația rurală a scăzut între 1948 și 1986 (cu circa 21 000 de locuitori), ca urmare a trecerii în categoria așezărilor urbane a localităților menționate și a intensificării plecărilor definitive, cu deosebire spre Tîrgu Jiu. Aria așezărilor rurale cu o populație în scădere include numeroase sate din Depresiunea Cilnicului, din bazinul Amaradiiei, Dealul lui Bran etc. Excepție fac centrele rurale cu activități industriale (Albeni, Baia de Fier, Bîlteni, Tismana). Datorită dezvoltării lui industriale, și din trecut (exploatare de antracit) satul Baia de Fier, situat la contactul cu muntele, este cea mai mare așezare rurală (circa 3 500 de locuitori în 1977). Majoritatea satelor au sub 1 000 de locuitori (179, din care 100 cu mai puțin de 500 de locuitori).

Cele mai mari și mai numeroase sate sînt situate în culoarul depresionar, la contactul cu muntele (Baia de Fier, Dobrița, Tismana, Cloșani etc.) și în lungul Jiului și Gilortului (Peșteana-Jiu, Bîlteni, Ceauru, Benghești, Pociovaliștea etc.). Cele mai mici se află în cuprinsul unităților deluroase și cu deosebire în Dealul lui Bran, adică acolo unde circulația este mai greoaie, apa la

adineimi mai mari, terenurile mai puțin favorabile extinderii vetrelor.

Satele situate în lungul văilor formează principala categorie de așezări ca localizare geografică. Există aici „...tot atâtea linii de sate cîte ape brăzdează în curmeziș depresiunea. Nu există apă fără linia ei de sate...” (Ion Conea, 1932 a, p. 334). Marea majoritate a așezărilor sînt localizate pe terase, cele mai numeroase în lungul Jiului (Bumbesti-Jiu, Curtișoara, Iezureni etc.), Gilortului (Bălcești, Bengești, Albeni etc.), ca și al Tismanei, Șușiței, Amaradiei etc. În culoarul subcarpatic, alături de satele de vale, frecvente sînt și cele situate pe glacisuri, gruiuri piemontane, agestre. Ele se țin lanț sub abruptul carpatic (fig. 79).

Forma liniară, caracteristică satelor din Subcarpații Gorjului, se datorește dezvoltării așezărilor cu deosebire în lungul văilor. Extinderea vetrelor la extremități a dus, în multe cazuri, la unirea acestora și la apariția unor sate-bulevard înșirate pe distanțe mari. Astfel, Bumbesti-Jiu, Curtișoara, Iezureni formează o vatră aproape continuă pe o lungime de circa 18 km. Tot

în lungul Jiului, la sud de aria de divagare Tirgu Jiu—Bălcești, satele sînt aproape unite, și tot așa se întîlnesc și în lungul celorlalte văi (ale Gilortului, Galbenului, Blahniței, Amaradiei, Jaleșului, Bistriței etc.).

Profilul economic al celor mai multe sate este și în prezent preponderent agricol, dar alături de acestea au apărut și așezări cu funcții agroindustriale ca urmare a dezvoltării unor ramuri industriale și în mediul rural. Așa sînt Fărcășești, Moi, Peșteana-Jiu, Albeni, centre de exploatare a lignitului, Bilteni cu exploatare petrolifere, Rogojel, unde funcționează una din marile termocentrale din țară, Bumbesti-Jiu (declarat oraș în 1989) cu industria construcțiilor de mașini, Bîrsești cu industria materialelor de construcții. În aceeași categorie se mai includ Schela și Baia de Fier, vechi centre de exploatare a cărbunului. La acestea se adaugă Tismana, cu o însemnată producție artizanală, Săcelu, localitate balneoclimaterică (fig. 79).

În cadrul Subcarpaților Gorjului se diferențiază prin specificul reliefului și carac-




Fig. 79. Subcarpații Gorjului. Unitățile de relief, tipurile funcționale și mărimea așezărilor. 1, Dealuri subcarpatice; 2, înșeuări; 3, gruiuri piemontane; 4, depresiuni subcarpatice; 5, depresiuni intracolinare; 6, așezări cu funcție agricolă; 7, agricolă și industrială; 8, agricolă și balneoclimaterică; 9, agricolă și turistică; 10, industrială; 11, complexă. A. Populația Subcarpaților Gorjului la recensăminte și în 1986.

terele economice următoarele unități geografice:

a. Culoarul depresionar subcarpatic, desfășurat continuu de la Tismana la Baia de Fier, sub abruptul munților, se continuă și la est de Olteț în Subcarpații Vilcii. De munte se leagă printr-un șir de gruiuri piemontane netezite ce se pierd pe nesimțite în suprafața depresiunii, aflată la 250—350 m altitudine absolută. Cele mai extinse gruiuri (cu direcția nord—sud) sînt situate de o parte și de alta a văii Jiului și au altitudini între 370 și 500 m. La est de Jiu dealurile piemontane se restrîng continuu, pe alocuirea îngustîndu-se aproape pînă la dispariție.

Culoarul depresionar s-a format „...prin eroziune diferențială într-o arie sinclinală cu un mic graben, în care domină marno-argilele meotiene ușor cutate și străbătute de o serie de falii longitudinale și transversale” (V. Tufescu, 1966 a, p. 185). În nivelul inițial al ulucului depresionar subcarpatic, riurile, cu direcție nord—sud, au săpat mici depresiuni mai coborîte cu 100—160 m, care comunică lateral între ele prin șei ușor de trecut, permițînd o ușoară circulație longitudinală. Între depresiunile de la vest de Jiu și cele de la est există evidente deosebiri, primele fiind mai joase, mai netede și mai bine individualizate, celelalte mai înalte și mai compartimentate. Depresiunile de la vest de Jiu: Padeș pe Motru, Tismana în aria de subsidență a văii cu același nume și a afluenților săi, Peștișani pe Bistrița, Runcu pe Jaleș, Stănești pe Șușița, se prezintă ca niște cîmpuri aluvionare largi și netede, cu altitudini în jur de 250 m, în care apele divaghează datorită pantei de scurgere redusă. La est de Jiu șirul depresiunilor se continuă cu cele de la Bumbești-Jiu, Stăncești—Crasna, Novaci, Cernădia, Baia de Fier. Datorită fragmentării, partea estică a ulucului depresionar se prezintă ca o regiune colinară de gruiuri prelungi care separă micile depresiuni și fac legătura cu dealurile subcarpatice din sud.

Conurile de dejecție terasate formate la ieșirea apelor din munți au fost intens folosite ca loc de vatră pentru sate și terenuri agricole. Umanizarea accentuată a Depresiunii Subcarpatice s-a datorat, într-o mare măsură, și existenței unor bogate resurse de apă potabilă (izvoare la poala muntelui, pînza freatică la mică adîncime).

Vatră de veche locuire, culoarul depresionar concentrează circa 31% din populația totală a Subcarpaților Gorjului (fig. 80, 81).

Agricultura, îndeosebi creșterea animalelor și pomicultura, reprezintă ocupația principală a populației. Pe cele circa 65 000 ha de pășuni și finețe naturale (multe localizate însă în zona montană) se cresc îndeosebi ovine și bovine. Sînt recunoscute în creșterea ovinelor așezările Novaci, Tismana, Crasna, Bumbești-Jiu, Baia de Fier, Runcu, Peștișani, Padeș. Cu un număr de circa 119 000 de ovine (în 1986), culoarul depresionar deține 64% din totalul ovinelor din Subcarpații Gorjului. Prezența numeroaselor conace și adăposturi montane pentru populație și animale, construite pe plaiurile însoțite din Munții Parîngului și Munții Vilcanului, dovedește strînsa legătură a locurilor de aici cu muntele.

Pomicultura s-a dezvoltat prin extinderea plantațiilor pe terenurile în pantă, ocupate în trecut cu pășuni și finețe naturale slab productive sau cu mărăcinșuri. Cele mai mari suprafețe se întîlnesc pe gruiuri piemontane din cuprinsul comunelor Peștișani, Schela, Turcinești, Tismana, Bumbești-Pițic. Vița de vie, cultivată încă din vechime, este mai răspîndită în așezările situate în apropierea ramei calcaroase de la contactul cu muntele.

La ocupațiile tradiționale ale populației se adaugă și activitățile industriale (exploatarea din munții alăturați, de grafit la Baia de Fier și de antracit la Schela, construcțiile de mașini la Bumbești-Jiu etc.). Cel mai important centru industrial din culoarul depresionar devine Bumbești-Jiu, care în ultimul timp a depășit cu mult așezări ca Tismana (cunoscut centru al industriei artistice), Baia de Fier și chiar Novaci (singurul oraș din regiune), și ca urmare în anul 1989 a fost trecut în rîndul centrelor urbane.

Orașul Bumbești-Jiu, situat la ieșirea Jiului din defileu, acolo unde încă din perioada Daciei romane a existat un castru ale cărui urme se mai văd și astăzi, s-a dezvoltat, în decursul secolelor, ca așezare de creștere a animalelor pe baza pășunilor de munte. Locuitorii se ocupau și cu exploatarea lemnului din munții pe care îi dețineau ca proprietate a obștei satului. Cu timpul se dezvoltă unele meșteșuguri, iar în perioada anilor '30 a secolului XX se construiește aici o mică unitate din cadrul industriei construc-



Fig. 80. Cula de la Curtișoara, județul Gorj (foto C. P. B.).

ților de mașini. După anul 1950 se dezvoltă în Bumbesti-Jiu o puternică industrie a construcțiilor de mașini și ca urmare devine cel mai important centru de convergență umană din Subcarpații Gorjului (cu excepția municipiului Tirgu Jiu), care atrage forță de muncă din majoritatea așezărilor situate în Subcarpații dintre Jiu și Gilort. Concomitent se dezvoltă serviciile, se construiesc blocuri de locuințe, se fac lucrări tehnico-edilitare și se organizează transporturile pentru muncitorii navetiști. Numărul total al personalului muncitor depășește 9 000, iar populația orașului a ajuns în 1992 la 11 153 de locuitori.

Orașul Novaci (cu 6 422 de locuitori în 1992) este situat în nordul culoarului depresionar, pe valea Gilortului, la poalele Munților Paring, acolo unde coboară drumul care, de la Sebeș, traversează munții. Men-

ționat documentar pentru prima dată în secolul XVI, în timpul domniei lui Mihai Viteazul (*Documente...*, 1953), orașul Novaci s-a format din unirea satelor Novaci-Pămînteni (cu populația autohtonă) și Novaci-Ungureni (cu populație de oieri, venită din Mărginimea Sibiului).

Creșterea oilor, ocupație tradițională a celor veniți de dincolo de munte, este și în prezent una din activitățile economice de bază ale populației; Novaci este așezarea cu cel mai mare număr de oi din Oltenia — peste 21 000, în 1986. O parte din forța de muncă lucrează la exploatarea și prelucrarea lemnului din munte, la fabrica de cherestea și binala din localitate, la exploatarea carbonifere din Albeni etc.

În Novaci funcționează câteva unități social-culturale (casă de cultură, liceu, cinematograf, spital, han turistic, magazine) și

unități ale cooperăției meșteșugărești. Orașul constituie o atracție pentru turiști prin pitorescul locurilor, climatul blând cu efecte curative și pentru faptul că este punct de plecare spre cabana Rinca (situată în Munții Parîngului) și spre alte atracții turistice (Cheile Galbenului, Peștera Muierii).

b. Dealurile subcarpatice interne ocupă partea centrală a Subcarpaților Gorjului, despărțind depresiunile subcarpatice din nord de cele intracolinare din sud. Cu altitudini care variază între 300 m în părțile centrale și vestică (Dealul Tîrgului, Dealul Stolojani etc.) și 600 m în partea estică (Dealul Bechenilor, Dealul Seciului etc.), aceste dealuri sînt despărțite de culoarele largi ale văilor Bistriței, Jaleșului, Șușiței, Jiului, Gilortului, Galbenului în masive bine individualizate, chiar izolate. În mare parte au fost acoperite de păduri formate, îndeosebi, din gorun, cer și gîrniță, dar acestea au fost

defrișate, iar terenurile folosite ca pășuni și fînețe naturale, terenuri arabile, livezi și vii. Aceste dealuri au o accesibilitate relativ redusă și oferă condiții limitate pentru organizarea vetrelor, astfel că în cuprinsul lor satele sînt rare și mici (fig. 79). În părțile mai înalte predomină pășunile și fînețele naturale, iar pe pantele domoale și mai ales pe versanții înșoriți, plantații de vii și pomi fructiferi.

Șirul dealurilor subcarpatice începe, din vest, cu Dealul Sporești (403 m), cuprins între văile Tismanei și Bistriței. Periferic și radial este brăzdat de numeroase văi torențiale, iar valea Cîlnicului, în lungul căreia s-a instalat satul Seuca, aproape că îl despică în două. Urmează Dealul Stolojani (377 m) dintre Bistrița și Jaleș, în mare parte împădurit, dar și cu importante suprafețe acoperite cu vii. Este lipsit de așezări,



Fig. 81. Casa memorială a lui C. Brăncuși de la Hobița (foto C. P. B.).

acestea fiind localizate numai în lungul văilor Bistriței și Jaleșului, care îl limitează la vest și la est. În continuare spre est, între Jaleș și Șușița, se desfășoară Dealurile Rasovei (334 m), despărțite în două de valea cu același nume, în lungul căreia se înșiră pe o lungime de circa 4—5 km satul Rasova. Partea centrală și cea mai înaltă a dealului este acoperită cu păduri, iar versanții plantați cu vie și pomi fructiferi. Este traversat de drumul care, venind de la Tirgu Jiu, străbate culoarul depresionar spre Peștișani și Tismana. Șirul dealurilor de la vest de Jiu se încheie cu Dealul Tîrgului (349 m), dintre Șușița și Jiu, care se leagă prin șaua de la Turcinești cu culmea piemontană desprinsă din munte din dreptul satului Schela, spre a închide culoarul depresionar de la vest de Jiu. Pădurile care acopereau în trecut Dealul Tîrgului au fost defrișate, suprafața lui fiind ocupată în prezent mai mult de pomi fructiferi, viță de vie și pășune.

La est de Jiu, la circa 4—5 km distanță, se ridică la o altitudine de 421 m, Dealul Humelor (Bălăneștilor), limitînd spre nord-est marea depresiune a Tirgu Jiului, prelungită în nord, sub forma unui culoar larg pînă sub munte. Fața de est dinspre valea Amarădiei, în lungul căreia se desfășoară satul Bălănești, este plantată cu vii. Vinurile de Bălănești sînt de multă vreme cunoscute. În rest suprafața este acoperită cu păduri, fiind cel mai împădurit deal din Subcarpații Gorjului. Între Amaradia și Blahnița se extind Dealurile Copăcioasei (453 m), fragmentate de văi aproape paralele (Tărățel, Valea Rea), care le străbat de la nord la sud. Sînt aproape complet despădurite. Pe fața sudică s-au instalat cîteva sate (Scoarța, Copăcioasa, Lazuri, Lintea), în jurul cărora terenurile au fost acoperite cu pomi fructiferi sau sînt folosite pentru alte culturi.

Între Blahnița și Gilort se află Dealul Ciocădiei (569 m), acoperit ca și celelalte cu pomi, vii, pășuni și fînețe. La poalele lui, pe valea Blahniței, s-a dezvoltat stațiunea balneoclimaterică Săcelu, ale cărei ape minerale (sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice) au fost folosite de pe vremea romanilor, termele descoperite fiind un indiciu în acest sens. Stațiunea, care are mai mult importanță locală, dispune de instalații pentru băi calde, bazine pentru băi reci, tratamente cu nămol. În ultimul timp aici s-au construit

spații de cazare (peste 420 de locuri), unități social-culturale și comerciale. În cursul anului 1985 s-a dat în folosință noul stabiliment al băilor, dotat cu instalații moderne, care asigură efectuarea zilnică a 800 de proceduri.

La nord de confluența Gilortului cu Galbenul se extinde, pînă aproape de satul Pociovaliște, Dealul Seciului (588 m), mai puțin fragmentat, pe versanții cărui se îmbină suprafețele cu pomi fructiferi, pășuni, fînețe naturale și petice de pădure de cvercinee.

Între văile Galbenului și Gilortului, la vest și valea Călnicului, la sud, se desfășoară pe direcția nord-est—sud-vest, pînă în valea Oltețului, unul din cele mai întinse dealuri din Subcarpații Gorjului, Dealul Cîrligeilor (463 m). La poalele lui, în lungul apelor care îl înconjură s-au dezvoltat numeroase sate (Albeni, Călugăreasa, Dobrana, Prigoria, Zorlești, Sirbești, Bengești, Bălcești etc.) care și-au extins vetrele îndeosebi pe poduri de terase și la contactul acestora cu lunca. Singura așezare care a urcat pe o distanță de 5 km pe clina nordică a dealului cărui i-a dat numele este satul Cîrligei, a cărui populație a defrișat pădurea, rămasă acum mai mult în jumătatea sud-vestică, acolo unde terenul este mai fragmentat și mai puțin propice pentru folosință agricolă. Pantele mai domoale din apropierea satelor sînt plantate cu viță de vie, pomi fructiferi sau folosite ca terenuri arabile. În bazinul Călnicului s-au descoperit zăcămintele de cărbuni care se exploatează în raza satelor Albeni, Zorlești și Prigoria.

La sud-est de valea Călnicului, pînă la contactul cu Piemontul Oltețului, se află Dealurile Bechenilor (614 m), cu punctul cel mai înalt din Subcarpații Gorjului, care se continuă spre sud cu cele mai nordice prelungiri ale Piemontului Oltețului. Versanții mai domoli au permis organizarea în interiorul acestuia a unui număr mai mare de sate (Becheni, Dealul Viei, Bucșana, Roșia de Amaradia), fiind, sub acest aspect, unul din cele mai populate dealuri din Subcarpații Gorjului.

c. Depresiunea intercolinară are în mare măsură aspect de cîmpie de acumulare fiind „...una dintre depresiunile cele mai tipice din întreg spațiul colinar pericarpatic” (V. Mihăilescu, 1966, p. 174). În cuprinsul ei se diferențiază trei compartimente: Depresiune

nea Ciuperceni—Cîlnic, Depresiunea Tirgu Jiu și Depresiunea Cîmpu Mare.

Depresiunea Ciuperceni—Cîlnic, reprezentînd partea vestică a depresiunii intracolinare, este formată, ca și celelalte depresiuni, din două trepte. Treapta înaltă, constituită din terasele Tismanei și șaua de la Cîlnic, face legătura cu Depresiunea Tirgu Jiu. Treapta joasă, cu cea mai mare extindere, se desfășoară în lungul Tismanei și afluenților ei, prelungindu-se spre nord-vest între dealurile Sporești și Negoiești (pe unde se leagă cu depresiunea subcarpatică a Tismanei). La Ciuperceni și la Cîlnic se conturează două piețe de adunare a apelor, frecvent expuse inundațiilor în trecut. Din această cauză satele au căutat părțile mai înalte, instalîndu-se pe terase, pe conuri de dejecție sau pe pantele domoale ale dealurilor, constituindu-se în așezări în general sub 500 de locuitori. Darea în exploatare a zăcămintelor de lignit din bazinul Tismanei a impus, pentru protejarea acestora, îndiguirea Tismanei și dirijarea cursului ei inferior spre incinta de la Ceauru, ceea ce a avut ca rezultat scoaterea de sub pericolul inundațiilor a unor suprafețe agricole.

Depresiunea Tirgu Jiu, cea mai întinsă din Subcarpații Getici, se prezintă ca o cîmpie aluvială între Dealul Șomânești în vest, șaua de la Copăcioasa în est și Dealul lui Bran în sud. În nord trimite prelungiri sub forma unor culoare în lungul Jiului, Șușiței, Jaleșului, Bistriței.

Partea înaltă este formată din terasele Jiului, larg dezvoltate pe stînga, iar partea joasă din lîncă largă, adevărată cîmpie de subsidență, de la sud de Tirgu Jiu, unde se înregistrează cea mai coborîtă altitudine din Subcarpații Gorjului (169 m). Funcționînd ca arie de subsidență, această parte se înfățișează și ca piață de adunare a apelor, în cuprinsul căreia Amaradia, Pietroasă, Șușița, Bistrița au format conuri de dejecție largi și plate, în bună parte terasate. Panta redusă, convergența mai multor ape cu albie divagante și cursuri părăsite, pinza freatică la mică adîncime, favorizează stagnarea apei la suprafață. La viiturile de primăvară și toamnă terenuri întinse sînt expuse inundațiilor. În astfel de condiții aici s-au instalat numai cîteva sate — Bucureasa, Botorogi, Tămășești, Ceauru (primele trei cu un număr mic de locuitori). Populația a preferat terasele Jiului și contactul depresiunii cu dealurile din jur.

Peisajul geografic din Depresiunea Tirgu Jiu a cunoscut transformări ca urmare a complexului de lucrări executate în sectorul Ceauru—Rovinari (construcția unui baraj și a unei incinte cu rol de atenuare a viiturilor, devierea cursului Jiului, executarea de bazine de retenție și canale colectoare ale afluenților Jiului). Efectuarea acestor lucrări a impus mutarea satelor Ceauru și Bălăcești din perimetrul incintei îndiguite, la sud-est de satul Bălăcești.

Schimbările peisajului geografic de aici, ca și din lungul culoarului Jiului de la sud au fost generate și de dezvoltarea industrială a municipiului Tirgu Jiu, de darea în exploatare a unor importante zăcăminte de cărbuni și țiței, care au atras după sine modernizarea drumurilor, construirea căii ferate Tirgu Jiu—Rovinari, ca și apariția orașului Rovinari.

Municipiul Tirgu Jiu, centrul administrativ-politic al județului Gorj, este situat la întretăierea drumului care vine de la Rimnicu Vilcea (prin culoarul depresionar subcarpatic) și merge la Drobeta-Turnu Severin, cu cel care coboară de la Petroșani (prin Defileul Jiului) și se îndreaptă spre Filiași—Craiova. Vatra orașului s-a extins din lîncă pe terasele de pe stînga Jiului. Terenurile joase din lîncă, cu pinza freatică la suprafață și expuse, în trecut, inundațiilor au fost puțin folosite pentru construcții. Îndiguirea Jiului a făcut ca în prezent orașul să fie ferit de inundații, iar terenurile recuperate să fie folosite mai mult ca spații de agrement sau ca terenuri agricole. Pe dreapta Jiului orașul este extins numai în lungul șoselei spre Drobeta-Turnu Severin.

Încă din perioada romană aici a fost o intersecție de drumuri și o așezare care a îndeplinit funcția de stațiune comercială și poștală (Al. Ștefulescu, 1906). Orașul este menționat pentru prima dată în 1406. După această dată a apărut frecvent în documente istorice, în legătură cu diferite hotărnicii de proprietate, conducerea treburilor obștești, tranzacții comerciale. Din secolul XV, cînd devine reședință județului Jaleș (ulterior denumit Gorj), începe să aibă o viață socială, politică și economică mai încheată. Se dezvoltă îndeosebi ca centru comercial, aici făcîndu-se, în decursul timpului, un intens comerț cu animale, cu cereale aduse din cîmpie și cu mărfuri din Transilvania și chiar de peste hotare. Concomitent încep să se

dezvolte unele meșteșuguri. Cu toate acestea cea mai mare parte a populației era ocupată în agricultură. Astfel, în 1859, din cei 2 661 de locuitori aproape 75% erau agricultori, 12% meseriași, 11% comercianți etc. La mijlocul secolului XIX, orașul avea 1 741 de case și alte clădiri, din care peste 91% erau construite din lemn (material care predomina în construcția gospodăriilor din Gorj). Interesant este faptul că din totalul construcțiilor, casele de locuit reprezentau numai 36%, pe cînd clădirile cu alte destinații circa 64%, acestea din urmă fiind în general prăvălii, ateliere, depozite etc., ceea ce denotă importanța acestor îndeletniciri.

În prima jumătate a secolului XX, Tirgu Jiu s-a dezvoltat tot ca centru comercial, industria fiind reprezentată doar de fabrica de țigarete, cea de cărămizi refractare și cea de confecții. Populația era, ca și în trecut, în majoritate, ocupată în agricultură. Creșterea populației, bazată aproape în totalitate pe sporul natural, a fost lentă, numărul acesteia ridicîndu-se de la 9 763 de locuitori în 1912, la 13 030 în 1930 și la 17 698 în 1948.

În a doua jumătate a secolului XX, cu deosebire după 1968 (cînd este declarat municipiu și reședință a actualului județ Gorj), Tirgu Jiu a înregistrat o puternică dezvoltare industrială, fapt care a generat un important flux de forță de muncă din mediul rural. Ca urmare, populația a crescut la 34 923 de locuitori în 1966 și la 98 267 de locuitori în 1992¹. Concomitent cu dezvoltarea industriei și a celorlalte sectoare de activități neagricole a sporit și numărul mediu al personalului muncitor, care depășește 35 000 (din care circa 51% lucrează în industrie și construcții). În prezent în municipiul Tirgu Jiu sînt localizate cîteva întreprinderi de importanță națională cu diferite profile. Așa sînt combinatul de lianți și azbociment, combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de mașini-unelte pentru piese foraj, întreprinderea de sticlărie-menaj, combinatul de articole tehnice din cauciuc regenerat, fabricile de țigarete, de confecții, de nutrețuri concentrate. De asemenea, mai funcționează întreprinderile de industrializare a cărnii, laptelui, legumelor și fructelor, de panificație, Avicola, ca și

¹ Peste 75% din totalul populației este originară din alte localități.

unități ale industriei locale și cooperatiste. De menționat și existența Întreprinderii Agricole de Stat (cu o suprafață de 8 300 ha teren agricol) și a celei de mașini agricole. Municipiul Tirgu Jiu asigură pentru economia națională 15% din producția de ciment, 12% din cea de placaje, 8% din cea de plăci din particule aglomerate din lemn. Cele mai mari ponderi în producția globală industrială a municipiului le dețin industria materialelor de construcție (24%), construcțiile de mașini (20%), industria alimentară (17%), chimia (13%), prelucrarea lemnului (12%), confecțiile (8%) etc. (fig. 82A).

Ca urmare a localizării necorespunzătoare în raport cu direcția de circulație dominantă a aerului, unele dintre unitățile industriale situate în nordul și nord-vestul orașului au efecte poluante asupra acestuia. Astfel, combinatul de lianți, situat în nord-vest, degajă cantități mari de pulbere ce ajung pînă în culoarul piemontan al Jiului. Gradul de poluare este accentuat de combinatul de prelucrare a lemnului, de fabrica de produse de cauciuc ca și de crescătoria de porci de la Curtisoara.

Industrializarea orașului s-a reflectat în aceeași măsură în dezvoltarea edilitară, social-culturală, sanitară, învățămînt etc. În Tirgu Jiu au fost construite noi cartiere de locuințe, totalizînd aproape 20 000 de apartamente și funcționează 10 licee cu diferite profile, o casă de cultură, cinematografe, muzee, spitale (trei) și alte unități sanitare.

Structura internă, care în trecut cuprindea două artere comerciale (Calea Victoriei și Str. Tudor Vladimirescu) în jurul cărora se aflau case tip parter, a fost complet modificată, ca urmare a construcției unităților industriale, social-culturale, sanitare și de locuințe, astfel încît în prezent se disting cîteva zone funcționale (fig. 82). Partea centrală, complet re construită, concentrează principalele unități administrative și social-culturale (Institutul de sistematizare și proiectare, Centrul de calcul, clădirea poștei, casa de cultură, Gorj-Hotel, liceul Tudor Vladimirescu etc.), mari magazine, numeroase blocuri de locuințe. În partea nordică (la est de șoseana Tirgu Jiu—Petroșani) s-a extins pe circa 5 km lungime zona industrială, cuprinzînd majoritatea întreprinderilor (de prelucrare a lemnului, de sticlă, articole tehnice din cauciuc regenerat, de mașini-unelte, de panificație). În lungul Jiului se conțu-




Fig. 82. Municipiul Tîrgu Jiu. Zonle funcționale: 1, Industrială și de depozite; 2, transporturi feroviare și depozite; 3, rezidențială; 4, administrativă, social-culturală, comercială și rezidențială; 5, agrement, dotări sportive, spații verzi; 6, construcții de mașini, prelucrarea metalelor; 7, chimie; 8, materiale de construcții; 9, lemn; 10, sticlă, porțelan, faianță; 11, confecții; 12, alimentară; 13, alte ramuri.

rează zona de agrement (formată în trecut numai din parcul oraşului), mult extinsă spre nord prin construirea unui stadion şi a altor terenuri sportive, a unui debarcader, ştranduri etc. În sudul municipiului se află un mare cartier de locuinţe (9 Mai), nou construit şi dotat cu magazine, şcoli, unităţi sanitare, piaţă etc. În partea estică (la sud de şoseaua Tirgu Jiu—Rîmniciu Vilcea) s-a dezvoltat zona de transporturi feroviare, auto şi de depozite, prin construirea liniei ferate spre Rovinari şi a altor linii locale, a autogării şi a unor depozite care să corespundă noului trafic de mărfuri şi călători, mult intensificat în prezent. Noua gară este dotată cu întreg complexul de clădiri necesar dirijării automate a transportului feroviar (fig. 82).

Municipiul Tirgu Jiu este un centru turistic bine cunoscut datorită existenţei ansamblului structural, unic în ţară, realizat de C. Brâncuşi (Masa Tăcerii, Aleea cu 12 scaune, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului) (fig. 83). De amintit, între alte obiective, monumentul şi casa memorială a eroinei Ecaterina Teodoroiu.

Poziţia oraşului, pe Jiu, la întretărirea unor importante căi de comunicaţie îl recomandă şi ca principală localitate de tranzit spre celelalte obiective turistice din Subcarpaţii Gorjului (mănăstirile Tismana şi Crasna. Muzeul satului de la Curtişoara, castrul roman de la Bumbesti-Jiu, casa memorială a lui Constantin Brâncuşi din Hobita, izvoarele carstice de la Runcu şi Izvarna etc.), ca şi spre cele din regiunea montană (schitul Lainici, Defileul Jiului, Pesteră Cloşani etc.).

Depresiunea Cîmpu Mare, prîngire estică a depresiunii Tirgu Jiu, de care se leagă prin şaua de la Copăcioasa, este străbătută de Gilort şi Blahniţa, ale căror lunci şi terase ocupă cea mai mare parte a depresiunii. Terasa Cîmpu Mare, extinsă între Blahniţa şi Gilort, atinge pe alocuri 2,5 km lăţime (L. Badea, 1967 a).

La est de Gilort se continuă cu mica Depresiune a Prigoriei, dezvoltată în bazinul Călnicului, între Dealurile Cîrligeilor şi Dealurile Bechenilor.

Datorită netezimii şi prezenţei unor forme de relief înconjurătoare mai înalte, apare ca o unitate morfologică bine precizată. Pe depozitele groase de terasă (pietrişuri şi nisipuri acoperite de luturi nisipo-argiloase impermeabile) s-au format soluri compacte cu

fertilitate redusă, pe alocuri înmlăştinite din cauza stagnării apei din precipitaţii în micro-depresiunile de pe podul teraselor. De aceea, suprafaţa Cîmpului Mare a fost evitată de aşezări care au preferat contactul teraselor cu dealurile sau a luncilor cu terasele inferioare. În ultimii ani au fost efectuate lucrări de ameliorare a terenurilor mai puţin productive şi s-au plantat întinse suprafeţe cu pomi fructiferi şi viţă de vie.

Oraşul Tirgu Cărbunestî este localizat la confluenţa Blahniţei cu Gilortul, în Depresiunea Cîmpu Mare, acolo unde se întîlnesc drumurile ce coboară din nord (Săcelu, Novaci, Baia de Fier), cu cele care vin din vest (de la Tirgu Jiu), din sud (de la Filiaşi) şi din est (din spre Drăgăşani), traversînd Piemontul Getic. În acest loc a funcţionat mult timp unul dintre cele mai importante târguri de vite şi cereale din Oltenia subcarpatică, cunoscut în documentele istorice sub numele de Tîrgul Bengăi şi Tîrgul Gilortului. În actuala structură administrativ-organizatorică funcţionează din 1968, cînd a fost declarat oraş şi a înglobat satele Blahniţa de Jos, Cărbunestî-Sat, Cojani, Creţestî, Curteana, Floreştini, Măceşu, Pojogeni, Rogojeni şi Ştefăneştî. Acestea, cu excepţia satelor Cărbunestî-Sat (1 915 de locuitori) şi Pojogeni (1 310 de locuitori), au sub 1 000 de locuitori. Populaţia totală a oraşului Tirgu Cărbunestî se ridică la 9 309 de locuitori (în 1992). Majoritatea lucrează în agricultură, oraşul dispunînd de peste 6 700 ha teren agricol. În Tirgu Cărbunestî există o întreprindere de maşini agricole cu circa 200 de angajaţi (care serveşte şi unităţile agricole din comunele apropiate), o întreprindere agricolă de stat cu peste 400 angajaţi (cu 2 000 ha teren agricol). Industria este reprezentată printr-o întreprindere de utilaj minier şi unităţi ale industriei locale şi cooperatiste, în cadrul cărora se produc ambalaje din lemn, mobilier, confecţii textile, tricotaje, produse lactate, zaharoase, cu care se aprovizionează şi populaţia din satele componente şi alte localităţi apropiate.

d. Dealurile subcarpatice externe, cea mai sudică unitate de relief din cuprinsul Subcarpaţilor Gorjului, sînt reprezentate de Dealul lui Bran (333 m) şi Dealul Vîrtului, printre care Jiul pătrunde în culoarul larg de la sud, adîncit în Piemontul Getic. Acoperite în mare parte de păduri, aceste




Fig. 83. Poarta Sărutului din ansamblul sculptural realizat de C. Brâncuși în orașul Tîrgu Jiu (foto V. Sencu).

dealuri sînt bine individualizate, deși altitudinea lor absolută abia trece de 300 m (Dealul lui Bran, 333 m). Amîndouă reprezintă fragmente din terasa superioară, înălțate neotectonic și fragmentate radiar de o rețea relativ densă de văi și ogașe. Afectat neuniform de mișcările neotectonice, Dealul lui Bran are în jumătatea estică înfățișarea unui platou înalt pe care s-au fixat cîteva sate înconjurate de terenuri agricole (Brătuia, Merfulești, Trocani), pentru ca în vest să se prezinte sub forma unor culmi deluroase împădurite, separate de văi adînci cu versanți repezi.

La sud de Dealul lui Bran, în mica depresiune de obîrșie a văii Cioianei, s-au dezvoltat, pe circa 12 km lungime, ca o vatră continuă, localitățile Gura Lumediei, Rășina, Tîcleni și Tunși care au format orașul **Tîcleni**. Includerea acestuia în categoria așezărilor urbane (în 1968) s-a datorit dezvoltării sale ca centru de coordonare a exploa-tărilor de petrol din regiune.

Orașul Tîcleni, care are 5 349 locuitori (în 1992), înregistrează o creștere lentă a populației ca urmare a unui spor natural redus și plecării unor locuitori în alte părți, datorită faptului că industria petrolieră solicită puțină forță de muncă. În afara extracției petrolului și a gazelor, industria mai este reprezentată de o unitate de reparat utilaj petrolier și minier și unități ale coope-rației meșteșugărești. În raza orașului, odată cu zăcămintele de petrol, au fost descoperite și izvoare sărate și termale care au fost captate și folosite în cura balneară, practi-cată anual de circa 7 000 persoane. În acest scop orașul a fost dotat cu un complex balnear.

La sudul Dealului Vîrțu, pe dreapta Jiului, în apropierea centralei termoelectrice de la Rogojel s-a construit centrul minier **Rovinari**, unde locuiesc muncitori care lucrează la exploatarea de cărbune din bazinul subcarpațic al Jiului. Aici au fost ridicate, pe lîngă blocuri de locuințe (circa 3 100 apartamente), unități social-culturale, de învățămînt (liceu minier cu 24 clase, atelier pentru practica productivă), sanitare (spital cu 250 paturi, policlinică etc.), comerciale, de prestări de servicii etc. În anul 1981 a fost declarat oraș. În prezent aici funcționează combinatul minier Rovinari, în cadrul căruia lucrează circa 18 000 de muncitori, întreprinderea de utilaj minier cu aproape 3 500

de muncitori, unități de reparații etc. Populația orașului aproape s-a triplat în ultimii zece ani (4 336 de locuitori în 1982 și 13 357 în 1992), datorită, îndeosebi, sporului migratoriu.

4.2.1.3. Subcarpații Vîlcii

La vest de Topolog și la est de Olteț are loc o schimbare treptată a ceea ce este caracteristic Muscelelor Argeșului și Subcarpaților Gorjului, astfel că se ajunge la apariția unor particularități locale și regionale care definesc clar individualitatea Subcarpaților Vîlcii. La aceasta contribuie în mare măsură Culoarul Oltului, adevărată axă geografică, spre care se afundă structurile subcarpatice și converg liniile principale ale reliefului, precum și rețeaua hidrografică majoră. Toate interfluviiile dintre Topolog și Cerna, pornind din marginea muntelui, parcă anume se arcuiesc spre a se termina în Culoarul Oltului, iar văile riurilor care le separă, toate purtătoare de drumuri, facilitează legăturile dintre valea Oltului cu întreaga regiune și fac ca aceasta să dispună de condiții favorabile pentru a funcționa ca axă de polarizare a întregii activități umane din cuprinsul acestui sector de mijloc al Subcarpaților Getici. Spre această arie se îndreaptă drumuri din toate direcțiile, imprimîndu-i un caracter evident de arie obligatorie de trecere sau de răsplată, pentru toate legăturile din cuprinsul Subcarpaților și dintr-o regiune mult mai întinsă. Este partea care a cunoscut un vechi și intens proces de populare, în prezent cu cea mai mare densitate de așezări și locuitori, cea mai puternic antropizată (Constanța Rusenescu, 1968).

Particularitățile reliefului și reflectarea lor în peisaj arată că la vest de Cerna Oltețului are loc o coborîre generală a depresiunilor, ceea ce face ca limita dintre Subcarpații Vîlcii și cei ai Gorjului să fie pusă pe Dealul Muierii, adică pe interfluvialul dintre bazinele Oltului și Jiului, deci între Olteț și Gilort. Asupra limitei de est s-au exprimat mai multe opinii cu argumente pentru fixarea ei pe Olt sau pe Topolog. Dar s-a emis și ideea (bazată pe menținerea caracterelor geomorfologice de muscele în dealurile de la vest de Olt) de a limita spre est Subcarpații Vîlcii la valea riului Olănești. Fără îndoială că există asemănări între dealurile dintr-o parte și alta a Oltului, fără

a se ajunge la o identitate cu muscelele propriu-zise și tocmai acest fapt arată că aici se îmbină trăsături subcarpatice (de muscele înalte, fragmentate adine; de dealuri scunde pe structură cutată, de depresiuni de contact, de culoare largi în lungul văilor principale, toate puternic umanizate etc.) care, prin modul lor de asociere, dau individualitatea geografică a Subcarpaților Vileii.

Valea Oltului a fost îndeobște considerată ca limită fizico-geografică între Subcarpații Olteniei și Muscelele Argeșului (avându-se în vedere și discontinuitatea pe care o produce în distribuirea elementelor fizice), dar, mai mult decât o limită, ea reprezintă un culoar de polarizare a activității din aria vecină nu numai de la vest, ci și de la est. Ca urmare, dealurile dintre Olt și Topolog aparțin unui singur sector subcarpatic, iar limita lui estică se află pe stînga Topologului, adică pe culmea dintre bazinele Oltului și Argeșului, prelungire nordică a Piemontului Cotmenei.

În nord, din valea Oltului și pînă în cea a Topologului, depresiunile de sub munte Horezu—Olănești—Muereasca—Călimănești—Berislăvești—Sălătrucu subliniază clar diferențele dintre regiunea de munte și cea subcarpatică și, prin aceasta, limita dintre cele două unități. Între pîriul Costești și pîriul Debrădet, condițiile tectonice și litologice n-au mai favorizat formarea culoarului depresionar ca la est și la vest de cele două văi, astfel că între munți și Subcarpați contactul nu mai este tot așa de clar. Aici așezările sînt mai puțin numeroase, iar ca utilizare a terenului predomină pădurea. Puțin mai la sud, însă (în est, pînă în riul Olănești); denivelarea ce se schițează în nordul șirului de largiri Bărbătești—Suseni—Zmeurătu (care corespunde aproximativ contactului dintre formațiunile paleogene și cele miocene) apare ca o limită clară între munți și Subcarpați (L. Badea, 1963).

Spre piemontul de la sud, limita nu este, însă, atît de precisă cît s-a considerat că ar fi dată, în general, de cuesta care mărginește spre nord cuvertura de pietrișuri piemontane. La est de Cerna Oltețului, caracterile și funcționalitatea reliefului nu sînt întru totul dependente de repartiția formațiunilor pliocene și cuaternare. Chiar dacă mai persistă resturi din cuvertura piemontană pe interfluviile dintre Luncavăț și Topolog, aspectele reliefului, utilizarea tere-

nurilor, peisajul și gradul lui de umanizare oferă suficiente argumente pentru a include aceste culmi în unitatea geografică a Subcarpaților și a menține limita acestora în lungul Luncavățului, de la Popești pînă la Olt, apoi, în continuare spre est, pînă în valea Topologului.

Caracterul orografic dominant rezultă din asocierea fragmentării în culmi relativ înguste și paralele, orientate nord—sud, dar ușor convergente spre Olt, cu șirurile de depresiuni și șei joase, condiționate tectonic și mai ales litologic, în sensul dezvoltării formațiunilor geologice paralel cu marginea munților.

Disponerea dealurilor și depresiunilor într-o adevărată rețea, mai clar decît în oricare altă parte a Subcarpaților Getici, a dat posibilitatea formării unei foarte dense rețele de așezări și a unei de drumuri spre a lega așezările între ele și cu valea Oltului.

Sub munte, continuînd culoarul subcarpatic al Gorjului, Depresiunea Hurezului se încheie la pîriul Costești, dar se leagă tot în această parte estică, prin șaua de la Negrulești, cu lărgirea de pe riul Otăsău, de la Pietrari. Prin intermediul acesteia se continuă (în partea centrală a Subcarpaților Vileii) cu Depresiunea Stoenesti—Bunesti, prelungită în sud, cu culoarul Govorei, pînă la Olt. Tot așa de bine conturat este și culoarul riului Olănești, lărgit mult la Păușești—Măglași (în dreptul confluenței pîriului Debrădet cu riul Olănești), unde șirul de largiri Dobriceni—Zmeurătu se leagă cu acesta. Mult mai bine individualizat este, însă, culoarul de contact dintre Valea Cheii și Topolog (Băile Olănești—Muereasca—Călimănești—Berislăvești—Sălătrucu), sculptat subsecvent în formațiuni predominant marinoase paleogene, cu cea mai mare dezvoltare pe Olt și în stînga acestuia, în depresiunea Călimănești—Sălătrucu—Berislăvești, drenată de pîriul Coisca (L. Badea, 1960).

Dealurile subcarpatice vileene au o energie mai redusă decît Muscelele Argeșului, dar sînt ceva mai semețe și mai puțin domoale decît dealurile Gorjului. Ele oferă imaginea unui relief mai răvășit de eroziune, dar încadrat unor sectoare cu particularități determinate de caracterile structurii dominante. De exemplu, la nord de șirul lărgirilor Negrulești—Pietrari, Stoenesti, Păușești—Măglași, Vlădești—Rîmnicu Vlcea se desfășoară un grup de dealuri înalte de peste 700 m,

dezvoltate pe formațiuni paleogene și miocene monoclinale, în care domină succesiunile de cueste. Ele se aseamănă cu muscelele de la est de Topolog prin fragmentare, energie de relief și pante accentuate. Sunt mai împădurite decât dealurile de la sud, cu păduri încheiate mai ales pe abrupturile de cuestă, orientate ca dosuri de deal cu fețele structurale sudice peticite de finețe și numai sporadic de livezi, mai cu seamă în împrejurimile satelor. La sud de Depresiunea Hurez și de șirul lărgirilor mai sus amintit se desfășoară dealuri formate pe structuri mio-pliocene cutate, la vest de Bistrița, reprezentate prin anticlinalul recutat și faliat al Măgurii Slătioarei (M. G. Filipescu, 1943). Cele mai accentuate complicații tectonice sînt în sectorul Oțele Mari, datorate masivelor de sare ajunse la zi prin anticlinalul Oțele Mari—Titireciu (Gr. Popescu, 1954), în lîngul căruia s-a adîncit parțial Piriul Sărăt spre a forma butoniera Oțele Mari—Ocnîța (L. Badea, D. Bălțeanu, 1978). Condiționările structurale și tectonice nu se reduc, însă, numai la formarea acestei butoniere, pentru că văile riului Olănești și piriului Debrădet sînt axate pe falii: Măgura Slătioarei este pusă în evidență ca anticlinal recutat și înălțat, depresiunea subcarpatică de la nord corespunde unui sinclinal cu flancurile faliolate, iar valea Oltului, între Rimnicu Vilcea și Băbeni, se înscrie pe aria de afundare structurală, ușor activă și în cuaternar (fig. 84 B).

Latura de sud a Subcarpaților Vîlcii, de la contactul cu piemontul relict, este formată din dealuri înscrise pe formațiuni sarmatice (pornind din flancul sudic al Măgurii Slătioarei), pliocene și cuaternare cu structură monoclină, ceea ce face ca dispunerea rocilor în benzi, orientate de la vest la est, să fie subliniată de succesiunea aliniamentelor de cueste în unghi.

Cele trei sectoare, cu relief atît de clar diferențiat morfometric și morfogenetic și ca posibilități de utilizare, se deosebesc și sub raportul resurselor subsolului. Dacă dealurile cu aspect de muscele, sculptate în formațiuni predominant paleogene, oferă numai izvoarele minerale cloruro-sodice-sulfuroase din aliniamentul Costești—Olănești—Muereasca—Călimănești, dealurile de la sud, complicate tectonic, conțin zăcămintele de sare de la Oțele Mari, apele minerale de zăcămint de la Băile Govora și zăcămintele de hidrocarburi de la Băbeni—Galicea

și Folești. Mai la vest, în dealurile monoclinale pliocene dintre Luncavăț și Olteț sînt puse în evidență zăcămintele de lignit din fișa Cucești—Cernișoara—Berbești—Alunu (fig. 84A).

Denudarea activă din cuaternar (stimulată și de un proces neotectonic mai accentuat de la vest la est — Mihaela Dinu, A. Cioacă, 1987) și manifestată ritmic s-a soldat cu dezgroparea în cea mai mare parte a structurilor subcarpatice de sub cuvertura piemontană, cu apariția unei succesiuni de trepte în partea superioară a versanților și cu crearea sistemului de terase (7—8), începînd cu nivelul de 200—220 m altitudine relativă. Acest sistem este bine păstrat pe Olt, Bistrița și Luncavăț, în latura sudică a Subcarpaților (L. Badea, 1981, 1983).

Mobilitatea accentuată a reliefului este reflectată direct de intensitatea proceselor de denudare și de cantitatea considerabilă a materialelor transportate în albi și reținute acum în lacurile de acumulare de pe Olt. La instabilitatea generală, de fond, a versanților s-au adăugat efectele modificărilor antropice ale mediului cu implicații mari asupra fondului funciar. Deplasările în masă au o frecvență mare și ele au precumpănit în procesul de prelucrare a versanților, dîndu-le un aspect vălurit sau în trepte. Sub acțiunea lor s-au format acele mici lărgiri și depresiuni de obîrșie cu forme domoale în care s-au dezvoltat numeroase așezări omenești.

Dispersarea populației într-un număr mare de sate mici și foarte mici (mai mult de 3/4 din total au sub 750 de locuitori) este consecința directă a caracterelor reliefului și a structurii forme de proprietate. Satele libere, moșnenești, foarte numeroase aici, au avut un număr de locuitori redus. Sînt puțin numeroase satele care au, în 1977, între 1 500 și 2 500 de locuitori — Jiblea Veche (1 936 de locuitori), Costești (1 667), Polovragi (2 472), în Depresiunea Subcarpatică, Bărbănești (2 075), Pietrari (2 007), Pietrarii de Sus (1 732), în dealurile dintre Olt și Bistrița, Sălătrucu (1 717) în valea Topologului etc., iar cele cu peste 2 500 de locuitori pot fi considerate adevărate excepții: Vaideeni (3 004 de locuitori), Băbeni (3 444 de locuitori) (fig. 85). Acestea au funcții social-economice diferite: Vaideeni se remarcă printr-o foarte dezvoltată economie pastorală și forestieră,




Fig. 84. Profile (I) dintre Măpătinii și Lunca Oltului (A) și dintre Olt și Topolog (B). 1, Craiul de Cozia; 2, etelac superior; 3, cocen; 4, oligocen; 5, burdigalian; 6, helvețian; 7, miocen superior; 8, pliocen inferior; 9, pliocen superior; 10, cuaternar; 11, falii.




Fig. 85. Subcarpații Vilcii. Relieful și distribuția așezărilor. 1, Dealuri subcarpatice; 2, șei deluroase; 3, grăduri deluroase aparținând depresiunii subcarpatice; 4, arii depresionare; 5, iacuri.

iar Băbeni prin funcții mixte (industriale, agricole, pastorale).

În marea lor majoritate, satele au vetre cu structură răsfirată, textură neordonată (unele chiar întortochiată), forme de poligoane neregulate sau forme alungite, liniare.

Cele mai multe din satele situate în culoarul submontan Băile Olănești—Călimănești—Berislăvești se află pe versanții văluriți și modelați de alunecări, fie în totalitate, în cuprinsul unor bazine de alunecare—Șuta, Pripoara, Andreiești (comuna Muereasca), Șerbănești, Pătești (comuna Sălătrucel), Dingești, Rădăcinești (comuna Berislăvești)—, fie cu un nucleu în vale și cea mai mare parte a vetrei satului urcând pe versanții acoperiți cu coluvii de alunecare (Muereasca de Sus, Berislăvești etc.). Este o situație care se repetă aproape în fiecare bazin hidrografic secundar, unde s-au schițat largiri

ușoare. Este relativ redus numărul așezărilor care au vetrele numai în lunci sau pe fragmentele de terase, pe agestre și pe glacisurile de la baza versanților. Așa este mai ales cazul localităților din lungul Oltului (Călimănești, Jiblea Veche, Jiblea Nouă, Rîureni, Stolnicieni, Stupărei, Mihăești, Băbeni, Goranu, Budești, Barza, Birsești, Bercioiu etc.) dar și unele de pe alte râuri, cum sînt Horezu, Măldărești, Costești, Bistrița, Govora, Frincești, Bunești etc. Cele mai multe așezări au o parte a vetrelor la baza versanților, iar cea mai mare parte extinsă pe unul sau pe ambii versanți, de obicei domoliți de alunecări. Sînt și cîteva cazuri de sate fixate în șei și pe interfluvii, ca cele de pe culmea piemontană dintre Topolog și Olt, prelungită din Dealul Negru (Izbășești, Bănești etc.) sau de pe culmile de la

vest de Olt (Buda, Cosota, Teica, Gătejești, Curăturile, Mirești), dar sînt puțin numeroase, mici ca număr de locuitori și cu posibilități de dezvoltare economică reduse.

Culoarele și ariile depresionare legate într-o adevărată rețea au oferit condiții prielnice pentru dezvoltarea așezărilor. Fiecare depresiune, indiferent de mărime, reprezintă un loc adăpostit, dar nu izolat, cu posibilități de legături lesnicioase în mai multe direcții. Nefiind izolate, între masive deluroase înalte, în cuprinsul lor nu se instalează inversiuni termice, cu coboriri accentuate ale temperaturii, și, totodată, sînt ferite de invaziile de aer rece cu viscole în timpul iernii¹. În timpul perioadelor foarte calde se înregistrează o evidentă moderare submontană (cu diminuarea temperaturilor și aerisire zilnică prin brize locale), caracteristică deosebit de favorabilă pentru ambianța în care se află stațiunile de cură balneară și odihnă din Subcarpații Vileii².

Climatul local este destul de nuanțat de la un loc la altul, în funcție de poziția locului față de ansamblul orografic în care se află: ușor răcoros, dar cu mai mult calm la Băile Olănești, de exemplu, mai uscat și cu amplitudini termice mai mari la Govora și Ocnele Mari, mai frecvent supus curenților de aer canalizați în lungul culoarului Oltului.

Cu toate înghețurile și brumele tirzii ce pot surveni în unii ani pînă în a doua jumătate a lunii aprilie, condițiile climatice și de sol sînt favorabile pomiculturii, cu deosebire culturii prunului.

O mențiune specială pentru topoclimatul cu nuanță îndulcită din depresiunea subcarpatică unde, sub adăpostul muntelui și prin expunerea generală sudică (fără a exclude influența calcarului din Masivul Arnota și a gnaisului din Cozia), se întrunesc condiții pentru creșterea castanului comestibil, în apropierea mănăstirilor Polovragi, Hurez, Bistrița și Cozia (I. Conea, 1932 b)³.

¹ În timp ce în partea de sud a dealurilor piemontane vilcene, cele mai scăzute temperaturi au ajuns la -33.5°C (Drăgășani), în depresiunile subcarpatice au coborît numai pînă la -27.0°C (Călimănești -25.0°C , Rîmnicu Vilcea -26.0°C , Govora -27.0°C).

² La fel, temperaturile maxime sînt mai mici cu $2-4^{\circ}\text{C}$, decît în dealurile piemontane din sud: Călimănești 38.0°C , Govora 37.0°C , Rm. Vilcea 39.9°C .

³ Aceleași condiții topoclimatice, cu adăpost și expunere sudică, permit cultura viței de vie, cu rezultate foarte bune, la Jiblea Veche, pe cîlna sud-estică a Dealului Păuș.

În Subcarpații Vileii proporția terenului agricol este de aproximativ 46% și aproape jumătate din această suprafață este alcătuită din pășuni și finețe naturale (aproape 49%), mai puțin de 1/3 din teren arabil (31%) și aproape 1/5 din livezi și pepiniere pomicole.

În repartitia diferitelor categorii de terenuri există deosebiri mari de la o comună la alta. Sînt comune în care terenul agricol deține peste 70% din suprafață (Păușești 75%, Alimpești, Tomșani și Mateești în jur de 72%, Slătioara 71% etc.), dar și altele în care pădurea ocupă mai mult de jumătate din moșia lor (fig. 86A). Acesta este cazul așezărilor de la contactul cu muntele (Vaideeni 65%, Horezu 64%, Costești 76%, Muereasca 52%, Călimănești 66%, Sălătruc 75%), ca și al unora mai de la sud, în a căror suprafață administrativă intră masive deluroase bine împădurite (Șirineasa 61,5%, Runcu 61%, Nicolae Bălcescu 61%, Băile Govora 57%, Goranu 55%) (fig. 86 B).

Pentru unele localități pășunile și finețele reprezintă o categorie principală de utilizare. Acestea sînt cele care își întind moșia în regiunea de munte și ajung ca 2/3 din suprafața agricolă să fie reprezentată din pășuni și finețe (Berislăvești 70%, Sălătrucel 64,5%, Costești 61% etc.).

Cele mai întinse suprafețe arabile le dețin, în general, așezările din lungul riurilor mai mari: Galicea (72,1%), Băbeni (68,3%), Budești (60%), Mihăești (56%) etc., în Valea Oltului, Poienarii de Argeș (34,5%), Tigveni (34%), Ciofringeni (33,5%), în cea a Topologului, Șirineasa (43%) și Tomșani (37%), de pe Luncavăț, Polovragi (37%) și Alimpești (31%) de pe Olteț, dar sînt și altele, din partea sudică a Subcarpaților cu suprafețe arabile întinse: Bunești (52%), Frincești (46%), Ocnele Mari (45%) etc. Culturile agricole predominante sînt cele de cereale (porumb), leguminoase pentru boabe, legume și zarzavaturi.

Livezile de pomi fructiferi și pepinierele pomicole sînt mai întinse în jumătatea estică a Subcarpaților Vileii.

Dacă pentru întreaga regiune proporția pomilor nu depășește, în general, pe comune, 1/3 din terenul agricol, numeroase așezări au cu mult peste această proporție: Cepari (42%), Băile Olănești și Băile Govora (41%), Muereasca (39%), Păușești-Măglași (38,0%), Ocnele Mari (37,0%), Goranu (36,0%),




Fig. 86. Modul de utilizare a terenurilor în Subcarpații Vilei dintre Olt și Luncăvâș, la sud de depresiunea subcarpatică (A) și dintre Olt și Topolog (B). 1, Pădure; 2, livezi; 3, teren arabil și arabil cu pomi; 4, pășuni; 5, vii; 6, localități; 7, exploatări de lignit; 8, lac de baraj; 9, cale ferată; 10, drumuri.

Milcoiu (35,0%), Șuici (35,0%) etc. În livezi predomină prunul și mărul, iar o mare parte a producției de fructe se prelucerează la fabrica de conserve de la Rîureni.

Agricultura, în care creșterea animalelor și pomicultura ocupă un loc de seamă, reprezintă ocupația de bază, tradițională, a majorității populației. Dar suprafețele de terenuri agricole, totuși reduse, au obligat populația să folosească și alte resurse, fapt oglindit în caracterul complex al activităților rurale și în practicarea unor meșteșuguri. În cazul așezărilor de lângă munte se adaugă activitățile forestiere. În ultimele decenii s-au adăugat activitățile industriale pe seama valorificării resurselor locale: la Băbeni, Oteșani, Berbești, Alunu, Tigveni etc.

Timp de mai multe secole, viața social-economică a fost influențată de exploatarea și comercializarea sării de la Oțele Mari. Se presupune că urmele materiale din epoca dacică au la bază locuiri de aproape 4 000 de ani, de când tracii au exploatat acest zăcămint (D. Berciu, 1967). Necropola tumulară de la Ferigile (comuna Costești) atestă locuiri ce aparțin epocii de tranziție de la neolitic la epoca bronzului și din epoci ulterioare, până în evul mediu timpuriu (Al. Vulpe, 1967). Apare, așadar, firesc numărul mare al așezărilor menționate documentar până în secolul XVIII.

În regiunea saliferă au apărut primii germeni ai vieții urbane, orașele Oțele Mari și Rîmniceu Vilcea, deși cu mari diferențe între ele, au fost, totuși, cele mai importante. Centre de schimb și cu o rețea slabă de unități de producție meșteșugărească, aceste orașe au avut o evoluție lentă și oarecum asemănătoare până la începutul secolului nostru. Punerea în valoare a apelor minerale a dus, relativ recent, la formarea stațiunilor balneoclimaterice: Băile Govora, Băile Olănești, Călimănești și Căciulata (Constanța Rusenescu, 1968, 1969).

În secolul XIX și în prima jumătate a secolului XX, evoluția numerică a populației a avut un ritm de creștere continuu, dar lent și fără mari variații. Pentru prima jumătate a secolului XIX numărul locuitorilor este evaluat la aproximativ 70 000 (în anul 1831). În 1899 populația ajunsese la 188 000 de locuitori, la 225 700 în 1977 și la peste 290 000 în 1985.

Între 1912 și 1985 ritmul mediu de creștere a populației a fost de peste 11‰₂₀, ceva mai accentuat în ultimii ani (14‰₀₀). În ul-

mii 25 de ani, pe întreaga regiune se înregistrează o sporire mai accentuată a populației urbane. În 1912 populația urbană era de 32 600 de locuitori, în 1966 a ajuns la 57 700 (25,6%), în 1985 la 116 300, iar în 1988 la 131 000 de locuitori (45% din populația totală). Ritmul mediu de creștere a fost de 36‰₀₀ (mai accentuat în ultimii ani) și a fost asigurat printr-un spor migratoriu provenit de la sate, în deosebi din județul Vilcea.

Populația rurală a sporit lent și chiar foarte lent în multe localități și perioade, înregistrând un ritm de creștere de 4,6‰₀₀. Condițiile de așezare și resursele fiecărui sat au determinat o mare variație a dinamicii populației pe localități. Ca urmare, se întâlnesc sate cu creșteri rapide și sate cu populație stagnantă sau care scade. Numărul acestora din urmă a sporit în ultimii 15 ani.

Sporul natural a prezentat curbe diferite pe cele două medii de viață. În anul 1985, acesta era de 8,3‰₀₀ în orașe, de 5,8‰₀₀ în comunele suburbane și foarte mic în comunele rurale (0,2—0,6‰₀₀).

Mișcarea migratorie spre Subcarpații Vilcii are, de mai mulți ani, un rol secundar în sporirea numerică a populației. Pe ansamblul regiunii, sosirile întrec cu puțin plecările, dar pe medii de viață apar diferențe mari datorită în special municipiului Rîmniceu Vilcea, unde se înregistrează afluxuri însemnate. La sate se înregistrează plecări continue și în număr mare (în majoritatea comunelor plecările întrec sosirile).

Distribuirea neuniformă a populației în așezări foarte diferite ca mărime și ca mod de dispersare în teritoriu, reflectă direct gradul de concentrare locală a activităților umane în areale care corespund ariilor de depresiune și văilor cu condiții de mediu mai favorabile, ca locurile cele mai propice pentru fixarea așezărilor, utilizarea agricolă a terenurilor și instalarea căilor de legătură. Acestea sînt ariile care au suportat în primul rînd efectele presiunii umane — mai de timpuriu și mai intens — și prezintă peisajul subcarpatic cu cele mai accentuate modificări antropice.

Culoarul subcarpatic de la contactul cu muntele, în care se află baza de utilizare imediată a spațiului muntos de alături, pe lângă a celui subcarpatic, este format din două părți:

Depresiunea Polovragi—Hurez, o asociere de suprafețe aluviale netede (poduri de terase), cu gruiuri prelungi, domoale, stră-

juite în sud de Măgura Slătioarei (767 m) și în nord-est de masivul calcaros al Builei, prezintă un topoclimat de adăpost care permite dezvoltarea castanului comestibil. Oferă posibilități de circulație ușoară în lungul marginii munților și în cuprinsul ei se adună drumurile ce urmăresc riurile, în egală măsură spre sud, în Piemontul Oltețului, ca și spre nord, în munte. Cu posibilități reduse pentru cultura cerealelor (condiționate nu atât de fragmentarea reliefului, cât de natura solurilor predominant brune luvice și luviosoluri albice), este o regiune în care suprafețe întinse sînt ocupate de livezi (meri și pruni) și finețe. Creșterea animalelor este o îndeletnicire veche care a făcut renumele unor sate ca Vaideeni și Polovragi.

Ambianța acestei regiuni de un pitoresc deosebit, rezultat din asocierea a ceea ce oferă marginea munților (Cheile Oltețului, Cheile Bistriței, Cheile Pietrenilor și masivul calcaros al Builei) și depresiunea însăși cu numeroasele ei vestigii istorice și de arhitectură (Mănăstirea Polovragi, Mănăstirea Hurez, Mănăstirea Bistrița, culele de la Măldărești) deține un mănunchi de valențe turistice prin care a stimulat interesul și formarea unor intense fluxuri turistice (mai puțin de sejur, mai mult de tranzit), determinate și de poziția obligatorie de trecere între văile Oltului (Rîmnicu Vilcea) și Jiului (Tîrgu Jiu).

Orașul Horezu¹, punctul central al depresiunii în care se întîlnesc drumurile principale ce străbat Subcarpații Vilcii și partea nordică a Piemontului Oltețului (un drum venind chiar de la Craiova), a funcționat ca loc de popas, stație de poștă și tîrg (de mare importanță la sfîrșitul secolului XVIII), fiind declarat oraș în 1968. Așezat pe terasele de la întîlnirea Luncavățului cu Luncăviciorul și Pîrîul Urșanilor, înglobează șase localități, ajungînd la o populație de aproape 7 000 de locuitori (în 1992 — 7 245 de locuitori). După anul 1970 a cunoscut o dezvoltare industrială bazată pe exploatarea și industrializarea lemnului, industria alimentară, industria textilă și a confecțiilor, iar în ultimii ani și industria combustibililor pe seama valorificării lignitului din bazinele

Luncavățului și Oltețului. Horezu rămîne, însă, în continuare un centru de schimb, comercial și turistic, ca loc de cazare și de plecare spre obiectivele turistice din împrejurimi, ca renumit centru pentru vestita ceramică de Horezu.

Culoarul Olănești — Călimănești — Berislăvești, culoar tipic de contact, se înfățișează în vest ca o succesiune de largiri de vale (Băile Olănești, Muereasca, Călimănești) legate prin șei înalte, continuată la est de Olt cu Depresiunea Jiblea—Berislăvești, legată, la rîndul ei, cu valea Topologului prin șaua dublă de la nord de Robaia (fig. 86B). Fragmentarea accentuată și intensitatea proceselor de deplasare în masă nu au permis instalarea unei legături directe în lungul culoarului, între Olănești și Călimănești (așa cum este de la Călimănești către Topolog pînă la Șuici), cu toate că este o fișie plină de așezări, mai mărunte și risipite la vest de Olt, mai numeroase și mai închegate în depresiunea de la est, toate cu o economie mixtă bazată în mare măsură pe valorificarea resurselor munților de alături. Dar tot acest culoar este dominat și iese în evidență prin importanța izvoarelor de apă minerală pe seama cărora au apărut stațiunile balneoclimaterice (de tratament și odihnă) Băile Olănești și Călimănești—Căciulata.

Orașul Băile Olănești, declarat localitate urbană în 1956, s-a dezvoltat pe vatra fostului sat Livadia. Aici se găsec peste 30 de izvoare, căutate pentru tratarea bolilor de nutriție și endocrine, diabet, intoxicații profesionale, boli dermatologice, ale sistemului periferic, gută etc. Apele au fost utilizate empiric de la începutul secolului trecut, dar primele analize s-au făcut în anii 1830—1833. În anul 1895, în urma unei inundații catastrofale, amenajările incipiente au fost distruse, astfel că numai după această dată s-au făcut captări și amenajări care stau la baza dezvoltării actuale a stațiunii, devenită permanentă cu o capacitate de 1 500 de locuri. Orașul are 4 773 de locuitori (în 1992) și își păstrează de cîteva decenii aproximativ aceeași mărime.

Orașul Călimănești înglobează pe lîngă stațiunea Călimănești—Căciulata cîteva sate din Depresiunea Jiblea—Berislăvești și ajunge la 9 094 de locuitori (în 1992). Deși stațiunea aparține (prin prezența izvoarelor cloruro-sodice-calcice, magneziene, sulfuroase de la Călimănești, Căciulata și Păușa)

¹ Numele orașului derivă din Huhurezi, Hurezi, nume consemnat în documente și lucrări vechi (C. Alexandrescu, 1893). Prima atestare într-un document prin care Vlad Vodă Voievod întărește lui Roman și lui Vlad ocine în Huhurezi și în Rîmești.

mai mult Defileului Oltului decât Subcarpaților, totuși prin localizarea așezării vechi Călimănești, prin extinderea actuală, prin legăturile și gravitarea către Rîmnicu Vilcea, orașul se integrează unității subcarpatice. Este cea mai mare dintre stațiunile vîlcene, căpătînd prin eficacitatea curativă a izvoarelor un binemeritat renume internațional. Dispune de o capacitate de peste 2 000 de locuri și este vizitată anual de peste 30 000 de persoane. Avînd o poziție foarte favorabilă, la gura sudică a Defileului Coziei, cu posibilități de acces spre Masivul Cozia și de circulație ușoară în lungul Oltului, are perspectiva dezvoltării în continuare ca bază turistică, pe măsura amplificării dotărilor din regiunea în care se integrează.

Depresiunile de sub munte nu au legături directe între ele și toate, prin culoarele din lungul văilor, se leagă cu valea Oltului, subliniindu-i foarte clar rolul de axă de polarizare economică. Depresiunea Jiblea — Berislăvești (cu legătură spre valea Topologului și Depresiunea Loviștei) gravitează spre Călimănești; lărgirea de la Muereasca se continuă, în lungul pîrîului Muereasca, pînă în valea Oltului la Bujoreni, iar mica lărgire de la Băile Olănești se leagă cu Rîmnicu Vilcea prin valea largă a riului Olănești, mai mult o depresiune plină de așezări înșirate aproape fără întrerupere de la Băile Olănești pînă la Rîmnicu Vilcea. Depresiunea Hurez se înscrie, după cum s-a arătat, în axa de circulație din lungul Subcarpaților, continuată prin lărgirea de la Pietrari (de pe Otăsău) cu valea Govorei, limitată de dealuri domoale, pline de livezi. Aceasta din urmă, lărgită ca o depresiune intracolinară, străbate pe direcția nord-vest—sud-est Dealurile Govorei (dîntre riul Olănești și Bistrița Vîlcii), cu cele mai autentice caractere subcarpatice.

Dealurile Govorei — un relief cu aspecte imprimate de o evoluție ceva mai grăbită sub influența alcătuirii litologice (roci miopliocene friabile, predominant nisipoase și argiloase, favorabile, în egală măsură, eroziunii torențiale și deplasărilor în masă), manifestărilor neotectonice diferențiate și apropierea albiei foarte coborîte a Oltului. De aceea, numai în cîteva puncte, și anume între văile Govorei și Olăneștilor înălțimea absolută depășește 600 m (Cristescu 658 m, Suvița Cacovei 676 m), iar ariile depresionare sînt numeroase, fără, însă, a constitui o depresiune bine individualizată spre a

atrage cu precădere concentrarea așezărilor. Ramificarea lărgirilor și depresiunilor de obîrșie a făcut ca așezările să aibă o mare dispersare în teritoriu și prin aceasta să se ajungă la o mai generală antropizare a peisajului. Satele s-au răspîndit pretutindeni (multe cu structură răsfrîtată și chiar risipită), drumurile principale urmăresc văile, dar cele secundare traversează, prin șei, culmile, suprafețele utilizate agricol (cu predominarea livezilor, finetelor și pășunilor) urcă pe versanți, lăsînd pădurea numai în petice pe culmi.

Modificarea antropică mai accentuată a peisajului din acest sector subcarpatic este consecința — și nu în ultimul rînd — a unor activități (intensificate în ultimele decenii), apărute prin punerea în valoare a resurselor subsolului. Zăcămintele de sare de la Ocelele Mari și Ocnița au constituit obiectul unor exploatari permanentizate, probabil, încă din vremea dacilor. Pe seama lor a apărut și s-a dezvoltat orașul Ocelele Mari și a fost atrasă în activități neagricole populația dintr-o arie mai întinsă (Dobriceni, Stoenesti, Păușești-Măglași, Vlădești).

Orașul Ocelele Mari, situat la 10 km sud-vest de Rîmnicu Vilcea, în mica depresiune Ocelele Mari—Ocnița (o butonieră), se înscrie printre cele mai vechi centre urbane din Țara Românească. Prima atestare documentară datează din anul 1402, dar ulterior a apărut pe hărți și a fost cunoscut sub diferite nume, toate legate de exploatarea sării: Ocne, Tîrgul de la Ocna, Ocna cea Mare, Tîrgul Ocna și Ocelele Mari. Exploatarea sării este consemnată pentru prima dată în diploma din 1247 prin care se acorda cavalerilor teutoni dreptul de a face comerț cu sare (Documentele Hurmuzaki, vol. I, p. 250). La sfîrșitul secolului XVIII sarea extrasă de aici se încărea în toate schelele de pe Dunăre, de la Cladova pînă la Islaz (Documentele Hurmuzaki, vol. XIX, p. 51—52). Scăderea importanței comerțului cu sare în secolul următor, ca urmare a deschiderii altor ocne, a determinat declinul economic și demografic al orașului, proces ce a continuat și în secolul XX (6 733 de locuitori în anul 1912, 3 584 în 1992).

Din anul 1963 a fost abandonată exploatarea în ocnă, prin cameră trapezoidală (făcînd inutilă calea ferată Riureni—Ocnița) și a fost introdusă exploatarea în soluție, prin puțuri sub presiune. Saramura este transportată prin două saleducte la uzina

de produse sodice Govora¹. O mare parte din populație lucrează în întreprinderile și instituțiile municipiului Rîmnicu Vilcea și numai o parte redusă este prinsă în activitățile cerute de funcția balneară, cea prin care se afirmă în prezent orașul. Stațiunea funcționează numai în sezonul cald, utilizând apele clorurosodice și iodurate din lacurile formate pe locul vechilor saline inundate și prăbușite.

De fapt, și celălalt oraș-stațiune — Băile Govora — își datorează existența tot apelor clorurosodice iodurate și clorurosodice sulfuroase, ape de zăcămint, legate de aceleași formațiuni salifere miocene.

Orașul Băile Govora, localitate declarată oraș în anul 1930, dezvoltată în bună parte pe vatra fostului sat de clăcași Prăjila, este cel mai mic dintre orașele din Subcarpații Vilcii (3 002 de locuitori în 1992), dar ca stațiune de tratament permanentă are un renume internațional prin eficacitatea tratamentului în afecțiunile cronice ale aparatului locomotor, în boli endocrine, tulburări circulatorii periferice, boli de piele, intoxicații cronice, boli cronice ale aparatului respirator etc. Stațiunea are o capacitate de cazare de 1 800 de locuri și primește anual peste 30 000 de vizitatori.

În marginea sudică a Dealurilor Govorei, la vest de Băbeni, peisajul a căpătat un aspect nou prin apariția turlelor specifice exploatărilor de petrol, iar mai recent, prin construirea căii ferate ce leagă exploatările de lignit dinspre Olteț (Berbești—Alunu) cu calea ferată din lungul Oltului.

Dealurile Slătioarei, situate la vest de Bistrița Vilcii (pînă în valea Oltețului), reprezintă acel fascicul de culmi alungite de la nord la sud, dezvoltate în mare parte ca flanc sudic, prelung, al anticlinalului Slătioarei, continuat cu monoclinul formațiunilor pliocene de la sud. Sînt culmi înguste, atacate puternic din ambele părți de organisme torențiale și deplasări în masă, foarte dificile pentru o circulație est—vest. Formațiunile monoclinale mai rezistente la eroziune, sculptate de rețeaua de văi secundare subsecvente, au permis punerea în evidență a unei succesiuni de cueste în unghi care accentuează gradul de fragmentare și neuniformitatea versanților.

¹ Necesarul de calcar utilizat la produsele sodice este adus din Masivul Arnota pe calea ferată îngustă de pe valea Bistriței prin Băbeni.

În aceste condiții circulația se face pe văi, în lungul cărora satele se înșiră aproape fără întrerupere, acele sate numite sate „bulevard” (chiar dacă unele au mici nuclee adunate), cu gospodăriile dispuse de o parte și alta a drumului, ale căror terenuri de cultură se întind din spatele casei pînă în culmea dealului. Dar nu este unic acest tip de sat pentru că în micile bazine de obirșie prelucrate și lărgite de alunecări s-au instalat sate mici, cu gospodării răsirate (Mirești, Tomșani, Dianu, Stroești etc.).

Tot acest sector subcarpatic aparține unei regiuni (dintre Olt și Gilort) rămasă mult timp într-o izolare relativă, cu o economie slab dezvoltată, bazată pe pomicultură și creșterea vitelor, o regiune cu permanent excedent de forță de muncă. Prin modernizarea drumurilor, începerea exploatării structurilor petrolifere din aria foarte apropiată Băbeni—Zătreni și mai ales prin deschiderea exploatărilor de lignit din sectorul Berbești—Alunu (ce au impus construirea unei legături directe rutiere și feroviare pînă la Băbeni), întreaga regiune a căpătat condiții și perspective noi de dezvoltare economică și socială. Faptul este dovedit în primul rînd de atragerea și reținerea forței de muncă și de fizionomia nouă a celor mai multe așezări.

Culoarul Oltului, cu lărgimea unei veritabile depresiuni (cu cit înaintăm spre sud), prin funcțiile trecute, și mai ales actuale, este, în primul rînd, o axă de convergență umană, social-economică și geografică, ale cărei funcții, cu legături îndepărtate, se răsfrîng asupra unui teritoriu mult mai întins decît aria Subcarpaților Vilcii. Valea Oltului, cu luncă largă, căreia i se alătură terase și glacisuri de acumulare întinse, a atras și a oferit condiții foarte favorabile pentru fixarea așezărilor, a constituit o cale de intensă circulație în toate epocile istorice, iar în ultimele decenii a devenit locul de amplasare a unor obiective economice de importanță națională pentru valorificarea resurselor locale și de utilizare energetică a Oltului. Prin construirea barajelor (cu hidrocentrale) de la Călimănești, Dăești, Rîmnicu Vilcea, Rîureni, Govora și Băbeni și apariția lacurilor corespunzătoare a avut loc o transformare radicală a luncii, modificarea căilor rutiere (prin utilizarea barajelor pentru traversarea albiei), schimbarea multor așezări. Toate acestea au adăugat aspecte noi peisajului antropic industrializat și urbanizat,

astfel că se poate vorbi aici de unul dintre sectoarele subcarpatice cele mai puternic transformate.

În acest răstimp a avut loc o evidentă concentrare a activităților, mult amplificate în Rîmnicu Vilcea și extinderea ariei ocupate pe acesta (cu includerea unor localități și influențarea directă, prin vecinătate, a altora), ca și apariția de noi nuclee cu activități neagricole (industriale, de transport) la Băbeni, Călimănești, Bujoreni. Fenomenul reprezintă, în același timp, un proces evident de dispersare a activităților noi (cu toate consecințele lor sociale) în tot culoarul subcarpatic al Oltului.

Municipiul Rîmnicu Vilcea, situat în amănța dealurilor, în mare parte împădurite, cu versanți prelungi ce coboară în trepte spre Olt, la 16 km de la ieșirea acestuia din Defileul Coziei, este așezat în locul de întilnire a drumurilor principale ce străbat Subcarpații în toate direcțiile. În acest fel își asigură legături directe și controlul asupra unei regiuni foarte întinse. Poziția i-a dat, astfel, posibilitatea de a deveni centru polarizator (ce-și exercită funcțiile de coordonator al întregii activități social-economice din județul Vilcea) și cel mai mare centru urban din Subcarpații Getici (113 356 de locuitori în 1992).

Urmele arheologice arată o locuire străveche și permanentă, ceea ce dovedește întrunirea unor condiții favorabile care au atras pe om în toate epocile. Cetatea Rîmnicului, reședință a lui Pătrașcu cel Bun (secolul XIV) și Mănăstirea Cetățuia de pe dealul cu același nume amintesc și de rolul strategic al așezării.

Orașul apare atestat documentar într-un act din 20 mai 1388, prin care Dan Voievod face danie mănăstirii Cozia o moară și o vie la Rîmnic (Documenta Romaniae Historica, 1966, p. 27). În secolul XV se numără printre cele mai însemnate târguri din Țara Românească. Permanența și intensitatea activității comerciale — singura mai importantă în trecut — au imprimat orașului o anumită fizionomie: străzi înguste și întortochiate, magazine multe și mici. Pe harta din 1790 este figurată vatra orașului, reprezentată numai de „simburele” comercial (târgul) (fig. 87 A). În evoluția ulterioară, vatra orașului a evitat luncile inundabile ale Oltului și Rîmnicului (riul Olănești), extinzându-se pe terasele și pe tăpșanele acumulate la baza versanților, în unghiul dintre lunca Oltului și albia Rîmnicului.

În anul 1856 orașul este extins mai mult spre nord, dar și spre sud, pe dreapta Rîmnicului, ca și în lungul acestuia spre vest, spre satul Vlădești (fig. 87 B). Ia, astfel, o formă alungită pe direcție generală nord-sud, așa cum apare pe hărțile din secolul XIX. Vatra reunește două arii relativ diferențiate funcțional: una comercială și de locuit și alta rezidențială și cu funcție agricolă, în jurul celei dintii. Numai spre sfârșitul secolului XIX, prin înființarea unor întreprinderi industriale, se remarcă o tendință de extindere a intravilanului. Gospodăriile erau însă rare și aproape toate cu grădini și livezi întinse (fig. 87 C).

Procesul foarte lent de dezvoltare (cu intervale de stagnare) din prima jumătate a secolului nostru a fost întrerupt spre sfârșitul deceniului al VI-lea, când orașul a intrat într-o perioadă de dezvoltare industrială (fig. 87 D). În prezent structura industrială a orașului este dominată de dezvoltarea industriei chimice (53,2% în anul 1982), urmată de ramuri cu ponderi mult mai mici: construcțiile de mașini și prelucrarea metalelor (17,3%), energia electrică (7,4%), industria alimentară (7,6%), exploatarea și prelucrarea lemnului (5,5%), industria pielăriei, blănăriei și încălțăminte (5,0%) etc. Mutățiile înregistrate în a doua jumătate a secolului XX (după 1960) pe plan economic și social au dus la o extindere teritorială și la o diferențiere funcțională a diferitelor părți ale orașului.

Centrul de gravitație al producției industriale a orașului s-a deplasat spre sud, pe platforma chimică, unde s-a conturat o zonă industrială și de transport, ce realizează o treime din producția industrială globală a orașului.

Partea veche, centrală, incluzând nucleul inițial sub care orașul a ființat timp de mai multe secole, constituie și astăzi zona comercială continuată spre nord și parțial contopită cu zona administrativă și de servicii, relativ restrinse ca suprafață în comparație cu celelalte (fig. 88). Activitatea comercială s-a desfășurat inițial în partea centrală, mai înaltă. Ulterior, piața s-a mutat mai jos, spre est, unde se află și astăzi. În apropierea acesteia, pe locul din dreapta Rîmnicului, unde se țineau târgurile anuale, după anul 1960, a fost amplasată aria rezidențială din sudul orașului. Deși este în curs de modernizare, mai păstrează, totuși, unele din trăsăturile lăsate de existența îndelungată a funcției comerciale. Această parte a orașului




Fig. 87. Extinderea teritorială a orașului Rimnicu Vilcea : în 1790 (A) ; în 1856 (B) ; în 1925 (C) și în 1955 (D). 1, Localitatea Rimnicu Vilcea ; 2, sate sau cătune înglobate ulterior orașului ; 3, gospodării izolate ; 4, drumuri ; 5, cale ferată.

a fost transformată radical în ultimii ani, dar mai prezintă câteva clădiri vechi în stil românesc cu un singur nivel sau cu un etaj.

În aria administrativă și de servicii se găsesc cele mai multe și mai însemnate instituții ale orașului. Unele dintre acestea funcționează în clădiri vechi, dar bine păstrate (Palatul Culturii, primăria orașului,


muzeul de istorie), iar altele în sedii noi (clădirea PTT, hotelul Alutus etc.).

În părțile de est și de sud, în lungul Oltului și al căii ferate, s-au conturat zonele industriale și de transport : una nordică, în vatra veche a orașului, cealaltă sudică, extinsă pe aproximativ 8 km la sud de cartierul Ostroveni (fig. 88). Aici sînt amplasate întreprinderile orașului, dintre care mai

importante sînt întreprinderea de exploatare și industrializare a lemnului și fabrica de piele și încălțăminte „Vilceana”. Această din urmă unitate industrială este cea mai veche întreprindere din oraș (provenită din contopirea atelierelor meșteșugărești înființate de

gări ale orașului). În afara intravilanului, la Rîureni, funcționează o veche unitate industrială: fabrica de conserve de legume și fructe, iar alături s-a dezvoltat puternic industria chimică prin construirea a două mari unități: combinatul chimic și cel de

Fig. 88. Ariile funcționale ale orașului Rîmnicu Vilcea. 1, Arie industrială; 2, industrială și de transporturi; 3, comercială; 4, administrativă și de servicii; 5, rezidențială; 6, spațiu verde și de agrement; 7, localități aparținînd orașului; 8, teren agricol; 9, pădure.



locuitorii veniți din părțile Sibiului). După anul 1900, aceste ateliere au devenit treptat fabrici de tăbăcărie și frînghii, iar la naționalizare au fost contopite într-o unitate industrială mare. Celelalte unități industriale (fabrica de cărămidă, întreprinderea de morărit și panificație, întreprinderea Vinalcool, întreprinderea pentru industrializarea cărnii) au importanță locală. Aici sînt amplasate și numeroase depozite ale industriei locale, ale gospodăriei orășenești și unități pentru transporturi (gara și una din cele două auto-

produse sodice, în cadrul căroră se obține o gamă variată de produse chimice de bază (sodă calcinată și caustică, mase plastice și rășini sintetice). Chimia este ramura care domină profilul industriei municipiului Rîmnicu Vilcea, care a devenit unul dintre cele mai importante centre ale industriei chimice (fig. 88).

Pe măsura extinderii combinatului chimic a crescut gradul de poluare a atmosferei prin cantitățile tot mai mari de noxe expulzate în atmosferă. Mai ales în perioadele de



Fig. 89. Aspect al zonei rezidențiale actuale din orașul Rimnicu Vilcea (foto C. P. B.)

calm și de umezeală sporită a atmosferei în tot Culoarul Oltului, de la Rimnicu Vilcea până la Băbeni, se formează o pîclă densă purtătoare de noxe.

Ariile rezidențiale dețin suprafața cea mai mare. În anii din urmă, s-au ridicat cartiere noi cum sînt : Petrișor, Traian, Nord, Crăsnaru, Ostroveni. Cele mai noi și mai reprezentative pentru stadiul actual de dezvoltare urbană sînt, însă, ansamblurile de locuințe Parc—Zăvoi și Ana Ipătescu, precum și cele care se află în construcție pe axa principală și la intrările dinspre nord și dinspre sud ale orașului (fig. 89).

În prima parte a secolului XIX (în anul 1835), Rimnicu Vilcea avea 3 200 de locuitori,

iar în 1899 a ajuns la 7 300 de locuitori. În anul 1912 populația orașului număra 13 600 de locuitori, 15 600 în anul 1930, 17 200 în 1948 și 19 000 de locuitori în anul 1956. După această dată, ritmul de creștere al numărului de locuitori este mai ridicat, datorită amplificării activităților industriale. Se ajunge, astfel, la 23 900 de locuitori în anul 1966, la 66 300 în 1977, la 113 356 de locuitori în 1992. Numai numărul de locuitori este suficient pentru a ilustra dezvoltarea actuală a acestui oraș.

Multe din construcțiile vechi păstrează stilul tradițional, specific Olteniei subcarpatice, cu ceardacuri peste beciuri înalte, cu foișor din arcade de stîlpi. Cîteva clădiri mai

mențin stiluri de construcție mult mai vechi, de cula, de felul aceleia în care este amenajată casa memorială „Anton Pann”.

Important este faptul că cele mai noi construcții sînt adaptate specificului local și dau orașului un pitoresc aparte.

În lunca de pe stînga rîului Olănești, încă de la jumătatea secolului trecut (în vremea lui Barbu Știrbei, în anul 1856) s-a amenajat un spațiu verde care, extins și modernizat, cuprinde parcul Zăvoi (cu o suprafață de 13 ha), stadionul orașului (cu 6 000 de locuri), teatrul de vară, strandul etc. La nord de acesta și la vest de nucleul vechi al orașului, Dealul Capela, acoperit cu pădure (40 ha), a fost amenajat ca spațiu verde pentru recreere, iar alte două spații pentru agrement au fost amenajate în sud-estul și nord-estul orașului în lungul Oltului, legate de amenajările hidroenergetice efectuate în ultimii ani. Alte spații verzi, restrinse ca suprafață, se găsesc și în partea centrală a orașului, unde s-a construit motelul Cozia. La ariile funcționale menționate trebuie adăugată și una agricolă, altădată mai extinsă, dar care în prezent mai deține o suprafață ceva mai mare în cartierul Ostroveni, cultivată în exclusivitate cu legume și zarzavaturi.

Dezvoltarea actuală complexă a orașului Rîmnicu Vilcea sintetizează și vechi tradiții culturale, o arhitectură tradițională armonios imbinată cu cea modernă, îndeplinind o tot mai marcată funcție industrială și turistică, atît pe plan regional cît și național.

4.2.1.4. Muscelele Argeșului

Muscelele Argeșului, numite astfel încă din 1909 de I. Popescu-Voitesti, se desfășoară la sud de șirul munților Frunți—Ghițu—Iezer, între văile Topologului, în vest, și Dimboviței, în est, cu o lățime de 15—30 km. Sînt formate din dealuri alungite de la nord la sud, puternic fragmentate cu altitudini variind, în general, între 600 și 900 m, dar ajungînd și chiar depășind 1 200 m (Chiciura 1 218 m). Acestea sînt despărțite de un mănunchi de rîuri paralele, orientate nord—sud (Topolog, Argeș, Vilsan, Rîul Doamnei, Bratia, Rîul Tîrgului, Argeșel), toate cu văi largi, ospitaliere, pline de sate. După modul de asociere a înălțimilor se pot distinge două trepte: una înaltă, formată din culmile submontane, dominată de virfuri, ca: Tamaș (1 104 m), Cioara (1 043 m) între Topolog și Argeș; Chiciura (1 218 m) între Argeș și Vilsan; Toaca (899 m)

între Vilsan și Rîul Doamnei; Muscelele Plătici și Rîușorului (1 143 m) între Rîul Doamnei și Bratia; Ciocanu (886 m) între Bratia și Bughea; Ciuha (750 m) între Bughea și Rîul Tîrgului, Mătân (1 018 m) între Rîul Tîrgului și Argeșel, Groapa Oii (751 m) între Argeșel și Dimbovița; a doua, cu altitudine medie de 600—650 m, face trecerea spre Gruiurile Argeșului, de la sud. Cunoscute sub numele local de „muscele”, aceste dealuri, despădurite în mare parte și acoperite cu pășuni, finete și livezi, se înscriu în peisaj prin caractere cu totul aparte.

Contactul dintre munți și depresiunile submontane, adică între rocile ariei carpatice cristalino-mezozoice (gnaisul de Frunți—Ghițu, calcarele din Mateias) și rocile sedimentare mai puțin rezistente la eroziune (gresii, marne, sisturi disodilice) ale Depresiunii Getice, este un abrupt de cîteva sute de metri, structural și litologic. Depresiunile, sculptate în formațiuni eocene și oligocene, sînt restrinse și nu formează culoare largi și continui ca la vest de Olt. S-au format prin eroziune diferențială (grăbite și de ridicarea în bloc de la sfîrșitul pliocenului și din cuaternar), uneori condiționată de accidente tectonice care afectează formațiunile sedimentare.

Șirul depresiunilor submontane începe de la Topolog cu Depresiunea Sălătruc (sau Sălătrucelor după V. Mihăilescu, 1966), formată la întîlnirea citorva văi mici subsecvente (Adinea, Tisa, Manița, Baba) și legată prin șei înalte cu depresiunile Jiblea—Berislăvești în vest (744 m) și Aref în est (913 m). Între Argeș și Rîul Doamnei, depresiunile sînt mici, cu aspect deluros, reprezentînd mai mult lărgiri locale ale văii Argeșului și afluenților săi principali. Așa sînt depresiunile Arefu pe Argeș, Brădet pe Vilsan, Bahna Rusului și Nueșoara pe Rîul Doamnei, Corbi pe Bratia, legate între ele prin șei largi, dar înalte și deluroase. Depresiunile adăpostesc așezări cu funcții forestiere (Arefu, Nueșoara, Albești de Muscel), agropastorale și balneoclimaterice specifice așezărilor Brădet și Bughea de Sus. Între Bratia și Dimbovița se desfășoară Depresiunea Cîmpulung, cea mai dezvoltată din șirul acestor depresiuni, prelungindu-se spre nord-vest cu mica depresiune Albești—Cîndești. În Depresiunea Cîmpulung dealurile au aceeași orientare nord—sud, înscriindu-se în nivelul de 700 m. Dacă depresiunea, în ansamblul

ei, este considerată ca avînd la origine un accident tectonic local — afundarea depozitelor paleogene care a favorizat depunerea pietrișurilor și nisipurilor pliocene cu intercalații de tufuri dacitice și gipsuri —, particularitățile reliefului sînt reflexul diversității rocilor. În cuaternar aici au avut loc importante remanieri ale rețelei hidrografice N. Muică, 1971).

formează un culoar depresionar, cunoscut sub numele de „Depresiunea celor șapte muscele” (V. Mihăilescu, 1966). Compartimentul de la Tigveni de pe Topolog se continuă cu cel de la Curtea de Argeș, cel mai dezvoltat din tot culoarul intracolinar, care, la rîndul său, se leagă cu lărgirea de la Mușătești—Stănești, unde culoarul se îngustează la 1—2 km și devine mai înalt (șaua




Fig. 90. Profile geologice prin Muscelele Argeșului. A, Pe interfluviul dintre Argeș și Vîlsan; B, pe interfluviul dintre Rîul Tîrgului și Argeșul. 1, Pietrișuri, nisipuri, argile (strate de Cîndești și de Frătești); 2, argile, marne și nisipuri (levantin); 3, nisipuri, marne, argile cu intercalații de cărbuni (dacian); 4, marne, argile, nisipuri și pietrișuri (ponțian); 5, conglomerate și marne cenușii (helvetian); 6, conglomerate, gresii și marne nisipoase (burdigalian); 7, conglomerate, gresii, marne nisipoase, tufuri, gips și argile sistuoase (rupelian-acvitanian); 8, megabrecii și megaconglomerate, gresii și marne (ypresian-lutețian); 9, gresii și marne (vraco-cenomanian); 10, calcare masive (jurasic superior); 11, micașturi și paragnease.

Spre sud, depresiunile submontane sînt închise de dealuri alcătuite din roci mai rezistente — conglomerate burdigaliene și helvețiene în alternanță cu gresii, marne nisipoase, tufuri, dispuse monoclinale, în care predomină relieful de cîuste, în general bine reprezentat pe toate interfluviile dintre Topolog și Dimbovița, prin punerea în evidență a orizonturilor conglomeratice, grezoase și calcaroase. La sud de o linie ce ar trece prin localitățile Ceparii-Ungureni, Albești, Berevoiești, Poienari, Cetățeni se desfășoară o a doua fișie de cîuste, predominînd cele în unghi (fig. 90).

Mai la sud, în partea centrală a muscelor se insinuează alte lărgiri formate de regulă pe văi secundare subsecvente, despărțite de culmi joase cu șei, care înlesnesc legăturile pe direcția est—vest. Aceste lărgiri

Argeș—Vîlsan 500 m, șaua Vîlsan—Rîul Doamnei 600 m) (fig. 90 A). Culoarul pătrunde apoi prin sudul Muscelor Plătici și dealurilor Ciocanul—Ciuha—Mătau, pînă la valea Argeșului. Între Argeșul și Dimbovița (est de Boteni) se insinuează o culme de legătură (790 m) între Groapa Oii și Piemontul Cîndești. Aceste depresiuni sînt sculptate în formațiuni pliocene, reprezentate printr-o alternanță de marne, argile și nisipuri. Alături de livezi, înserise pregnant în peisajul umanizat al acestor depresiuni, apar și elemente distincte ale industriei: exploatarea de lignit din bazinul Schitu Golești (la Pescăreasca, Godeni, Berevoiești Slănic, Poienari, Jugăr și Boteni), lanțul de hidrocentrale de pe Argeș (Oești, Albești, Cerbureni, Valea Iașului, Curtea de Argeș).

Depresiunea intracolinară a celor șapte muscele este dominată dinspre sud de o altă serie de cueste situate la altitudinea absolută de 650—750 m (Ripa Roșie 614 m, între Topolog și Argeș, Ripa cu Brazi 771 m, între Argeș și Vilsan, Păcuraru 726 m, între Riul Doamnei și Bratia, Prislop 690 m, între Bratia și Riul Tîrgului, Obăița 691 m, între Riul Tîrgului și Argeșel și Dl. Perilor 745 m, între Argeșel și Dîmbovița), care marchează limita dinspre Gruiurile Argeșului (fig. 90 B).

Varietatea fragmentării reliefului și diversitatea litologică se reflectă în gama variată de soluri, formate în climatul specific ținutului subcarpatic, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 6 și 7°C, ale lunii celei mai reci între -2 și -4°C, iar ale lunii celei mai calde între 16 și 18°C. Temperaturile minime absolute au fost înregistrate în 1933 la Curtea de Argeș - 30.8°C și Cîmpulung - 31°C, unde, în timpul iernii, se constată inversiuni de temperatură. La Cîmpulung inversiunile sînt frecvente atît iarna, cît și în lunile de vară (Elena Teodoreanu, Elena Mihai, 1971). Construirea întreprinderii de lianți la Valea Mare—Pravăț, la nord-est de Cîmpulung, a dus, datorită și inversiunilor de temperatură, la poluarea aerului, la creșterea numărului zilelor cu ceață și scăderea insolației, ca urmare a unei aerări reduse. În Muscelele Argeșului precipitațiile variază între 700 și 900 mm, și au o distribuție foarte variată, atît de la vest spre est (odată cu reducerea influenței climatului oceanic), cît și de la nord la sud (odată cu reducerea altitudinii). Cele mai mari cantități medii anuale s-au înregistrat la Arefu (1 727,7 mm în 1966), Nucșoara (1 708,5 mm în 1915), Domnești (1 519,6 mm în 1897), Cetățeni Deal (1 460,5 mm în 1972) etc. Cea mai mare parte (400—600 mm) din cantitatea anuală de 700—900 mm cade în semestrul cald, restul în semestrul rece.

Efectele negative ale variației sezoniere a precipitațiilor coroborate cu alimentarea riurilor cu ape provenite din topirea zăpezilor au fost diminuate prin amenajarea complexă a sistemului hidroenergetic al Argeșului superior. Amenajarea lacurilor de acumulare, atît în cuprinsul zonei muscelor la Oești, Cerbureni, Curtea de Argeș, cît și avale, asigură reținerea viiturilor cu debite mari și înlătură pericolul inundațiilor, satisface alimentarea cu apă a populației și

activitățile economice, modificînd totodată peisajul natural.

Cele mai răspîndite soluri sînt cele brune eu-mezobazice și regosolurile întîlnite pe depozitele argiloase ale versanților mai puternic înclinați și ale culmilor înguste dintre Topolog și Riul Doamnei. Între Riul Doamnei și Argeșel predomină solurile brune luvice (podzolite) și local luvisoluri albe. Solurile brune luvice pe depozite cu textură mijlocie și grosieră se întîlnesc pe versanții cu înclinare mai slabă. De asemenea pe versanții modelați, înclinați și despăduriți predomină soluri negre clinohidromorfe. Terassele riurilor principale sînt acoperite de luvisoluri slabe tipice, inclusiv slab luvice și cernoziomuri cambice tipice. Luncile aceluiași riuri sînt în cea mai mare parte acoperite de soluri aluviale, unele frecvent gleizate.

Vegetația naturală a cunoscut, în decursul timpului, mari transformări, datorită despăduririlor din lungul văilor și mai ales din cuprinsul depresiunilor, inclusiv al șeilor, în favoarea spațiului ocupat de așezări omenești și de terenuri agricole. Astfel, Depresiunea Cîmpulung și dealurile aferente de la sud au fost aproape în întregime despădurite. De aceea de la Dîmbovița pînă la vest de Bratia se întinde o arie largă, în care locul pădurilor este luat de terenuri agricole. O reducere de proporții se constată și pe interfluviul dintre Riul Doamnei și Vilsan (de la nord de satul Mușătești pînă la nord de satul Brădet), ca și de-a lungul culoarelor Riului Doamnei și Riului Tîrgului, către convergența de la nord de Pitești.

Pădurile care dețin peste 1/2 din suprafața muscelor sînt reprezentate prin fâgete și gorunete și au o mare extindere între Topolog și Riul Doamnei.

Prezența unor masive forestiere întinse a creat premisele unei ramuri tradiționale în economia muscelor. Exploatarea la scară industrială a esențelor de foioase a început îndeosebi din a doua jumătate a secolului XX.

Regiunea prezintă o dinamică accentuată a versanților, intrucît, exceptînd conglomeratele și intercalațiile grezoase și conglomeratice (deci formațiunile paleogene și miocene mai rezistente situate în partea de nord), toate celelalte roci sînt friabile și favorabile dezvoltării proceselor de denudare. Dacă la acestea se adaugă energia de relief mai accentuată (150—350 m), frecvența mare a alternanțelor de nisipuri și marne-argile, defrișarea vegetației arborescente de pe suprafețele înclinate și particularitățile

factorilor climatici și îndeosebi ale precipitațiilor (700 mm) este explicabilă existența deplasărilor în masă și a proceselor de ravănare. Formarea și desfășurarea lor depinde de particularitățile strict locale ale bazinelor secundare, care au un rol important în ritmul accelerat de colmatare a lacurilor de pe Argeș. Necesitățile de diminuare a transportului solid au impus amenajarea antierozională a bazinelor mici aferente Vîlsanului, Rîului Doamnei etc. La unele se remarcă o diminuare a intensității proceselor de albie și de versant (Valea Seacă, Valea Satului, Birna), la altele efectul este nesemnificativ (Priseaca, Valea Dadelor, Băjenoaia etc.). Concomitent cu lucrările transversale dacă se intensificau și lucrările silvice, rolul lor ar fi fost amplificat, iar amenajările antierozionale ar fi avut efectul scontat.

Varietatea fragmentării reliefului și topoclimatelor a influențat vădit structura și distribuția fondului funciar. Terenurile arabile reprezintă 5,8% din suprafața totală a unității și ocupă îndeosebi terasele și luncile rîurilor dintre Topolog și Dimbovița. O caracteristică dominantă a peisajului local este dată de întinderea livezilor și a pășunilor și fînețelor care dețin peste 4/5 din suprafața agricolă.

Particularitățile reliefului, distribuția rețelei hidrografice și condițiile pedoclimatice au influențat puternic atât repartitia teritorială a așezărilor, orientarea căilor de transport, cât și activitățile economice ale oamenilor acestor locuri de străveche populare.

Muscelele Argeșului, avînd un potențial oicumenic ridicat, s-au impus ca o puternică vatră de locuire și continuitate, în care activitatea umană a lăsat numeroase urme materiale din neolitic (Godeni și Stoenеști), din epoca bronzului (Berevoiești) și a fierului (Cetățeni) pînă în prezent.

Muscelele Argeșului au constituit în perioada feudală locul de formare a voievodatului lui Seneslau, ducînd, ulterior, în secolul XIV la înființarea statului feudal al Țării Românești. Orașele Cîmpulung și Curtea de Argeș au fost primele capitale ale noului stat, cunoscînd un nivel ridicat de dezvoltare, concretizat prin numeroase edificii monumentale cu valoare arhitectonică și picturală, păstrate pînă în zilele noastre. Ulterior, factori de ordin economic, social și politic au contribuit la diminuarea importanței politice și organizatorice a acestui teritoriu, care își păs-

trează însă un rol important în comerțul cu cereale, lemn și fructe.

În secolele XVIII–XIX a existat un intens proces de transhumanță a oierilor transilvăneni spre sudul țării, care s-a soldat cu stabilirea unora dintre ei și în Muscelele Argeșului, unde au organizat cîteva sate dublete: Căpățineni-Ungureni, Oești-Ungureni, Cepari-Ungureni ș.a. În decursul secolului trecut și în prima jumătate a secolului XX populația muscelor înregistrează o creștere lentă pe măsura ritmului de valorificare a resurselor naturale, creștere bazată pe sporul natural cîrui i s-a adăugat aportul migrator de peste munți, din a doua jumătate a secolului trecut. În aceste condiții populația totală în anul 1912 era de 4,6 ori mai numeroasă decît în anul 1835. În prima jumătate a secolului nostru, ritmul relativ ridicat de creștere a populației se bazează mai mult pe sporul populației rurale, cea urbană înregistrînd o creștere foarte lentă între anii 1912 și 1956. Dezvoltarea economică redusă a celor două orașe — Cîmpulung și Curtea de Argeș — a condus la intensificarea fenomenului de emigrare a populației spre alte centre din țară.

Transformările economice au produs mutații în dinamica și structura populației, rolul hotărîtor revenind celor două centre urbane (în care dublarea numărului de locuitori s-a realizat mai ales pe seama sporului migrator din mediul rural), ca și dezvoltării puternice a celor două orașe din apropiere, cu funcții noi, complexe, în teritoriu — Pitești și Rîmnicu Vîlcea.

Pe fondul unei densități de ansamblu de 74 loc./km² se înregistrează mari diferențieri, de la mai puțin de 20 loc./km² în comunele nordice (Arefu, Sălătrucu, Nucșoara) pînă la 160 loc./km² în bazinul carbonifer Schitu Golești. În general densitățile mai ridicate se întîlnesc în așezările situate de-a lungul arterelor de transport din lungul văilor.

Ca urmare a reducerii sporului natural și a creșterii soldului migrator negativ s-a accentuat procesul de „feminizare” a populației rurale. În unele comune cu un nivel economic mai redus, sau situate, de regulă, la distanță de principalele artere de transporturi, sau de cele două orașe polarizatoare, gradul de feminizare depășește 52% (de exemplu, Brăduleț, Cicănești, Mioarele, Poienarii de Argeș, Tigveni). Dimpotrivă, în comunele cu economie dominată de industria extractivă (Berevoiești, Poienarii de Mus-

cel), sau situate în imediata apropiere a orașelor ponderea populației feminine se situează sub 50%.

Importante modificări, ca efect al transformărilor economice, au intervenit în structura populației active pe ramuri de activitate. Dacă în trecut agricultura era ocupația de bază a populației rurale și într-o măsură mare chiar și a celei urbane, în prezent activitățile neagricole concentrează circa 3/5 din populația activă, industriei revenindu-i ponderea prioritară. Această mutație a fost cauzată în mod direct de dezvoltarea industrială a celor două orașe, care a făcut ca aproape 1/2 din populația ocupată în activitățile neagricole din mediul rural să se deplaseze zilnic pentru lucru în cadrul acestor așezări.

Așezările rurale, în număr de 177, conferă trăsătura dominantă a peisajului umanizat al muscelor.

Densitatea generală a așezărilor este de 6,7/100 km², densitate, generală pentru toți Subcarpații. Dacă se face abstracție de spațiul ocupat de păduri, îndeosebi în partea nordică, densitatea efectivă este de 14,8/100 km².

Cele mai multe sate (102) sunt situate în lungul văilor, ocupând fragmente de glacisuri, conuri de dejecție, terase și se desfășoară liniar de-a lungul drumului principal, cu unele ramificații perpendiculare spre versanții ușor accesibili. În cursul superior al râurilor Vilsan, Rîul Doamnei, Bratia se întind satele de vale și de versant (Brădet, Corbi, Bughea de Sus etc.). Pe interfluvii, îndeosebi în partea estică, s-au dezvoltat sate a căror vatră s-a extins în mai multe direcții: pe culmi și pe versant (Mioarele), pe versant (Poienari) sau așezate la contactul cu panta muntelui (Albești, Valea Mare—Pravăț, Cindești).

În funcție de condițiile locale și profilul activităților economice mărimea satelor variază de la mai puțin de 50 de locuitori la peste 3 000 de locuitori. Cele mai numeroase sate (97) numără peste 500 de locuitori, concentrând 84,5% din totalul populației rurale (la nivelul recensământului din 1977).

Față de situația consemnată de recensământul din 1966 s-a intensificat procesul de concentrare a populației în satele mai mari de 1 000 locuitori. Numărul acestor așezări a sporit de la 35 în 1956 la 44 în 1977, iar ponderea lor în populația satelor a crescut de la 46,3% la 55,5%. Este semnificativ că așezările cu peste 1 000 de locuitori,

sînt de regulă reședințe de comună, avînd astfel un nivel mai ridicat de dotări edilitare și sociale. Acestea sînt situate pe terasele râurilor și în lungul arterelor principale de transport. Așezările cele mai mari, cu peste 2 000 de locuitori, sînt amplasate cu precădere în partea estică a muscelor, pe Rîul Doamnei (Domnești), valea Bratiei (Berevoiești, Vlădești), Rîul Tîrgului (Schitu Golești), valea Bughei (Bughea de Jos) sau a Argeșului (Boteni) (fig. 91).

În ce privește satele mici (sub 250 de locuitori), care dețin ceva mai puțin de 1/4 din numărul total, ele sînt situate, în majoritate, pe interfluvii sau la contactul cu lunca, de-a lungul drumurilor secundare nemodernizate. Nu puține sînt satele așezate la capăt de drum (Valea Muscelului, Chiliz, Oțeluș a.). Poziția lor izolată, lipsa dotărilor de infrastructură contribuie la stagnarea sau chiar reducerea numerică a populației în aceste așezări. Fenomenul de scădere a populației se manifestă și în cazul multor sate din categoriile superioare de mărime. Rezolvarea acestei situații este condiționată în primul rînd de sporirea gradului de modernizare a drumurilor, dotărilor social-edilitare etc. Faptul că aproape 3/5 din numărul satelor sînt dispuse de-a lungul văilor contribuie la asigurarea unor legături lesnicioase între satul de reședință și satele componente. În unele cazuri, distanțele foarte mici dintre sate fac imposibilă delimitarea lor (de exemplu, în valea Argeșului — Oiești-Ungureni, Oiești-Pămînteni, Corbeni, Bucșenești).

Structura prezintă aspecte diferențiate de la aceea adunată — compactă în lungul văilor (Domnești, Poienari Argeș etc.) la aceea răsfrîntă, proprie satelor de versant (Brăduț, Ungureni, Colnic, Mățău), pînă la structura de tip risipit a satelor de versant și culme (Arefu, Nucșoara, Jgheaburi, Turburea, Cindești a.).

Resursele naturale și evoluția ascendentă a economiei din cele două orașe au contribuit la diversificarea funcțională a așezărilor din regiunea muscelor. Dacă în trecut tipul predominant era cel de creștere a animalelor în corelare cu activitățile forestiere, în nord (Nucșoara, Arefu, Albeștii de Muscel), și cel pomicol și de creștere a animalelor, în partea de sud (Corbeni, Domnești, Valea Danului a.), în prezent s-au conturat tipul de activități mixte industrial-agricole (Berevoiești, Aninoasa, Albești-Muscel, Godeni, Schitu Golești, Valea Iașului)




Fig. 91. Muscelele Argeșului. Unitățile de relief, funcțiile și mărimea așezărilor. 1, Dealuri subcarpatice cu structură monoclină; 2, înșeuări; 3, depresiuni; 4, lunci și terase; 5, defilce; 6, așezări cu funcție silvo-pastorală; 7, agro-pomicolă; 8, agroindustrială; 9, agro balneoclimaterică; 10, pomicol-zootehnica; 11, complexă.

sau chiar industrial (Valea Mare-Pravăț). Funcția economică predominant agricolă a așezărilor de pe valea Topologului (Poienari-Argeș, Cepari, Tigveni, Șuici), prin poziția lor laterală față de principalele axe de comunicație și activitate economică, nu a suferit modificări esențiale. Funcția balneoclimaterică complementară este specifică doar așezărilor Brădet și Bughea de Sus (fig. 91).

Activitatea economică dispune de o gamă variată de resurse naturale care și-au pus amprenta asupra structurii sale timp îndelungat, fără, însă, a depăși un cadru modest, impus de însăși activitatea redusă a orașelor polarizatoare Cimpulung și Curtea de Argeș. Economia industrială se baza în trecut numai pe exploatarea și prelucrarea primară a lemnului, pe extracția rocilor de construcții și cărbunului. Industria prelucrătoare se rezuma la fabrica de confecții din Curtea de Argeș și cea textilă din Cetățeni. În rest, câteva mici ateliere și unități meșteșugărești. Pentru cea mai mare parte a

populației agricultura era ramura principală de ocupație, orientată spre creșterea animalelor și pomicultură.

Valorificarea resurselor naturale, construirea de noi întreprinderi industriale alături de extinderea și modernizarea celor vechi au dus la mutații profunde în structura economică a muscelor argeșene. Numai în perioada 1971—1980, pentru dezvoltarea acestei regiuni, au fost alocate celor două orașe polarizatoare 13,5% din totalul investițiilor realizate în județul Argeș, industriei revenindu-i peste jumătate.

Pe lângă modernizarea și extinderea vechilor întreprinderi au fost puse în funcțiune noi întreprinderi care au modificat profund peisajul muscelor și activitățile oamenilor. În locul unor ateliere mecanice de reparații s-a construit la Cimpulung o uzină pentru producția autoturismelor de teren. La Valea Mare-Pravăț, lângă Cimpulung, în anul 1972 a fost pusă în funcțiune întreprinderea de lianți care valorifică calcarele de la Mateiaș și

argila de la Stoenesti. După 1980, tot la Cimpulung, a început să producă întreprinderea de fire și fibre sintetice, care primește materia primă de la combinatul petrochimic Pitești. La Curtea de Argeș în anul 1971 a intrat în funcțiune întreprinderea de produse electronice și electrotehnice, iar în anul 1974 întreprinderea de porțelan pentru menaj. Ulterior tot aici a început construirea întreprinderii de drojdie furajeră din produse petrochimice. Concomitent, pe râul Argeș au fost construite hidrocentralele Oești, Albești, Cerbureni, Valea Iașului (de 15 MW fiecare) și Curtea de Argeș (de 15,4 MW).

Industria a devenit ramura principală a economiei Muscelor Argeșului, ea deținând ponderea cea mai mare în producția valorică a regiunii.

În prezent economia Muscelor Argeșului deține, mai ales prin industrie, un loc important în ansamblul economiei naționale. Muscelele Argeșului dețin ponderi însemnate în producția de energie electrică, în industria materialelor de construcții, a prelucrării lemnului, porțelanului și faianței. La scara economiei naționale, Muscelele Argeșului se impun prin producția autoturismelor de teren „ARO” și a aparatelor electrocasnice.

Structura pe ramuri și repartitia teritorială actuală a industriei evidențiază predominanța accentuată a industriei construcțiilor de mașini, gradul de concentrare a industriei în cele două orașe, o anumită disproporție între ramurile bazate pe prelucrarea materiilor prime locale și cele bazate pe materii prime și forță de muncă din alte centre ale țării.

Industria constructoare de mașini, ramură nouă în cadrul muscelor, deține aproape 1/2 din valoarea producției globale industriale, în timp ce alte ramuri, ca industria confecțiilor, alimentară, a materialelor de construcții și a prelucrării lemnului cumulează circa 2/5.

Structura teritorială a industriei se caracterizează printr-o pondere ridicată a acesteia în orașele Cimpulung și Curtea de Argeș (circa 3/4 din totalul industriei), fapt explicabil prin natura unor ramuri, ca industria construcțiilor de mașini, chimică sau a confecțiilor, care au o deosebită eficiență prin concentrarea capacităților. Mediul rural se evidențiază printr-o repartizare teritorială a industriei dispersată, cu ramuri ca producția energiei electrice în hidrocentrale, industria extractivă, exploatarea lemnului, pre-

pararea primară a fructelor ș.a. Aproape 3/4 din industria existentă în mediul rural este concentrată în câteva localități (Valea Mare-Pravăț, Aninoasa, Arefu, Cetățeni, Godești, Schitu Golești).

Agricultura, deși constituie ocupația principală pentru mai mult de jumătate din populația activă, deține o pondere completă în economia Muscelor Argeșene.

Prin specificul condițiilor naturale agricultura muscelor este orientată spre creșterea animalelor și pomicultura. Dealtfel această regiune se evidențiază atât pe plan regional, cât și național ca un bogat furnizor de fructe și produse animale (fig. 92).

Pășunile și fânețele dețin circa 68% din suprafața totală agricolă, având o mai largă răspândire în partea nordică, unde opt comune cuprind 1/2 din suprafața totală a acestor terenuri și concentrează circa 1/3 din șeptelul bovinelor și 40% din cel al ovinelor (Arefu, Corbeni, Corbi, Mioarele, Pietroșani, Tigveni ș.a.). Porcinele sînt mai frecvente în partea sudică (Mihăiești, Mușătești, Valea Danului). Deși Muscelele Argeșene se caracterizează, față de regiunea piemontană și de cîmpie de la sud, prin densități mai ridicate ale animalelor, există încă importante rezerve pentru intensificarea creșterii animalelor (de exemplu, sporirea ponderii vacilor de lapte, care în prezent se situează sub 50%), creșterea producției animale, precum și valorificarea superioară industrială a acestora.

Pomicultura, a doua ramură de tradiție în agricultura Muscelor, se caracterizează prin suprafețe mai mari în comunele Boteni, Domnești, Hirtiești, Mioarele și Vlădești, unde ajung să dețină în plantații compacte peste 30% din totalul suprafețelor agricole (fig. 92). Principalele soiuri cultivate sînt cele de prun (Tuleu gras, Vinete românești) și măr (Jonathan și Parmen auriu). Producția pomicolă bogată a acestei regiuni a determinat înființarea fabricii de sucuri și conserve din fructe de la Băiculești.

Terenurile arabile dețin sub 15% din suprafața agricolă a muscelor. Cele mai mari suprafețe se întîlnesc în lunca Topologului (Cepari, Tigveni, Șuici) și în partea sudică, la contactul cu Gruiurile Argeșului (Domnești, Hirtiești, Mihăiești).

În structura suprafețelor cultivate predomină cerealele (porumb, grâu, orz, orzoaică), cartoful și plantele de nutreț, care cunosc o importantă extindere în ultimii ani.

dar - cantitățile cele mai mari sînt dirijate spre întreprinderea de prelucrare a lemnului de la Pitești.

Producția pomicolă este dirijată spre prelucrare în afara regiunii deși s-ar impune, în cadrul dezvoltării industriei mici, înființarea unor întreprinderi locale. În privința produselor cerealiere muscelele sînt tributare cîmpiei.

Structura de ramură a industriei nu este însă suficient de dezvoltată, avînd ca unică ramură de profil (45,5% din producția globală totală) industria construcțiilor de mașini. Pe de altă parte, ramurile existente creează disproporții în utilizarea forței de muncă pe sexe.

Deși există resurse disponibile în forța de muncă feminină, acestea nu sînt absorbite în suficientă măsură de industria orașelor. Pe de altă parte, în mediul rural, predominarea industriei extractive și a exploataării prelucrării lemnului nu permit utilizarea mîinii de lucru feminine, ceea ce contribuie la intensificarea mișcării migratorii spre alte regiuni.

În ce privește unitățile constructoare de mașini, acestea au legături de cooperare cu unitățile similare din Pitești, Brașov și București.

Orașul Cîmpulung, așezat în depresiunea cu același nume, pe terasele inferioare ale Rîului Tîrgului, este centrul urban principal din Muscelele Argeșului. Beneficiind de o poziție favorabilă la intersecția unor vechi drumuri comerciale, care făceau legătura între Transilvania și Țara Românească, orașul a îndeplinit funcția de primă capitală a Țării Românești, punct vamal, centru meșteșugăresc și comercial în perioada feudală.

În perioada interbelică menținîndu-și funcția de capitală de județ, a avut numai o importanță comercială, dar ulterior orașul a cunoscut o puternică ascensiune datorită procesului de industrializare, prin înființarea întreprinderii mecanice pentru producerea autoturismelor de teren „ARO” și mai apoi a întreprinderii de fire și fibre sintetice și a celei de lianți din Valea Mare—Pravăț (comună suburbană).

Dezvoltarea industrială s-a reflectat în creșterea populației orașului de peste 2,4 ori în perioada 1948—1992 (ajungînd de la 18 174 la 44 060 și în accentuarea rolului polarizator pentru populația din comunele învecinate.

Noua funcție industrială a orașului Cîmpulung este confirmată de ponderea ridicată

a populației ocupate în această ramură, care depășește 3/5 din populația activă antrenînd, de asemenea, o parte din populația comunelor învecinate. Față de nivelul anului 1970 personalul ocupat în industrie a crescut de peste 2,5 ori.

Pînă nu de mult industria construcțiilor de mașini era aproape singura ramură dezvoltată în oraș. În prezent, prin intrarea în funcțiune a întreprinderii de fire și fibre sintetice, ponderea construcțiilor de mașini a scăzut la 3/5. Celelalte ramuri însumează numai 16%, ceea ce indică necesitatea ameliorării structurii pe ramură a industriei, îndeosebi prin prisma utilizării forței feminine de muncă.

Dezvoltarea industriei a fost însoțită de o creștere, dar mai lentă, a sferei serviciilor, care ocupă doar 1/4 din totalul personalului muncitor.

Ascensiunea economică a orașului a fost însoțită, în ultimul deceniu, de înnoiri edilitar-sociale. Locuințele noi, ridicate în deceniul opt, reprezintă peste 2/5 din totalul fondului locativ. Străzile sînt modernizate în proporție de 2/5, peste 1/2 din ele au canalizare și 4/5 dispun de alimentare din rețeaua urbană de apă potabilă.

Prezența unor monumente cu valoare ridicată istorică și arhitectonică, ca și poziția la poalele Masivului Iezer—Păpușa, pe șoseaua care face legătura cu Brașovul, fac din orașul Cîmpulung un important centru turistic.

Orașul Curtea de Argeș, prin poziție și prin funcții, este centrul polarizator al părții vestice a Muscelor Argeșului. Situat într-o lărgire a văii Argeșului, la 450 m altitudine, pe terasele de pe stînga rîului, orașul beneficiază de o poziție geografică favorabilă, aflîndu-se la intersecția unor drumuri care străbat Subcarpații și fac legătura cu regiunile din sud ca și din nord, drumuri vechi, istorice (spre Cîmpulung, spre Țara Loviștei—Sibiu), iar recent noua arteră de circulație a Transfăgărășanului.

Așezare cu mărturii de veche locuire, oraș de seamă pe la 1300, a fost a doua capitală a Țării Românești (secolul XIV). Dezvoltat în secolul XV—XVI ca important centru meșteșugăresc și comercial, Curtea de Argeș își pierde importanța economică după mutarea scaunului domnesc la Tîrgoviște. Timp de cîteva secole, inclusiv în prima jumătate a secolului XX, dezvoltarea orașului a fost modestă, acesta avînd funcție administrativă, comercială și agricolă.

Modernizarea și dezvoltarea întreprinderilor de prelucrare a lemnului și confecții existente au fost însoțite de construirea de noi întreprinderi: de porțelan pentru menaj, de aparate electrotehnice și pentru producerea drojdiei furajere. Industrializarea a dus la creșterea populației orașului de aproape 4 ori în intervalul 1948—1992 (de la 9 180 la 35 823 de locuitori), ca și la modificarea structurii pe ramuri de activitate a populației active. Astfel, într-o perioadă scurtă, între 1966 și 1985 ponderea celor ocupați în industrie a sporit de la 45,6% la 69,2%, aceasta, împreună cu construcțiile și transporturile, ajungând să dețină circa 4/5. O asemenea mutație s-a realizat îndeosebi pe seama reducerii de peste trei ori a ponderii celor ocupați în agricultură.

Dezvoltarea industriei a necesitat creșterea efectivului personalului muncitor. În consecință, a sporit forța de polarizare a orașului asupra comunelor învecinate, din care se deplasează zilnic circa 2/5 din totalul celor ocupați în economia orașului.

Spre deosebire de orașul Cîmpulung, structura de ramură a industriei orașului Curtea de Argeș este mai diversificată. Astfel, alături de industria construcțiilor de mașini și a confecțiilor, care dețin peste 55% din valoarea producției globale, sînt relativ dezvoltate industria de prelucrare a lemnului, cea a porțelanului și alimentară.

Creșterea economică a impus dezvoltarea edilitară și socială a orașului. Fondul de locuințe a fost înnoit numai în deceniul opt în proporție de 2/5. Circa 3/4 din lungimea totală a străzilor este modernizată, iar alimentarea cu apă potabilă curentă cuprinde peste 1/2 din ele.

Concentrînd monumente istorice de o deosebită valoare pentru patrimoniul național (Ansamblul Curții domnești, Biserica mănăstirii Curtea de Argeș, ruinele Sinicoară) și avînd o poziție favorabilă în apropierea lacului de acumulare Vidraru, orașul Curtea de Argeș este și un important centru turistic.

4.2.2. Subcarpații de la Curbură

4.2.2.1. Caracterele generale

Dacă Subcarpații reprezintă — în ansamblul reliefului României — unitatea recunoscută ca avînd cea mai accentuată com-

plexitate geografică, partea lor dintre Dimbovița și Trotuș — Subcarpații de la Curbură — prezintă nu numai cea mai largă dezvoltare (lățimea în jur de 30 km, în Subcarpații Buzăului), dar și structura cea mai complicată, urmată de o dinamică foarte accentuată a reliefului. Cu toate că unele din particularitățile lor (mai ales structurale) se întîlnesc și la vest de Dimbovița, în Muscele, iar în cealaltă extremitate Depresiunea Cașinului se dezvoltă la sud de Trotuș, în continuarea Depresiunii Tazlăului, limitele de vest și de nord sînt considerate ca fiind formate de văile Dimboviței și Trotușului. La exterior, limita este mai clară decît oriunde pentru că numai această parte a Subcarpaților vine în contact direct cu Cîmpia Română, și anume cu cîmpii piemontane tinere și de divagare (supuse încă unui proces lent de afundare), în funcție de care s-a produs adîncirea văilor și întreaga modelare cuaternară (fig. 93).

Chiar dacă spre munte (mai ales între Teleajen și Slănicul Buzăului) s-a argumentat existența unei fișii de tranziție sau de interferență carpato-subcarpatică (a cărei prezență ar părea să infirmе diferențierea și separarea netă a celor două mari unități geografice), contactul cu munții se poate urmări clar de-a lungul unor depresiuni de contact relativ bine individualizate. Conturarea unei fișii de interferență a caracterelor montane și subcarpatice (care de fapt se pune în evidență și în Subcarpații Getici de o parte și de alta a Oltului) nu înseamnă nici diminuarea individualității Subcarpaților, nici lipsa elementelor geografice prin care să se poată fixa o limită precisă.

Evoluția, complexitatea geografică și legăturile Subcarpaților de la Curbură cu munții justifică pe deplin existența unor asemănări între cele două regiuni de-a lungul fișiei de contact, dar acestea nu ajung să modifice caracterelor subcarpatice în așa măsură încît să se poată vorbi de un mediu nesubcarpatic. Această fișie de interferență nu este decît dovada diversității geografice (foarte accentuate) din cuprinsul acestei unități, a schimbărilor din fiecare bazin, de la Dimbovița pînă la Trotuș, și nu mai puțin de la munte pînă la contactul cu cîmpia, contact unic prin particularități în toată desfășurarea Subcarpaților de la Moțru pînă în valea Moldovei.


Varietatea mare a reliefului este în primul rînd consecința diversității petrografice,

complexității tectonice și intensității de manifestare (regional și local diferențiate) a mișcărilor din cuaternar care au stimulat pătrunderea eroziunii într-un ritm mai accentuat decât în oricare altă regiune. Formațiunile paleogene intră și în alcătuirea Subcarpaților de la vest de Dimbovița, dar numai în Subcarpații de la Curbură pătrund sub

țuate în raport cu caracterul liniilor tectonice tăiate de riuri.

Eroziunea a pătruns adânc sub condiționarea directă a diferențelor structurale regionale și locale, iar relieful în ansamblul lui se află într-un stadiu de punere în evidență a structurilor printr-o evidentă selecție petrografică. Ca urmare, depresiunile și masi-

Fig. 93. Subdiviziunile Subcarpaților de la Curbură.



forma celor doi pîteni de fliș (de Homoriciu și de Văleni), într-o alternanță aparte cu cuvetele (Drajna și Șoimari—Calvini). În plus, aici intervin culele diapire care au provocat deranjamente tectonice de o complexitate și intensitate mai puternice ca oriunde în Subcarpați, afectînd nu numai formațiunile pliocene dar și pe cele cuaternare. De aceea este pe deplin explicabil de ce depozitele pliocenului superior și cuaternarului inferior sînt ridicate pînă aproape de 1 000 m (în Măgura Odobeștilor, în dealurile dintre Buzău și Bîsca Chiojdului) și de ce terasele riurilor principale, atît cît s-au păstrat, prezintă fie o convergență accentuată spre marginea exterioară a Subcarpaților (ca în Subcarpații Vrancei, mai puțin frămîntați tectonic), fie deformări accen-

vele deluroase nu mai prezintă dispunerea de la nord de Trotuș și de la vest de Dimbovița, iar procesele de denudare actuală, în egală măsură a versanților și a albiilor, se manifestă cu o violență cu totul aparte. Dacă între Slănicul Buzăului și Trotuș se poate vorbi de două șiruri de depresiuni limitate de două alinamente de dealuri, între Slănicul Buzăului și Dimbovița ariile de depresiune nu mai respectă această ordonare orografică și formează o adevărată rețea dispersată între masivele deluroase (într-o măsură asemănătoare cu cea din Subcarpații Vilcii), în care se recunoaște atît influența structurilor, în general paralele cu marginea munților, cît și rolul rețelei hidrografice dispusă transversal sau parțial adaptată la structură.

Mulțimea depresiunilor de o foarte mare varietate ca dimensiuni, formă și particularități ale condițiilor locale (de la depresiunile joase cu șesuri aluviale pînă la cele suspendate între dealuri ca largiri de obirșie) a favorizat dezvoltarea așezărilor și instalarea unei rețele relativ dese de drumuri, în lungul văilor, mai importante chiar a căilor ferate care, cu excepția celei din lungul Prahovei, străbat Subcarpații și se opresc la contactul cu munții. Dacă la aceste condiții de așezare se adaugă existența zăcămintelor specifice regiunii subcarpatice — petrol, cărbuni, sare, mai de timpuriu puse în evidență și exploatare aici decît în altă parte, este de înțeles că ambianța generală a fost foarte favorabilă pentru dezvoltarea unor activități economice mai variate și mai puternice. Aceasta se reflectă atît în densitatea mare a populației, cît și în gradul mai accentuat de urbanizare a așezărilor (mai ales în Subcarpații dintre Dîmbovița și Buzău) decît în alte subunități subcarpatice.

Numărul mare și dispersia în teritoriu a așezărilor, densitatea ridicată a populației, desfășurarea unor activități economice complexe și foarte variate local și regional au dus la modificarea puternică a peisajului, în anumite părți ajunse la degradări ale terenurilor de proporții, drept pentru care a fost nevoie de măsuri ample (luate cu deosebire în ultimii 30 de ani) de combatere și refacere a terenurilor. S-a început, astfel, o remodelare antropică a peisajului, soldată și cu efecte economice favorabile.

Diferențierile regionale și locale ale peisajului sînt evidente și separarea subunităților nu ridică probleme greu de rezolvat. S-au exprimat mai multe opinii privind numărul diviziunilor, dar în general au fost puse în evidență trei subunități foarte clar deosebite atît prin trăsăturile fizico-geografice, cît și prin aspectele populației, utilizării terenurilor, particularităților modului și gradului de antropizare a peisajului: Subcarpații Prahovei, între Dîmbovița și Teleajen (cu separarea clară a Subcarpaților Ialomiței, pînă la valea Prahovei și Subcarpații Teleajenului, inclusiv Dealurile Bucovelului), Subcarpații Buzăului, desfășurați pînă la Slănicul Buzăului și Subcarpații Vrancei (fig. 93).

4.2.2.2. Subcarpații Prahovei

Dealurile subcarpatice de la est de Dîmbovița nu reprezintă o continuare directă a celor de la vest, deși elemente structurale caracteristice acestora trec în dreapta Dîmboviței, adică în extremitatea estică a Muscelor Argeșului. Aici, pe Dîmbovița, se produce un fel de rupere a desfășurării Subcarpaților prin deplasarea mai spre sud, atît a marginii munților cît și a Subcarpaților. De aceea, limita dintre munții și dealurile de la est de Dîmbovița se află cu 15 km mai la sud decît aceeași limită la vest de Dîmbovița, iar Subcarpații Prahovei se leagă cu Muscelele Argeșului printr-o porțiune de numai 8—10 km, fiindcă mai la sud se desfășoară Piemontul Cîndești, iar structurile subcarpatice se afundă sub acesta. Acest fapt a făcut pe mulți cercetători să vorbească de „linia Dîmboviței”, considerată de unii ca falie, iar de alții ca o linie de inflexiune, o flexură sau o linie de dislocație pe care alții o contestă (N. Popp, 1939, p. 15).

Limitarea Piemontului Getic la Dîmbovița face ca Subcarpații dintre Dîmbovița și Teleajen, ca și cei de dincolo de Teleajen, să vină în contact direct cu cîmpia, numai că, în timp ce la est de Teleajen limita este tranșantă, între acesta și Dîmbovița se constată o întrepătrundere între dealuri și cîmpie, dealurile apărînd și sub formă de insule sau „măguri” izolate (Emm. de Martonne, 1907 p. 106—108).

Spre munți, limita Subcarpaților Prahovei nu este tot așa de clară (dată de un abrupt muntos), cum este la vest de Dîmbovița sau imediat la est de Teleajen. Astfel, de la Dîmbovița pînă la Ialomița, între munți și dealuri nu se vede o denivelare evidentă, înălțimea dealurilor fiind apropiată de a munților. Numai la nord-est de Puchenii se constată o denivelare mai pronunțată, de la 900 la 1 000 m. În schimb, este un evident contrast în înfățișarea peisajului, în general puternic umanizat în Subcarpații.

Între Ialomița și Prahova, limita este încă și mai greu de stabilit, deoarece trecerea se face aproape pe nesimțite. În plus, aici se constată și o întrepătrundere a caracterelor celor două regiuni. De aceea limita trebuie pusă oarecum convențional pe la nord de Pietroșița, de Ocina, pînă la Comarnic. Mai la est, pînă la Teleajen, limita este mai bine reliefată, pe la nord de Șotrile, printr-un povîrniș de 100 m, care se continuă spre est,

pe la nord de Pietricea, Berte, stațiunea Slănic, Schiulești, până la Mănești. La sud de această limită este un șir aproape continuu de așezări.

Subcarpații Prahovei sînt alcătuiți din formațiuni miocene și pliocene, la care, local, se adaugă formațiuni paleogene și cuaternare, în general de o foarte mare varietate. Peste formațiunile paleogene, cu apariție locală, se găsesc argile cu sare și gips, conglomerate și gresii cu intercalații marnoase (provenind din burdigalian), peste care urmează un complex de gresii micacee, tufuri, șisturi argiloase foioase și chiar depozite de sare (badeniene și bugloviene). În continuare apar în alternanță marne, nisipuri, gresii cu trovanți și conglomerate cu intercalații de marne calcareoase, calcare politice și calcare cochilifere sarmațiene. Formațiunile pliocene sînt, de asemenea, de o mare varietate litologică. Predomină complexele nisipoase și grezoase, cu intercalații de marne (meotiene), de marne și marne nisipoase (ponțiene), nisipurile și gresiile noi cu intercalații de marne, argile nisipoase, pietrișuri, și cu orizonturi de lignit (daciene). Ultimele formațiuni sînt constituite din marne argiloase verzui, nisipuri, gresii moi, peste care urmează pietrișuri cu stratificație încrucișată.

Toate aceste formațiuni au fost puternic cutate și faliat, Subcarpații Prahovei aparținînd așa-numitei zone a cutelor diapire, care se întinde de la Dimbovița până la est de Cricovul Sărat (I. Băncilă, 1958; N. Onicescu, 1965). În această zonă, culele sînt caracterizate prin pătrunderea unor simburii de sare, de forme și dimensiuni variate, prin bolta anticlinalelor, fie ajungînd pînă la suprafață (la anticlinalale Țîntea—Băicoi, Moreni—Gura Ocniței), fie oprindu-se la o anumită adîncime (la Boldești, Aricești etc.). Culele sînt strînse în partea internă, dinspre munte, și mai puțin pronunțate, chiar incipiente, discontinue și dispuse în culise, către cîmpie. În partea internă a Subcarpaților de la est de Dimbovița, depozitele miocene formează două sinclinale largi, paralele cu limita munților: un sinclinal nordic, Slănic—Bezdead, care se poate urmări pînă la sud de Pietroșița, și altul sudic, continuarea cuvetei Drașnei de la est de Teleajen pînă la vest de valea Vărbilăului. Între ele se află pîntenul de Homoriciu, iar la sud pîntenul de Văleni, care se continuă și mai la vest de Teleajen. În regiunea Buștenari—Cîmpina—Gura Drăgăneșei este o impor-

tantă linie de falie, de-a lungul căreia depozitele miocene încăleacă peste cele pliocene de la sud. Faptul că stratele din romanian sînt cutate arată că mișcările din faza valahă au fost puternice chiar în cuaternar.

În general, formațiunile din care sînt alcătuiți Subcarpații Prahovei conțin zăcămintele bogate de minerale utile. Dintre acestea locul principal îl ocupă țițeiul, strîns legat de culele diapire, prezente într-o fișie situată la sud de linia Cîmpina—Buștenari. Structurile petrolifere sînt faliat și străpunse de simburii de sare, iar formele de străpungere sînt atît de variate, încît aproape fiecare cută reprezintă un caz aparte (N. Grigoraș, 1961).

Cele mai importante zăcămintele de țiței au fost găsite în orizonturile de nisipuri meotiene acoperite de stratele impermeabile ponțiene. Daciaul este productiv acolo unde este străpuns complet de masivul de sare și este prezent acoperișul de protecție din baza romanianului, ca la Băicoi—Țîntea, Moreni, Gura Ocniței și la Ochiuri. Dintre acestea, cea mai bogată s-a dovedit structura diapiră de la Moreni—Gura Ocniței, a cărei grosime atinge 400 m (N. Grigoraș, 1961). La Buștenari—Runc, în fișia de încălecare a oligocenului din pîntenul de Văleni peste depozitele miocene, pliocenul acoperind și mascînd această încălecare, este un anticlinal asimetric faliat, de asemenea bogat, iar la Runc se cunoaște un caz de criptodiapirism (N. Grigoraș, 1961).

Alături de țiței se găsesc gaze naturale, mai ales în formațiunile daciene, fie în aceleași stratele cu țițeiul, ocupînd partea superioară a zăcămintului, deasupra țițeiului, fie în stratele separate. Printre structurile bogate în gaze sînt socotite cele de la Băicoi—Țîntea și Boldești.

În toate culele diapire se găsește sare (sub formă de simburii, stîlpi sau lamele sau alte forme de dimensiuni variate), venită de la adîncimi mari, în unele locuri ajunsă chiar pînă la suprafață (la Băicoi, Doftana, Ochiuri). În apropierea zăcămintelor de sare sau de argile salifere se află izvoare de apă sărată, mai mult sau mai puțin concentrată (provenită din apele vadoase care au trecut prin formațiuni salifere), folosită pentru băi (la Poiana Cîmpinei, Slănic, Oglinzi). De mai mică importanță sînt apele sulfuroase (utilizate la Vulcană Băi), sulful din împrejurimile Pucioasei (de unde și numele localității, devenită stațiune balneară importantă), gipsul din depozitele miocene, tufurile

dacitice (folosite la industria cimenturilor speciale și ca piatră de construcție) și bentonită.

În afară de acestea, dar de o importanță mai mare este lignitul, aflat în orizonturi intercalate în formațiunile daciene din flancurile anticlinalelor Șotînga—Doicești (cu lungime de 17 km și o lățime de 7 km), Dolani—Tătărani, între Ialomița și Dimbovița, în sinclinalul Gușoiu, la est de Ialomița, între anticlinalele Glodeni și Șotînga—Doicești și în sinclinalul Valea Popii, dintre anticlinalele Dolani—Tătărani și Șotînga—Doicești. Mare parte din cărbunii exploatați sînt folosiți la termocentrala Doicești. Lignitul de la Filipeștii de Pădure se găsește în formațiuni daciene, pe flancurile unui anticlinal.

Subcarpații dintre Dimbovița și Teleajen au aspectul unui ansamblu de masive și culmi deluroase cu dimensiuni și orientări variate (fig. 94), a cărui înălțime crește din spre cîmpie către munte de la 300—400 m (dominînd cu 150—200 m cîmpia), pînă la 800—900 m. Cea mai mare parte a culmilor sînt înguste, multe avînd înfățișare de creste, astfel încît este greu de admis existența unor suprafețe de nivelare generale (N. Popp, 1939). Dar nici apariția locală a unor resturi de relief evoluat (ca pe unele culmi de la vest de Provița) nu poate fi contestată. Acest fel de suprafețe sînt foarte rare și foarte mici și nu se află pe dealurile cele mai înalte. De aceea, ele nu ne îndreptătesc să afirmăm că sînt resturi de suprafețe de nivelare cu întindere cel puțin regională.

Deasupra nivelului general, dat de majoritatea culmilor, se găsesc cîteva virfuri care domină împrejurimile: Măgura (654 m) de pe dreapta cursului inferior al Vărbilăului, Dealul Roșet (490 m) de la nord-est de Ocnîța, Dealul Sultanu (849 m) de la obîrșia Cricovului Dulce, Dealul Măceșului (815 m) de la nord de Buștenari, toate dominînd împrejurimile cu 100—150 m.

Sub nivelul general al culmilor se schițează mici arii depresionare, unele abia conturate, altele mai bine reliefate. Unele sînt foarte mici și au forma unor circuri la obîrșia văilor. Astfel, la poala muntelui se constată un șir de depresiuni mici, începînd de la Cetățeni, din valea Dimboviței, spre est, pe la Virfuri, Pucheni, Brebu, Runc și apoi Pietroșița, pe valea Ialomiței, fără a fi legate între ele prin curmături largi, ca să se poată vorbi de un uluc, ca în alte re-

giuni subcarpatice. De la Ialomița spre est, această însușire se atenuează tot mai mult, chiar pierzîndu-se pînă la satul Ocina, unde reapare și de unde se continuă spre est ca un uluc abia schițat pe la Șotrile, Pietriceaua și Aluniș, de unde caracterul depresionar se pierde din nou.

Mai la sud se află un al doilea șir de mici depresiuni cu însușiri asemănătoare, începînd de la Bărbulețu, pe linia localităților Rîu Alb, Costești, Bezdead, Ursei, Vișinești, Cimpina, Telega, Buștenari, unde șirul se intrerupe (fig. 94).

La nord de Dealul Măceșului se găsește alt șir, în care se află satele Melicești, Poiana Trestiei, Cosminele, Poiana Vărbilăului. Aproape paralel apare încă un șir de lărgiri, care începe la Pietrari, pe cursul inferior al Rîului Alb, și se continuă pe la Vilcana, Valea Lungă pe Cricovul Dulce și încă mai departe spre est. Mai la sud se individualizează Depresiunea Ocnîța—Iedera de Jos, iar la est de Prahova ulucul larg al Mislei, continuat și dincolo de Teleajen, pînă la Cricov, ca un vechi șes aluvial, care separă Dealurile Bucovelului de dealurile subcarpatice de la nord.

Cu excepția ulucului Mislea—Măgurele—Racova, depresiunile sînt mici, deluroase, iar în cuprinsul lor domină relieful de pornitură, în mare parte nestabilizate, cu soluri tinere, brune sau chiar regosoluri, pe care se întind pajști naturale, folosite ca fîneață sau pășune, și livezi de prun.

În timp ce dealurile sînt alcătuite din roci rezistente sau poroase (gresii, nisipuri), depresiunile sînt sculptate în roci mai ușor de modelat, marne și argile, indiferent de structură. Astfel, șirul de depresiuni de la Buștenari, Telega, Cimpina, Provița este sculptat în bolta unui anticlinal, pronunțat asimetric la Buștenari. De acest anticlinal se leagă zăcămintele de țiței de la Cimpina, Telega, Buștenari, exploatate încă de la începutul acestui secol. Și în această regiune interfluviile și văile rîurilor principale sînt orientate, în general, de la nord-nord-vest spre sud-sud-est sau chiar de la nord spre sud (Doftana, Teleajen), iar șirurile de depresiuni ca și de dealuri sînt orientate aproximativ est—vest, conform direcției generale a cutelor (N. Popp, 1939, Pl. B).

Apele principale — Dimbovița, Ialomița, Prahova cu Doftana, Teleajenul cu Vărbilăul — venind din munți, au săpat văi largi și adinci, cu terase și lunci întinse, formînd adevărate culoare. Terasa din lungul

acestor văi, bine dezvoltate, au oferit locuri foarte bune pentru aşezări, pentru agricultură şi pentru instalarea căilor de comunicaţie. Cele mai întinse terase, depozitate mai ales pe dreapta, sînt de-a lungul Teleajenului. Aşa cum a observat Emm. de Martonne (1907, p. 109) nici un alt riu care străbate Subcarpaţii Munteniei nu are terase atît de întinse. În plus, profilul lor longitudinal

numai cele mijlocii şi inferioare se înscriu bine în peisaj şi sînt utilizate intens. Cea mai întinsă este terasa Cîmpinei (altitudine relativă de 55–65 m la Cîmpina, 75 m la Breaza), pe al cărei pod se găsesc cele mai însemnate aşezări din această parte a văii Prahovei (Cîmpina, Breaza, Comarnic, Cornu). Interesant este faptul că, în timp ce spre munte înălţimea teraselor creşte cu




Fig. 94. Subunitățile de relief ale Subcarpaților Prahovei. 1, Dealuri; 2, depresiuni și culoare de vale.

arată deformări puternice neotectonice în raport direct cu mobilitatea structurilor tăiate transversal de Teleajen (Gh. Niculescu, 1963). Interesant este faptul că unul dintre nivelele aluviale inferioare nu urmărește numai actualul drum al riului, ci se bifurcă la Măgurele, o parte mergînd spre est pînă la Cricov, prin ulucul Mislei. S-au emis ipoteze numeroase asupra acestui fenomen, dar problemele au fost numai parțial rezolvate (Emm. de Martonne, 1907; G. Valsan, 1916; F. Weymüller, 1931; N. Popp, 1936, 1938; A. Bănu, 1946; Gh. Niculescu, 1963, 1965, 1971, 1974).

Valea Prahovei are terase mai puțin dezvoltate decît valea Teleajenului, dar importanța lor nu este mai mică. Inițial s-a vorbit de 4 terase (Karl Hummel, 1927), iar mai tîrziu de 5 terase (N. Popp, 1939; Gh. Niculescu, 1965, 1971). Dintre acestea

atît mai mult cu cît sînt mai vechi, spre cîmpie înălțimea scade, sfîrșindu-se prin agestre care se unesc pe nesîmțite, cum este cazul celor de la Băicoi și Cîmpina (Emm. de Martonne, 1907). Valea Prahovei joacă un rol deosebit pentru transporturi pentru că în lungul ei se face legătura principală dintre capitală și Transilvania.

Doftana, principalul afluent al Prahovei, are cîteva terase dintre care cea mai întinsă este tot nivelul Cîmpinei. Celelalte sînt de însemnătate mult mai mică (Gh. Niculescu, Ș. Dragomirescu, 1961).

De-a lungul văii Ialomiței, numărul teraselor este mai mare (N. Popp, 1939), dar numai cele mijlocii și inferioare se impun în peisaj, îndeosebi în împrejurimile Doiceștilor. Terasile mijlocii și superioare sînt acoperite de păduri și pajiști, iar cele inferioare sînt utilizate agricol și pentru aşezări, care

se țin lanț de la cîmpie pînă aproape de munte. De-a lungul văii Dimboviței a fost pus în evidență, de asemenea, un număr mai mare de terase: dintre acestea terasele inferioare sînt folosite pentru cultura pomilor fructiferi, îndeosebi a mărului și prunului.

Relieful Subcarpaților Prahovei puternic fragmentat și (exceptînd culoarul Mislei), mai puțin ordonat orografic, cu culoare depresionare accesibile, explică prezența așezărilor îndeosebi în lungul văilor și în micile depresiuni, separate de masive deluroase împădurite. Văile principale, cu terase și lunci bine dezvoltate, concentrează în lungul lor cele mai multe și mai mari așezări și pentru faptul că acestea au reprezentat, în toate timpurile, axe de legătură chiar între părțile de sud și centrale ale țării.

Printre cele mai mari așezări, localizate în lungul acestor văi, sînt: Pucioasa, Fieni (orașe), Pietroșița, Brănești, Doicești, Șoținga, Aninoasa, Răzvad etc. în lungul Ialomiței, Cimpina, Breaza (orașe), Poiana Cimpina, Cornu de Jos, Brănești, Măgureni etc. în lungul Prahovei, Vălenii de Munte (oraș) Teișani, Gura Vitioarei, Măgurele, Lipănești etc. în lungul Teleajenului (fig. 95).

Multe sate sînt situate pe văile secundare sau în bazinele de obirșie ale riurilor.

Ac acestea sînt sate mici, cu vetre răsirate sau formate din grupuri mici de case. De fapt, peste 60% din așezări au sub 1 000 de locuitori.

Cele mai multe sate au vetrele extinse fie pe versanți cu pante domoale, fie sub formă de tentacule în lungul unor văi secundare. Tipice în acest sens sînt așezările Pietrari, Vulcana de Sus, Șipot, Ialomița, Virfuri, Vișinești, Ștubee, Tisa, Glodeni etc. între Ialomița și Prahova, și Scorțeni, Buștenari, Măceșu etc. la est de Prahova (fig. 95).

Acceasi răsfire în teritoriu o prezintă și satele localizate în micile depresiuni situate în jumătatea nordică a Subcarpaților Prahovei: satul Bărbulețu din depresiunea cu același nume, Șotriile, Pietriceaua, Aluniș, Berteia, Melicești, Poiana Trestiei, Cosminele etc. (fig. 96). Pe toate interfluviile din jumătatea nordică a regiunii și mai ales pe cele dintre Dimbovița și Prahova satele prezintă o răsfire mare și cu gospodării chiar risipite, încît creează impresia că acestea formează o singură vatră, fenomen care nu se mai înregistrează în altă parte a Subcarpaților. În schimb, interfluviile din jumătatea sudică sînt mai puțin populate sau chiar lipsite de așezări (Dealurile Pode-




Fig. 95. Subcarpații Prahovei. Funcțiile și mărimea așezărilor. 1, Dealuri subcarpatice; 2, depresiuni și culoare depresionare; 3, așezări cu funcție industrială; 4, industrial-agrară; 5, agroindustrială; 6, agricolă; 7, așezări cu funcție complementară balneară; 8, climaterică.

nilor, Dealurile Vilcanei, Plaiul Căprărețului, Plaiul Roncii etc.).

Condițiile climatice cu contrastele dintre iarnă și vară diminuate față de cîmpie se caracterizează prin temperatura medie anuală de 10°C în marginea dinspre cîmpie, de unde




Fig. 96. Utilizarea terenurilor în perimetrul localității Bărbulețu. 1, Pădure; 2, livezi; 3, pașiste; 4, drumuri.

scade treptat spre contactul cu muntele unde ajunge sub 8°C. Media lunii ianuarie coboară de la -2° ... -3°C, în partea de sud, la -4 ... -5°C lângă munte. În latura dinspre cîmpie a acestor dealuri sînt unele insule în care temperatura are valori chiar mai mari de -2°C, adică mai ridicată decît în cîmpie. În iulie, temperatura medie este ceva mai mare de 21°C în partea de sud (la Tîrgoviște și Moreni) și scade spre munte pînă la 17-18°C.

Cantitatea medie anuală de precipitații este între 500 și 1 000 mm, observîndu-se aceeași distribuție în raport cu altitudinea: 500-600 mm în vecinătatea cîmpiei, peste 800 mm în vecinătatea muntelui. Luna cea mai ploioasă, iunie, primește în medie între 80 mm - la contactul cu cîmpia - și 140 mm, în părțile înalte dinspre munte, iar luna cu cele mai puține precipitații este februarie, cînd cad în medie între 35 și 50 mm. Ca

vînturi dominante se sînt cele de nord-est și de vest, dar și Subcarpații Prahovei au renumele unei regiuni adăpostite, cu ușoare intensificări și canalizări ale curenților în lungul văilor și culoarelor depresionare.

Pe aceste însușiri climatice generale se manifestă topoclimate de o foarte mare varietate, determinate în primul rînd de diversitatea structurii orografice. Inversiunile locale de temperatură în depresiuni și văile largi au ca urmări vizibile bruma timpurie, toamna, și tirzie, primăvara. Tot pe fundul văilor se simte curgerea aerului de la munte spre cîmpie. Pe „fete” de dealuri precumpănese plantațiile de pomi și chiar de viță de vie, în timp ce pe „dosuri” domină pădurea.

Condițiile pedogenetice generale au fost favorabile dezvoltării solurilor brune luvice, solurilor luvice mai mult sau mai puțin pseudogleizate și pe unele locuri, chiar a solurilor brune acide cu mull sau moder. Din cauza tinereții relative a reliefului, a variației litologice și a intensității proceselor de modelare a versanților, la care se adaugă marile diferențe de umezire, există un adevărat mozaic de soluri. Dintre solurile zonale, aici se găsește seria întreagă de la solurile brune tinere, care au mai mult un caracter intrazonal, pînă la solurile luvice, mai mult sau mai puțin poligenetice. Solurile cele mai evolute, argilo-iluviale luvice, se găsesc pe podurile teraselor mai vechi ale Dimboviței, Ialomiței, Prahovei, și mai ales ale Teleajenului, ca și pe unele culmi mai largi și povîrnișuri domoale, ferite de eroziune, cum sînt în dealurile din partea sudică, gruiurile dintre Dimbovița și Ialomița și culmile dealurilor de la nord de ulucul Mislei. Soluri brune luvice, mijlociu și slab evolute, se găsesc pe unele terase inferioare, pe culmi și povîrnișuri domoale, cu precădere în partea dinspre cîmpie. Unele șesuri aluviale cu soluri luvice, evolute slab și mijlociu, ca terasele inferioare ale Teleajenului, Ialomiței și ulucul Mislei, constituie cele mai bune terenuri pentru agricultură din această regiune.

Pe porniturile tinere, formate din material sărac în carbonați, care ocupă suprafețe destul de întinse, sînt soluri brune tinere și regosoluri, la care se adaugă soluri gleice, pseudogleice și, local, chiar de mlaștină. Doar pe porniturile formate din material marnos sînt soluri negre clinomorfe și pseudorendzine.




Fig. 97. Utilizarea terenurilor și resursele din Subcarpații Prahovei. 1, Păduri; 2, pășuni și flnețe naturale; 3, iivezi; 4, vii; 5, teren arabil; 6, vetre de așezări; 7, petrol și gaze naturale; 8, lignit; 9, sare; 10, gips; 11, nisip cuarțos; 12, hidrocentrale; 13, termocentrale; 14, izvoare minerale; 15, căi ferate; 16, drumuri.

Pe povirnișurile nordice, sculptate în roci relativ acide, sînt soluri brune acide, cu mull sau chiar cu moder, aflate sub pădure de fag. Dar în aceste dealuri, unde se manifestă o eroziune puternică, apar frecvent, pe suprafețe întinse, regosoluri, pe unele locuri litosoluri și roca la zi (în împrejurimile localităților Telega, Brebu, Slănic, Bezdead, Bărbulețu etc.).

Condițiile naturale generale, zonale, sînt favorabile dezvoltării pădurilor de foioase, de gorun și fag, care acoperă încă aproximativ două treimi din suprafața acestor dealuri (fig. 97).

În partea de sud domină pădurea de gorun care, pe „fețe” înaintea și mai la nord, chiar pînă la 800 m, pe soluri scheletice. Gorunului i se asociază de obicei carpenul, la care se adaugă jugastru, ulm, tei, mojdrean, stejar (*Quercus robur*), scoruș (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*). O mare parte dintre arborii de gorun maturi sînt paraziți de visc (*Loranthus europaeus*). Subarborul este alcătuit din sînger, corn, lemn ciînesc, măceș, păducel și porumbar.

Pădurea de fag domină în partea de nord a acestor dealuri, în timp ce în partea de sud ea se găsește numai pe „dosuri” și pe

tăpșanele de pornituri din partea inferioară a povirnișurilor, unde sînt soluri brune-luvice cu un exces de umezeală (la nord de Moreni). Fagului i se asociază mesteacăn, cireș, plop tremurător, paltin și salcie căprească. Pe unele locuri se constată și o întrepătrundere între fag și gorun, vîdîndu-se tendința de înaintare a fagului.

Destul de des se întîlnesc și plante agățatoare care, pe unele locuri, capătă dimensiuni impresionante: curpenul, iedera și vița sălbatică. Iedera apare numai în pădure de gorun sau de fag, pe cînd curpenul și vița de vie se întîlnesc atît în pădure, cît și în mărăcinușurile care sînt destul de frecvente în pajști. Sînt impresionante exemplarele de vița sălbatică din pădurea de fag de sub capătul estic al cuestei dealului Măceșului, pe povirniș sudic, la est-nord-est de Bușteni.

Pe pornituri cu soluri umede, gleice, unde omul nu a intervenit prea mult, este pădure rară de esențe moi, ca anin (*Alnus glutinosa*, *A. incana*), plop tremurător, salcie, fie în amestec, fie alcătuite numai dintr-o singură specie, cum este arinișul de la nord de satul Ursei (obirșia Cricovului Dulce).

Pajiștile ocupă, de asemenea, suprafețe întinse, îndeosebi în partea de nord și mijlocie a Subcarpaților, pe povirnișurile mai domoale decît acelea pe care se află pădurea, în mare parte pe pornituri și pe culmi. Astfel, pe soluri brune luvice în diferite stadii de evoluție pînă la soluri brune acide, sînt asociații de *Agrostis tenuis* și de *Festuca rubra*, la care se adaugă *Holcus lanatus*, *Cynosurus cristatus*, *Euphorbia cyparissias*, *Botriochloa ischaemum* etc. Pe locurile umede sînt specii de *Carex*, de *Juncus*, *Agrostis stolonifera* și esențe lemnoase, ca salcie, arin, plop ș.a.

Pe cea mai mare parte a pajiștilor de pe pornituri, folosite ca imăș, sînt multe mărăcinișuri, îndeosebi păducel, mur, măceș, singer și porumbar, în unele tufărișuri apare și mesteacănul, un pionier al vegetației arborescente naturale. Lîngă aceste mărăcinișuri cresc și plante agățătoare, ca vița sălbatică și mai ales curpenul, care îmbracă complet unele tufe.

Pe locurile cu solul erodat puternic și roca marnasă la suprafață, sau foarte aproape de suprafață, se dezvoltă cătina (*Hippophaë rhamnoides*), care formează deșisuri de nepătruns. Astfel de cătinișuri apar chiar în arealul pădurii. În lungul văii Prahovei, îndeosebi la nord de Cîmpina, se văd suprafețe mari, pe povirnișuri repezi și chiar pe abrupturi, fără sol, cu cătinișuri întinse, care constituie un pionier binefăcător al lumii plantelor. În multe locuri nu este o delimitare clară între pădure, pe de o parte, și pajiști sau pajiște cu pomi, pe de altă parte, așa cum se observă la Lutul Roșu, Bertea, Pietricea, ca și în multe alte locuri la periferia satelor risipite pe povirnișuri. În alte locuri se mai constată o tendință de înaintare a pădurii în arealul vechi al cîmpului, pe care era fie pajiște sau pajiște cu pomi, fie terenuri lucrate.

În astfel de condiții fizico-geografice și de densitate a populației, pădurile se mențin pe mai mult de 37% din suprafața Subcarpaților Prahovei. Terenurile agricole, cu predominarea pășunilor și finețelor, ocupă 47%. Pădurile extinse pe aproximativ 105 000 ha fac din Subcarpații Prahovei partea cea mai împădurită a Subcarpaților (fig. 97).

Subcarpații Prahovei au oferit condiții favorabile dezvoltării pomiculturii, viticulturii și creșterii animalelor, care dau specificul agricol al acestora. Sînt trei ramuri dezvoltate mult, în ultimele decenii, prin

extinderea suprafețelor plantate cu pomi fructiferi și cu viță de vie, și prin amenajarea pășunilor și finețelor naturale. S-au efectuat lucrări de combatere a eroziunii solurilor pe circa 20 000 ha, și terasări pentru plantații de pomi și viță de vie și lucrări pentru irigații în raza comunelor Valea Călugărească, Măgurele, Măgureni și Bălțești.

Cele mai mari suprafețe din terenurile agricole (58%) le dețin pășunile și finețele naturale (715 000 ha), cu frecvența mai mare în jumătatea nordică a regiunii unde pot ajunge pînă la 80% și chiar peste 80% — Măneciu (89%), Runcu (88%), Fieni (86%), Bertea, Șotrile (80—85%) etc. Cu puține excepții (Plopeni, Poiana Cîmpina, Bănești, Cocorăștii Mislui, Lipănești și Doicești), așezările au cel puțin 500 ha folosite ca pășuni și finețe naturale, dar la multe dintre acestea depășesc 1 000 ha, ajungînd chiar la 5 000 ha. Așa sînt Măneciu (peste 5 500 ha), Slănic, Brebu, Izvoarele, Bertea (toate cu peste 2 000 ha) Teleaga, Șotrile, Teișani, (între 1 200 și 1 600 ha) situate pe interfluvii dintre Teleajen și Prahova; Bezdead (cu circa 3 000 ha), Breaza (2 300 ha), Pucioasa, Răzvad, Glodeni, Talea, Buciumeni (între 1 300 și 2 000 ha), toate între Prahova și Ialomița; Bărbulețu (3 800 ha), Runcu (2 500 ha), Pucheni, Voinești și Brănești (între 1 200 și 1 600 ha), la vest de Ialomița. Aceste așezări, care totalizează 34% din numărul localităților din Subcarpații Prahovei, dețin aproape 45 000 ha de pășuni și finețe naturale, respectiv circa 62% din totalul acestor terenuri.

Existența suprafețelor întinse cu pășuni și finețe, naturale îndeosebi în partea nordică și extinderea culturilor cu plante furajere, mai ales în jumătatea sudică a Subcarpaților, au favorizat dezvoltarea creșterii animalelor, cu deosebire bovine și ovine. Cele mai multe animale se cresc în așezările din apropierea munților, unde există și suprafețe întinse de pășune. Astfel, efectivul de bovine este numeros în localitățile Bărbulețu, Voinești, Bezdead, Buciumeni, Teișani, Brebu, Bertea, Măneciu, Pucioasa, Pucheni, Runcu etc. În majoritatea așezărilor numărul oilor este de peste 1 000 de capete, ajungînd în unele dintre ele la mai multe mii

(Vălenii de Munte, Brebu și Runcu, cu peste 7.000 oi fiecare, Măneciu mai mult de 5.000 etc.).

Au fost construite complexe zootehnice pentru creșterea animalelor, cum sînt cele din Băicoi, unde efectivul de oi se ridică la aproape 10.000 de capete, iar cel de bovine la circa 3.000 de capete. Tot în această categorie intră și crescătoria de porci de la Boldești-Scăeni (cu 5.000 de capete) și cea de berbecuți de la Pucioasa. Porcinele sînt mai puțin numeroase, ca urmare a suprafeței arabile restrinse (numai 33.000 ha). Cu excepția comunelor Bărbulețu, Voinești, Valea Călugărească, Bezdead, Izvoarele, Măneciu, în care numărul de porcine este cuprins între 1.000 și 2.000 de capete, în toate celelalte așezări numărul este redus.

O importanță deosebită în economia agricolă o au livezile de pomi fructiferi (fig. 97). Acestea, alături de pășuni, finete naturale și păduri dau nota dominantă a peisajului. Toate comunele și centrele urbane posedă livezi, iar la cele mai multe dintre ele ocupă peste 100 ha, excepție făcînd: Cîmpina, Plopeni, Fieni, Doicești, Șotînga, Moșăeni, Brănești, Glodeni și Ocița. Cea mai extinsă suprafață cu pomi fructiferi (peste 1.100 ha) se află pe teritoriul comunei Voinești, cunoscută prin stațiunea de cercetări pomicole, unde s-au creat soiuri de pomi și în special de meri adaptați la condițiile pedoclimatice locale. Între Dimbovița și Ialomița mai sînt cunoscute ca așezări cu mari suprafețe pomicole Bărbulețu (850 ha) și Runcu (circa 300 ha). Mult mai extinse sînt livezile la est de Ialomița. Astfel, printre așezările dintre Ialomița și Prahova, cu livezi se pot cita: Breaza (800 ha), Bezdead (550 ha), Pucioasa (400 ha), Adunați, Provița de Sus, Provița de Jos, Buciumeni, Pietroșița (între 300 și 400 ha fiecare), totalizînd peste 3.500 ha (aproape 25% din suprafața lor agricolă). La est de Prahova cele mai mari suprafețe acoperite cu pomi fructiferi le deține orașul Băicoi (650 ha), după care urmează comunele Berteza, Teișani, Măgurele, Teleaga, Slănic (oraș), Măgurele (între 400 și 500 ha), apoi Măneciu, Gura Vitoarei, Șotriile (300—325 ha), Vălenii de Munte (oraș) și Scorțeni cu circa 250 ha. Suprafețele acoperite cu livezi de pomi ale acestor așezări totalizează circa 5.050 ha, adică 15% din terenul agricol.

Viticultura este bine dezvoltată în latura de sud a Subcarpaților Prahovei, mai ales între Teleajen și Cricovul Sărat, la contactul cu cîmpia, unde se află cunoscuta podgorie Valea Călugărească, care cuprinde, pe lângă Valea Călugărească, cu aproape 1.300 ha vii, centrele viticole Boldești-Scăeni, Iordăcheanu, Plopu și Bălțești, care au la un loc aproape 700 ha. În acest areal sînt localizate circa 72% din viile din Subcarpații dintre Dimbovița și Teleajen. Alte așezări în care via ocupă suprafețe relativ întinse sînt Valea Lungă pe Cricovul Dulce, la nord de Moreni (150 ha), Măgurele pe Teleajen (60 ha), Răzvad (70 ha), Aninoasa (40 ha) și orașul Băicoi (70 ha). În totalitate viile ocupă numai 2.700 ha, din care 88% sînt localizate în raza așezărilor menționate, majoritatea situate la contactul cu cîmpia. Vinurile produse la Valea Călugărească de Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație, care își desfășoară activitatea în mijlocul acestei podgorii, au fost unanim apreciate la concursurile internaționale, obținînd numeroase medalii. La Valea Călugărească a fost construit și un mare combinat viticol.

Terenurile arabile (circa 33.000 ha) ocupă suprafețe mai mari în lunci și pe terase, ca și la contactul Subcarpaților cu cîmpia. Așezările situate în aceste locuri dețin între 1.000 și 2.000 ha terenuri arabile (Gura Ociței, Măgureni, Răzvad, Lipănești, Bănești, Iordăcheanu etc.). Dar în majoritatea așezărilor terenurile arabile nu depășesc 1.000 ha, iar la cele localizate în jumătatea nordică a Subcarpaților scad chiar sub 50 ha (Slănic, Breaza, Berteza, Șotriile, Șteflești, Adunați, Provița de Sus, Talea, Pietroșița, Pucheni etc.).

Terenurile arabile sînt cultivate în proporție de 77% cu cereale, îndeosebi cu porumb, care deține peste 70% din suprafața cultivată. În partea nordică a acestui teritoriu porumbul se extinde aproape pe 100% din suprafață. Numai în unele așezări din partea sudică (Băicoi, Măgureni, Iordăcheanu, Bănești), ale căror teritorii sînt extinse și în cîmpie, grîul se cultivă pe suprafețe mai mari (între 600 și 1.000 ha). Circa 2.500 ha terenuri sînt amenajate pentru irigație, îndeosebi în raza centrelor Măgurele (525 ha), Băicoi (400 ha), Bălțești (260 ha), Lipănești (200 ha), Scorțeni, Plopu etc.

Valorificarea, încă din secolul XIX, a unor importante resurse ale subsolului

(petrol, cărbune, sare etc.) a dus la apariția mai de timpuriu a unor ramuri industriale, în comparație cu alte regiuni ale țării și la dezvoltarea în continuare a unei economii complexe. Așa se face că aici sînt prezente toate ramurile economiei naționale. Specificul producției industriale este dat îndeosebi de exploatarea și prelucrarea țițeiului și de industria construcțiilor de mașini cu profil petrolier.

Primele unități economice datează din secolul XVI. Înainte de 1630 exista o manufactură de sticlărie, proprietate domnească, (probabil la Vulcanu-Băi), despre care Del Chiaro menționează că producea o sticlă transparentă, albastră, superioară celei care se aducea din Polonia. În secolele XVI—XVII funcționau mori de apă, pive, povere, care prelucrau materiile prime locale. Zăcămintele de petrol sînt menționate în numeroase documente istorice, care atestă existența, „fîntinilor de păcură”, din care se scotea țițeiul. În secolul XIX țărani din Colibași (com. Iedera) extrăgeau țiței din gropi și îl vindeau în Bărgan, Oltenia și la Brașov. La sfîrșitul secolului XIX se intensifică exploatarea țițeiului ca urmare a intrării în producție a unor sonde mecanice. La vechile centre de extracție, Băicoi, Țintea, Boldești, se adaugă altele prin descoperirea unui mare zăcămint între valea Prahovei și valea Proviței, la Drăgăneasa (com. Provița de Jos) și extinderea schelelor pe văile Prahovei și Teleajenului la Cîmpina, Gura Vîtioarei, Poiana Cîmpina și între Prahova și Ialomița, la Gura Ocnitei, Moreni și Aninoasa. La sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX au fost construite cu capital străin, rafinării de petrol, la Cîmpina și Doicești. Rafinăria „Steaua Română” de la Cîmpina, cu o capacitate de 1,5 milioane tone pe an, distrusă, în parte, în timpul celui de-al doilea război mondial, ulterior a fost refăcută, extinsă și modernizată. Totodată s-au descoperit noi cîmpuri petrolifere și s-a trecut la exploatarea rezervelor de mare adîncime, cu utilaje fabricate la uzinele din Ploiești și întreprinderile pentru construcții de mașini de la Cîmpina, Moreni și Ploeni, profilate pe producția unor agregate, utilaje și instalații de extracție și foraj. Alături de petrol, în unele locuri, se exploatează gazele de sondă (Gura Vîtioarei, Boldești, Băicoi, Gura Ocnitei etc.).

Cărbunele (lignit), o altă resursă economică localizată în Subcarpații Prahovei, a

început să fie exploatat după anul 1879 în zona Șotînga—Mărgineanca, unde se extrage și în prezent. Este folosit, în cea mai mare parte, la termocentrala de la Doicești, care are o putere instalată de 120 MW. O altă termocentrală funcționează la Cîmpina. În Subcarpații dintre Dîmbovița și Teleajen se mai exploatează sarea și diferite roci folosite în industria materialelor de construcții. Masivul de sare de la Slănic, a fost exploatat încă din a doua jumătate a secolului XVIII.

La Slănic funcționează cele mai mari ocne din țară, utilizîndu-se mijloace mecanizate de mare randament. Între Prahova și Ialomița au mai fost identificate trei mari zăcămint de sare la Moreni—Gura Ocnitei, Ochiuri și Ocnita. Alte resurse naturale importante sînt apele sulfuroase de la Pucioasa, Vulcanu-Băi, Bărbulețu, apele clorosodice, sulfatate, calcice de la Slănic, folosite în tratamentul balnear, sulful de la Pucioasa, gresiile calcaroase exploatate la Moreni, marnele la Malu Roșu și Șotriile, gipsul la Slănic și de lingă Fieni, argila în mai multe locuri, printre care la Valea Bradului de lingă Doicești, nisipul cuarțos la Vălenii de Munte și balastul din albiile rîurilor principale. Calcarele și marnele se folosesc la combinatul de lianți și azbociment din Fieni, argila la fabrica de produse ceramice din Doicești, nisipul cuarțos la fabrica de geamuri de la Scăeni, gipsul la uzinele chimice de la Cîmpina și combinatul chimic de la Valea Călugărească pentru producerea acidului sulfuric etc. La Doicești funcționează și o întreprindere de prefabricate rezultate din arderea cărbunelui la termocentrala din localitate. Diferite materiale de construcții se mai produc la Cîmpina, Pucioasa, Pietroșița etc.

Pe lingă industria construcțiilor de mașini cu profil petrolier sînt de amintit întreprinderile „Steaua electrică” din Fieni, care produce lămpi electrice cu incandescență, întreprinderi pentru industria materialelor de construcții și industria chimică, unități ale industriei de prelucrare a lemnului (fabrici de cherestea, ambalaje, bînale etc.) la Măneciu, Vălenii de Munte, Cîmpina, Telega, Moreni, Pucioasa, Voinesti, unități ale industriei textile la Pucioasa și ale industriei alimentare la Valea Călugărească, Vălenii de Munte, Pucioasa etc. În cadrul industriei locale cooperatiste funcționează unități de confecții și ale industriei alimentare

în toate centrele urbane și în cele mai dezvoltate așezări rurale.

După cum atestă vestigiile arheologice, Subcarpații Prahovei au oferit condiții de dezvoltare vieții umane din cele mai vechi timpuri. Au fost găsite urme materiale care datează încă din paleolitic la Măneciu pe Teleajen și Cornu pe Prahova. Epoca bronzului este atestată prin descoperirile de la Viforita (com. Aninoasa) de pe valea Ialomiței, Ocina și Izvoru de pe valea Proviței, Cimpina și Breaza pe Prahova, Măneciu și Homoriciu pe Teleajen, Șotriile, Teișani etc. Epoca fierului este reprezentată prin resturi ale culturii Hallstatt, scoase la iveală la Valea Voievozilor, Breaza și Slănic și ale culturii geto-dacice descoperite la Adincata, ca și prin urme ale așezărilor dacice de la Măneciu, Cornu, Cimpina, Slănic, Băicoi, Gura Vitioarei, Telega, Vîlcănești, Lipănești, Cernești, apoi ale așezărilor daco-romane la Străoști (com. Iordăcheanu) pe Cricovul Sărat, Băicoi, Coțofenești (com. Vărbilău) și numeroase urme de așezări străromânești, printre care la Cornu, Cernești (com. Izvoarele), Străoști, Măneciu, Mehedința (com. Podarii Noi) etc.

Toate acestea confirmă continuitatea vieții umane, o stratificare a culturilor materiale în aceleași vetre și organizarea unui număr tot mai mare de așezări pe măsură ce ne apropiem de mileniul II, cînd multe din actualele centre umane sînt menționate, sub diferite forme, în documente istorice și cartografice apărute în secolele următoare. Primele mențiuni documentare ale unor așezări (Răzvad, Brănești, Aninoasa, Telega, Gura Vitioarei etc.) datează din secolul XV. În continuare, apar, în documente și hărți, majoritatea așezărilor existente în teritoriu și în prezent, cele mai multe localizate în lungul drumurilor comerciale care urmăreau văile principale. Harta stolnicului Constantin Cantacuzino dă în Subcarpații dintre Dîmbovița și Teleajen un mare număr de așezări. La recensămîntul din 1859 aici este înregistrată cea mai densă populație din sudul țării (aproape 50 loc./km²). La începutul secolului XX (1912) populația număra aproape 217 500 de locuitori, iar densitatea ei se ridica la 75,5 loc./km², cu mult mai mare decît densitatea țării (53,8 loc./km²). În lungul Ialomiței, Prahovei și Teleajenului aceasta depășea frecvent 100 loc./km², ajungînd chiar la 150 (Răzvad, Moșăieni, Provița de Sus, Telega, Vălenii de

Munte, Slănic etc.), în mod excepțional trecînd chiar de 250 loc./km² (Cimpina).

În secolul XX, din 1912 și pînă în 1985, populația se dublează și, înregistrînd un spor de peste 236 000 de locuitori, totalizează aproape 454 000 de locuitori. Creșterea medie anuală a fost de 14,9‰ locuitori. Cel mai mic spor (6,5‰ locuitori în medie anual) se realizează în perioada 1941—1948, datorită urmărilor celui de-al doilea război mondial, această regiune subcarpatică, cu bogatele ei resurse de țiței, suferînd mari pierderi materiale.

Populația orașelor a cunoscut o creștere medie anuală, din 1912 pînă în 1985, de 88,3‰, ajungînd de la peste 23 500 la circa 175 000 de locuitori. În aceeași perioadă, populația rurală a înregistrat un spor mediu anual de numai 6,0‰ (193 966 de locuitori în 1912 și 278 516 în 1985). Între 1948 și 1985 sporul mediu anual al populației orașelor a fost de 86,7‰. În același interval populația rurală a crescut doar cu 0,8‰. Acest fenomen nu este o urmare a scăderii populației din centrele rurale care înregistrează, cu foarte puține excepții, o dinamică pozitivă, ci se datorește trecerii unor așezări, în acest interval de timp, în categoria orașelor (Băicoi-Boldești, Scăieni, Breaza, Fieni, Plopeni, Comarnic), care au în prezent circa 84 000 de locuitori. Totodată s-a manifestat, ca și în alte regiuni ale țării, fenomenul de migrare a unor locuitori din sate spre centrele urbane din interior, dar și spre cele două mari orașe din apropiere, Ploiești și Tîrgoviște, cu influență puternică în regiunea subcarpatică. Sporul migratoriu, datorită sporului natural cu valori mai ridicate, nu a avut ca efect scăderea populației rurale, ci diminuarea ritmului de creștere.

Densitatea populației (157 loc./km²) s-a dublat față de cea din 1912, și este mult superioară densității medii a țării (95,8 loc./km²). În multe din așezări, și îndeosebi în cele din lungul Ialomiței și în majoritatea celor situate între Prahova și Teleajen, aceasta depășește 200 și chiar 250 loc./km² (Răzvad 215, Brănești 216, Cornu 280, Bănești 277, Lipănești 284, Doicești 461 loc./km² etc.).

În Subcarpații Prahovei s-au dezvoltat 286 de așezări din care 11 orașe¹. Cu toate

¹ Boldești-Scăieni, Băicoi, Breaza, Cimpina, Comarnic, Fieni, Moreni, Plopeni, Pucioasa, Slănic și Vălenii de Munte.

că aici există cel mai mare număr de orașe, în comparație cu celelalte părți ale Subcarpaților, datorită faptului că în afară de Cîmpina, Moreni și Băicoi, toate au sub 20 000 locuitori, populația lor nu reprezintă decît 38% din numărul total al locuitorilor. Mai mult de jumătate dintre aceste orașe sînt tinere, trecute în rîndul centrelor urbane după anul 1950 (Băicoi, Boldești-Scăeni, Breaza, Comarnic, Fieni și Plopeni) și se află încă în faza de organizare și definativare a profilului economic, iar altele, mai vechi (Vălenii de Munte, Pucioasa, Slănic) nu au o industrie dezvoltată care să atragă forța de muncă (fig. 95).

Densitatea așezărilor este mare (10,2 așezări la 100 km²) în comparație cu media pe țară (5,8 la 100 km²), dar majoritatea au sub 1 000 de locuitori (29,5% sub 500 și 31,7% între 500—1 000 locuitori). În aceste așezări trăiește numai 26,6% din populația Subcarpaților. În celelalte așezări (care totalizează sub 40%) trăiește aproape 74% din populație. Cele mai mari centre rurale sînt Telegă (peste 6 000 de locuitori) și Doicești (5 700 de locuitori). Urmează un număr de 6 așezări cu 4 000 pînă la 5 000 de locuitori, dintre care Răzvad, Bezdead, Ocnița și Măgureni (situate între Ialomița și Prahova), Vărbilău și Șotînga. Cele 11 așezări cu 3 000 pînă la 4 000 locuitori sînt localizate, în majoritate, la est de Prahova: Bănești, Țintea, Aluniș, Berteza, Brebu Mănăstirii, Cornu de Jos, Măgurele, Măneciu Pămînteni. Din această categorie mai fac parte Poiana Cîmpina pe dreapta Prahovei, Brănești pe dreapta Ialomiței și Gura Ocniței la est de Tîrgoviște. Mai numeroase (peste 20) sînt satele care au între 2 000 și 3 000 de locuitori: Aninoasa, Pietroșița, Vîforița, Valea Voievozilor, Teiș, Vîlcănești, Urleta, Izvoarele, Homorîciu, Brebu Megieșesc, Măneciu-Ungureni, etc. Mai mult de jumătate sînt situate în Subcarpații Teleajenului. Satele cu 1 000 pînă la 2 000 de locuitori reprezintă aproape 25% din totalul așezărilor și cuprind peste 31% din populația rurală. Cele mai mari sate sînt vechi centre de extracție a țițeiului și cărbunelui (Doicești, Șotînga, Telegă, Gura Ocniței, Răzvad, Țintea etc.), iar cele mai mici sînt așezări cu suprafețe agricole reduse și relativ izolate față de căile principale de transport.

Cele mai multe așezări rurale au profil agricol cu specific de creștere a animalelor (bovine și ovine) și pomicultură (Bezdead,

Buciumeni, Bărbulețu, Pietroșița, Măneciu, Runcu, Vișinești, Pucheni, Brebu etc.) iar unele și cu un pronunțat specific viticol (Valea Călugărească, Iordăcheanu etc.). Unele așezări rurale, destul de multe în comparație cu alte părți ale Subcarpaților, au profil agroindustrial (fig. 95), rezultat al valorificării resurselor de țiței și cărbune (Răzvad, Gura Ocniței, Aninoasa, Doicești, Șotînga, Telegă etc.) sau dezvoltării pe teritoriul lor a unor unități economice din alte ramuri de producție (Voinesti, Pietroșița, Brănești, Teișani, Vărbilău, Șorteni etc.). Vulcanul Băi funcționează ca stațiune baneclimaterică.

Centrele urbane s-au dezvoltat în lungul văilor principale, cu drumuri vechi comerciale (Cîmpina, Breaza și Comarnic pe Prahova, Pucioasa și Fieni pe Ialomița, Vălenii de Munte pe Teleajen, Slănic pe valea cu același nume) și la contactul cu cîmpia, în aria cîmpurilor petrolifere (Moreni și Băicoi) sau în locurile unde au fost construite importante unități industriale (Plopeni și Boldești-Scăeni).

Cîmpina, Moreni și Băicoi sînt centre ale industriei de extracție și prelucrare a petrolului și ale industriilor construcțiilor de mașini. Slănic și Pucioasa sînt stațiuni balneoclimaterice, primul cunoscut și prin exploatarea sării, iar al doilea, prin industria textilă. Breaza și Vălenii de Munte sînt stațiuni climaterice, cunoscute și ca centre pomicole și de creștere a animalelor. Fieni este centru al industriei materialelor de construcții și industriei electrotehnice, Plopeni, centru al industriei construcțiilor de mașini, iar Boldești-Scăeni al industriei de extracție a petrolului, industriei de geamuri și important centru viticol.

Orașul Cîmpina (41 843 de locuitori în 1992), cel mai mare centru din Subcarpații Prahovei, situat în valea Prahovei, la confluența acesteia cu Doftana, este atestat documentar în secolul XV, la sfîrșitul căruia funcționa ca unul din punctele de vamă importante ale Țării Românești. În a doua jumătate a secolului XVII a devenit tîrg și s-a dezvoltat ca centru meșteșugăresc și de schimb, fiind situat în lungul drumului comercial, de importanță istorică, care făcea legătura cu Brașovul. Începuturile exploatarea zăcămintelor de țiței din secolul XIX și construirea în 1898 a unei rafinării (Steaua Română, cu o capacitate de prelucrare de 1,5 milioane tone) au făcut ca la sfîrșitul secolului XIX orașul să devină unul dintre centrele importante ale industriei de extracție

și prelucrare a petrolului din România. Că urmare, numai între anii 1899 și 1912, populația orașului a crescut de la 3 779 de locuitori la 8 525 de locuitori. În secolul XX numărul locuitorilor înregistrează o creștere mai rapidă, astfel că în 1948 Cimpina avea 16 963 de locuitori, 22 902 în 1966 și 38 479 în 1985.

Cea mai mare parte a populației active lucrează în industrie, și îndeosebi în exploatarea petroliferă, în industria construcțiilor de mașini și în industria chimică. Cimpina a cunoscut o puternică dezvoltare industrială prin modernizarea și extinderea rafinării de petrol, construirea uzinelor mecanice care produc agregate și instalații pentru extracții și foraj, a întreprinderii de reparat utilaj electric, a uzinelor chimice, care produc acid sulfuric. Pe lângă acestea, în Cimpina mai funcționează o termocentrală electrică, unități ale industriei de prelucrare a lemnului (o fabrică de cherestea și alta de mobilă), ale industriei materialelor de construcție, industriei confecțiilor, alimentare etc. Cea mai mare pondere în valoarea producției industriale o deține industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor (circa 50% din total), dezvoltată în strinsă legătură cu industria de prelucrare a petrolului, care deține 20% din producția industrială. În Cimpina își desfășoară activitatea și o întreprindere agricolă de stat cu profil pomicol și de creștere a animalelor. Aici funcționează un institut de cercetări pentru foraj și extracție și un liceu industrial pentru pregătirea cadrelor necesare industriei de extracție și prelucrare a petrolului. O deosebită importanță pentru viața culturală și științifică o prezintă casele memoriale ale marelui pictor Nicolae Grigorescu, filologului și istoricului Bogdan Petriceicu Hașdeu, castelul Iuliei Hașdeu și Muzeul de artă populară, în care sînt expuse costume și țesături cu specific național și obiecte cu sculptură în lemn.

Orașul Moreni, situat la contactul cimpiei cu Subcarpații Ialomiței, pe Cricovul Dulce, în lungul drumului care vine de la Tîrgoviște, și se îndreaptă spre Ploiești, cunoscut ca un vechi centru de extracție a petrolului, a fost declarat centru urban în 1948. Primele exploatare, la scară industrială, s-au făcut încă de la începutul secolului XX (1903). Legat de exploatarea de țiței au luat ființă în Moreni, în acea perioadă, atelierele pentru reparații de utilaj petrolier. Acestea au fost extinse, reutilitate și modernizate, trans-

formîndu-se în întreprindere mecanică de utilaj tehnologic, care produce utilaj necesar industriei exploatarea de țiței. În exploatarea de petrol și industria construcțiilor de mașini lucrează peste 80% din populația ocupată în industria orașului. Dezvoltarea celor două ramuri industriale, care dau specificul economic al orașului, și a altor unități economice de importanță locală, a dus la creșterea numărului de locuitori de la 9 046 în 1948 la 22 880 în 1992. În prezent peste 70% din locuitorii orașului trăiesc în locuințe construite după anul 1950.

Orașul Băicoi, format din localitățile Băicoi, Dimbu, Liliеști, Schela, Tufeni și Țintea, a fost trecută în rîndul centrelor urbane în anul 1956 (fig. 98). Este cunoscut ca unul dintre cele mai vechi centre de extracție a petrolului din România. Situat pe stînga Prahovei, la circa 20 km nord-vest de Ploiești, într-o bogată regiune petroliferă, întreaga dezvoltare social-economică a orașului a fost legată de extracția țițeiului, mai ales că acesta se exploatează pe raza tuturor localităților componente ale orașului. Din 1956 pînă în 1992 populația orașului a crescut de la 8 287 la 20 676 de locuitori. Majoritatea populației lucrează în industria de exploatare a petrolului și în unități economice dezvoltate în strinsă legătură cu valorificarea acestei bogății: întreprinderea de foraj (Liliеști), întreprinderea energo-petrol (Liliеști), schela Băicoi și centrul mecanic de reparații (Băicoi). În anul 1962 aici s-a construit un complex zootehnic de creștere a vacilor de lapte și o unitate avicolă pentru aprovizionarea centrelor din regiunea petroliferă a Prahovei.

Orașul Breaza a fost declarat centru urban în 1956. În componența lui intră 10 localități¹, a căror vatră se desfășoară de o parte și de alta a Prahovei, la sud de Comarnic, pe o distanță de peste 10 km. Poziția orașului la o altitudine de circa 600 m, cu un climat mai blînd, a favorizat dezvoltarea acestuia ca stațiune climaterică, renumită pentru tratarea nevrozelor și a bolilor cardiovasculare.

Populația orașului a înregistrat o creștere lentă. Aceasta a ajuns de la 11 601 de locuitori în 1948, la 14 764 în 1966 și la 19 293 în 1992.

¹ Breaza de Jos, Breaza de Sus, Frăsînet, Gura Belcii, Irimești, Nistorești, Podul Corbului, Podul Vădulei, Surdești, Valea Tîrsei.




Fig. 98. Băile Țintea cu ape sărate și nămoluri terapeutice (foto C. P. B.).

Forța de muncă masculină lucrează îndeosebi în industria de extracție și prelucrare a țițeiului din centrele de pe Valea Prahovei. Femeile își continuă vechea îndeletnicire, artizanatul, care astăzi este organizat în unități ale micii industrii cooperatiste, cu secții de țesătorie mecanică, covoare, broderii și croitorie. Orașul Breaza este cunoscut și ca un important centru pomicol, livezile de pomi ocupând o suprafață de aproape 800 ha. O parte din populație se ocupă și cu creșterea animalelor (îndeosebi ovine), favorizată de existența a circa 2 300 ha de pășuni și fânețe naturale. Acestea, împreună cu livezile de pomi, dețin peste 96% din terenul agricol.

Orașul Comarnic, format din localitățile Comarnic, Ghioșești, Podu Lung, Poiana și Posada, a fost trecut în rîndul centrelor urbane în anul 1968. Situat pe Prahova, la contactul Subcarpaților cu munții s-a dezvoltat, la început ca centru de schimb, documentele istorice din secolele XV—XVI menționîndu-l ca tîrg feudal pentru practicarea cîrăușiei și loc de popas pentru tînsul oilor (Gh. Niculescu, I. Velcea, 1973). La începutul secolului XX aici s-a construit o fabrică de var și una de ciment. Fabrica de ciment, extinsă și modernizată, produce sortimente speciale de ciment folosite la betoanele refractare, în industria chimică etc. În prezent mai funcționează o întreprindere de

ceramică pentru materiale refractare necesare industriei siderurgice și o unitate a industriei textile, care produce covoare, cusături naționale etc.

Populația orașului, care a crescut de la 9 687 de locuitori în 1948 la 13 809 de locuitori în 1992, se ocupă și cu creșterea animalelor și cultura pomilor fructiferi. Orașul dispune de 7 226 ha teren agricol, din care peste 3 000 ha pășuni și fânețe naturale (pe baza cărora se crește îndeosebi ovine) și aproape 600 ha livezi de pomi.

Orașul Slănic, format din localitățile Slănic, Groșani și Prăjani, se înșiră pe circa 15 km în lungul văii cu același nume. În 1992 avea 7 226 de locuitori. Alături de Cîmpina și Vălenii de Munte face parte din cele mai vechi centre urbane din Subcarpații Prahovei. A apărut ca tîrg în secolul XVIII și a reprezentat cea mai mare așezare umană din Subcarpații Prahovei pînă la începutul secolului XX, cînd a fost depășit de Cîmpina. În 1912 avea numai 5 512 de locuitori. Dezvoltarea orașului s-a datorat exploatării zăcămintelor de sare și tolosirii izvoarelor minerale (clorosodice, sulfatate și calcice) pentru tratament de la sfîrșitul secolului XIX. Documentele istorice vorbesc de sarea exploatăată cu secole în urmă din minele de la Slănic și trimisă pe drumul Teleajenului pentru a fi comercia-

lizată în porturile dunărene sau în centrele din Transilvania. În prezent sarea exploatată este folosită în mare parte în industria chimică. O parte a gurilor rămase după exploatare a fost transformată în lacuri și amenajate pentru tratament (Baia Baciului, Baia Roșie). De asemenea, s-au construit stabilimente pentru băi calde cu apă minerală și nămol sapropelic, precum și spații de cazare cu peste 1 000 de locuri. În prezent orașul Slănic este cunoscut ca o importantă stațiune balneoclimaterică pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii, cardiovasculare, reumatismale, ginecologice, și posttraumatisme.

Muntele de sare cu Grota Miresei — monument al naturii și salina „Unirea” (210 m adâncime), amenajată pentru tratament, ca și Muzeul sării și Muzeul de artă sînt obiective de un deosebit interes turistic pentru publicul vizitator al orașului Slănic (fig. 99).

Orașul Vălenii de Munte s-a dezvoltat ca tîrg încă din secolul XVII datorită poziției favorabile pe drumul de pe valea Teleajenului, care făcea legătura cu Brașovul. Este unul din cele mai vechi centre urbane din Subcarpații Prahovei, care și-a menținut această funcție, fără întrerupere, pînă în prezent. Situat într-o regiune cu climat propice cîrui climaterice și favorabil cultivării pomilor fructiferi, s-a dezvoltat ca stațiune climaterică și important centru pomicol. Suprafețele ocupate cu livezi (230 ha) dețin circa 18% din terenul agricol al orașului (1 240 ha).

Industria este reprezentată printr-o fabrică de cherestea, o întreprindere pentru exploatarea nisipului cuarțos (folosit la fabrica de geamuri din Boldești-Scăeni), o fabrică de conserve din fructe și unități ale cooperăției meșteșugărești. Ocupația de bază a populației este creșterea animalelor (mai ales ovine) și pomicultura. Pășunile și fînețele naturale dețin 57% din terenul agricol.

Populația a înregistrat o creștere continuă, dar lentă. De la mijlocul secolului XIX pînă la începutul deceniului doi al secolului XX a sporit numai cu 1 000 de locuitori (3 704 în 1912, față de 2 791 în 1859). Pînă în 1948 ajunge la 4 495 de locuitori, iar, în continuare, se ridică la 7 380 în 1966 și la 13 624 în 1992.

Asfaltarea, după 1965, a drumului Vălenii de Munte — Cheia și, mai departe, peste Pasul Bratocea, spre Brașov a dus la intensificarea circulației în regiune și, ca urmare, la un aport sporit de turiști spre obiectivele turistice de aici (Mănăstirea Vălenii, construită în 1680, Muzeul memorial „Nicolae Iorga” și Muzeul de etnografie).

Orașul Pucioasa, format din localitățile Pucioasa, Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești și Pucioasa sat, se înșiră pe o distanță de circa 10 km în lungul Ialomiței. Situat între dealuri, la 350 m altitudine, într-un climat moderat cu veri răcoroase și ierni blinde, și, beneficiind de existența izvoarelor sulfuroase, clorosodice și bicarbonatate, s-a dezvoltat ca stațiune balneoclimaterică. În anul 1930 a fost trecut în rîndul centrelor urbane.

Populația a înregistrat o scădere de la 5 772 de locuitori în 1930, la 4 643 de locuitori în 1948. Ulterior a cunoscut o evoluție ascendentă, ajungîndu-se la 11 212 în 1966 și la 16 484 de locuitori în 1992.

Încă din primele decenii ale secolului XX existau în Pucioasa și mici unități industriale, care funcționau pe baza materiilor prime locale sau din import (bumbac). În 1935 funcționa o fabrică de var, o carieră de piatră și o cooperativă pentru desfacerea apelor minerale (*Enciclopedia României*, vol. II, 1938). În apropiere, la Brănești, exista o fabrică de stofe și pinzeturi din bumbac, iar la Zărăfoaia (în prezent cartier al orașului), o filatură de bumbac. Modernizate și reprofile, aceste unități textile produc fire și țesături din bumbac, din in și cînepă (D. Bugă, I. Zăvoianu, 1974).

Industria textilă, în care lucrează peste 80% din populația ocupată în industrie, dă specificul economic al orașului. În Pucioasa mai există o fabrică de prelucrare a fructelor, o fabrică de teracotă și unități meșteșugărești. Orașul posedă 2 200 ha teren agricol, din care pășunile și fînețele naturale, pe baza cărora se cresc bovine și ovine, dețin cea mai mare parte (58%). O importanță deosebită în economia agricolă a orașului o au livezile de pomi fructiferi, care ocupă aproape 400 ha (18% din suprafața agricolă).

În oraș funcționează un complex sanatoriu cu bază proprie de tratament și un




Fig. 99. Muntele de sare de la Slănic Prahova, monument al naturii (foto V. Sencu).

complex balnear cu instalații pentru băi calde, aerosoli și inhalații, electro- și hidro-terapie etc. Spațiile de cazare (vile, hotel, han, popas turistic etc.) totalizează aproape 1 000 de locuri.

Orașul **Fieni**, situat la confluența Ialomitei cu Ialomicioara, a fost declarat centru urban în 1968, ca urmare a organizării și dezvoltării întreprinderii de lianți și azbociment, și a celei de becuri „Steaua electrică”, unități industriale care au la bază vechile fabrici de ciment și de becuri, construite în primele decenii ale secolului XX. În aceste unități economice lucrează circa 98% din populația ocupată în industria orașului. Cimentul, plăcile și tuburile de azbociment, ca și becurile electrice dețin ponderi însemnate în producția de ramură a economiei naționale (industria electrotehnică și industria materialelor de construcții).

O parte a populației se ocupă cu agricultura, orașul dispunând de o suprafață agricolă de aproape 1 100 ha, din care 84% îl dețin pășunile și finetele naturale, care sînt folosite pentru creșterea unui număr relativ mare de ovine și bovine.

Evoluția populației este lentă, creșterea bazîndu-se numai pe sporul natural. Aceasta a ajuns de la 5 139 de locuitori în 1966 la 8 242 loc. în 1992.

Orașul **Plopeni** este unul din cele mai mici centre urbane din Subcarpații Prahovei (10 298 de locuitori în 1992). A fost declarat oraș în anul 1968. La recensămîntul din 1966 număra numai 2 806 de locuitori. Situat la circa 20 km nord de Ploiești, s-a dezvoltat ca centru urban datorită construcției aici a unei mari unități industriale din ramura construcțiilor de mașini, care produce utilaje pentru industriile petroliere și miniere, elemente și instalații hidraulice, pluguri pentru tractor etc. Vatra orașului s-a organizat pe un loc viran. Construcțiile de locuințe, unitățile social-culturale și edilitar-gospodărești au fost ridicate odată cu construirea uzinei mecanice.

Orașul **Boldești-Scăeni**, situat la circa 10 km nord de Ploiești, între Teleajen și Bucovel, a fost declarat centru urban în 1968, cînd au fost grupate sub acest nume localitățile Boldești, Scăeni și Seciu, datorită intensificării exploatărilor de petrol din regiune și construirii, la Scăeni, a unor mari fabrici de geamuri și mucava. Boldești, Băicoi și Țintea sînt cele mai vechi centre

de exploatare a țițeiului din regiunea Prahovei.

Populația orașului (11 782 de locuitori în 1992) lucrează, în majoritate, în industrie. O parte se ocupă cu agricultura, orașul dispunînd de circa 2 100 ha teren agricol, din care 50% arabil. Fiînd situat la contactul Subcarpaților cu cîmpia, într-o regiune favorabilă viticulturii și pomiculturii, aproape 14% din terenul agricol al orașului este acoperit cu vii și 32% cu pomi fructiferi.

Cele mai multe din orașele Subcarpaților Prahovei prezintă importanță turistică. Totodată, unele dintre ele — Slănic, Fucioasa, Breaza, Vălenii de Munte — funcționează ca stațiuni balneoclimaterice sau climaterice. O stațiune balneoclimaterică de interes local este Vulcanul Băii. Aici, ca și în alte locuri (Vîrfuri, Ursei, Gura Ocnitei, Teleaga, Poiana Cîmpina etc.) există numeroase izvoare de ape minerale deosebit de apreciate prin efectele curative. De asemenea, în Subcarpații Prahovei există importante monumente istorice, de cultură și artă: ruinele palatului brîncovenesc din secolul XVIII și biserica de la Doicești, mănăstirea Vîfărița de la Aninoasa (ctitorie a lui Vlad Țepeș, 1530), biserica din Băicoi în care se găsesc cîteva icoane pictate de Nicolae Grigorescu. La Brebu există o veche ctitorie a lui Matei Basarab, clădită între 1640 și 1650, la Vulcanul Băii, Schitul Bunea (1662), pe dreapta Teleajenului, la Coadă Malului renumitul „Hanu Roșu”, datînd din secolul XVII; la Gemenea „crucea comemorativă” a fraților Buzești (ridicată în 1595), la Pietroșița, Casa Bălășescu, care a adăpostit guvernul provizoriu din 1848.

4.2.2.3. Subcarpații Buzăului

Destășurați pe o suprafață de 2 760 km². între Slănicul Buzăului, în est, Teleajen și Cricov, în vest, Subcarpații Buzăului sînt alcătuiți dintr-o succesiune de dealuri și depresiuni deluroase cu o complexitate mai mare decît a Subcarpaților Vrancei și cu o accentuată mobilitate endogenă și exogenă. Lățimea maximă de 40 km (cea mai mare din toți Subcarpații), schimbarea în orientarea generală a cutelor de la nord-est la sud-vest pînă la valea Nișcovului, apoi de la est la vest dîncolo de această vale, com-

plexitatea structurală, rețeaua hidrografică predominant transversală, alcătuirea litologică diversă, frecvențele peisaje puternic degradate, precum și inversiunile de relief sînt doar cîteva din elementele care îi diferențiază de toate celelalte părți ale Subcarpaților.

Rețeaua hidrografică și, implicit, depresiunile și culmile principale converg spre valea Buzăului care reprezintă și o puternică axă de polarizare a tuturor activităților social-economice. Spre vest, însă, Depresiunea Drajna—Chiojd și Dealurile Priporului gravitează spre Valea Teleajenului.

În partea de nord, la contactul cu Munții Buzăului a fost pusă în evidență existența unei zone de interferență carpato-subcarpatică (V. Mihăilescu, 1963; Gh. Niculescu, 1971). Limita taie pieziș pîntenul de Văleni, urmărind în continuare, pînă la valea Teleajenului, marginea nordică a Depresiunii Drajna—Chiojd, depresiune tipică subcarpatică. În sud structurile subcarpatice vin în contact direct cu cîmpia prin intermediul unui glacis îngust pe aliniamentul localităților Cîndești, Vernești, Merei, Pietroasa, Gura Vadului, Ceptura, Urлаți.

În vest sînt separați de Subcarpații Prahovei prin valea largă a Cricovului Sărat între Urлаți și Gornet Cricov, prin depresiunea netedă a Podenilor și prin Valea Teleajenului între Măgurele și Măneciu-Ungureni. În nord-est, limita spre Subcarpații Vrancei urmărește valea Slănicului Buzăului între Lopătari și Săpoca.

Relieful, cu altitudini de 300—800 m, este constituit din formațiuni de molasă neogene și din pietrișuri și nisipuri romaniene, fiind acoperit spre exterior de depozite loessoide cu diferite grosimi. În partea de nord-vest se adaugă și fișiile de fliș paleogen ale pîntenilor de Văleni și de Homoriciu. Alcătuirea regiunii din complexe de sedimente cu grosimi și extensiuni variate și cu rezistențe diferite la acțiunea agenților externi a favorizat modelarea selectivă a versanților prin procese diferențiate pe spații restrinse și a condiționat înfățișarea de ansamblu a reliefului.

Dealurile înalte sînt sculptate pe depozitele de fliș paleogen (Priporu 823 m, Cetățuia 710 m), pe gresii și calcare sarmatiene (Blidișel 825 m, Bocu 809 m, Dilma 804 m, Istria 754 m) și pe pietrișuri romaniene (Cornetu 827 m). Dealurile mijlocii și scunde (Dealurile Piclelor, Ursoaia, Dealurile

Matifei) cuprind numeroase intercalații argiloase și marnoase. Depresiunile corespund în cea mai mare parte sinclinalelor (Drajna—Chiojd, Singeru, Nișcov, Cislău, Policiori), fiind sculptate în marne și argile, dar se întîlnesc și unele inversiuni de relief, cum este Depresiunea Berca. Aceste unități de relief se înscriu pe fișii morfostructurale relativ bine conturate, începînd cu fișa de fliș paleogen puternic cutat și faliat din latura internă și terminînd cu fișa mio-pliocenă cu cute largi de la exterior. Substanțele minerale utile sînt reprezentate prin materiale de construcție (argile, calcare, pietrișuri), prin țitei și cărbuni (lignit) (fig. 100).

Diferențierile litologice introduc variații importante în densitatea și adîncimea fragmentării reliefului și în conformația și înclinarea versanților, care influențează direct modul de utilizare a terenului. Arealele cu cea mai scăzută densitate a fragmentării (2—3 km/km²) corespund teraselor joase și conurilor de dejecție utilizate ca terenuri arabile și pentru amplasarea așezărilor. Culmile largi, cu versanți complecși, convexe-concavi, alcătuite din alternanțe de roci cu permeabilitate diferită, avînd densitatea fragmentării de 3,0—4,0 km/km² sînt utilizate predominant ca fînețe, pășuni și livezi. Cele mai mari valori ale densității fragmentării reliefului corespund dealurilor înalte, sculptate în pietrișuri de Cîndești (Cornetu) și în depozite de fliș paleogen (Priporu, Cetățuia), afectate de procese intense de ravenare și împădurite în cea mai mare parte.

După încheierea depunerii pietrișurilor de Cîndești, prin antrenarea regiunii într-un proces de înălțare generală, a urmat adîncirea ritmică a rețelei hidrografice (cu o amplitudine totală de 500—600 m). Procesele intense de eroziune au fragmentat terasele care au rămas numai ca fragmente. Pe Buzău au fost identificate 7—8 terase, între care cea mai înaltă are o altitudine relativă de 215 m (L. Badea, D. Bălțeanu, 1977). În anumite sectoare terasele sînt deformate de mișcările neotectonice (L. Badea, 1963). Pe fondul general al înălțării Subcarpaților s-au înregistrat tendințe locale de amplificare și de încetinire (subsidențe locale în ariile de depresiune). Subcarpații Buzăului sînt situați în sudul regiunii seismice Vrancea, în zona de maximă îngroșare a sedimentelor din Depresiunea Precarpatică, în lungul căreia se află ariile seismice cele mai intense de pe teritoriul României (M. Socolescu și colab., 1975). În ansamblu, trăsăturile Subcarpa-




Fig. 100. Utilizarea terenurilor în Subcarpații Buzăului. 1, Păduri; 2, pășuni și flnețe; 3, vii; 4, livezi; 5, livezi și pășuni; 6, teren arabil; 7, arabil, pășune, vie; 8, vetre de așezări; 9, Țiței; 10, cărbune; 11, diatomit; 12, gips; 13, piatră de var; 14, cale ferată; 15, drumuri.

ților Buzăului indică prezența unei regiuni tinere, cu o mobilitate accentuată a reliefului, reflectată în formația și dinamica actuală a versanților și albiilor. Din punct de vedere morfotectonic regiunea studiată se află în fază de orogeneză, manifestată prin mișcări plicative și frecvente cutremure. În prezent, Subcarpații se află în stadiul de degajare și de distrugere a structurilor și de accentuare a fragmentării (L. Badea, 1966).

În aceste condiții, modelarea reliefului se desfășoară diferențiat pe bazine hidrografice și pe compartimente tectonice în cadrul cărora factorul litologic are un rol esențial.

Deplasările în masă au o acțiune puternică asupra versanților și furnizează albiilor cantități mari de materiale (D. Bălțeanu, 1983). Denudarea se desfășoară și prin procese intense de ravenare și de spălare, accentuate de activitățile antropice manifestate

prin despăduriri și utilizări necorespunzătoare ale terenurilor. În astfel de condiții a fost necesară efectuarea unor lucrări complexe de îmbunătățiri funciare pe bazine hidrografice (lucrări de combatere a eroziunii, amenajarea versanților afectați de alunecări, terasări etc.). Ca urmare a acestor măsuri, prin trecerea unor terenuri cu productivitate inferioară într-o categorie superioară, s-a schimbat structura modului de folosință a terenului. În prezent, din suprafața totală de 286 000 ha, suprafața arabilă este de 38 800 ha (14%), pășunile ocupă 56 000 ha (20%), fânețele 28 000 ha (10%), viile 14 000 ha (5,0%), livezile 19 000 ha (7%), fondul forestier 98 500 ha (36%), iar celelalte suprafețe 23 000 ha (8%).

Terenurile agricole dețin 56% din suprafața totală, reprezentând tipul de utilizare predominant. În cadrul suprafeței agricole pășunile și fânețele naturale dețin cea mai mare parte, iar după acestea urmează terenul arabil, livezile și viile. Terenurile arabile sunt mai extinse în depresiunile din lungul Buzăului. În partea internă a Subcarpaților pășunile și fânețele naturale sunt preponderente, deținând valori între 40 și 80% din terenul agricol. Alături de acestea, pomii fructiferi dețin între 10 și 30% și peste 30% din terenul agricol. În partea de sud a Subcarpaților se remarcă ponderea ridicată a culturii viței de vie, care ajunge la 30–40% și peste 40% din terenul agricol. În ultimii ani se înregistrează o extindere a plantațiilor de viță de vie și pomi fructiferi, mai eficiente decât alte culturi (fig. 100).

Cultura viței de vie ocupă o suprafață de circa 14 000 ha, în cea mai mare parte deținută de podgoria Dealul Mare—Istrița. Plantațiile de vii se desfășoară sub forma unei benzi continue între Ceptura—Tohani—Pietroasa—Gura Sărății—Merei, deținând la nivelul comunelor peste 30% din terenul agricol. În partea de vest a podgoriei, pe soluri predominant argiloase, se cultivă soiuri de struguri din care se obțin vinurile aromate (Tămioasă) și vinuri demiseci (Grasa de Pietroasele). Pe versanții cu înclinare redusă și pe glacisul de la contactul cu cîmpia se cultivă soiuri de masă.

Livezile ocupă o suprafață de 19 000 ha, fiind în extindere în comunele specializate, ca Pătirlagele, Calvini, Cislău, Pîrscov, Cărbunești etc. Predomină cultura prunului (62,3%), după care urmează mărul (20,8%), părul (4,3%), cireșul și vișinul (3,6%) etc. Prunul are o răspândire mai mare pe dealurile

cu înălțime medie și în depresiunile din lungul Cricovului Sărat, Biștii Chiojdului, Bălănesii, Sărățelului și Slănicului. Mărul deține suprafețe mai însemnate în plantațiile intensive din lungul Buzăului (Măgura, Pîrscov, Cislău) și în plantațiile din Depresiunea Draja—Chiojd (Draja, Posești, Chiojdu), iar părul, în plantațiile din Depresiunea Draja—Chiojd. Prelucrarea primară a fructelor se face la Pîrscov, Berca, Cislău, Beceni.

Creșterea animalelor, cu o tradiție îndelungată, este favorizată de suprafețele întinse de pășuni și fânețe naturale. Baza furajeră este de circa 86 000 ha. Creșterea ovinelor este ramura cea mai bine dezvoltată, efectivul acestora fiind de circa 215 000 de capete. Densitatea cea mai mare se întâlnește în Dealurile Dîlmei (Brăiești, Colți, Bozioru etc.) și în depresiunile Calvini și Chiojd, trecînd în mod frecvent peste 200 de capete la 100 ha teren agricol. Bovinele însumează circa 46 000 de capete, ceea ce reprezintă o densitate de 30 de animale la 100 ha teren agricol. Densități mai mari, între 40 și 60 de capete, se întâlnesc în depresiunile Sărățelului, Berca, Draja și Nișcovului.

Pe terenurile agricole denudarea versanților atinge valori globale de 41,5 t/ha an, din care 28 t/ha an prin ravenare și alunecări și 13,5 t/ha an prin eroziune în suprafață (M. Moțoc, 1982). Ca urmare a colectivizării agriculturii s-a înregistrat fenomenul de părăsire treptată a unor terenuri mai greu accesibile care, în stare de pîrloagă, au intrat într-un stadiu accelerat de degradare prin procese de eroziune, alunecări și curgeri de noroi. Fără lucrări curente de drenaj, de plantare a virfurilor ravenelor și de întreținere a agroteraselor, care se efectuau în fiecare gospodărie în parte, aceste suprafețe s-au degradat într-un ritm accelerat, fiind afectate de procese violente de modelare neîntîlnite în regim natural sau în terenurile folosite de om (D. Bălțeanu, 1983).

Procesele de eroziune sînt intensificate de precipitațiile cu caracter torențial din timpul verii și de cantitățile mari de apă rezultate în urma topirii zăpezilor. Suma medie a precipitațiilor atinge valori anuale de 600–650 mm. Cele mai mari cantități medii lunare se înregistrează în luna iunie, iar cele mai reduse corespund lunii octombrie. În peste 80% din numărul de zile cu precipitații cantitățile de apă nu depășesc 15 mm; cantităților cuprinse între 15 și 30 mm le corespund 9% din cazuri. Canti-

tățile de precipitații de peste 30 mm în 24 de ore au o frecvență mai redusă, dar au un rol însemnat în modelarea reliefului. Numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este cuprins între 30 și 45, iar grosimea medie este de 10–12 cm. Lunile august, septembrie și octombrie sunt caracterizate printr-o tendință de ariditate, iar lunile mai și iunie sunt cele mai umede (Octavia Bogdan, Elena Mihai, 1981).

Rețeaua de riuri, între care cele principale sunt alohtone, este caracterizată prin oscilații mari de debite și nivele, lunare, sezoniere și anuale. Debitul mediu anual al Buzăului la Măgura (perioada 1958–1967) este de 21,8 m³/s, iar scurgerea medie specifică are valoarea de 11,2 l/s. km². Scurgerea medie în timpul primăverii reprezintă circa jumătate din volumul anual, iar iarna și vara între 13 și 16%, chiar mai puțin. În timpul verii sunt caracteristice viiturile puternice, datorate ploilor torențiale foarte intense căzute în bazinul superior. De exemplu, în iulie 1975, la Măgura, a fost înregistrat debitul maxim de 2 100 m³/s, care este de peste 1 600 de ori mai mare decât debitul minim (1,30 m³/s în septembrie 1954).

Buzăul transportă cantități mari de aluviuni, consecință a proceselor intense de denudare din Subcarpați. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 57,5 kg/s, iar cea mai mare valoare medie lunară a fost de 138,2 kg/s, în luna iulie 1969. Scurgerea medie specifică de aluviuni în suspensie atinge valori de peste 25 t/ha an. Pentru bazinul Cîlnăului a fost estimată o cantitate de 56,5 t/ha an, iar pentru Slănicul Buzăului s-au înregistrat 43,0 t/ha an (C. Diaconu, 1974).

Durata perioadei de vegetație (cu temperaturi mai mari de 5°C) variază între 220 și 230 de zile pe terenurile orizontale și la baza versanților și între 190 și 200 de zile pe dealurile înalte (N. Muică și colab., 1981). Subcarpații Buzăului se încadrează în etajul gorunului și în cel al pădurilor de gorun și de fag, în amestec. Activitățile antropice au determinat o diminuare a suprafețelor împădurite care se mențin pe suprafețe mai mari pe dealurile înalte și pe versanții cu înclinare mare.

Pădurile de gorun sunt dezvoltate pe soluri brune eu-mezobazice și pe soluri brune slab acide și ocupă suprafețe mai întinse în culmile Salcia, Botanul și în Dealurile Blăjenilor. Temperatura medie anuală este de 10°C, iar radiația globală este apreciată la

circa 115 kcal/cm² min., durata de strălucire a Soarelui fiind de 2 100–2 200 de ore anual. Pe versanții cu expoziție nordică și nord-vestică gorunul este amestecat cu fag.

În pașistile naturale nedegradate apar ca specii edificatoare *Festuca rubra*, *Agrostis tenuis*, la care se adaugă în locuri bine însoțite *Festuca valesiaca*, *Crysopegon gryllus*, iar în finetele umede, *Festuca pratensis* (Cristina Muică și colab., 1979). În pașistile din dealurile scunde și pe versanții cu expunere sudică, cu efecte de foehn, apar și unele elemente stepice, ca *Stipa capillata*, *S. joannis*, *Adonis vernalis*, *Carex humilis*.

Pe terenurile despădurite cu degradare medie sunt caracteristice pașistile cu *Botriochloa ischaemum*, asociate adesea cu *Festuca valesiaca*. Pe terenurile puternic degradate prin ravenare, eroziune în suprafață și alunecări, pe soluri neevolute sau erodate (erodisoluri și regosoluri) sunt caracteristice tufărișurile de cătină (*Hippophaë rhamnoides*). Unele sectoare puternic degradate au fost plantate cu pin și salcîm.

Pe rețeaua de văi din Subcarpații Buzăului, văile Buzăului, Bistii Chiojdului, Bălăneșei, Slănicul Buzăului, Nișcovului sunt concentrate majoritatea așezărilor, arterele de circulație și, în cazul văilor principale, terenurile arabile.

Descoperirile arheologice, hărțile vechi (Harta rusească din 1835, *Charta României Meridionale* din 1864), descrierile unor călători (Fr. Sulzer în 1781, Raicewich în 1788), ca și studiile (G. Vălsan 1915; N. Popp, 1940; I. Petrescu-Burloiu, 1977) atestă faptul că Subcarpații Buzăului, cu o populație în întregul ei rurală, au fost în permanență bine populați pentru că pe lângă adăpostul și siguranța sporite din epocile istorice trecute resursele locale variate au satisfăcut cerințele populației.

În anul 1835, în Subcarpații Buzăului existau circa 65 000 de locuitori, ceea ce reprezenta o densitate medie de 23 loc./km². Pînă în 1912 numărul locuitorilor a sporit la circa 162 000 de locuitori, indicînd, față de anul 1835, o creștere de 2,3 ori. Cea mai mare creștere se constată în lungul Buzăului, fapt explicat prin funcția de axă de circulație a văii Buzăului, prin dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului și prin apariția exploatărilor petrolifere de la Berca și a celor carbonifere de la Joseni.

În anul 1977, Subcarpații Buzăului însușeau 236 958 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere de 1,46 ori față de anul 1912.

Populația activă este ocupată, în cea mai mare parte, în agricultură (53%), după care urmează cea ocupată în industrie (25%), în activitățile de servicii (16%) și de construcții (6%).

Așezările, în totalitate rurale, numără 377 de sate. Dezvoltarea continuă a agriculturii și specializarea acesteia în funcție de condițiile naturale și economice locale, precum și crearea unor unități de valorificare a resurselor solului și subsolului, au contribuit la apariția unor diferențieri funcționale (fig. 101). Astfel, în așezările cu funcții agricole situate în dealurile și depresiunile dintre Sibiciu și Sărățel, datorită suprafețelor întinse cu pășuni, fânețe naturale și livezi, ocupația de bază a locuitorilor este creșterea animalelor asociată cu pomicultura. Satele sînt mici și foarte mici (sub 500 de locuitori) și se înșiră în lungul văilor secundare și pe versanții cu pantă redusă, pe alunecări vechi. Condițiile naturale și caracterul activităților economice au imprimat așezărilor o structură risipită.

Fig. 101. Distribuția așezărilor în Subcarpații Buzăului. 1, Limita Subcarpaților spre munte și spre cîmpie; 2, fîșia de interferență dintre Carpați și Subcarpați; 3, dealuri subcarpatice; 4, depresiuni și culoare depresionare; 5, înșeuări; 6, așezări cu funcție viticolă; 7, pomicolă și de creștere a animalelor; 8, agroindustrială; 9, industrial-agricolă; 10, industrial-agricolă; 11, balneoclimaterică.




Fig. 101. Distribuția așezărilor în Subcarpații Buzăului. 1, Limita Subcarpaților spre munte și spre cîmpie; 2, fîșia de interferență dintre Carpați și Subcarpați; 3, dealuri subcarpatice; 4, depresiuni și culoare depresionare; 5, înșeuări; 6, așezări cu funcție viticolă; 7, pomicolă și de creștere a animalelor; 8, agroindustrială; 9, industrial-agricolă; 10, industrial-agricolă; 11, balneoclimaterică.

Așezările rurale cu funcții agricole și industriale, în care activitatea agricolă cuprinde între 60 și 80% din populația activă, au o răspindire mai mare în Dealul Istrița (Călugăreni, Gura Vadului, Pietroasa etc.), unde satele s-au specializat în cultura viței de vie. Aceste așezări au un rol însemnat în producția de struguri a țării. Satele cu un pronunțat caracter viticol sînt, în general, de mărime mijlocie (între 500 și 1 000 de locuitori) și sînt caracterizate printr-o evoluție a structurii răsfricate către cea adunată. Activitatea industrială este legată de prelucrarea și valorificarea resurselor solului (struguri, fructe), care absoarbe în medie între 15 și 20% din populația activă locală (fig. 101).

Așezările cu funcții agricole și de servicii sînt mai răspindite în depresiunile subcarpatice dintre Slănic și Buzău. Economia agricolă este reprezentată de creșterea animalelor, cu deosebire a ovinelor, și de pomicultură. Activitățile de servicii absorb în medie între 12 și 15% din populația activă. Predomină satele cu o structură răsfricită. Relativ numeroase sînt și așezările cu funcții agricole, industriale și de servicii. Activitatea economică preponderentă o constituie creșterea animalelor și pomicultura. Cîteva comune dispun însă de o intensă activitate industrială, care absoarbe între 24 și 40% din populația activă. Activitatea industrială este legată de exploatarea țițeiului (Cărbunești, Surani, Tisău etc.), cărbunului (Ceptura), materialelor de construcții (Pătirlagele). Satele din aceste areale se înșiră, în cele mai multe cazuri, pe terasele din lungul văilor sau pe spinarea dealurilor, acolo unde acestea prezintă forme domoale și prelungi. Au o structură răsfricită, cu forme de tranziție de la satul răsfricit la cel adunat.

Așezările cu funcții industriale, agricole și de servicii aparțin de Berca, Scorțoasa, Tisău și de Urlați. Activitățile industriale absorb între 38 și 50% din populația activă și sînt legate de exploatarea țițeiului, exploatarea lemnului și a materialelor de construcții, la care se adaugă agricultura specializată în creșterea animalelor și cultura pomilor fructiferi.

În ansamblu, economia Subcarpaților Buzăului are un caracter mixt. Agricultură absoarbe o parte importantă a forței de muncă și furnizează materia primă necesară industriei alimentare, textile etc. Activitatea industrială s-a dezvoltat relativ tîrziu.

Pînă în secolul XX industria era limitată la mici ateliere de postav, dimie (Cislău, Rătești, Singeru, Sibiciu), ceramică (Măgura, Viperești, Mărunțișu), la unele mori, precum și la cîteva ferăstraie (cu precădere în lungul Buzăului) sau puțuri petrolifere (Fundu Sărății, Păcureți, Apostolache). Cu timpul, și mai ales după 1950, s-au dezvoltat unele ramuri pe seama valorificării resurselor locale. Dintre acestea, industria alimentară constituie ramura cea mai importantă și deține 36,5% din valoarea producției globale a industriei. În cadrul acesteia sînt dezvoltate în special subramurile care valorifică materia primă locală (morărit, panificație, vinuri și băuturi alcoolice etc.). În numeroase documente istorice din ultimele secole este menționat morăritul, cu o mare dezvoltare în lungul văii Buzăului și fabricarea rachiuului în ariile de specializare pomicolă. O atenție deosebită s-a acordat valorificării resurselor agricole locale prin crearea unor unități ale industriei conservării fructelor și legumelor (Pîrscov, Berca, etc.) sau de produse lactate, în special brînzeturi (Pătirlagele, Chiojdu, Beceni, Singeru, Bozioru, Posești, Drajna, Podenii Noi etc.) și numeroase centre de prelucrare a vinului (Pietroasa, Tohani, Izvoru Dulce etc.).

Industria energetică (17,5% din producția globală industrială) este reprezentată prin exploatarea de cărbuni, de țiței și gaze asociate. Centrele de exploatare a țițeiului se află la Berca, Piclele, Beciu, Arbănași, Plopeasa, Monteoru, Grăjdana, Tisău, Aricești, Zeletin etc., iar lignitul se exploatează la Ceptura și se folosește la centrale electrice și la calea ferată.

Industria textilă și a confecțiilor a ajuns să însumeze 14,0% din valoarea producției globale industriale. Ca unități de industrie textilă sînt de amintit Filatura de lînă corădată de la Pătirlagele și Filatura de lînă și fire tip lînă de la Beceni. Industria confecțiilor se înșerie cu unitățile de la Pătirlagele, Beceni, Berca, dar și cu numeroase unități ale cooperației meșteșugărești, răspindite aproape în toate localitățile mai importante (Chiojdu, Starchiojd, Șoimari, Breaza, Lopătari, Podenii Noi, Predeal Sărari, Calvini, Cătina, Cozieni etc.).

Industria materialelor de construcții este reprezentată prin numeroase unități pentru fabricarea materialelor liante (var) la Măgura, Drajna, Podenii Noi, Cătina, Viperești, Pîrscov, Pietroasa etc., a cărămizilor și blocurilor ceramice la Breaza, Măgura,

Industria de prelucrare a lemnului are o tradiție îndelungată. În această parte a

celui liceal. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în unități de cercetare legate de valorificarea superioară a resurselor agricole (Stațiunea de Cercetări Viticole Pietroasa, înființată în anul 1893, Stațiunea de Cercetări și Producție Pomicolă Buzău—Cindești, Centrul de Cercetări




Fig. 102. Subunitățile de relief ale Subcarpaților Buzăului.

Subcarpaților sînt fabrici de cherestea (la Vernești, Lopătari, Brăești, Bozioru, Pătlagele, Calvinii etc.) și de mobilier (la Vernești, Starchiojd, Posești, Berca etc.). Pe lîngă întreprinderile menționate mai sînt și alte unități industriale din domeniul construcțiilor de mașini, pielăriei, încălțămîntei care satisfac mai mult necesitățile populației locale.

Rețeaua de învățămînt din Subcarpații Buzăului este reprezentată de 580 de unități, din care 225 aparțin învățămîntului preșcolar, 352 celui primar și gimnazial și trei

Sericicole Cislău) de ameliorare a terenurilor degradate (Stațiunea de Cercetări pentru Combateră Eroziunii Aldeni) și de cunoaștere globală a mediului (Stațiunea de Cercetări Geografice Pătirlagele).

Trăsăturile fizico-geografice și modul în care sînt utilizate resursele naturale în Subcarpații Buzăului permit diferențierea mai multor subunități geografice (fig. 102).

Culoarul văii Buzăului reprezintă axa principală de convergență a regiunii, situată pe o arie de afundare axială a cutelor, un culoar tectonic rezultat prin

scufundarea fundamentului cristalin în lungul unei fracturi transversale (M. Socolescu și colab., 1975). În lungul văii există o alternanță de sectoare transversale și diagonale, puse în evidență prin existența unor largiri cu aspect de depresiuni alungite (în general deluroase, dar unele cu vatra constituită din glacisuri de acumulare, conuri de dejecție și terase) și a unor îngustări cu versanți instabili.

Între Valea Lupului și Cislău, valea Buzăului străbate depresiunile Pătirlagele și Cislău, având un caracter diagonal. Între ieșirea din Depresiunea Cislău și Ciuta este un sector de vale îngustă, orientată sud-vest—nord-est, perpendicular pe principalele structuri. În continuare, până în Depresiunea Pîrscov, valea își schimbă din nou direcția, având un caracter diagonal. Între Pîrscov și Berca valea are un caracter transversal, pentru ca la ieșirea din Subcarpații să intersecteze oblic principalele structuri. Buzăul reprezintă nivelul de bază local, în funcție de care s-a desfășurat evoluția geomorfologică a regiunii. Valea canalizează, în lungul ei, circulația maselor de aer. În lungul văii sunt situate și principalele artere de circulație: drumul național Buzău—Brașov și calea ferată Buzău—Nehoiășu, afectate adesea de inundații și de alunecări. Localitățile Pătirlagele, Cislău, Pîrscov, Berca din depresiunile cu același nume sunt centre economice cu o industrie care asigură prelucrarea materiilor prime în special din Subcarpații Buzăului, reprezentând centre de convergență puternice pentru satele din jur (fig. 102).

Dealurile Istriței, situate la sud de șirul de depresiuni Podeni, Singeru și Nișcov, au un relief conform cu structura geologică, dominat de Măsiul Istriței (750 m), alcătuit din calcare și gresii sarmatiene. Aceste dealuri cu expoziție sudică sunt caracterizate prin condiții naturale favorabile culturii viței de vie. Pe flancul sudic al lor, la obârșia bazinelor hidrografice au fost sculptate depresiunile Sărata, Vispești, Fințești, Scheia și Călugăreni. Condițiile climatice favorabile și existența calcarelor au favorizat dezvoltarea unor elemente floristice și faunistice termofile.

Plantațiile de vii (cunoscute, se pare, încă din vremea geto-dacilor) se desfășoară sub forma unei benzi continue pe fațada însorită a Subcarpaților între Ceptura—Tohani—Pietroasa—Gura Sărății—Merei—Săseni. În legătură cu această utilizare predominantă

a terenurilor s-au dezvoltat și centre de prelucrare a strugurilor la Pietroasa și Tohani. La Sărata Monteoru — în prezent stațiune balneoclimaterică — au fost făcute descoperiri arheologice începând cu epoca bronzului (Cultura Monteoru), iar la Pietroasa au fost puse în evidență urmele unui castru roman.

Partea superioară a dealurilor și versanții nordici sunt în mare parte împăduriți.

Dealurile și depresiunile Salciei și Lapoșului, situate între Buzău, Bîsca Chiojdului și Teleajen, corespund unei îmbinări complexe între culmi subcarpatice cu înălțime medie, dezvoltate pe anticlinale și depresiuni ramificate în lungul principalelor văi tributare Cricovului Sărat. Este o regiune puternic umanizată cu localități specializate în cultura pomilor fructiferi și creșterea animalelor (Salcia, Șoimari, Surani, Lapoș) (fig. 102).

Unele depresiuni, cum este Depresiunea Cislău, sunt largi, cu o adâncime a fragmentării redusă și terase extinse, utilizate pentru culturi de cîmp și pomi fructiferi. În depresiunile Singer și Nișcov adâncimea fragmentării reliefului este mai mare, iar utilizarea terenului mai diversificată în funcție de particularitățile reliefului. În depresiunile Nișcovului și Lapoșului, dezvoltate în lungul unor sinclinale largi, a fost pusă în evidență o treaptă de relief care dovedește existența unei transgresiuni în cuaternarul mediu (L. Badea și colab., 1980).

Dealurile Priporului și Cetății corespund reliefului complex dezvoltat pe pînteni de fliș paleogen și pe cuvele cu depozite miocene dintre aceștia. Dealurile Priporului (823 m) și Cetățuii (710 m), dezvoltate pe fliș, sunt în cea mai mare parte împădurite, avînd și suprafețe restrînse utilizate ca pășuni și fînețe. Depresiunea Drajna—Chiojd, dintre cei doi pînteni, este caracterizată printr-un relief domol, acoperit în cea mai mare parte de livezi, fînețe și pășuni. Activitățile agricole, bazate pe creșterea animalelor și cultura pomilor fructiferi se îmbină cu exploatarea lemnului și utilizarea pășunilor din Munții Buzăului.

Dealurile Cornetului (827 m) sunt reprezentate printr-o culme prelungă, predominant împădurită, alcătuită din depozite de fliș paleogen, depozite miocene și pietrișuri de Cîndești. Sunt fragmentate de o rețea deasă de văi secundare, în lungul cărora, pe unele deluvii, parțial fixate, se întîlnesc livezi și pășuni.




Fig. 103. Relief structural și de pornituri în Dealul Blidișel (foto D. Bălceanu).

Dealurile Blidișel—Dîlma sînt situate între Buzău și Sărățel și sînt reprezentate prin culmile Blidișel, Breazu, Bocu, Dîlma și Ursoaia, dezvoltate, în cea mai mare parte, pe formațiuni conglomeratice și grezoase și prin depresiunile Văvălușele — Brăești, Trestia — Odăile, Ghiocari, Plopeasa, corespunzătoare unor sinclinale largi, umplute cu depozite de molasă predominant argiloase (fig. 103).

Localitățile principale Brăești, Bălănești, Bozioru, Odăile, atestate, în parte, din secolele XVI și XVII sînt localizate în depresiuni, în lungul văilor principale, iar satele mai mici sînt situate pe versanți, la obîrșia unor văi secundare, afectate de alunecări. Activitățile economice sînt legate de creșterea animalelor pe baza pășunilor și a fînețelor naturale și de cultura pomilor fructiferi, în special a prunului. Culturile de cîmp sînt slab reprezentate, datorită condițiilor naturale specifice, consumul populației în astfel de produse fiind acoperit cu

producție realizată pe terenurile deținute în cîmp.

Dealurile și depresiunile Piclelor, situate între Sărățel și Slănic, corespund reliefului dezvoltat pe structuri pliocene de cîte largi puțin faliat și decroșate. În cuprinsul lor predomină depresiunile deluroase, puternic degradate prin eroziune și alunecări (Depresiunea Niculești, Depresiunea Policiori — Grabicina), dezvoltate pe sinclinale și butoniera Berca—Arbănași, în care sînt localizate platourile cu vulcani noroioși de la Piclele Mari și Piclele Mici.

În depresiunea Berca—Arbănași se exploatează țițeiul încă din secolul XIX.

Terenurile sînt utilizate predominant ca pășuni, fînețe și livezi. Versanții sînt afectați de procese intense de alunecare și de eroziune, pentru a căror frînare s-au efectuat lucrări complexe de îmbunătățiri funciare. Pe viitor trebuie acordată o atenție deosebită extinderii pe versanți a livezilor prin efectuarea

unor lucrări de terasare și împăduririi terenurilor puternic degradate.

4.2.2.4. Subcarpații Vrancei

Subcarpații Vrancei (situați între Trotuș și Slănicul Buzăului) întrușchipează foarte clar noțiunea de *Subcarpați* în conținutul ei geografic. Complexitatea lor structurală, alinierea aproximativ paralelă a dealurilor și depresiunilor cu munții, mobilitatea apreciabilă a versanților, frecvențele procese foehnale, rețeaua hidrografică transversală, precum și particularitățile economiei locale, imprimă Subcarpaților Vrancei trăsături care-i definesc ca o diviziune evidentă a Subcarpaților de la Curbură.

Abruptul ce corespunde faliei marginale separă net munții acoperiți cu păduri de fag în amestec cu molid și brad din vest, de depresiunile subcarpatice în care alternează pădurile de fag și gorun cu terenuri agricole. La poalele acestui povirniș există un șir de sate așezate fie în văi, fie pe interfluvii, după particularitățile morfologice locale: Rotilești, Dragosloveni, Tulnici, Coza, Brădetu, Paltin, Nereju, Bahnele, Neculele, Bisoca, Lacurile. Contactul cu muntele este evident nu numai prin localizarea așezărilor, ci și prin aspectele economice pentru că satele sînt subcarpatice, însă viața lor economică este legată în mare măsură de munte.

Spre est limita geografică a Subcarpaților Vrancei nu mai este tot atît de netă ca cea din vest, pentru că aici nu mai este o schimbare tranșantă geografică, geomorfologică, climatică, biogeografică, ci o trecere gradată către cîmpia piemontană. Relieful unităților aflate în contact nu mai este diferențiat într-atît încît să imprime și celorlalte componente ale peisajului deosebiri nete. Trecerea de la glacisul subcarpatic la cîmpia piemontană a Rîmnicului se face gradat, subliniat poate cel mai bine de trecerea de la pădurile cu gorun în amestec cu elemente termofile (specifice arealelor cu influențe foehnale) ce aparțin domeniului dealurilor, la pajistile puternic modificate, cu pîlcuri de arțar tătăresc și stejar brumăriu în care predomină terenurile agricole. Trebuie subliniat faptul că în decursul ultimului secol culturile viticole, specifice laturii externe a Subcarpaților, s-au întins încetul cu încetul spre cîmpia piemontană, acolo unde sînt localizate cele mai multe din așezările cu funcții viticole. Aceste așezări, deși situate în cîmpia piemontană, pot fi considerate

totuși, în mare măsură, prin funcțiile dominante, ca avînd caractere subcarpatice. Ele formează un șir care subliniază marginea estică a Subcarpaților Vrancei (Panciu, Țițești, Jariștea, Odobești, Faraoanele, Cotești, Timboești și altele).

Spre nord Subcarpații Vrancei domină Depresiunea Cașinului (dincolo de înălțimile Tiharele 657 m și Oușoru 753 m) și Culuarul Trotușului, iar spre sud-vest, Slănicul Buzăului îi separă de Subcarpații Buzăului.

Această subunitate a Subcarpaților de la Curbură are un caracter de tranziție (subliniat de V. Mihăilescu, 1966 și H. Grumăzescu, 1973) pe direcția nord-sud, între Subcarpații Moldovei și cei ai Munteniei Centrale și pe direcția vest-est între Carpați și Cîmpia piemontană a Rîmnicului.

În primul rînd caracterul de tranziție este pus în evidență prin alcătuirea geologică. La nord de Trotuș stilul structurii geologice este caracterizat de linii relativ simple care dau reliefului un caracter de omogenitate. La sud, odată cu complicarea liniilor tectonice (evidentă la sud de Mănăstirea Cașin) și depărtarea lor față de fruntea pinzei de șariaj a faciesului paleogen din Munții Vrancei, s-au creat premisele sculptării unui uluc depresionar subcarpatic format din bazine succesive (Soveja, Tulnici, Năruja, Bahnele, Jitia). Se constată că subunitățile de relief sînt puse în evidență de particularitățile tectonice majore: partea dinspre munte (la vest de linia faliei inverse Mănăstirea Cașin — Rotilești — Valea Sării — Jitia — Bisoca — Mînzălești) se înscrie pe o structură cutată, uneori o structură solzi (depresiunea subcarpatică și șirul de dealuri care o închid spre est), iar cea estică, dinspre cîmpie, pe o structură monoclină ce cuprinde seria concordantă sarmațian-pleistocen (fig. 104).

Aceste trăsături generale ale structurii geologice se transmit direct asupra modului de dispunere a subunităților de relief (șiruri alternative de dealuri și depresiuni subcarpatice), iar particularitățile litologice dau naștere unui relief de detaliu ce se înscrie în cadrul general printr-o mai mare amplitudine a reliefului creat prin eroziune diferențială și printr-o dinamică accentuată a proceselor geomorfologice actuale (A. Cioacă, 1985). Ulucul depresionar este format din Depresiunea Soveja, Depresiunea Vrancei și Depresiunea Neculele, prin care se face legătura cu valea Slănicului. Acolo unde ulucul depresionar subcarpatic este traversat de

rețeaua hidrografică (I. Donisă, 1957) au fost create mici depresiuni și largiri (ca cele de la Soveja, apoi de la Negrilești, Tulnici, Năruja, Nereju din Depresiunea Vrancei, Bahnele, Jitia, Bisoca din Depresiunea Nereju), ce se înscriu în cadrul unitar al ulucului subcarpatic (fig. 104). Înălțimile deluroase ce domină spre est culoarul de sub munte — *Tiharele* (657 m), *Oușoru* (753 m), *Răchitașu Mic* (892 m), *Dealul Lozii* (815 m),

(*Cîmpuri—Răcoasa*), uneori ramificate (*Vidra*), alteori ca o arie de largă concentrare hidrografică (*Mera*), sau evoluind prin dezvoltarea laterală a culoarelor depresionare către un început de uluc depresionar intracolinar (*Buda—Dumitrești—Poiana Cristei*). Trebuie remarcat că aceste depresiuni mai tinere sînt rezultatul unui complex de factori morfogenetici (eroziunea diferențială, influența dispunerii monoclinale a straturilor




Fig. 104. Profil complex prin Subcarpații Vrancei. 1, Eocen; 2, oligocen-miocen; 3, romanian; 4, pleistocen inferior (a), glaciis (b); 5, falii; 6, păduri; 7, pășuni și fînețe; 8, vii; 9, livezi; 10, culturi agricole; 11, cernoziomuri cambice; 12, soluri cenușii; 13, soluri brune luvice; 14, luvisoluri albice; 15, soluri brune; 16, soluri brune acide; 17, soluri brune podzolite; 18, lăcoviști; 19, regosoluri și erodisoluri.

Ghergheleu (849 m), *Răiut* (960 m), *Gîrbova* (979 m), *Dealul Roșu* (944 m) și *Dealurile Bisocăi* — se suprapun pe o structură pozitivă tăiată transversal de rețeaua hidrografică. Dacă aceste dealuri corespund unei structuri mai complicate decît la nord de Trotuș (C. Brînduș, 1981), ele se prelungește însă spre est printr-un monoclin reflectat în asimetria dealurilor din latura externă — *Mateiașu* (466 m), *Tarnița Mare* (481 m), *Măgura Odobești* (996 m), *Deleanu* (694 m), *Cotîfanu* (526 m), *Căpățîna* (524 m), *Hîrboca* (417 m). În cuprinsul acestui monoclin a fost sculptat un șir de depresiuni intracolinare care încep la nord cu mici depresiuni de obirșie (*Prălea*) și se continuă spre sud prin depresiuni cu aspect de culoar

și, nu în ultimul rînd, rolul proceselor geomorfologice în retragerea și evoluția versanților).

În mare măsură Subcarpații Vrancei se suprapun cu aria de maximă activitate tectonică și seismică a Curburii și în cuprinsul lor apar diferențieri între tendința de puternică înălțare a ulucului depresionar subcarpatic într-un ritm de +2,0 mm/an (printre cele mai ridicate din Subcarpați) față de numai +0,5 mm/an din latura lor externă (Mihaela Dinu, A. Cioacă, 1987). Faptul în sine conduce la ideea că, în aria ulucului depresionar subcarpatic, rețeaua hidrografică se adîncește mai mult, formînd îngustări ale văilor și versanți puternic înclinați, iar terasele suferă o deformare evidentă (terasele Putnei la Coza și Topești, ale Șușitei la Rotilești, ale Zăbalei la Nereju, ale Rîmnii-

cului la Jitia). În schimb, în aria depresiunilor intracolinare albiile sînt înecate în aluviuni, iar la periferie depozitele piemontane îmbracă dealurile (Mateiașu, Tarnița Mare, Măgura Odobești, Deleanu, Coțifanu, Căpățîna, Hirboca), accentuîndu-le aspectul de asimetrie, cu povîrnișurile repezi orientate spre vest.

Un rol aparte, cu implicații apreciabile în economia regiunii, îl are relieful de detaliu, datorat eroziunii torențiale și porniturilor de teren. Acestea sînt un efect al raportului dintre ritmul de înălțare al acestei regiuni subcarpatice și cel al adîncirii rețelei hidrografice, raport ce se menține dezechilibrat în condițiile unei labilități tectonice. Suprafețele degradate întinse sînt în bună parte rezultatul intensificării eroziunii verticale¹, dar stimulată de activitatea umană din ultimele secole. Arealele cu pornituri de teren ocupă versanții sculptați în marne și argile, precum și povîrnișurile frunților teraselor din depresiuni (Gr. Poșea și colab., 1974).

Această suprafață cu o declivitate variată, acoperită în bună parte cu păduri, dispune de un potențial energetic solar în medie de 120–122,5 kcal/cm² (Atlas R. S. România, planșa IV–1, 1972–1979). Alături de acest potențial, circulația atmosferică generală, în care componentele vestică și polară au o preponderență absolută, iar ciclonii mediteraneeni retrograzi mai activi la Curbură, reprezintă factorii genetici ce stabilesc caracterul climei din acest sector subcarpatic (N. Ion-Bordei, 1988). Nu se poate omite rolul de barieră al Carpaților, care obligă masele de aer umed din vest să-și escaladeze pentru ca apoi să coboare către Subcarpații Vrancei cu proprietăți noi — foehnale. De altfel, frecvența proceselor foehnale de aici face să se diminueze nebulozitatea, iar durata anuală a strălucirii Soarelui să ajungă la cele mai ridicate valori din toți Subcarpații: 2144,4 ore/an (Odobești).

În aceste condiții, regimul temperaturii aerului are valori medii anuale destul de

ridicate: 8–9°C în Depresiunea Vrancei (Tulnici 8,5°C) sau pot depăși chiar aceste valori în culoarul Rîmnucului, la sud de Buda și pe suprafața piemontană de sub Dealul Hirboca. Iarna valorile termice scad pînă la –2 și –3°C (ianuarie), ceva mai ridicate pe dealurile marginale (–1 și –2°C) și sub –3°C în Depresiunea Vrancei (Tulnici –3,4°C). Aici apar iarna inversiuni termice (dar cu o frecvență mai redusă), pe cînd în sezonul cald au loc puternice încălziri datorate fie vînturilor catabatice, fie pătrunderii maselor de aer tropical din sud, astfel că media lunii iulie ajunge pînă la 19°C (Tulnici 19,0°C) și chiar 21°C pe suprafața piemontului din sud-est.

Dintre ceilalți parametri climatici, mai reprezentativi pentru definirea caracterului climei Subcarpaților Vrancei sînt precipitațiile atmosferice și vînturile locale. Valoarea medie anuală a cantităților de apă ce au căzut pe aceste suprafețe oscilează între 650 mm (Tulnici), 680 mm (Soveja), legate de vecinătatea cu unitățile muntoase și sub 600 mm la Panciu (550 mm) și Odobești (590 mm), ca efect al foehnizării și subinfluența maselor de aer continental, în regim anticiclonal provenite din anticiclonele nord-uralian. Din analiza acestor parametri climatici rezultă existența unui climat de dealuri înalte, în care se pot deosebi două topoclimate complexe: cel al dealurilor și cel al depresiunilor de la curbura. Ca particularități de o însemnătate aparte pentru cultura viței de vie sînt frecvența proceselor foehnale și numărul mare de ore de insolație.

În depozitele groase de terasă și coluviodeluviale din ariile depresionare din partea vestică sînt acumulate ape freatice bogate. În general mineralizarea lor se menține între 200 și 500 mg/l, dominînd tipul carbonatat, însă prezența formațiunilor salifere modifică pe alocuri aceste valori ale mineralizării. De menționat mulțimea unor izvoare clorurate la Negrilești, Valea Sării, Vrîncioaia, Năruja ș.a., precum și a unor surse clorurate cu sulf și iod la Herăstrău.

Rețeaua hidrografică este predominant transversală, cu puține puncte de convergență hidrografică (Vidra, Mera) iar densitatea ei are valori relativ reduse: 0,45–0,65 km/km². Scurgerea apei se caracterizează printr-o puternică torențialitate, reflectînd particularitățile climatice (efecte ale ciclonilor retrograzi). Creșterile puternice ale nivelului apelor sînt amplificate de sectoarele îngustate ale albiilor Putnei, Zăbalei,

¹ Despăduriri iraționale s-au practicat și în alte regiuni montane și subcarpatice, dar acestea n-au avut ca efect amploarea degradărilor de aici. Acestea trebuie puse și pe seama rocilor, dar mai ales pe tendința riurilor de a compensa intensele mișcări de ridicare a scoarței, tendință ce duce la acumulări cantitative ale energiei proceselor de eroziune verticală, ce au ca rezultat salturi calitative în dinamica versanților. Acest fapt presupune o ciclicitate seculară, dar la o altă scară a degradărilor, respectiv la o extindere ciclică a suprafețelor degradate, ceea ce se petrece desigur în Subcarpații de la Curbură și cu precădere în cei ai Vrancei.

Milcovului și Rîmnicului și duc adesea la închiderea legăturilor depresiunilor cu exteriorul, „...silindu-i pe vrînceni să iasă numai pe drumuri de culme” (V. Tufescu, 1966). Regimul hidrologic pericarpatic de la curbura se caracterizează prin ape mari primăvara și viituri frecvente vîră. Rîurile au o alimentare superficială pluvio-nivală predominantă și subterană moderată.

Subcarpații Vrancei au renumele unei regiuni puternic despădurite dar șirul masivelor deluroase interne este într-o măsură apreciabilă acoperit cu păduri de fag și gorun (fig. 106). Pe culmile teșite sau pe podurile de terasă și chiar pe treimea inferioară a versanților, aceste păduri au fost înlocuite cu pajiști secundare. Dealurile înalte din est sînt acoperite, predominant, cu păduri de gorun (*Quercus petraea*), atît în partea superioară, cît și pe povîrnișul lor vestic mai abrupt. Către vest, versanții prelungi și domoli sînt ocupați, de la partea lor mediană în jos, de fișii înguste de pajiști secundare și mai ales de terenuri agricole ocupate de vii. Spre contactul cu cîmpia piemontană printre terenurile agricole apar resturi de păduri de stejar pedunculat, precum și pajiști stepice. Pe valea Sușitei se remarcă frecvența șleaurilor cu gorun, în structura cărora participă specii de carpen și tei. Arbuștii sînt de regulă numeroși, predominant fiind alunul, cornul, singurul și diverse specii de păducel.

În depresiunile în care aflorează breția sării apar „chelituri” (locuri albicioase lipsite de vegetație), pe marginea cărora se detașează specii edificatoare de plante halofile (*Festuca pseudovina* și *Cynodon dactylon*).

Sub presiunea antropică vegetația a cunoscut de-a lungul secolelor modificări importante, în compoziție și structură, dar pentru a conserva unele din peticele de pădure ce au importanță deosebită prin compoziția lor, în 1973 au fost declarate rezervații naturale pe plan județean pădurea Cénaru (cu exemplare de tișă) în sectoarele numite „Cénaru I” (150 ha) și „Cénaru II” (233 ha), pădurea seculară socotită zonă de protecție contra alunecărilor din perimetrul comunei Andreiașu de Jos, pădurea seculară Schitul Dălhăuți (188 ha) din moșia comunei Cîrligele precum și perimetrele de protecție ale unor rezervații geologice, ca : Focul Viu de la Andreiașu de Jos (12 ha), zidurile ciclopice din pădurea Scruntaru (125 ha), locul cap-

tării Zăbalei de către Putna la „Grumaz” (fig. 105).

În privința solurilor se constată predominarea argiluvisolurilor și cambisolurilor pe dealuri, iar în depresiuni și în lungul culoarelor de vale a solurilor neevoluuate sau trunchiate. Pe pantele domoale ale glacisului estic ce trece gradat către cîmpia piemontană, dar și pe interfluviile dintre Cîlnău și Slănic apar molisoluri pe depozite argiloase și loessoide.

Dintre argiluvisoluri, pe suprafețele cu o declivitate medie din părțile estică și centrală ale Subcarpaților Vrancei, sub pădurile de fag în amestec cu gorun, se găsesc soluri brune luvice, iar sub pădurile de fag, luvisoluri albice ce se extind și pe terenurile ocupate de pajiști ori pe suprafețele ușor vîlurite de la baza versanților, soluri utilizate pentru pajiști și livezi sau chiar pentru cultivarea unor plante industriale. În areale compacte din sudul și vestul regiunii formate mai ales pe marne, gresii și argile, se individualizează soluri brune eu-mezobazice, utilizate pentru pajiști sau livezi.

În partea inferioară a depresiunilor, pe depozite aluvio-proluviale, sub păduri de șleau cu gorun sau pe terenuri cu pajiști mezohidrofile se găsesc protosoluri aluviale (Valea Sușitei) și soluri aluviale. Din aceeași clasă de soluri neevoluuate se întîlnesc în depresiunile Mera, Vidra și Vrancea erodisoleni formate pe roci sedimentare neconsolidate (nisipuri slab cimentate), folosite pentru unele culturi agricole și pentru livezi (fig. 106).

În Subcarpații Vrancei se observă o schimbare gradată a învelișului vegetal de la pădurile de fag cu carpen din vest, la pădurile de gorun cu carpen din est, în care apar elemente termofile. În depresiuni, pajiștile secundare stepizate alternează cu terenuri agricole ce utilizează atît soluri neevoluuate, cît și soluri luvice și luvisoluri albice.

✕ Cadrul natural al Subcarpaților Vrancei a oferit încă de timpuriu posibilitatea apariției unor așezări omenești, cu precădere în depresiunile subcarpatice și pe piemontul ce face trecerea către Cîmpia piemontană a Rîmnicului (N. Al. Rădulescu, 1937). Săpăturile arheologice au scos la iveală dovezi materiale asupra populării încă de la sfîrșitul paleoliticului superior la Bîrsești și mai ales din neolitic la Bonțești, Mănăstioara—Fîtionestî, la Topești—Bîrsești, Cîrligele etc. Săpăturile de la Bîrsești,





Fig. 105. Confluența Putnei cu Zăbala „La Grumaz” (foto C. P. B.).

Bonțești, Țifești ș.a. indică practicarea unei agriculturi primitive (cu plugul) și a păstoritului, ocupații specifice culturii Monteoru din epoca bronzului. Din epoca fierului s-au descoperit urme la Odobești, Dumbrăveni, Pădureni etc. Din epoca romană au fost scoase la iveală fragmente ceramice la Virteșcoiu, Pădureni, Țifești care aparțin culturii Poienestii (sec. III d. Chr.), specifică aici carpiilor, populație cu o viață economică dezvoltată ce avea legături economice cu așezările romane de la Barboși și Șendreni de pe drumul roman care lega, prin văile Siretului și Trotușului, Dobrogea cu Transilvania.

Pentru secolele IV—X și ulterior, există urme mult mai numeroase care dovedesc dezvoltarea așezărilor omenești și ocupațiile populației: stațiunea arheologică Dragosloveni (comuna Dumbrăveni), săpăturile de la Faraoanele (tezaurul monetar de factură bizantină), Cîrligele, Urechești, Bordești, Dragosloveni etc.

De menționat că încă în secolul XV documentele vremii atestă specializarea viticolă a localităților Spărieți, Igești, Șoldești etc. și dau informații cu privire la „întăriile primite pentru dreapta credință” a dregătorilor scaunului domnesc asupra satelor Bătinești, Călimani, Șindrilari, Andreiașu, Voloșcani ș.a. Documentele cartografice din secolul XVIII (Harta lui Dimitrie Cantemir, aceea a lui Otzellowitz, a lui Specht, Obrist etc.) pun în evidență două categorii de așezări: unele care s-au dezvoltat pe loc datorită unei continue specializări economice, altele formate de populația venită din afara regiunii sau de cea care s-a deplasat în cadrul regiunii. Se disting astăzi câteva arii de concentrare a așezărilor: valea Putnei, unde satele s-au dezvoltat fie în lungul apelor mai mici (Tulnici, Birsești etc.), fie în mici depresiuni (Păulești, Spinești); valea Susiței (Soveja, Crimineț, Cimpuri, Mărăști, Răcoasa, Verdeja, Străoane, Repedea etc.), unde se remarcă tendința de a valorifica

Fig. 106. Utilizarea terenurilor în Subcarpații Vrancei. 1, Păduri; 2, pășuni și fânețe naturale; 3, vii; 4, livezi; 5, vetre de așezări; 6, drumuri; 7, căi ferate.



orice mică suprafață ce poate fi utilizată ca teren agricol; la sud de Milcov (Virteșcoiu, Olteni, Faraoanele, Dălhăuți, Blidarele, Cotești etc.), unde s-a extins mult cultura viței de vie. Alte sate s-au dezvoltat în lungul văilor Milcovului (Andreiașu, Mera etc.) și Zăbalei (Nereju, Năruja etc.), unde pădurile au fost defrișate și terenurile folosite ca pășune pentru creșterea animalelor. O categorie aparte de așezări o constituie cele apărute ca urmare a imigrațiilor de populație din alte părți ale țării: Dragosloveni și Rucăreni (din Dragoslavele și Rucărul Muscelului), Chiojdeni (format probabil din locuitori ce au venit din Chiojdu, din părțile Buzăului, ori din Chiojdeanca din Prahova), Vilcani (din Lopătari de pe valea Slănicului Buzăului) etc. Documentele atestă unele mișcări de populație legate de actul de danie din ianuarie 1801 al lui Constantin Ipsilanti către vistiernicul Iordache Ruset Roznoveanu a ținutului liber de secole al Vrancei (I. Diaconu, 1930). Din satele Nereju, Năruja, Nistorești pleacă un mare număr de locuitori, cei mai mulți stabilindu-se în localitățile Rîmnic, Rașca, Larga, Vulcăneasa, Faraoanele, Chiojdeni, Dălhăuți etc.

În ceea ce privește evoluția numerică a populației și repartitia ei teritorială se constată, din analiza datelor statistice, că există mari diferențieri în această privință în diferite perioade ale secolelor XIX și XX.

În perioada 1835—1912, când încep să se dezvolte anumite ramuri ale agriculturii, se remarcă un spor natural și migratoriu mai ridicat. În 1835 majoritatea satelor aveau sub 500 de locuitori, iar densitatea medie a populației era de 22 loc./km².

Dezvoltarea unor ramuri industriale (exploatarea și prelucrarea lemnului) și extinderea unor ramuri agricole (viticultura, pomicultura, creșterea animalelor etc.) către sfîrșitul secolului XIX au determinat o sporire continuă a populației, aceasta ajungînd în 1912 la 201 500 de locuitori. Mari sporuri le-a înregistrat populația așezărilor din bazinele Rîmnicului, Rîmnei și Milcovului (satele Jitia, Chiojdeni, Andreiașu de Jos, Poiana Cristei etc.), a căror populație s-a dublat. În satele de la limita cu Cîmpia piemontană a Rîmnicului (Urechești, Jariștea, Budești etc.), creșterea a fost și mai ridicată (între 35,0 și 45,0‰, față de circa 20,0‰ anual în bazinele Rîmnicului, Rîmnei și Milcovului). Sporuri mai mici de populație (11,4‰ în medie anual) s-au înregistrat în satele așezate pe dealurile dintre Rîmnic și Mil-

cov (Poienița, Dealul Lung, Petreanu, Mera etc.).


După 1912 populația continuă să crească, dar sporul mediu anual (7,8‰ între 1912 și 1977) nu atinge valorile din perioada 1835—1912. Astfel, între 1912 și 1977 creșterea totală a populației a fost de circa 102 700 de locuitori. O parte din locuitorii unor sate, cu suprafețe agricole limitate, au plecat definitiv în cîmpie în urma improprietărilor din 1921 și 1945.

În ultimele decenii populația s-a aglomerat mai ales în satele dinspre Cîmpia piemontană a Rîmnicului dintre Zăbrăuț și Rîmnic și în depresiunile Vrancei și Soveiei. În sectorul de contact dintre Subcarpați și cîmpie, unde s-a extins cultura viței de vie, s-a mărit numărul satelor cu o populație între 1 500 și 2 000 de locuitori (Bordești, Budești, Cîndești, Cotești, Urechești etc.), iar unele dintre sate au depășit 2 000 de locuitori (Popești, Movilița, Străoane etc.) (fig. 107). Pe areale largi densitatea populației este cuprinsă între 150 și 250 loc./km², iar în unele locuri între 250 și 500 loc./km². Sporul natural din depresiunile subcarpatice prezintă valori superioare mediei pe țară. În bazinul superior al Putnei satele au o populație medie între 500 și 1 000 de locuitori (Tulnici, Negriștea, Topești etc.), iar în al Șușiței (Dragosloveni, Rucăreni, Cîmpuri, Răcoasa etc.) între 1 000 și 1 500 de locuitori. În aceste locuri deși populația a crescut, întrucît satele sînt rare, densitatea are, totuși, valori mai reduse (20—40 loc./km² și 60—80 loc./km²). Dezvoltarea economiei forestiere a dus, printre altele, și la creșterea numărului de locuitori și a densității lor în anumite areale de pe cursul superior al Putnei, Zăbalei, Milcovului, Rîmnei și Rîmnicului, unde s-a înregistrat un spor mediu anual între 10,0 și 20,0‰.

Structura populației pe medii arată predominarea considerabilă a celei rurale (92,7%), majoritatea locuitorilor trăind în cele 303 sate și numai 7,3% în cele două orașe (Panciu, situat la contactul Subcarpaților cu Cîmpia piemontană a Rîmnicului, și Odobești, extins pe partea cea mai înaltă a Cîmpiei piemontane a Rîmnicului), care s-au dezvoltat în partea estică a Subcarpaților Vrancei.

Populația activă reprezintă 56,5% din populația totală. Cele mai ridicate valori le găsim în arealele specializate în cultura viței de vie (Cotești, Străoane, Virteșcoiu, Țițești, Movilița, Bordești, Urechești, Cîrligele,

Fig. 107. Unitățile de relief, mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Dealuri; 2, înșeuări; 3, depresiuni sau culoare de depresiune; 4, așezări cu funcție viticolă; 5, pomicolă și de creștere a animalelor; 6, pomi-viticolă și de creștere a animalelor; 7, agroindustrială; 8, industrial-agrară; 9, climaterică.



Jariștea etc.), precum și în comunele cu o economie agricolă mai dezvoltată din depresiunile intracolinare (Valea Sării, Cimpuri, Dumitrești, Răcoasa, Buda etc.). În partea dinspre munte populația activă are o pondere mai mare în comunele specializate în creșterea animalelor sau legate de muncile forestiere (Soveja, Birsești etc.).

Ocupația de bază a locuitorilor din Subcarpații Vrancei o constituie și azi, ca și în trecut, agricultura (61,1% din populația activă). În industrie lucrează 19,2% din totalul populației active, iar în construcții 5,5%. Sînt unele comune, ca cele profilate pe creșterea animalelor (Vrîncioaia, Birsești, Bisoca, Tulnici etc.), în cultura viței de vie (Țifești, Bordești, Timboești etc.), pe pomicultură și creșterea animalelor (Poiana Cristei, Gura Calitei, Vizantea—Livezi, Valea Sării, Cimpuri etc.), în care populația activă din agricultură depășește 80%. În schimb, în depresiunile subcarpatice (Năruja, Soveja) se înregistrează cele mai scăzute valori, fapt explicat prin absorbirea unei părți a populației active în exploatarea forestiere (fig. 107).

Dezvoltarea social-economică din trecut a Subcarpaților Vrancei nu a creat condiții pentru apariția în interiorul lor a unor centre urbane. Singurele așezări urbane sînt Panciu, amplasat pe terasele de la ieșirea Șușiței din Subcarpați, și Odobești, situat pe fișia de contact dintre Subcarpați și Cîmpia piemontană a Rîmnicului.

Așezările rurale au cunoscut, în dezvoltarea lor, trei căi de specializare economică care le conferă diferite funcții: predominant agricole, agricole și industriale, agricole și forestiere (fig. 107).

În cadrul primei categorii, în dealurile și depresiunile de lingă munte se deosebesc așezări rurale specializate în creșterea animalelor. Acestea se situează în lungul văilor, formînd lanțuri de gospodării pe mari distanțe, ce alcătuiesc vetre cu structură risipită (Coza, Nistorești, Jitia, Bisoca). În latura externă, mai ales pe versanții vestici, s-au dezvoltat așezări specializate în pomicultură, creșterea animalelor și cultura cerealelor (Dedulești, Buda, Arva, Șerbești ș.a.). Au o structură predominant răsfirată. Pe versantul estic al acestor dealuri și, în continuare, pe suprafața piemontului sînt așezări care s-au specializat în cultura viței de vie (Străoane, Satu Nou, Țifești, Movilița etc.). Acestea au o structură răsfirată cu tendințe de adunare. În piemontul dintre

Rîmnic și Cîlnău specificul așezărilor este dat de cultura cerealelor și creșterea animalelor (Zăplazi, Homești, Petrișoru ș.a.).

Așezările rurale cu funcții agricole și industriale au un nivel de viață mai ridicat, apropiindu-se, ca aspect, de centrele urbane mici (Cotești, Urechești, Budești etc.).

Celelalte așezări, în care creșterea animalelor se împletește cu activități legate de exploatarea forestiere, sînt localizate în aria de contact a Subcarpaților cu munții, unde predomină pășunile naturale, pe baza cărora s-a dezvoltat creșterea animalelor (Tulnici, Soveja, Nistorești, Năruja, Jitia, Bisoca ș.a.).

În trecut, industria din Subcarpații Vrancei era aproape inexistentă. În anul 1938 în afara cîtorva unități legate de prelucrarea primară a fructelor și strugurilor (o distilerie de spirt la Odobești și de rachiu la Panciu), existau doar mici ateliere pentru prelucrarea lemnului.

Pe lingă acestea, în anii din perioada postbelică, s-au construit unele unități industriale mai ales din ramura industriei alimentare și industriei de prelucrare a lemnului, care prelucrază materiile prime locale agricole și lemnul. Astfel, industria vinurilor, localizată în mijlocul podgoriilor vrîncene, cuprinde întreprinderi de prelucrare și îmbuteliere la Odobești, Panciu și Cotești și centre de vinificație la Faraonele, Cotești, Urechești, Budești. Legumele, fructele și strugurii se conservă la centrele de la Gugești, Odobești și Panciu, laptele se prelucrază la Panciu (telemea, produse proaspete, brînză de Moldova), Cimpuri (telemea și brînză de Moldova), Dumitrești (caș) etc.

Exploatarea și prelucrarea lemnului s-au dezvoltat pe seama suprafețelor întinse de păduri din bazinele Șușiței, Putnei, Milcovului, Rîmnei etc. Dintre unitățile de prelucrare cele mai reprezentative sînt cele de la Soveja, Tulnici, Nistorești, Nereju, Vidra, Mera, Dumitrești etc., care produc cherestea, parchete, lăzi, traverse, lemn de construcții, lemn de mină etc. De asemenea, extinderea fabricii de cherestea, parchet, panel, furnir de la Gugești (situată pe piemontul dintre Rîmna și Milcov) se inserie pe linia valorificării superioare a masei lemnoase extrasă din bazinele Rîmnei și Rîmnicului.

Deosebiri climatice (sînt evidente trei subzone ale climatului de dealuri), pedologice (principalele clase și tipuri de sol imprimă unele trăsături specifice în repartitia ramurilor agricole) și de relief (în principal

Fig. 108. Utilizarea terenurilor în împrejurimile localității Panciu. 1, Vii; 2, fermă viticolă; 3, stațiune viticolă; 4, livezi; 5, pășuni; 6, teren arabil; 7, construcții; 8, drumuri modernizate; 9, drumuri ne-modernizate; 10, căi ferate.




Fig. 109. Podgoria Panciu de pe latura estică a Subcarpaților Vrancei (foto C. P. B.).




Fig. 110. Crama de la Odobești (foto C. P. B.)

declivitatea și expunerea versanților) au impus două direcții principale de dezvoltare a economiei agricole. Astfel, în depresiunile subcarpatice și Subcarpații interni s-a dezvoltat de timpuriu creșterea animalelor, pe cînd în Subcarpații externi, depresiunile intracolinare și piemontul estic s-au dezvoltat, îndeosebi, pomicultura și viticultura.

Viticultura, practică din timpuri străvechi, reprezintă principala ramură a agriculturii din partea estică a Subcarpaților Vrancei. Viile se extind azi mai mult pe Cîmpia piemontană a Rîmnicului decît pe dealuri¹, ocupînd circa 27 600 ha (peste 9% din suprafața cultivată cu viță de vie din România). În ultimele decenii s-au rea-

lizat importante lucrări de amenajare a teritoriului și s-au plantat cele mai propice soiuri pentru condițiile pedoclimatice de aici. În fișia piemontană viile ocupă în medie între 30 și 40% din terenul agricol (Movilița, Străoane, Bolotești, Țifești etc.), iar în unele locuri ocupă 40—60% (Panciu, Odobești, Gura Calitei etc.) și chiar peste 60% (Cîrligele, Vîrteșcoiu, Ruginești etc.). În funcție de specificul cadrului natural, de extinderea suprafețelor, de cantitatea și calitatea produselor viticole se pot delimita mai multe podgorii, dintre care reprezentativă, pentru Subcarpații Vrancei, este *Podgoria Panciu*, care cuprinde localitățile Panciu, Străoane, Țifești, Movilița și Fîtionuș. Aceasta ocupă o suprafață de peste 7 500 ha și se întinde pe dealurile Chlcera, Boul Roșu, Curături, Ciolanu, Costin, Trotușanu din piemontul terasat. Este renumită în producția de struguri pentru

¹ Intruct cele mai multe localități din cadrul podgoriilor își au vatra în cîmpia piemontană, iar moșla se extinde și pe dealurile subcarpatice, podgoriile sînt prezentate în ansamblul lor fără a se face diferențieri în funcție de treapta de relief pe care se află.

masă (30% din total) (fig. 108, 109). Celelalte podgorii (*Odobesti* cu circa 6 200 ha, *Cotești* cu 7 000 ha și *Rîmnic* cu peste 3 000 ha) sînt situate mai mult în Cîmpia piemontană.

Podgoria Odobesti, cu suprafața de circa 6 200 ha, se întinde pe teritoriul localităților Odobesti, Virteșcoiu, Jariștea, Broșteni, Bolotești etc. Este profilată pe soiuri de struguri pentru vinuri (Galbena de Odobesti, Fetească Albă, Risling italian). Numai 10% din producție îi reprezintă strugurii pentru masă (fig. 110).

Podgoria Cotești este amplasată într-o regiune cu condiții pedoclimatice favorabile cultivării soiurilor destinate îndeosebi producției de vinuri (în special roșii). Se extinde pe o suprafață de 7 000 ha pe teritoriul localităților Cotești, Cîrligele și Urechești. Existența Combinatului viticol la Cotești, în mijlocul acestei podgorii, a stimulat extinderea ei.

Podgoria Rîmnului, care este cea mai mică (circa 3 000 ha), se desfășoară pe teritoriul localităților Bordești, Timboești, Podgoria, Topliceni. Se cultivă mai mult soiuri de struguri pentru producerea de vinuri (93%).

În depresiunile intracolinare din Subcarpații Vrancei și pe versanții terasați ai dealurilor, cu excepția arealelor cu soluri acide ori cu relief accidentat, sînt plantați pomi fructiferi. În acest sens se pot delimita unele bazine pomicole, ca de exemplu bazinele pomicol al Șușiței, care se extinde pe raza comunelor Soveja, Cîmpuri, Răcoasa etc., bazinele pomicol al Putnei, care cuprinde unele terenuri din depresiunile subcarpatice (Vrancea) pînă la cele intracolinare (Vizantea, Vidra etc.) și bazinele pomicol al Rîmnului și Rîmnei, care include localitățile Chiojdieni, Dumitrești, Buda, Dedulești, Băbeni, Răducești, Poiana Cristei, Gura Calitei. În toate aceste bazine este predominant prunul după care urmează mărul sau nucul. Principalele centre de prelucrare a fructelor din Subcarpații Vrancei sînt: Panciu, Vidra și Dumitrești.

O ramură a agriculturii, cu vechi tradiții în Subcarpații Vrancei, este creșterea animalelor, care a beneficiat întotdeauna de pășuni și fînețe naturale întinse (circa 85 700 ha), la care în deceniile din urmă s-au adăugat aproape 25 000 ha cultivate cu plante de nutreț. Se cresc îndeosebi oi și cornute mari, a căror densitate la 100 ha teren agricol

este superioară mediei pe țară. Creșterea animalelor este una din ramurile economice care aduce importante venituri unei mari părți din populația Subcarpaților Vrancei (I. Velcea și colab., 1964).

În general, căile de comunicație urmăresc văile și converg către Focșani. Numai în sud, drumurile din lungul Rîmnului și Slănicului se îndreaptă spre Rîmnicu Sărat și Buzău. Singura legătură transcarpatică urmărește valea Putnei și apoi trece peste pasul Mușat către Tîrgu Secuiesc în Depresiunea Brașovului (DN 2D). Așezările de la contactul Subcarpaților cu Cîmpia piemontană a Rîmnului sînt favorizate de existența căii rutiere DN2 și a celei feroviare din lungul Culoarului Siretului și al Cîmpiei piemontane, către care drumuri secundare le asigură o legătură lesnicioasă.

Deși unitar, spațiul geografic al Subcarpaților Vrancei prezintă totuși diferențieri ce decurg din varietatea peisajelor naturale, a gradului de antropizare și al activităților economice, care întrunesc în diferite zone caractere comune și definesc subunități foarte clar individualizate.

1. **Ulucul depresiunilor subcarpatice**, avînd în întregime un aspect deluros, cuprinde depresiunile mici și relativ izolate (Soveja, Bisoca—Neculele) și depresiunea mai întinsă, dar foarte compartimentată a Vrancei.

Depresiunea Soveja, situată pe cursul superior al Șușiței, are un relief deluros, dominat la vest de Zboina Neagră, iar la est de dealurile Răchitașul Mic și Răchitașul Mare, acoperite cu păduri de fag și gorun. Podurile de terasă au oferit suprafețe favorabile agriculturii și așezărilor omenești care s-au dezvoltat aici din timpuri străvechi. Legăturile cu exteriorul se fac cu precădere în lungul Șușiței, prin „poarta” Cîmpurilor, pe unde se transportă, spre Panciu, materialul lemnos și produsele livezilor de la Soveja, Cîmpuri, Răcoasa etc., dar și spre Brașov, peste pasul Mușat prin stațiunea Soveja (fig. 111).

Depresiunea Vrancei, situată între munții Coza, Verdele, Pietrosul etc. în vest și dealurile Răchitașul Mic, Gherghelou, Teiuș, Răiut, Tojanu etc. în est, se prezintă sub forma unui culoar cu o lungime de 35 km pe direcția nord—sud (fig. 107). Este fragmentată de cursurile longitudinale ale Putnei și Zăbalei și de cel transversal al Nărujei, astfel că în cuprinsul ei se pot distinge mai multe lărgiri locale: Negrilești, Tulnici,

Birsești, Vrincioaia, Năruja, Nerej etc. (fig. 112). Legăturile acestei depresiuni („inima” Țării Vrancei) cu exteriorul se fac fie în lungul văii Putnei prin „poarta” de la Prisaca, fie prin șaua de la Reghiu, către valea Milcovului, sau prin pasul Mușat către Depresiunea Brașovului. În subsol se găsește sare care aflorează la Valea Sării, Vrincioaia, Năruja, Andreiașu de Jos, Herăstrău (unde se găsește și izvoare minerale clorurate, dar și cu iod și sulf, utilizate balnear pe plan local). Interfluviile dintre micile depresiuni cu înălțimi de peste 800 m, numite aici „măguri”, sunt acoperite de pășuni și finețe naturale și numai pe alocuri cu păduri de fag și gorun. Terasale din lungul Putnei și Zăbalei, numite local „poduri”, sunt folosite ca teren arabil și cultivate cu porumb. O parte din terenuri sunt degradate, iar suprafețele pentru culturi agricole sunt puține. Ca urmare, încă din secolul trecut, o parte din populație a primit terenuri în lunca

Siretului, care sunt deținute și azi de locuitorii Depresiunii Vrancei (circa 1 350 ha în comunele Garoafa, Cîmpineanca, Golești etc.). Suprafețele întinse cu pășuni și finețe naturale au favorizat dezvoltarea creșterii animalelor, iar pădurile, ocupații legate de economia forestieră.

Depresiunea Bisoca — *Neculele* este situată la extremitatea sudică a ulucului subcarpatic, între înălțimile Monteorului, Furului Mare, Furului Mic, în vest, și Dealurile Gurbăneșei, Dealul Roșu etc., în est. Cu Depresiunea Vrancei comunică prin curmătura Dealului Negru, iar cu Depresiunea Lopătari prin culoarul Bisocăi. Legătura cu depresiunile intracolinare se face prin valea Rîmnicului. Ca și în Depresiunea Vrancei, suprafețele ocupate de pășuni și finețe naturale au favorizat creșterea animalelor, în special a ovinelor, iar pădurile din vecinătate au oferit masa lemnoasă (fag, stejar, rășinoase) care se prelucerează la Gugești.




Fig. 111. Casa lui Moș Ion Roată din Cîmpuri — Vrancea (foto C. P. B.).

2. Dealurile subcarpatice se înscriu în peisaj prin culmi proeminente, împădurite cu fag și gorun pînă sus (*Răchitașu Mic* 892 m; *Dealul Lozii* 815 m; *Ghergheleu* 849 m; *Răiuf* 960 m; *Gîrbova* 979 m; *Dealul Roșu* 944 m; *Dealurile Bisocăi*). Aceste

cît și către est, printre dealurile externe Zăbrăuț, Măgura Odobești, Deleanu, Coțifanu, Căpățina. Aproape toate aceste depresiuni se caracterizează printr-un relief de glacisuri și terase, cu versanți în care eroziunea și procesele geomorfologice actuale au




Fig. 112. Valea Putnei la Tulnici (foto C. P. B.).

dealuri corespund formațiunilor grezoase din seria de Brebu și sînt separate de sectoarele înguste ale văilor Șușitei, Putnei, Milcovului și Rîmnicului Sărat (fig. 107).

3. Depresiunile intracolinare au în general dimensiuni reduse și sînt în diferite stadii de dezvoltare: *Pralea* (depresiune de obirșie), *Răcoasa*, *Vidra*, *Mera* (depresiuni dezvoltate pe largiri ale văilor Șușitei, Putnei, Milcovului) și *Poiana Cristei—Dumitrești—Buda*, un adevărat uluc depresionar intracolar. Culoarele văilor permit legătura atît către vest, printre dealurile Răchitașu Mic, Ghergheleu, Răiuf, Gurbăneasa, Bisoca,

creat fie un aspect de badlands (mai ales în cazul strătelor așezate în hogback și al formațiunilor din breția sării), fie alunecări și curgeri noroioase îndeosebi pe versanții văilor Rîmnicului, Rîmnei și Milcovului.

Aceste depresiuni constituie o arie de străveche populare (așezări atestate din secolele XV și XVI), terasele întinse oferind terenuri agricole favorabile culturilor de cîmp, iar pantele dealurilor pentru livezi de pomi (în care predomină prunul, nucul și mărul). O parte din forța de muncă lucrează la exploatarea forestieră, iar alta, mai numeroasă, în podgoriile vecine.

4. Dealurile externe și piemontul cuprind două tipuri de peisaje geografice: unul deluros, cu mase padoase de gorun corespunzând părții vestice, cu formațiuni villafranchiene, și altul, al versanților prelungi din est, cu fișii de pajiști secundare și terenuri agricole, ocupate, în cea mai mare parte, de vii, între care se inseriu și pileuri de păduri de stejar pedunculat ori pajiști stepice. Areaul piemontan a oferit premisele dezvoltării viticulturii, condițiile pedoclimatice fiind printre cele mai favorabile (aici se înregistrează cel mai mare număr de ore de strălucire a Soarelui ca urmare a proceselor de foehnizare). Este cea mai populată zonă a *Subcarpaților Vrancei* (între 150—250 loc./km² și 250—500 loc./km²).

Pe terasele Șușitei, la ieșirea din Subcarpați, a apărut ca tîrg în secolul XIX orașul Panciu. După construirea, în 1902, a căii ferate Mărășești—Panciu devine locul principal de colectare și distribuire a produselor marii podgorii în mijlocul căreia se află (fig. 108) și se intensifică transportul materialului lemnos din bazinul Șușitei către Focșani, Galați etc. Distrus în cursul luptelor din primul război mondial, a fost refăcut, apoi distrus parțial de seismul din 10 noiembrie 1940 și de luptele din cel de-al doilea război mondial. A fost apoi refăcut complet și extins spre Cîmpia piemontană a Rîmniceului. Activitatea principală a orașului este legată de valorificarea și industrializarea produselor viticole. Face parte dintre orașele mici ale țării, cu numai 10 005 de locuitori (1992).

4.2.3. Subcarpații Moldovei

4.2.3.1. Caracterile generale

Desfășurați de la nord la sud pe aproximativ 160 km, Subcarpații Moldovei ocupă o suprafață de 5 000 km² și prezintă aspecte din cele mai tipice pentru întreaga regiune subcarpatică, dar și aspecte specifice. Astfel, existența unui uluc depresionar, suprapus unor sinclinoii și mărginit de culmi înalte anticlinale, corespunde întru totul imaginii Subcarpaților tipici. În Subcarpații Neamțului, însă, Depresiunea Cracău—Bistrița este închisă prin dealuri izolate, acoperite de depozite sarmațiene aproape orizontale, care se suprapun peste miocenul cutat.

În general, se poate aprecia că în Subcarpații Moldovei se manifestă o tendință de

simplificare structural-morfologică în raport cu toate celelalte diviziuni ale Subcarpaților. Aceasta a depins, în bună parte, de particularitățile evoluției paleogeografice, în primul rînd de timpul și modul de acumulare a sedimentelor de molasă, apoi de timpul și felul în care acestea au fost afectate de mișcările orogenice și, în ultimă instanță, de durata modelării subaerene. La nord de Trotuș sedimentarea a încetat încă din sarmațian, și anume din kersonian între Trotuș și Bistrița, din basarabian între Bistrița și Moldova și din volhinian la nord de Moldova. Începînd de la sud de Trotuș, însă, în toată regiunea subcarpatică, sedimentarea a continuat pînă în villafranchian. Așa se face că Subcarpații Moldovei sînt alcătuiți din sedimente mai vechi decît pliocenul. La nord de Bistrița fișia de miocen cutat se îngustează treptat, încît dincolo de valea Moldovei se reduce la o fișie de 1—3 km și aceasta acoperită de sarmațianul necutat.

Se știe că regiunea subcarpatică a fost afectată de cele mai noi cutări, dar se pare că valul cutărilor s-a propagat și de la nord la sud, nu numai de la vest la est. Astfel, la nord de Moldova, peste miocenul cutat repauzează sedimente volhiniane nederanjate tectonic, mai mult, chiar baza volhinianului este prinsă sub revărsarea saliferului cutat, iar pe acesta se sprijină restul volhinianului, nederanjat. De la valea Moldovei pînă la sud de valea Bistriței, același fenomen se produce cu sedimentele basarabiene (I. Băncilă, E. Hristescu, 1963), pentru ca la sud de Trotuș să apară cutate depozitele pliocene și să fie deranjate, pe alocuri, chiar cele villafranchiene. Rezultă, deci, că la nord de valea Moldovei sedimentarul miocen a fost cutat de mișcările moldavice din volhinian, între Moldova și Bistrița au acționat și mișcările attice, din basarabian, iar la sud de Trotuș s-au manifestat din plin chiar cutările valahice. Cum cutările au fost însoțite de o înălțare accentuată, a avut loc restrîngerea treptată a ariei de acumulare, de la nord spre sud, ceea ce explică de ce Subcarpații Moldovei sînt alcătuiți, în ansamblu, din roci mai vechi decît Subcarpații de la Curbură.

Gama de resurse ale subsolului se inscrie, în linii generale, în categoriile de resurse comune Subcarpaților — petrol, gaze naturale, săruri, gips. Petrolul este cantonat în structurile din jumătatea sudică a Subcarpaților Moldovei, fie în axa sinclinoiului (la

Cîmpeni, Tețcani și Cașin), fie în lungul contactului cu flișul carpatic (la Tazlău, Frumoasa, Cucuieți, Mihoc, Foale—Moi-nești și Fierăstrău). La nord de valea Bistriței se cunosc numai zăcămintele de gaze naturale la contactul cu Podișul Moldovei (la Mărgineni, Țuțcani din Deal ș.a.). Structurile sînt mult mai puțin productive decît în Subcarpații Prahovei sau în Subcarpații Getici, unele zăcămintele s-au și epuizat, astfel că în prezent predomină producția de gaze naturale, obținută din zăcămintele mai recent descoperite. Ținînd seama de lipsa zăcămintelor de cărbuni, apare evidentă necesitatea suplimentării resurselor energetice ale acestei regiuni cu combustibili din Carpații Orientali, cu care se află în strînse relații de producție (cărbuni din Depresiunea Comănești, petrol din bazinul superior al Tazlăului Sarat), și din Podișul Transilvaniei (gaze naturale din domul Nadeș).

Mult mai bogate sînt resursele de sare gemă, cărcia în ultimii ani li s-au adăugat rezervele nou descoperite de săruri de potasiu, de la Tazlău, Roduri, Gălean ș.a., toate la contactul Subcarpaților cu flișul Carpaților Orientali. Exploatarea sării se face la Tîrgu Ocna (circa 365 000 t în 1989), de unde cea mai mare parte se transportă prin sale-duct spre unitățile industriei de produse clorosodice de la Borzești. Depozite vaste de marno-argile miocene și luturi loessoide cuaternare stau la dispoziția industriei materialelor de construcție în aproape toată aria subcarpatică, în trecut ele prilejuind largă răspîndire a unui artizanat al olăritului, prezent și astăzi în sate ca Blidari, Frumoasa, Schitu Frumoasa, Cucuieți sau Solonț. În albiile majore și în terase se găsesc cantități imense de pietrișuri, exploatate pentru întreprinderile de prefabricate din lungul Trotușului (la Urechești și Coțofănești), Bistriței (la Buhuși și Blăgești), Cracăului (la Bodești) și Ozanei (la Vinătorii Neamțului). Mai sînt de menționat rezervele de gipsuri (pe ambii versanți ai văii Tazlăului), de gresie, tuf vulcanic și alte roci utile, pînă acum valorificate numai pe plan local.

Modelarea subaeriană a acționat timp mai îndelungat decît în Subcarpații de la sud de Trotuș. În felul acesta au putut fi sculptate depresiuni mai clare și mai bine calibrate decît în restul teritoriului subcarpatic. Totodată, eroziunea a putut individualiza mai bine unele culmi anticlinale, cum sînt cele ale Pleșului și Pietricicăi Bacăului (Gr.

Obălcescu, 1883; D. Preda, 1917; T. Joja 1941).

La sud de Trotuș se schițează două șiruri de depresiuni, dar la nord de Trotuș situația se schimbă, astfel încît spre Siret, se întinde Piemontul Pănceștilor, alcătuit din prundișuri și nisipuri pliocen-cuaternare, la fel ca și Piemontul Zăbrăuțului de la sud de Trotuș, care închide depresiunea externă Cîmpuri—Răcoasa. De altfel, între Piemontul Pănceștilor și capătul sudic al culmii Pietricicăi se schițează o șa largă, ca o mică depresiune — Depresiunea Capăta. Spre nord, însă, această depresiune se închide, iar piemontul se îngustează și treptat dispăre. Mai trebuie semnalat că, prin marginea sa sud-vestică, Piemontul Pănceștilor contribuie și la închiderea Depresiunii Oituz—Cașin, împreună cu capătul nordic al Piemontului Zăbrăuțului. Toate acestea fac ca în regiunea Trotușului să se poată vorbi de o adevărată tranziție între Subcarpații de la Curbură și Subcarpații Moldovei. De la două șiruri de depresiuni se trece la un șir, depresiunile externe avînd la nord de Trotuș numai un caracter incipient. Pe de altă parte, la nord de Trotuș se menține un platou piemontan de dimensiuni relativ mici. Însăși Depresiunea Oituz—Cașin este închisă spre sud-est de platouri piemontane și de culmea anticlinală Pietricică.

Vechimea mai mare a Subcarpaților Moldovei face ca, la nord de Bistrița, vîrsta sedimentelor cu caracter piemontan să fie sarmatică (C. Martiniuc, 1948 a, b, 1950) și nu pliocen-cuaternară. În același timp, Platforma Moldovenească, cu acoperitura sa de sedimente, a suferit înălțări recente de circa 600—700 m, astfel că între miocenul cutat al Subcarpaților și monoclinul platformei nu s-au creat denivelări mari, care să imprime înclinări accentuate depozitelor piemontane sarmatice. De aceea, Depresiunea Cracău—Bistrița, și, în parte, Depresiunea Ozana—Topolița sînt închise spre est de o serie de dealuri în care, peste miocenul cutat, apar depozite piemontane sarmatice slab înclinate. Doar local, în lungul „dislocației marginale a Subcarpaților” (H. Grozescu, 1918) sau al liniei pericarpatică (L. Mrazec și colab., 1902), stratele sarmatice sînt deranjate și înclinate foarte puternic, fără ca aceasta să se reflecte în relief, cu excepția cazului în care apar roci mai dure: în Măgura Șerbeștilor gresiile și conglomeratele se im-

5 T
pun evident în relief (M. David, 1932). La Mărgineni și la Hălmăcioiaia—Gura Văii, pe un fond litologic de nisipuri și argile, apar platouri netede care trec în terasele înalte ale Bistriței. Faptul că aici natura rocilor este mai importantă decât structura este dovedit prin suprapunerea punctelor dominante pe pietrișuri sarmațiene, care formează măguri: Movila Iucașu, lângă Mărgineni, Bobeica și Runcu, la nord și est de Buhuși. Îngustarea spre nord a fișiei de miocen cutat se reflectă în dispariția ulucului depresionar propriu-zis la nord de valea Rîșcuței unde, spre contactul cu flișul, din uluc nu mai rămân decât cîteva șei formate pe miocen.

Luind în considerare în primul rînd caracterelor geomorfologice, Subcarpații Moldovei au fost împărțiți în: Subcarpații Trotușului și Subcarpații Neamțului.

Subcarpații Trotușului (sau Subcarpații Tazlăului) prezintă cea mai mare complexitate din toți Subcarpații Moldovei. Ulucul depresionar subcarpatic este bine reprezentat prin depresiunile Oituz—Cașin și Tazlău, închise spre est de culmea anticlinală *Pietricica Bacăului* și *Piemontul Pănceștilor*, care apare ca o prelungire spre sud-est a culmii amintite. Între acest piemont și Pietricica se schițează *Depresiunea Capăta*.

Subcarpații Neamțului cuprind *Depresiunea Cracău—Bistrița*, închisă imperfect spre est de *masivele deluroase Corni—Mărgineni—Runcu*, separate între ele prin șei largi, *Depresiunea Ozana—Topolița* (N. Bucur, 1954; G. Davidescu, 1969), închisă de *Culmea Pleșului*. În sectorul dintre Rîșca și Suha, Subcarpații se îngustează și se simplifică.

5 ↑ Privit în ansamblu și sub aspectul condițiilor oferite activității umane, relieful Subcarpaților Moldovei se prezintă sub forma a trei mari trepte:

Treapta părții centrale a depresiunilor, formată — în special în jurul confluențelor — printr-o largă dezvoltare a teraselor inferioare și medii ale Trotușului, Bistriței, Ozanei și afluenților acestora, ca și a glacisurilor de eroziune și acumulare, se caracterizează prin predominarea suprafețelor orizontale sau ușor înclinate, dispuse în trepte. Aceste forme ating aici cea mai mare extindere din toată regiunea subcarpatică din țara noastră, găsindu-și o asemănare doar în Depresiunea Tîrgu Jiu. Substratul permeabil, format în mare parte din pietrișuri aluvio-proluviale, aso-

ciat cu temperaturi mai ridicate și precipitații mai puține, creează condiții pentru o vegetație mezoxerofitică și pentru soluri cu o reacție neutră. Arii cu astfel de condiții apar în patru sectoare distincte: în partea centrală a Depresiunii Cracău—Bistrița, pe stînga rîului principal, pînă la linia localităților Piatra Neamț—Girov—Costișa (aria cea mai întinsă); în partea central-sudică a Depresiunii Oituz—Cașin, pe dreapta Trotușului, pînă pe linia localităților Tuta—Cașin—Borzești; în partea central-estică a Depresiunii Ozana—Topolița, între Vinătorii Neamțului, Netezi și Tirpești; pe cursul inferior al Tazlăului Sărat, între Moinești și Tețcani.

Condițiile naturale au permis popularea acestei trepte de relief în faza cea mai timpurie, mai ales odată cu „revoluția neolitică”, cînd a început defrișarea stejărișurilor și extinderea treptată a culturilor, fapt marcat de un număr foarte mare de așezări umane — una din regiunile cele mai dens locuite din întreaga țară: Bodești, Negrești, Dochia, Zănești, Podoleni, Izvoare, Traian, Costișa, Ștefan cel Mare, Frumușica etc., în Depresiunea Cracău—Bistrița; Podei, Malu, Tuta etc. în sectorul de la sud de Trotuș (N. Zaharia și colab., 1970; C. Buzdugan, 1968); Poduri, în sectorul de pe Tazlăul Sărat (D. Monah și colab., 1985). Vechime a populării și a luării în cultură a acestor arii centrale, adevărate vetre de populare pentru întreaga regiune subcarpatică, este responsabilă de evoluția cuverturii vegetale spre silvostepă. Aceste vetre ale depresiunilor înregistrează cea mai mare proporție a terenului cultivat din suprafața totală, ajungînd la 60—70% în centrul Depresiunii Cracău—Bistrița (la Girov, Roznov, Zănești etc.). Acesta este domeniul de bază al culturilor de cîmp, unde se obțin recoltele cele mai mari și unde mecanizarea este posibilă, ceea ce se răsfrînge în peisajul agrar prin forma regulată și dimensiunile mari ale soarel, asemănătoare celor din cîmpie. Disponibilul de teren arabil a făcut ca pe această treaptă de relief să se ridice aproape toate și singurele mari așezări rurale noi: Dumbrava Roșie, Traian, Humuleștii Noi ș.a. Satele, de regulă de dimensiuni mari sau mijlocii, se ordonează în aliniamente în lungul frunților de terasă, în apropierea surselor de apă (de unde și toponime, ca Șipote, Izvoare). Ele au densitate mare în vatră, o

tendință spre compactare și oferă condiții bune de evoluție treptată spre urbanizare.

Treapta deluroasă marginală a depresiunilor și a șeilor este alcătuită dintr-un relief mai înalt, mult mai fragmentat, cu versanți mai înclinați și cu o dinamică mai activă. Interfluviile sînt relativ înguste, cu o orientare dezordonată, rar ținînd seama de detaliile structurale. Terasale și albiile majore sînt, de asemenea, înguste, ceea ce obligă la cultivarea versanților, cu consecințe destul de grave pe planul activării antropice a eroziunii solului (în special în partea central-nordică a Depresiunii Tazlăului). Treapta aceasta este cea mai întinsă din Subcarpații Moldovei (fig. 113).

Umiditatea relativ ridicată, solurile sărace, versanții puternic înclinați au creat un ansamblu de condiții mai puțin propice pentru agricultură. De aceea, umanizarea și valorificarea acestei trepte au rămas destul de puțin avansate, deși așezări omenești au existat și aici încă din preistorie, dar în număr mai mic. Frecvent, așezările preistorice și antice de pe înălțimile dominante, cu deosebire cele din perioada geto-dacă, așa cum au fost cele de la Piatra Șoimului—Horodiștea sau de la Tîltea, lângă Tîrgu Ocna, au îmbrăcat forma cetăților, uneori fortificate.

Bine adăpostite față de drumurile marilor migrații, părțile mai înalte ale depresiunilor subcarpatice au început să fie intens populate în perioada prefeudală, cînd Subcarpații au constituit, în ansamblu, o arie de refugiu, așa cum arată descoperirile arheologice ale așezărilor din secolele III—XIII de la Căciulești, Cindești, Bălțatești, Ciortea, Bogdănești, Rădeana. O remniscență tîrzie a uniunilor de obști țărănești libere din perioada prefeudală a fost și mult discutatul Cîmp al lui Dragoș, menționat de numeroase documente feudale între valea Bistriței și cumpăna de ape Bistrița—Tazlău. Mai tîrziu, cele mai multe din satele medievale apar în această arie, în poienile sau runcurile din mijlocul pădurii, adăpostite de regulă în bazinele de recepție ale torenților, la obîrșile pîraielor, în hîrtoape și evitînd locurile larg deschise. Este acea dispoziție „în cuiburi” a majorității satelor subcarpatice, atît de sugestiv denumită de G. Vâlsan (1912), vizibilă și astăzi la Ghindăoani, Grumăzești, Bălțatești ș.a.

Agricultura prezintă forme caracteristice de adaptare la condițiile naturale. Proportia terenului cultivat este de numai 20—30%, dar crește proporția livezilor, fîcțelor, pășunilor, pădurii. Versanții au fost pe alocuri terasați, în special în anii postbelici, pentru plantarea de livezi masive, bine adaptate la condițiile de versant. În general, solele au dimensiuni mici și forme neregulate. Frapantă este fragmentarea trupurilor de pădure mai ales în partea central-nordică a Depresiunii Tazlăului, unde s-a păstrat pînă în secolul XIX o proporție însemnată de țărâșe răzășească și regimul exploatații libere a pădurilor. Satele au densități reduse în vatră, cu case rare, mult teren agricol și o rețea stradală foarte neregulată, nu lipsită, însă, de un pitoresc deosebit. Căile de comunicație sînt deficitare, cu puține drumuri modernizate.

Culmile și masivele subcarpatice prezintă condițiile cele mai puțin bune pentru locuire. Altitudinea mai mare (ajungînd la peste 900 m), clima rece și umedă, versanții puternic înclinați, adîncimea apei freatice (ca în partea mîntă a Piemontului Panceșilor), toate au contribuit la menținerea paucității pe cea mai mare parte a terenului. Economia se sprijină pe exploatarea lemnului și creșterea animalelor. Căminurile ocupă suprafețe neînsemnate, sub 10%, lipsind integral în Culmea Fleșului și în Pietricica Bacăului. Satele sînt rare și fără excepție noi, de regula de dimensiuni mici, adevărate catune (ca Lărguța în Pietricica Bacăului).

Culoarele Troușului, Bistriței, Ozanei și afluenților acestora au jucat un rol de seama în procesul de umanizare, fiindcă au reprezentat căi naturale de legătură deosebit de importante într-o regiune cu relief accidentat, mai ales prin deschiderile pe care le-au oferit spre marile pasuri și trecători ale Carpaților Orientali: Oituz, Ghimeș, Tulgheș, Pătru Vodă ș.a.

Pentru procesul de populare și luare în cultură a diferitelor sectoare din Subcarpații Moldovei, de o deosebită importanță au fost curenții de populație, mai ales de proveniență transilvăneană, dirijați prin pasul Oituz și valea Oituzului. De aceea, nu întîmplător numărul cel mai mare de transilvăneni s-a stabilit în depresiunile Oituz—Cașin și Tazlău precum și pe versantul estic al Culmii Pietricica (în sate ca Lucăcești, Faraoani, Valea Seacă, Pustiana ș.a.),




Fig. 113. Relieful, mărimea și funcțiile așezărilor din Subcarpații Trochușului: 1, Dealuri subcarpatice; 2, arie de depresiune: a, dealuri joase din cuprinsul depresiunilor; b, glacisuri, terase și lunci; 3, șei; 4, așezări cu funcții industriale și de servicii; 5, industrial-agricole; 6, agricol-industriale; 7, agricole; 8, căi ferate; 9, drumuri. I, Culmea Pietricică; II, Piemontul Pânceștilor; III, Depresiunea Tazlăului; IV, Depresiunea Oituz - Cașin; V, Depresiunea Trebiș; VI, Depresiunea Capăta.

la Mănăstirea Cașin intrînd în interferență cu un alt curent de populație — cel al rucărenilor, originari din Muscel. Spre nord, numărul așezărilor cu populație de origine ardelenască se reduce considerabil, fără a dispărea cu totul (de exemplu, Mocani, pe valea Orbicului, cartierul Țutuieni la Tîrgu Neamț).

Căile de comunicație destinate unor legături rapide au respectat, într-o foarte mare măsură (chiar excesivă), orientarea impusă de rețeaua de văi, calea ferată generînd condiții de urbanizare și industrializare a fișiiilor pe care le servește, contribuind la o importantă creștere a populației. În felul acesta s-au detașat în mod net, în dinamica populației și în structura acesteia, axele celor două văi urmărite de calea ferată — ale Bistriței și Trotușului — cu creșteri ale densității populației de la 100 pînă la peste 400 loc./km².

Întrucît culmile subcarpatice și podișul de la est au altitudini în general sub 800 m, masele de aer rece continental venite dinspre nord-est acoperă Subcarpații Moldovei aproape nestingherite. Pătrunderea și revărsarea lor în ulucul depresionar se face cu ușurință. De aceea iernile sînt destul de aspre; chiar în părțile mai adăpostite ale depresiunilor, temperatura medie a lunii ianuarie coboară sub -3°C, rămînînd, totuși, mai ridicată decît în Culoarul Siretului. Caracterul de adăpostire permite încălziri puternice în timpul verii, astfel că media lunii iulie depășește 19°C, iar maxima absolută poate ajunge pînă la 40°C.

Altitudinea mare a culmilor subcarpatice influențează distribuția temperaturii aerului prin coborîrea valorilor termice în timpul verii. Iarna se produce inversiuni termice în depresiuni, dar pe culmi se înregistrează frecvent temperaturi mai blinde.

Precipitațiile atmosferice sînt caracterizate printr-o variabilitate mare, după cum atestă raporturile de 1/4 sau chiar 1/5 între minimele și maximele lunare, precum și de aproximativ 1/2 între sumele anuale minime și maxime. Regimul anual al precipitațiilor este caracterizat printr-un maxim puternic în mai—iulie (90—130 mm/lună) și un minim foarte scăzut (20—30 mm/lună) în decembrie—ianuarie. Cantitatea anuală de precipitații se menține în jur de 600 mm în părțile mai joase ale depresiunilor și crește la peste 700 mm pe culmile înalte.

Desfășurarea Subcarpaților Moldovei pe circa 160 km de la nord la sud și ușoara tendință de creștere a altitudinilor de la sud la nord (240 m pe valea Trotușului, 280 m pe valea Bistriței, 300 m pe valea Ozanei) imprimă o nuanță de climă din ce în ce mai răcoroasă și mai umedă cu cît înaintăm spre nord. Aceasta se răsfrînge asupra solului și cuverturii vegetale, dar și asupra modului de utilizare a terenului și a structurii culturilor, reducîndu-se treptat, spre nord, culturile pretențioase la căldură. Astfel, via ocupă încă suprafețe apreciable pe fațada estică a Piemontului Pănceștilor și a Pietricicăi Bacăului (depășind chiar 5% din suprafața totală a unor comune ca Valca Seacă, Orbeni, Parava, Faraoani, Măgura); dar se reduce în interiorul depresiunilor Oituz—Cașin și Tazlăului sub 2%, în Depresiunea Cracău—Bistrița sub 1%, iar la nord de latitudinea Tîrgului Neamț dispăre complet. Calitatea mai bună a pajiștilor și proporția sensibil mai mare a plantelor de nutreț, în jumătatea nordică față de cea sudică, a Subcarpaților Moldovei, tot ca urmare a climei mai umede și mai răcoroase, oferă condiții favorabile pentru creșterea animalelor. Densitatea bovinelor ajunge la 63/100 ha teren agricol (în Subcarpații Neamțului) și a ovinelor la 150/100 ha, în timp ce în Subcarpații Trotușului predomină creșterea porcinelor (130/100 ha teren arabil).

Răspîndirea mare a rocilor permeabile, particularitățile morfologice și cantitatea relativ redusă de precipitații au condiționat dezvoltarea unor riuri modeste ca debit, deși în unele sectoare densitatea rețelei hidrografice atinge valori mari. Depresiunile sînt, însă, străbătute de riuri carpatice importante.

Valorificarea energiei hidraulice a reprezentat o formă tradițională de utilizare a resurselor naturale. Nenumărate instalații ale industriei casnice feudale au funcționat pe baza apei: în documentele secolului XV, în majoritatea satelor, se menționează mori de apă pe Bistrița, Cracău, Topolița (M. Costăchescu, 1931—1932), pive și fierăstraie, pe Tazlău, Tazlăul Sărat, Cașin, Oituz, Trotuș. O importantă industrie artizanală a postavului s-a dezvoltat, în secolele XVII—XVIII, la Tîrgu Neamț și în satele înconjurătoare. În perioada contemporană s-a realizat amenajarea hidroenergetică a văii Bistriței, prin construirea a cinci hidrocentrale de dimensiuni medii, care produc într-un

an normal circa 438 mil. kWh energie electrică.

Abundența și calitatea superioară a apei din râurile de origine carpatică au permis amplasarea, în Subcarpații Moldovei, a unor întreprinderi mari și cu consumuri specifice de apă industrială foarte ridicate, cum sînt uzinele chimice de la Săvinești—Roznov și de la Borzești.

Precipitațiile nu asigură formarea unor rezerve prea mari de apă subterană, deși în depresiuni, terasele fluviale oferă un depozit care ar putea înmagazina cantități mari de apă. Doar șesurile bine prunduite și alimentate de râurile carpatice pot oferi cantități mai mari de apă. De aceea, alimentarea cu apă a aglomerărilor umane valorifică adesea resursele de apă din Carpați, chiar de la distanțe apreciabile (din lacul Poiana Uzului pentru orașele Onești și Moinești, din freaticul de terasă inferioară de la Vaduri pentru Piatra Neamț). Amenajarea unor lacuri cu scop energetic, de alimentare cu apă și de agrement pe Bistrița a introdus elemente hidrografice noi și a modificat profund regimul său hidrologic.

Existența sării miocene în substrat a prilejuit apariția a numeroase izvoare cu apă puternic mineralizată, valorificate balnear la Bălățești, Moinești, Tîrgu Ocna etc., utilizare care ar putea fi extinsă și la Mănăstirea Cașin, Oglînză și Sărata, creîndu-se valențe noi pentru dezvoltarea așezărilor rurale respective.

Învelișul vegetal este reprezentat prin păduri de foioase (peste 90% din suprafață). În părțile sudice și joase domină stejarul și gorunul, în timp ce pe culmile mai înalte domină fagul. Pe Culmea Pleșului și pe rama vestică a depresiunilor Ozana—Topolița și Cracău—Bistrița s-au dezvoltat chiar păduri mixte, de fag și conifere, în unele sectoare cu o pondere importantă a bradului (C. Burduja, 1948, 1957; N. Doniță și colab., 1960).

Efectele fechnizării maselor de aer, pe de o parte, și influențele continentale, pătrunse prin șelle largi din est, pe de alta, au permis infiltrarea unor elemente floristice de silvostepă, îndeosebi în centrul Depresiunii Cracău—Bistrița, unde prezența lor a fost favorizată și de unele condiții edafice specifice, legate de bogăția pietrișurilor de terasă (P. Eneulescu, 1926; C. Burduja, 1948).

Cea mai importantă modificare antropică a condițiilor de mediu a constat în defrișarea treptată a pădurii din vatra depresiunilor, ceea ce a făcut ca astăzi pădurea să acopere numai 27,5% din suprafața regiunii. În ariile centrale ale depresiunilor (de exemplu, în comunele Săvinești, Zănești, Măgîrești, Pîrgărești ș.a.) pădurea a dispărut cu desăvîrșire; se păstrează încă foarte bine în Culmea Pleșului (unde acoperă peste 95% din suprafață), în Piemontul Pănceștilor, în Pietricica Bacăului, Dealul Corni, pe interfluviul dintre Bistrița și Tazlău. Defrișările cele mai intense au avut loc în secolul XIX, cînd a fost fragmentată în masive păduroase izolate fișia aproape continuă de codru din lungul înălțimilor subcarpatice. Procesul de defrișare a lăsat multe urme în toponimia așezărilor actuale sau dispărute din Subcarpații Moldovei (Poiana Cracăoani, Runcu, Lăzești, Secătura ș.a.), în timp ce alte sate poartă denumiri care indică prezența, odinioară, a pădurii (Rediu, Dumbrava Roșie, Mastacăn, Pădurenii, Valea Arinilor, Cornet, Tisa, Teiuș etc.). Frecvent, satele din aliniamentele de bordură ale depresiunilor subcarpatice marchează etape vechi de retragere a pădurii (D. Chiriac, 1971). Cea mai elocventă situație este cea de la trecerea între Depresiunea Cracău—Bistrița și masivele deluroase Corni și Runcu, indicată de linia satelor: Itrinești — Deleni — Mărgineni — Hoiești — Hirtești—Vîrlani — Goșmani—Romăni și Costișa. În sectoarele mai înalte, aureolele de defrișare din jurul satelor de poienire, mult lărgite cu timpul, sînt foarte caracteristice (de exemplu, la Berzunți, Tîlci, Slătioara ș.a.).

Pe seama resurselor de lemn s-a dezvoltat, în trecut, unul dintre cele mai răspîndite tipuri de artizanat casnic rural, reprezentat prin fabricarea cherestelei (la Iapa, Negulești, Calu, Roznov), a draniței (la Mănăstirea Cașin și Suha), a butoaielor și doagelor (la Șohodol, Drăgulești, Cornățel ș.a.) (Condica Lîuzilor, 1803).

Fondul forestier al Subcarpaților Moldovei este apreciat la peste 80 000 ha, din care se exploatează circa 240 000 m³ de lemn, anual. Cele mai importante exploatari se practică pe bordurile sudică și vestică ale depresiunilor Tazlăului și Oituz—Cașin (la Solonț, Mănăstirea Cașin, Oituz ș.a.), în Culmea Pleșului, pe marginea vestică a depresiunilor Ozana—Topolița și Cracău—Bistrița, în

masivul deluros Cointi și pe interfluvii înalt dintre Bistrița și Tazlău. Lemnul local este, totuși, nesatisfăcător pentru acoperirea capacităților de producție și el este suplimentat cu o cantitate însemnată de materie primă din munte.

Pașistile secundare, folosite ca pășune și fâneață, au o răspîndire mai mică decît pădurea, acoperind 62 000 ha. Ele ocupă suprafețe însemnate într-o fișie intermediară, între vetrele depresiunilor subcarpatice și bordura înaltă a acestora, de regulă pe terenuri defrișate mai recent, puțin favorabile pentru culturi, mai ales în treimea nordică a depresiunilor Cracău—Bistrița și Tazlăului (la Crăcăoani, Solonț ș.a.). Înaintarea puternică a culturilor a făcut, adesea, ca pașistile să se limiteze la versanții abrupti, cu o dinamică activă, sau la albiile majore inundabile.

În cuprinsul Subcarpaților Moldovei apare un mozaic de soluri, care reflectă marea diversitate a condițiilor pedogenetice. În părțile mai joase ale depresiunilor, pe terasele inferioare, s-au format cernoziomuri argiloiluviale; iar pe terasele medii — soluri cenușii, care reflectă influențele climatice continentale est-europene, dar și un grad foarte înalt de antropizare a întregului cadru natural. Albiile majore sînt acoperite cu soluri aluviale, în diverse stadii de evoluție.

Pe terasele înalte, pe interfluvii și pe culmile subcarpatice, cuvertura de soluri este mai evoluată, fiind reprezentată prin soluri brune argiloiluviale, soluri brune luvice și chiar luvisoluri albice. Pe un substrat impermeabil apar planosoluri și soluri negre clinohidromorfe. Pe interfluvii, solurile sînt frecvent pseudogleizate, în timp ce pe versanți predomină erodisolurile și litosolurile (N. Florea și colab., 1971; Gh. Lupașcu și colab., 1978).

În mod intuitiv în trecut și într-o manieră organizată în perioada contemporană, s-a ajuns treptat la o adevărată tot mai avansată a modului de utilizare a terenului și a structurii planului de cultură la potențialul productiv al solurilor. Astfel, pe solurile cenușii și pe solurile cernoziomoide din ariile centrale ale depresiunilor subcarpatice se înregistrează proporțiile cele mai mari la cultura grîului, orzului și legumelor, pe solurile brune argiloiluviale din părțile marginale ale depresiunilor predomină porumbul, leguminoasele pentru boabe, inul, sfecla de zahăr, iar solurile brune luvice și solurile

brune acide din înălțimea culmilor și masivelor deluroase înalte își găsesc utilizarea optimă pentru pădure, fâneață și parcele relativ mici de cartof și plante furajere.

Îmbinarea optimă a unor condiții și resurse naturale propice unei valorificări economice complexe, vechimea populării, sporul natural în mod tradițional ridicat și atracția exercitată de Subcarpații Moldovei asupra populației din alte regiuni concurează la explicarea densităților mari de populație, cu o medie de 142 loc./km², densitate care, însă, în lungul culoarului Bistriței sau în aria de influență imediată a Bacăului, poate depăși 200 loc./km².

Industrializarea avansată, dar și dimensiunile relativ mici ale celor mai multe orașe explică intensitatea deplasărilor periodice pentru muncă, avînd curenți pendulari care se îndreaptă atît spre orașele din Subcarpați (Onești, Piatra Neamț, Buhuși), cît și spre exterior, cu deosebire spre orașele de pe valea Siretului (Bacău, Adjud, Roman, Pașcani). Aceasta dovedește că din punct de vedere economic Subcarpații Moldovei sînt divizați între sferele de atracție ale mai multor centre de polarizare, distribuite în funcție de facilitățile de transport.

În cadrul activității economice, caracterizată în general printr-o mare diversitate, prin îmbinarea activităților industriale cu cele agricole, agricultura are forme adevărate condițiilor fizico-geografice, asigurînd necesarul de consum local și obținînd chiar excedente la unele produse (carne, lapte, ouă, miere) și la culturile puțin pretentioase la căldură — cartof, in, sfeclă de zahăr.

Gradul de intensivitate a agriculturii este foarte diferențiat; alături de arii cu productivitate agricolă ridicată (în special în aria centrală a Depresiunii Cracău—Bistrița), există arii cu un nivel redus al productivității — în sectoarele mai înalte, fragmentate, cu o frecvență mare a versanților degradați, așa cum este interfluvii dintre Bistrița și Tazlău.

Industria a înregistrat începuturi mai timpurii, plecînd de la prelucrarea tradițională a lemnului, lînii, inului, cînepii. Dezvoltarea industriei în anii postbelici a transformat Subcarpații Moldovei, într-o regiune cu un nivel de industrializare peste cel mediu, puternic specializată în ramuri și subramuri care utilizează materia primă locală, împreună cu resursele apropiate ale Carpaților flîșului:

rafinarea petrolului, industria produselor clorosodice, a maselor plastice, firelor sintetice și îngrășămintelor chimice, industria electro-energetică, industria lemnului, industria textilă a lînii și inului etc. Chiar și industria construcțiilor de mașini, deocamdată o ramură mai puțin dezvoltată, este strîns corelată cu necesitățile locale, de utilaj pentru industria chimică și de utilaj agricol. Există, totuși, unele materii prime locale, în special în domeniul materialelor de construcții, al industriei pielăriei și blănăriei, încă insuficient valorificate; ceea ce poate constitui o premisă de dezvoltare industrială în viitor.

4.2.3.2. Subcarpații Trotușului

Sînt cunoscuți și sub numele de Subcarpații Tazlău—Cașin (N. Popp, 1965) sau Subcarpații Tazlăului (V. Tufescu, 1966 a) și sînt reprezentați printr-un uluc depresionar, cu o lungime de peste 60 km, prin Culmea Pietricică Bacăului și Piemontul Pănceștilor, unități care despart ulucul subcarpat de Culoarul Siretului. Ulucul începe de pe dreapta văii Nechitului, la ieșirea acestuia din munte, se dezvoltă în lungul Tazlăului — lărgindu-se progresiv pînă la vărsarea în Trotuș—și se continuă, apoi, în lungul Trotușului și al Cașinului.

Limita vestică a depresiunii se menține în jurul altitudinii de 500—600 m, pe sub munceii Piatra Crăpată, Utur, Stogul de Piatră, din Munții Goșmanului și Culmea Berzunțului (C. Brînduș, 1981). Pe dreapta Trotușului, Depresiunea Oituz—Cașin este închisă de dealurile Măgura (721 m), Coșna (784 m), Scaunul Runcului (677 m), Măgura Cașinului (1 165 m) și Culmea Războiului (957 m), iar printr-o sa (Culmea Tepei) se leagă cu Depresiunea Cîmpuri—Răcoasa din Subcarpații Vrancei. La sud-est de valea Cașinului, depresiunea este închisă de Mășivul Oușoru (753 m) și de Piemontul Zăbrăuțului. Deși mai puțin precisă, ca urmare a pătrunderii unor lobi ai depresiunii în interiorul dealurilor de la est, limita dinspre Culmea Pietricică și Piemontul Pănceștilor poate fi, totuși, urmărită relativ ușor, mai ales că răspîndirea și localizarea așezărilor o scot în evidență. În mod asemănător, contactul dealurilor cu culoarele Bistriței și Siretului este subliniat de un șir aproape neîntrerupt de așezări.

În cuprinsul ulucului depresionar subcarpat se individualizează Depresiunea Oituz—Cașin, la sud de valea Trotușului, și Depresiunea Tazlăului, la nord (fig. 113).

Depresiunea Oituz—Cașin (numită și Depresiunea Onești—Bacău, I. Șandru, 1965) este modelată, în cea mai mare parte, în depozitele miocenului cutat, dar marginea sa sud-estică este sculptată în formațiuni monoclinale pliocene. Miocenul este reprezentat îndeosebi prin formațiuni predominant marnoase, cu intercalații de gresii și gipsuri și conținînd zăcămintele de petrol și de sare. Rocile friabile au favorizat sculptarea unui relief șters, cu interfluvii joase și plate, iar rîurile au creat terase întinse. Foarte bine dezvoltate sînt terasele Trotușului, cu mențiuni aparte pentru cele de 5—7 m, de 9—12 m (cu lățime pînă la 2 km la Tîrgu Trotuș și la Borzești) și de 65—80 m, care, la confluența cu Oituzul și Cașinul, apar sub forma unor poduri, ușor înclinate, cu lățimi de 2—3 km. Grosimea depozitului de terasă este variabilă, dar ajunge, la terasele medii, la 11—25 m, din care luturile loessoide gălbui de la suprafață au 6—20 m. Terasele sînt dezvoltate în special pe dreapta văii, prin aportul de aluviuni al Oituzului și Cașinului. Terasele mai înalte sînt puternic degradate și nu mai apar sub formă de poduri distincte (N. N. Lupu și colab., 1970).

Oituzul și Cașinul au sisteme de terase asemănătoare cu cel al văii principale, numai că altitudinea relativă a acestora scade treptat către marginea depresiunii. Astfel, terasa de 65—80 m devine o terasă de 25—35 m, iar celelalte nu au decît o dezvoltare fragmentară. Terasele și treptele de luncă oferă cele mai bune terenuri de cultură, folosite cu precădere pentru cultura grîului, porumbului, orzului, inului și cartofilor. Pe ele se grupează și marea majoritate a așezărilor, multe dispuse în aliniamente de-a lungul frunților de terasă (Răcăuți, Mahu, Crucea de Piatră, Borzești, Rădeana, pe terasa de 65—80 m ș.a.).

Deși faciesul marnos are o răspîndire mare, datorită extinderii suprafețelor netezite, procesele geomorfologice actuale se manifestă slab. Alunecările și eroziunea sînt prezente pe versanții mai puternic înclinați și pe fruntea terasei de 65—80 m.

În partea centrală a depresiunii, aflată sub 300 m altitudine absolută (250 m la Tîrgu Ocna, sub 200 m la Onești), media temperaturii este de 9°C (9.2°C la Tîrgu Ocna).

Verile sînt cîlduroase, cînd temperatura maximă poate ajunge la 40°C, dar iernile reci, cînd temperatura minimă absolută se poate apropia de -30°C. Condițiile climatice permit cultura, pe suprafețe apreciabile, a viței de vie, mai ales pe versanții cu expunere sudică. Aici se dezvoltă bine pomii fructiferi iubitori de căldură: cireșii, vișinii (la Tisești, Pîrgărești), cașii, zarzării (la Negoiești), piersicii (la Cașin, Pîrgărești, Bahna etc.). Cantitatea medie anuală de precipitații se menține în jur de 650 mm în partea centrală a depresiunii, dar urcă la peste 700 mm în dealurile din jur.

În partea centrală pădurea de stejar, gorun și fag a fost aproape în întregime îndepărtată, rămînînd doar cîteva petice restrîinse, mai ales între Oituz și Cașin. În schimb, rama înaltă, din sud, este și astăzi complet acoperită cu păduri predominant de fag.

Varietatea de combinare a factorilor pedogenetici a dus la formarea unui adevărat mozaic de soluri: în lunci soluri aluviale; pe terasele inferioare, de 5—6 m și 10—12 m; cernoziomuri argiloiluviale, iar pe terasele medii, de 50—60 m, soluri cenușii, cele mai bune soluri pentru cultura cerealelor și a rădăcinoaselor. Terasale înalte și culmile din sudul depresiunii sînt acoperite cu soluri brune luvice și luvisoluri albe în diverse stadii de pseudogleizare, favorabile mai mult culturilor de plante furajere sau utilizării ca fîneată, pășune și livadă. Pe rama înaltă împădurită sînt soluri brune mezobazice.

La Tîrgu Ocna, Trotușul are un debit mediu de 13,6 m³/s, cu oscilații între mediile lunare de la 34 m³/s, în aprilie, la 4,6 m³/s, în ianuarie. Variabilitatea mare a debitului face ca o singură viitură să ducă la scurgerea a peste 100 mil. m³ de apă. Dintre afluenții mai importanți, Oituzul are un debit mediu de 2,93 m³/s (cu variații între 8 m³/s în aprilie și 1,14 m³/s în decembrie), la Bogdănești, iar Cașinul — 2,25 m³/s, la Suseni. Pe Oituz se scurg anual, în medie, circa 92 mil. m³ de apă, o viitură putînd duce la scurgerea a 20—30 mil. m³ de apă, iar pe Cașin — circa 71 mil. m³ (la o viitură putîndu-se scurge pînă la 20 mil. m³). Inundabilitatea cu frecvență mare a albiilor majore a impus evitarea acestora de către așezări și folosirea lor în special pentru legumicultură sau ca pășune. Apa Trotușului este folosită pentru irigații la Tîrgu Trotuș, iar a Oituzului la Bogdănești.

Depresiunea Tarlăului, închisă spre exterior de culmea anticlinală a Pietricicăi (M. David, 1932), are o alcătuire geologică mai complexă decît cea a Depresiunii Oituz—Cașin, dar cea mai mare răspîndire o are același miocen salifer cutat. Pe marginea vestică apare o fișie îngustă de acvitanian, alcătuită din breccii argiloase care conțin gips, sare gemă și săruri de potasiu (la Tîrgu Ocna), iar în nord-vest și în axul unor anticlinale din partea centrală se întîlnesc alternanțe de gresii calcareoase, marne cenușii și brun-roșietice burdigaliene. Ca și în Depresiunea Oituz—Cașin, extinderea cea mai mare o au marnele și gresiile helvețiene cu intercalații de gips, însoțite de fișii înguste de gresii și tufuri vulcanice badeniene. Specifică este prezența sarmațianului inferior transgresiv, reprezentat prin gresii și chiar conglomerate, cu intercalații argiloase, păstrat în lungul unui sinclinal din marginea sud-vestică a depresiunii (D. Preda, 1917).

Structura își spune cuvîntul asupra reliefului numai în linii generale, imprimînd orientarea de ansamblu a reliefului prin suprapunerea ulucului depresionar cu sinclinalul pericarpatic. Apar unele forme de relief structural pe roci mai rezistente — hogbackuri pe gipsuri și gresii în sudul și sud-vestul depresiunii, cueste pe depozitele sarmațiene. Interesant este relieful carstic dezvoltat pe gipsuri helvețiene în dealurile Bălăneasa, Livezi, Dealul Stîinii, Carageaua (C. Brînduș și Filipina Brînduș, 1973).

Energia și gradul de fragmentare ale reliefului sînt sensibil mai mari decît în Depresiunea Oituz—Cașin, iar versanții ocupă 65% din suprafața totală. Alături de interfluvii largi, interpretate ca fragmente ale unor suprafețe de nivelare (M. David, 1932), apar și interfluvii înguste, chiar creste de intersecție a versanților. Versanții au înclinații dominante între 6° și 20° și, unde au fost despăduriți, sînt intens afectați de procese actuale, în primul rînd de alunecări favorizate de marnele și gipsurile helvețiene (în bazinele pîraielor Răchitiș, Orășuța, Valea Rea, Helegiu, Ludași, Solonț ș.a.). Mobilitatea versanților afectează căile de comunicație, în primul rînd șoseaua națională Bacău—Onești (C. Brînduș, 1981). Terasarea versanților și plantarea acestora cu pomi fructiferi reprezintă forma principală de combatere a degradărilor, cu rezultate bune (în bazinul pîrîului Filipea, la est de

Livezi, în cel al pîrului Boul, la Grigoreni), dar suprafețele de acest fel sînt încă relativ mici.

Relieful de acumulare are o dezvoltare mult mai mică decît în Depresiunea Oituz—Cașin, deși există un sistem de 10 terase, create de Tazlău, care s-a deplasat în mod constant spre vest, probabil sub impulsul mișcărilor de ridicare din Culmea Pietricica. De aceea, terasele de 130—140, 120—125 și 95—105 m sînt dezvoltate numai pe versantul stîng, imprimînd văii un pronunțat caracter asimetric. În nord-estul depresiunii, terasele superioare ale Tazlăului sînt puternic atacate de afluenții de pe dreapta Bistriței, ajungîndu-se chiar la fenomene de captare, cum este cea efectuată de Nechit în dauna vechiului curs superior al Tazlăului (C. Brînduș și colab., 1971). Terasele inferioare sînt bine dezvoltate și mai continue decît cele superioare; în special terasele de 30—35 m și de 20—22 m, iar spre confluența cu Trotușul au o tendință de divergență. În afară de riul principal, un sistem mai complet de terase are doar Tazlăul Sărat. Terasa de 27—32 m are un pod larg, oferind, între Moinești și Tețcani, condiții de stabilire a unui număr mare de așezări. În general, însă, condițiile oferite de relief pentru așezări și agricultură sînt mai puțin favorabile ca în Depresiunea Oituz—Cașin. Satele nu găsesc totdeauna loc pe terase, astfel că adesea se înșiră în lungul glacisurilor înguste ale văilor (Stufu, Moreni); urcă pe interfluviile netede (Deleni, Cetățuia) sau se adăpostesc în bazine secundare cu toate dezavantajele pe care le oferă un astfel de loc (Pustiana).

Trecerea de la partea înaltă a depresiunii la regiunile vecine se face prin intermediul unor suprafețe discontinue de glacis piemontan de acumulare, mai larg dezvoltat între pîrui Cucuieți și Tazlăul Sărat, spre munte, sau între Drăgușești și valea Trotușului, spre Culmea Pietricică (C. Brînduș, 1981).

Temperaturile medii anuale coboară de la sud spre extremitatea nordică a depresiunii, de la 9°C la 7.5°C, iar media lunii iulie, de la 19°C la mai puțin de 18°C. În anotimpul rece apar frecvent inversiuni termice însoțite de ceață. Precipitațiile cresc pe aceeași direcție, de la 535 mm anual (la Livezi) la 732 mm (la Tazlău), paralel cu creșterea duratei stratului de zăpadă, de la 60—70 zile anual, la 80—85 și cu creșterea nebulozității. Aceste condiții se reflectă în reducerea suprafețelor cultivate cu viță de

vie, care la Berzunți sau Deleni se mai poate planta în masiv, pe versanții cu expoziție sudică, dar la nord de Balcani nu mai rezistă decît în spațiile protejate dintre clădiri.

Rețeaua hidrografică are aceleași mari variații ale debitului și creșteri bruște de nivel ca în toată regiunea subcarpatică. Tazlăul are un debit mediu de 4,9 m³/s, cu creșteri pînă la 701 m³/s (iunie 1971) sau scăderi pînă aproape de secare (0,09 m³/s, ianuarie 1954). La inundații este acoperită cu apă parțial chiar treapta de luncă de 3—4 m, ceea ce o face improprie așezărilor. Apa Tazlăului este mai larg folosită în irigații, pînă la sisteme de dimensiuni mijlocii, destinate cu precădere legumiculturii (la Sănduleni și Berești-Tazlău).

În sudul depresiunii vegetația spontană este reprezentată printr-un șleau de dealuri cu predominarea gorunului, în amestec cu arțar, frasin și alte specii (N. Doniță și colab., 1975), iar pe versanți apar frecvent tufărișuri secundare, cu aparență silvostepică. Pe dealurile dinspre contactul cu unitățile din jur și din nordul depresiunii, pădurea, mai bine păstrată, este formată din fag și carpen. În ansamblu, vegetația naturală se menține pe suprafețe mult mai mari decît în Depresiunea Oituz—Cașin, dar peisajul forestier este caracterizat printr-o fragmentare accentuată în nenumărate trupuri mici, consecință a vechii proprietăți răzășești.

Cele mai răspîndite sînt solurile brune argiloiluviale în jumătatea sudică a depresiunii și pe terasele Tazlăului și solurile brune luvice — în jumătatea nordică și pe interfluviile mai înalte. În general, fertilitatea naturală a solurilor este simțitor mai redusă decît în Depresiunea Oituz—Cașin.

Culmea Pietricica (numită astfel de S. Athanasiu, 1907) sau Culmea Tazlăului (după Gr. Cobălcescu, 1883) se înalță cu 200 m deasupra depresiunii de la vest și cu peste 500 m deasupra văii Siretului către care se termină printr-un versant prelung, dar puternic fragmentat, continuat cu un glacis (fig. 113). În sud-est Culmea Pietricica domină Depresiunea Capăta, iar în nord se continuă printr-o culme mai scundă, îngustată între Bistrița și Tazlău. Culmea Pietricica corespunde unui anticlinal, accentuat de mișcările valahe, cînd s-a conturat și Depresiunea Tazlăului. Puneră în evidență a Culmii Pietricica după villafranchian este demonstrată de faptul că elementele de sisturi verzi, atît de abundente în conglu-

meratele care aflorază în axa acestei culmi, lipsește în depozitele din Piemontul Pănceștilor, de vîrstă villafranchiană (E. Liteanu, 1953, 1960), dar abundă din nou în glaciurile de la poalele culmii și în depozitele de terasă ale Tazlăului (C. Brînduș, 1981). Tinerețea Culmii Pietricica este trădată și de adaptarea la structură a reliefului, cu interfluvii orientate aproape fără excepție nord-sud, paralel cu liniile structurale, cu văi înguste, simetrice, cu hogbackuri dezvoltate pe conglomerate, dar și cu unele inversiuni de relief — sinclinale suspendate și văi de anticlinal. Înălțimile maxime sînt în extremitatea sudică a culmii, unde cîteva virfuri depășesc altitudinea de 700 m, iar punctul cel mai înalt (Capăta) ajunge la 747 m. Continuitatea culmii este întreruptă de lărgirea Trebis și șaua de la vest de Luizi-Călugăra. Deși versanții sînt puternic înclinați, dinamica lor este mai redusă decît în Depresiunea Tazlăului, datorită permeabilității mai ridicate a substratului și menținerii pădurii de fag și carpen care acoperă 80% din teritoriu. La poalele marilor de eroziune formați din conglomerate, cu versanți de peste 45°, s-au format trene de grohotișuri.

Rețeaua hidrografică densă este reprezentată prin numeroșii afluenți mărunți ai Tazlăului și Siretului. Pe versantul estic apar apele minerale clorosodice de la Sărata.

Culmea Pietricica a rămas pînă astăzi o unitate cu economie forestier-pastorală, slab populată, o adevărată insulă de pădure, între două arii foarte dens populate. Așezările de la poala răsăriteană sînt mult mai mari și mai evoluat decît cele de la vest, datorită posibilității de valorificare complementară a resurselor agricole oferite de terasele largi ale Siretului, a resurselor pădurii și a pășunilor din culmea alăturată. Creșterea puternică a satelor de aici a dus la formarea unor șiruri de așezări pe distanțe de cîteva kilometri, ca Valea Budului, Trebis, Mărgineni, Secătura, Crihan, Sohodol, Măgura, Luizi-Călugăra. Pe contactul vestic, satele sînt mult mai rare și mai mici, unele sate izolate involuind pînă la dispariție (cătunul Negel).

Depresiunea Capăta corespunde cu bazinul Pîrului Mare, care, împreună cu afluenții săi, a reușit să sculpteze această mică depresiune deluroasă, lată de 3—4 km și lungă de peste 10 km (fig. 113). Modelarea ei a fost favorizată de faciesul marnos al

meoșianului. Relieful, destul de accidentat, se menține în general sub altitudinea de 400 m, fiind dominat spre nord-vest de capătul sudic al Culmii Pietricica. Spre sud-est depresiunea este închisă de cuesta Piemontului Pănceștilor.

Adăpostirea conferă depresiunii o climă mai blîndă, scoasă în evidență de suprafața mare cultivată cu viță de vie. Deși marea majoritate a așezărilor au apărut abia în secolul XIX, totuși depresiunea a ajuns foarte bine populată, cu o densitate de peste 90 loc./km².

Piemontul Pănceștilor (Culmea Troțușului, D. Preda, 1917) se întinde din avale de Valea Răcăciunilor pînă la valea Troțușului și domină Depresiunea Capăta prin partea sa cea mai înaltă, care atinge 610 m în virful Bobeica. Se prezintă ca un plan înclinat spre sud-est, care coboară spre confluența Troțușului cu Siretul pînă la 250—300 m. Alcătuit din marne și nisipuri pliocene, acoperite de pietrișuri pliocen-cuaternare, este bine împădurit, cu asociații de gorun și carpen, sub care s-au format soluri brune luvice și luvisoluri albice. În contrast cu partea centrală, lipsită de așezări, versanții dinspre văile Siretului și Troțușului sînt urmăriți de ghirlande continue de sate.

Încă de la primele mențiuni documentare, din secolele XIV—XVI, impresionează numărul mare de așezări din Subcarpații Troțușului, multe datînd din perioada prefeudală. Din cele 88 de localități cunoscute acum, cele mai multe se concentrau, pe de o parte, într-o arie care cuprindea Depresiunea Oituz—Cașin și extremitatea sudică a Depresiunii Tazlăului (Onești, Borzești, Grozești, Filipești, Deleni, Brătîla ș.a.), iar pe de altă parte, în lungul cursului inferior al Tazlăului Sărat (Leontinești, Prohozești, Bucsești, Băleni, Hemeeni, Șesuri). Procesul de populare și de defrișare s-a accentuat simțitor în secolele XVII—XVIII, cu o însemnată contribuție a populației de origine ardeleană care a format 10 din cele 111 așezări noi, menționate acum, mai ales pe versantul estic al Culmii Pietricica (Luizi-Călugăra, Coștila, Berindești etc.) și în bazinul superior al Tazlăului Mare. Cele mai multe din așezările noi s-au format prin roire. În felul acesta din Mărgineni s-au desprins Osebiții Mărgineni, din Faraoni—Cleja, din Popeni—Căiuții ș.a. Din cele 174 de așezări existente în 1803, mai bine de o treime erau sate răzășești, cu o maximă densitate în partea centrală a Depresiunii

Tazlăului—Băsești, Cucuieți, Măgirești, Se-suri, Ardeoani, Poduri, Nadișa etc. (fig. 113).

În secolul XIX procesul de populare, ur-mat de defrișări puternice, s-a accentuat mai ales pe versanții Culmii Pietricica (Bir-zulești, Negel, Mindrișca), în Depresiunea Capăta (Păltinata), în lungul contactului cu Munții Tarcăului (Ghidion, Căsoasa) și pe valea Trotușului, avale de Borzești (Boiș-tea—Galini, Mărești ș.a.). Populația a cres-cut de peste trei ori (de la circa 30 000 locuitori, la sfârșitul secolului XVIII, la 94 197 locuitori în 1912), depășind-o pe cea a Sub-carpaților Neamțului. În secolul nostru a urmat o stagnare a procesului de formare a unor așezări noi, deoarece rețeaua de sate, deosebit de densă (235 în anul 1900, adică o localitate la 6,7 km²), nu a mai permis decît înființarea citorva cătune roite din satele apropiate (Dealul Ariei, Solomonesti, Stejaru). Pierderile umane din timpul lup-telor din 1917 (mai ales la Mănăstirea Cașin) și plecarea sătenilor împroprietăriți în afara Subcarpaților în 1921—1924 (din Cucuieți, Grigoreni, Scorțeni) au făcut ca, în perioada 1912—1930, sporul mediu anual să coboare la 3,4‰. O nouă etapă de dinamism demo-grafic s-a înregistrat în 1956—1960, sporul mediu anual fiind de 24,6‰.

După 1966 procesul de socializare a agri-culturii a determinat plecarea unui număr crescînd de forță de muncă din mediul rural, rezultînd o moderare a creșterii populației (6,5‰ în 1966—1977 și 9,6‰ în 1977—1980).

Numărul total al locuitorilor a ajuns la aproape 212 000, rezultînd o densitate medie de 127 loc./km². Densități foarte mari, de peste 170 loc./km², sînt caracteristice comu-nelor periurbane (Luizi-Călugăra, Măgura, Tîrgu Trotuș), dar în partea centrală a De-presiunii Tazlăului, mai îndepărtată de cen-trele urbane, se produce un fenomen de scădere a populației și a densității (Stru-gari, Scorțeni etc.).

Subcarpații Tazlăului se comportă astăzi ca o arie exodinamică, cu un deficit migra-toriu de -7,0 pînă la -10,0‰ anual, deși aici se înregistrează una din cele mai înalte natalități din țară (19,7‰), ajungînd chiar la 23,0‰ în unele comune (Săndulești, Pir-gărești, Cleja), iar sporul natural (11,1‰) este de peste 2 ori mai mare decît cel mediu național.

În structura profesională a populației s-a ajuns la un echilibru între populația din agricultură (42%) și cea din industrie și construcții (41%). Industria a devenit prin-

cipala sursă de venituri chiar a populației din cîteva comune (Tazlău, cu industrie proprie, Măgura, Tîrgu Trotuș ș.a., cu forța de muncă angajată în centrele urbane vecine).

Deplasările pentru muncă au ajuns la o intensitate deosebită, antrenînd circa 32 000 de navetiști. Ceva mai mult de jumătate lucrează în această regiune, iar cealaltă parte se deplasează spre centrele de polari-zare din lungul văii Siretului (Bacău, Adjud, Răcăciuni, Sascut) sau amunte pe valea Trotușului (Comănești și Dărmănești).

Cel mai vechi oraș din Subcarpații Taz-lăului, chiar reședință de ținut, a fost Tîrgu Trotuș. El a decăzut, însă, încă din secolul XVII, cînd funcțiile sale au fost preluate de Tîrgu Ocna, iar aria centrală a regiunii a rămas mult timp lipsită de un centru urban. La finele secolului XVIII și la înce-putul secolului XIX s-au ridicat cîteva tirgușoare comercial-meșteșugărești — Moi-nești, Căiuți și Valea Rea (azi Livezi) — dintre care doar Moinești, datorită industriei petrolului a ajuns un oraș propriu-zis. Lipsa unui centru coordonator puternic a fost îndepărtată prin dezvoltarea orașului Onești.

Ca în toată fișia subcarpatică, condițiile naturale au imprimat agriculturii o struc-tură mixtă, diversificată și un echilibru între culturile de cîmp și creșterea animalelor. La 0,92% din populația țării revine numai 0,6% din suprafața agricolă națională. Faptul că se obține 0,65% din producția agricolă a țării denotă o agricultură cu un grad de intensivitate peste cel mediu. Gradul de productivitate este, însă, foarte diferențiat, dovedind existența unor mari rezerve de creștere a producției.

Fragmentarea reliefului a făcut ca propor-ția terenului cultivat să fie relativ mică (31,0%), iar pășunile (17,3%) să fie peste media pe țară.

În structura culturilor de cîmp predomină porumbul (45% din arabil), acesta devenind, în comunele de la contactul cu muntele, o cultură aproape exclusivă (82% la Pîrgă-rești). Dar tocmai aici se obțin și producțiile la hectar cele mai mici, productivitatea po-rumbului crescînd în est. Grîul și secară ocupă 23% din arabil, cu o importanță mai mare în comunele din lungul văilor Trotu-șului și Oituzului.

Cultura sfecei de zahăr, stimulată de apropierea fabricilor din Sascut și Roman, este practică în comunele de pe versantul estic al Culmii Pietricica, unde depășește 10% din terenul cultivat. Cultura inului

pentru fibră s-a dezvoltat mult odată cu construirea topitoriei de la Berești-Tazlău, ajungând să dețină, în unele comune (Scorțeni) peste 8% din terenul arabil. Cartoful este cultivat cu precădere în dealurile din nord-vest, iar legumicultura ciștigă o importanță crescândă în luncile irigabile ale Troțușului și Tazlăului, în aria periurbană a orașului Onești, unde s-a extins și cultura în sere, utilizând sursele industriale de căldură.

În jumătatea sud-estică a Subcarpaților Tazlăului viile ocupă 3 200 ha. În unele comune de pe versantul estic al Piemontului Pănceștilor și al Culmii Pietricica (Valea Seacă, Faraoani) funcționează o industrie a vinificației cu numeroase centre locale. Nu se dezvoltă, în schimb, la nivelul posibilităților, pomicultura, deși s-au făcut plantații masive la Pîrgărești.

Creșterea animalelor are la dispoziție 27 000 ha de pășune și 9 000 ha finețe și se bazează în primul rînd pe fermele de tip industrial pentru creșterea bovinelor pentru lapte (la Berești-Tazlău, Ardeani Onești ș.a.) sau pentru carne (la Tirgu Troțuș și Sănduleni), a ovinelor și păsărilor (la Ardeani). La cele mai multe specii de animale, densitatea este superioară mediei naționale, în primul rînd la porcine (130/100 ha teren arabil). Specializări se conturează tot mai mult în unele comune, ca Ardeani (porcine, bovine, ovine, păsări), Măgura și Măgîrești (bovine și păsări), Tirgu Troțuș (bovine și ovine). Pe plan local, se industrializează laptele (la Onești, Moinești, Faraoani, Bîrsănești, Tirgu Troțuș și Scorțeni), precum și carnea (la Tirgu Ocna, Onești, Moinești, Scorțeni și Pîrjol).

Resursele naturale au permis un început de industrializare mai timpuriu în comparație cu alte regiuni ale țării, materializat, pe lângă industria extractivă, cunoscută încă din evul mediu, prin mori și velnițe cu aburi, fabrica de sticlă de la Grozești, primele distilerii de petrol de la Lucăcești și Tețcani etc., toate datînd din prima parte a secolului XIX. În a doua jumătate a secolului trecut și în prima parte a secolului nostru, s-au înmulțit fabricile de cherestea (la Tazlău, Scutaru, Grozești, Lucăcești, Onești, Căiuți, Poduri), au apărut fabrica de spirt din Tețcani, rafinăria de petrol din Lucăcești, fabrica de sticlă din Cucuiești, dar nivelul industrializării a rămas modest.

În perioada contemporană Subcarpații Tazlăului s-au transformat într-o puternică bază energetică și chimică a țării.

Industria energetică este concentrată în platforma industrială de la Borzești, care deține o cincime din producția de rafinate petroliere a țării și care asigură 5% din producția de electricitate.

Cea mai puternică ramură industrială este, însă, industria chimică (peste 50% din valoarea producției industriale globale), concentrată pe platforma petrochimică Borzești. Se obțin aici peste 98% din producția de cauciuc butadien-stiren, 25% din cea de sodă caustică, 21% din cea de policlorură de vinil, 16% din cea de antidăunători etc. Fenolul produs aici (trei pătrimi din producția națională) este livrat cu precădere la Săvinești, pentru fire sintetice, iar alcoolii grași fabricilor de detergenți.

Industria construcțiilor de mașini este strîns legată de cerințele celorlalte ramuri industriale specifice, producînd utilaj chimic sau reparînd utilajul forestier, petrolier și agricol.

Pe baza resurselor de lemn locale s-au dezvoltat fabricile de cherestea de fag și stejar din Onești și Căiuți, iar pe seama lemnului de conifere cele de la Cașin, Poduri, Măgîrești și Solonț.

Mai modestă este industria materialelor de construcții și industria sticlăriei. În orașul Onești s-a construit o unitate mare de confecții, iar la Berești-Tazlău o topitorie de in. În mediul rural s-au înființat numeroase ateliere și secții ale industriei mici, mai ales pentru confecții (la Bîrsănești, Tazlău ș.a.), tricotațe de lînă (la Scorțeni, Poduri), covoare (la Frumoasa), repansat stofe (la Ardeani).

Municipiul Onești s-a dezvoltat într-o foarte favorabilă poziție economico-geografică, în partea centrală a ulucului depresionar subcarpatic, într-un punct de convergență naturală a căilor de comunicație, favorizată de colectarea de către Troțuș a trei din principalii săi afluenți — Oituz, Cașin și Tazlău — și de întinderea teraselor inferioare de confluență de 5—7 și 9—12 m.

Pe locul actualului oraș a existat satul Onești, menționat pentru prima dată la 1436 („seliștea lui Oană la Troțuș” — M. Costăchescu, 1931, I, p. 490). În pofida poziției sale optime, Oneștii nu au evoluat spre o dezvoltare urbană datorită apropierii unor așezări urbane mai vechi (Tirgu Troțuș și Tirgu Ocna), ca și a vestitelor iarmaroace de la Cașin. După construirea căii ferate pe valea Troțușului (1884), Oneștii preiau o parte din funcția comercială a

Caşinului, se construiesc o fabrică de cherestea (alimentată printr-o cale ferată îngustă, pe valea Caşinului), o mică distilerie de petrol, mori, o velniţă etc. dar aşezarea rămâne un sat mare, cu funcţii industrial-comerciale secundare.

fostul sat Oneşti, ceea ce permite o bună dispersie a noxelor industriale, în condiţiile unei circulaţii predominante a maselor de aer dinspre nord-vest. Ea cuprinde rafinăria de petrol (în funcţiune din 1956), o puternică termocentrală (intrată în funcţiune în




Fig. 114. Municipiul Oneşti. A. Evoluţia teritorială: 1, Satul medieval Oneşti; 2, extinderea în secolul al XIX-lea; 3, în perioada 1901—1952; 4, în perioada 1953—1986; 5, foste sate înglobate la oraş. B. Zonele funcţionale ale municipiului: 1, industrială; 2, de transport; 3, comercial-meşesugărească; 4, cultural-sanitară; 5, rezidenţială; 6, spaţii verzi.

Urbanizarea Oneştilor a început abia în anul 1953, cînd s-a decis construirea uneia din cele mai mari şi compacte platforme industriale energetico-chimice din ţara noastră — platforma industrială Borzeşti, beneficiind de posibilitatea concentrării produselor specifice regiunii subcarpatice: petrol, gaze naturale, sare, lemn şi apă industrială. Platforma industrială a fost organizată în lungul văii Trotuşului, la est de

acelaşi an), un combinat chimic, specializat în produse clorosodice (în funcţiune din 1959) şi un combinat de cauciuc sintetic (din 1959), ulterior, combinatul chimic şi cel de cauciuc sintetic s-au unit, dînd naştere combinatului petrochimic. Pe lângă acestea s-a dezvoltat şi industria construcţiilor de maşini (întreprinderea de utilaj chimic, în funcţiune din 1975), s-au construit o nouă termocentrală, cu cărbune, şi unităţi ale industriei

alimentare și ușoare. În felul acesta, municipiul Onești a devenit al doilea pol industrial al județului Bacău (fig. 114).

Construcția platformei industriale a antrenat o creștere corespunzătoare a populației (numai la Combinatul petrochimic lucrează 14 000 de persoane). Creșterea cea mai rapidă a avut loc în anii 1956—1966, cînd populația s-a ridicat de la 11 253 la 35 663 de locuitori. Ulterior, ritmul de creștere a devenit mai moderat, orașul ajungînd la 41 577 de locuitori în anul 1977 și la 59 008 în 1992. Sporul migratoriu este susținut atît de mediul rural local, cît și de personalul cu calificare superioară, originar din vechile centre industriale. În structura profesională a populației ocupate predomină cei care lucrează în industrie și construcții (69,0%), urmați de activii în învățămînt, sănătate și cultură (11,7%). Pe lîngă forța de muncă locală, municipiul Onești atrage și o foarte numeroasă forță de muncă navetistă, circa 15 000 de persoane, din care 11 500 lucrează în industrie și construcții, care se deplasează zilnic și săptămînal, mai ales pe calea ferată din lungul văii Trotușului (din comunele Ștefan cel Mare, Tirgu Trotuș ș.a.) și din cele de pe valea Tazlăului (Helegiu ș.a.).

Orașul propriu-zis cuprinde peste 15 000 de apartamente noi și s-a construit la vest de platforma industrială, pe terasele dintre văile Oituzului și Cașinului, parțial pe teren liber (în sud-est) și parțial pe locul fostului sat Onești. Au fost înglobate în oraș și alte foste așezări rurale, unele juxtapuse intravilanului (Malu, Borzești și Crucea de Pia-tră), altele încă izolate, pe stînga Trotușului —Slobozia Mielului și Poiana Nucului.

Municipiul Onești, cel mai mare oraș nou din țară, a fost construit după un plan modern, cu două magistrale de tranzit (Bulevardul Republicii și Bulevardul Oituz) și alei de acces pietonal și înregistrează cei mai înalți indicatori edilitari din întreaga țară. Pe lîngă funcția industrială dominantă (zonele industriale reprezintă 65% din intravilan), orașul își dezvoltă treptat și celelalte funcții urbane: de transporturi, de învățămînt, sanitară, comercială și turistică.

Tirgu Ocna este un oraș tipic de contact, apărut chiar pe limita dintre Subcarpații Moldovei și Carpații Orientali, pe valea Trotușului, într-un loc cu condiții favorabile, datorită dezvoltării largi a terasei de 9—12 m pe stînga văii și a prezenței unor resurse

naturale variate (sare, săruri de potasiu, petrol, roci de construcție, ape minerale).

Situat într-o arie de vechi locuire (așezările geto-dacice de la Titelca și Podei), Tirgu Ocna își trage originea dintr-un sat care a înregistrat un proces treptat de urbanizare, paralel cu intensificarea exploatarei sării și cu ruralizarea așezării urbane vecine, Tirgu Trotuș, fiind considerat pentru prima dată „tirgușor” de Dimitrie Cantemir, singurul centru de exploatare a sării din Moldova medievală. Pînă în 1781 și-a păstrat un statut special, cu o anumită autonomie, ceea ce i-a permis, în secolul XVIII și în prima parte a secolului XIX, o dezvoltare foarte rapidă, atît sub aspectul populației (de la 900 de locuitori în 1646 la 8 159 de locuitori în 1859), cît și sub aspect teritorial (de la 20 ha în 1700, la 329 ha în 1900). A urmat o fază de stagnare (în 1948 orașul avea 9 796 de locuitori) și o înviorare economico-socială în perioada contemporană, orașul ajungînd la 16 122 de locuitori în 1992. A crescut ponderea activilor în industrie și construcții (50,0% față de numai 20,4% în 1930), dar o bună parte din populația ocupată (circa 560 de persoane) lucrează în exterior, pendulînd mai ales spre platforma industrială Borzești. În prezent are o funcție industrial-mesteșugărească prin industria lemnului (mobilier), exploatarea sării, petrolului și gazelor naturale, industria ușoară (confecții, tricotaje de lînă, încălțăminte), alimentară și a materialelor de construcții. Orașul asigură legătura feroviară pentru stațiunea balneară Slănic-Moldova și are funcție balneoclimatică proprie (tratament pentru boli astmatice în salina veche și valorificarea izvoarelor clorosodice sulfuroase). Specific, sub aspect fizionomic, este aspectul de aglomerație urban-rurală, derivat din înglobarea unui număr mare de așezări vecine (Gioseni, Tisești, Mosoare, Pîriu Boghii, Gura Slănicului ș.a.) și din conservarea unei importante proporții de spațiu verde în intravilan.

Orașul Moinești este situat pe linia de contact dintre Subcarpați și munte, într-o șă relativ joasă (470 m) dintre Munții Goșmanului și cei ai Berzunțului, care permite o relație lesnicioasă între bazinul Tazlăului Sărat și Depresiunea Comănești.

Orașul are origini rurale îndepărtate, satul Moinești fiind menționat pentru prima dată în 1438. Spre finele secolului XVIII, la nord-est de sat, în lungul drumului Bacău—Comănești, a apărut un nou nucleu,

comercial-meșteșugăresc, care s-a unit, cu timpul, cu vechiul sat. În secolul XIX, pe seama accentuării exploatării petrolului și a apariției, după 1840, a primelor rafinării de petrol din Moldova, populația a crescut simțitor — de la 2 107 de locuitori în 1859, la 4 357 în 1899. Ascensiunea a continuat și în secolul nostru, mai ales după acordarea în 1921 a statutului de oraș, numărul locuitorilor ridicându-se la 8 512 în 1941 și la 25 607 în 1992. Majoritatea absolută a populației ocupate lucrează în industrie și construcții, dar, pe lângă aceasta, orașul atrage din satele apropiate un număr mare de angajați (peste 3 000 de persoane), datorită dezvoltării funcțiilor productive în perioada contemporană. În același timp se produce și un flux pendulatoriu centrifug îndreptat spre exploatarea petrolifere din bazinul Tazlăului Sărat.

Industria orașului este legată de exploatarea petrolului și a gazelor naturale, aici fiind un sediu al regiei petrolului, care activează în toată partea de nord-est a țării, cu o serie întreagă de unități de întreținere și reparare a utilajului. Secundar se dezvoltă industria alimentară (morărit, panificație, produse lactate, preparate din carne), industria lemnului (mobilier), industria confecțiilor și tricotajelor. Fiind doar cap de linie feroviară, se dezvoltă, în compensație, importante relații de transport auto, în special spre Depresiunea Tazlăului, care gravitează prin partea sa central-nordică spre Moinești. Orașul s-a extins mult în suprafață, atât prin construcția unor cartiere noi de locuințe (Albotești), cât și prin înglobarea satelor apropiate (Văsiești, Lucăcești, Hangani, Dealu Mare, Lunca ș.a.).

4.2.3.3. Subcarpații Neamțului

Constituie partea cea mai nordică a Subcarpaților. În cuprinsul lor se individualizează Depresiunea Cracău—Bistrița, Dealurile Corni—Mărgineni—Runcu, Depresiunea Ozana—Topolița și Culmea Pleșului.

Depresiunea Cracău—Bistrița se întinde în lungul celor două riuri după care a fost denumită, pe o lungime de peste 60 km și cu o lățime până la 16 km. În nord, la Crăcăoani, o șa cu altitudinea de 545 m face trecerea spre Depresiunea Ozana—Topolița, apoi limita vestică merge în jurul altitudinii de 600 m, pe la poalele munților până la valea Nechitului. De aici urmărește interfluviul

Bistrița—Tazlău și iese din nou în valea Bistriței, la Buda. Limita estică trece pe la est de Buhuși, pe sub Dealul Mărgineni și pe flancurile vestice ale Măgurii Șerbeștilor și ale Dealului Corni. Aliniamentele de așezări ușurează mult delimitarea, chiar dacă sint mai puțin continue decât în Subcarpații Tazlăului. La fel ca depresiunile de la sud, și aceasta corespunde cu același sinclinoriu, alcătuit din roci miocene. Acvitanianul apare doar sub forma unei fișii înguste, la contactul cu flișul, conținând sare gemă, săruri de potasiu și gips, lângă Cozla sau în sectorul piraiei Calu și Iapa. Burdigalianul este, de asemenea, slab reprezentat, apărind doar în partea nordică a depresiunii, dar întinzându-se cea mai mare o are helvețianul, în facies marnos-grezos. În colțul sud-estic al depresiunii capătă o extindere mai mare badenianul, format din marne cenușii-gălbui, cu intercalații groase de gipsuri și lentile de sare (fig. 115).

Relieful este caracterizat prin larga dezvoltare a șesurilor și teraselor Bistriței și Cracăului. Șesul Bistriței, cu lățimi până la peste 2 km, este format din trepte aluviale cu altitudini de 0,5—1, 1—2 și 2—4 m. Între Cut și Săvinești, pe stînga Bistriței, apare o terasă de 5—7 m cu lățimea până la 400 m, dar o extindere mai mare are terasa de 15—20 m, a cărei altitudine scade treptat, ajungînd la Buhuși la 5 m. Această terasă atinge o lățime de 3 km și este alcătuită, ca și cea de 5—7 m, aproape în întregime din pietrișuri. Și terasa de 35—40 m este foarte extinsă, ajungînd la 3,5 km lățime amunte de Traian. Peste soclul ei urmează 8—10 m de pietrișuri și apoi 8—10 m de luturi loessoide. Fragmentar apare o terasă de 50—55 m, pe dreapta Bistriței, la Văleni, ceva mai extinsă una de 75—90 m, cu un depozit aluvionar format de 10 m pietrișuri și peste 10 m luturi. Terasa de 100—110 m și de 165—170 m se dezvoltă îndeosebi în afara Depresiunii Cracău—Bistrița (I. Donisă, 1968).

Și în lungul Cracăului treptele șesului sint larg dezvoltate, dar terasele de 5—7 m și de 10—15 m au o extindere redusă. Ceva mai extinsă este terasa de 25—30 m, pe dreapta Cracăului, pe cînd terasa de 35—40 m apare sporadic. În Dealul Turtureștilor și în Dealul Vulpea se dezvoltă terasele de 75—90 m și 100—120 m. Terasa inferioară, până la circa 35—40 m altitudine relativă, sint bine dezvoltate și în lungul Cucejdului,

al Nechitului, pe pîraiele Iapa și Calu (I. Doniș, 1968 c).

Treptele de luncă și mai ales terasele constituie terenuri favorabile pentru cultura cerealelor, cartofului, plantelor de nutreț, sfecei de zahăr și leguminoaselor pentru boabe. Așezările omenești găsesc, de asemenea, cele mai bune condiții în lungul frunților de terasă, în apropierea izvoarelor, extinzîndu-se în alinamente paralele cu rîurile principale: Cut și Brășăuți pe terasa de 5—7 m; Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Slobozia, Zănești, Podoleni și Costișa pe terasa de 15 m; Izvoare, Dumbrava-Deal și Traian pe terasa de 35—40 m etc. Amenajările hidroenergetice au valorificat judicios amfiteatrul de terase ale Bistriței și Cracăului, canalele de deviere din Bistrița fiind în așa fel executate încît hidrocentralele să fie amplasate în trepte pe frunțile de terasă (hidrocentrala Roznov I, pe fruntea terasei de 35—40 m). Relieful este mai fragmentat în sud-vestul depresiunii, la sud de valea Nechitului, amintind aspectul caracteristic din Depresiunea Tazlăului. Versanții sînt puternic afectați de alunecări și de eroziune, iar fragmentarea a condiționat risipirea satelor pînă la gospodării izolate. Pădurea a rămas numai în petice, prin înlocuirea cu livezi și finețe.

În climă se resimt, pe de o parte, influențe continentale, iar pe de alta, unele influențe ale muntelui. Temperatura medie anuală este în jur de 8°C. Verile sînt calde, fără ca temperatura medie lunară să urce pînă la 20°C, iar iernile reci, încît media lunii ianuarie coboară sub -3°C. Precipitațiile se mențin în jur de 650 mm, dar în timpul verii perioadele de secetă sînt frecvente și efectul lor este accentuat de permeabilitatea pietrișurilor și a solurilor nisipoase. În lungul Bistriței se resimte manifestarea vînturilor de munte-vale (Fl. Mihăilescu, 1973).

Spre contactul cu Munții Stînișoarei, pe interfluviul dintre Cracău și Almaș se găsesc păduri în care foioasele intră în amestec cu molidul. Dealurile înalte dinspre limita depresiunii intră, de regulă, în domeniul pădurii de fag, ca pădurea de pe flancul nord-estic al Dealului Balaurului (C. Burduja, 1948) sau cea de la poala Muntelui Cozla. În etajul fagului se dezvoltă și mesteacănul (versantul nordic al Dealului Cășăria), ca și carpenul (Dealul Balaurului). Aria centrală a depresiunii a intrat în domeniul pădurii de evercinee, însă aceasta a fost aproape

integral defrișată, lăsînd doar urme în toponimia locală (Dumbrava Roșie). Efectele de foehn din fața ieșirii văii Bistriței din munte, influențele continentale și permeabilitatea mare a solurilor au permis înaintarea unor elemente silvostepice (P. Enculescu, 1926).

Clima mai rece și mai continentală decît în Subcarpații Trotușului reduce mult cultura vîței de vie, neînsenate pareele de vie menținîndu-se doar pe unele frunți de terasă, bine adăpostite, din sud-estul depresiunii sau în unele bazine, închise spre nord-vest, de pe dreapta Bistriței.

În sectorul nord-vestic al depresiunii, cu o climă mai răcoroasă și mai umedă decît în restul depresiunii, la nivelul pădurii de fag predomină solurile brune luvice, trecînd spre luvisoluri albice sub pădurea mixtă de fag și conifere sau în soluri brune argilo-iluviale sub pădurea de fag și evercinee. O extindere mai mare o au, însă, cernoziomurile argiloiluviale și solurile cenușii, care predomină în părțile centrală și estică ale depresiunii și pe terasele de 35—40 m. Pe treptele neînnundabile de luncă sînt cernoziomuri și cernoziomuri cambice. Impermeabilitatea depozitelor argiloase din substrat a impus, pe alocuri, pseudogleizarea solurilor molice, chiar în partea centrală a depresiunii, iar pe unele culmi secundare plate și pe versanți mai puțin înclinați din restul depresiunii s-a ajuns la soluri pseudogleice luvice, greu utilizabile în agricultură. În sud-vestul depresiunii, unde peste 80% din teren este afectat de eroziune, sînt foarte frecvente regosolurile și erodisolurile (Gh. Lupășcu și colab., 1978).

Artera hidrografică principală a Depresiunii Cracău—Bistrița a suferit intervenția omului, care a deviat-o pe o lungime de peste 30 km, în vederea amenajărilor hidroenergetice, în același scop fiind amenajat și Lacul Racova, cu o suprafață de circa 1 km² și un volum de 11 mil. m³. Apa Bistriței pune, astfel, în funcțiune hidrocentralele Roznov I și II, Zănești, Costișa și Buhuși, fiecare cu o putere de 11,5—14,5 MW, totalizînd o capacitate de 67,7 MW. Sistemul de lacuri de pe Bistrița și funcționarea hidrocentrelor au modificat complet regimul hidrologic al rîului. Cursului natural i se asigură un debit minim de 2,75 m³/s, prin intermediul lacului-tampon de lingă Piatra Neamț; prin aportul afluenților din avale la

întrarea în lacul Racova, Bistrița ajunge la un debit mediu de 19,4 m³/s.

Cracăul are un debit mediu la vărsare de numai 1,34 m³/s; 43% din scurgerea anuală este concentrată în lunile de primăvară și 33,5% în cele de vară. Uneori seacă aproape complet, dar la viituri debitul său poate ajunge la 380 m³/s și se pot scurge câteva zeci de milioane de metri cubi într-o singură viitură (față de un volum al scurgerii de 42 mil. m³ într-un an mediu).

Apele Bistriței și Cracăului se folosesc la irigarea a circa 4 000 ha pentru legumicultură și la culturile de cîmp (Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Costișa).

Dealurile Corni—Mărgineni—Runcu constituie rama estică a Depresiunii Cracău—Bistrița și reprezintă partea cea mai puțin tipică a Subcarpaților Moldovei. Această ramă nu se prezintă ca o culme continuă, ci sub forma unor înălțimi deluroase izolate, separate prin șei largi și joase. Doar parțial sînt constituite din miocen cutat, iar la partea superioară din depozite sarmațiene. De altfel, tocmai pietrișurile și nisipurile sarmațiene au permis menținerea acestor dealuri ca forme dominante de relief. Mai bine au rezistat gresiile și conglomeratele din Măgura Șerbeștilor.

Alcătuirea geologică nu pledează categoric pentru înglobarea acestor dealuri într-o culme subcarpatică propriu-zisă, ci mai curînd într-o unitate de tranziție între Subcarpați și Podișul Moldovei („Podișul piemontan sarmatic”, C. Martiniuc, 1960).

Ele formează rama estică a Depresiunii Cracău—Bistrița, dar versanții lor estici și șeile dintre ele prezintă aspecte asemănătoare celor ale Podișului Moldovei. Pe aceste dealuri precipitațiile ajung la 700 mm anual și de aceea au fost acoperite cu păduri de gorun și carpen, dar cu frecvență mare a fagului, pe culmile mai înalte și pe versanții nordici, precum și a stejarului, în părțile mai joase și pe versanții sudici (C. Burduja, 1948, 1957; C. Burduja și colab., 1973). Și astăzi pădurea se menține în bună parte.


Cele mai răspîndite sînt solurile brune luvice și luvisolurile albice, întrerupte de petice de soluri pseudogleizate (pe marnele helvețiene), rendzine (pe gresiile oolitice calcareose din Măgura Șerbeștilor) și soluri scheletice (pe pietrișuri). Pe șaua dintre dealurile Mărgineni și Runcu continentalizarea climii a permis pătrunderea solurilor molice (Gh. Lupășcu și colab. 1978). Aceste dealuri

reprezintă o arie mai slab populată, între marile concentrații de populație din valea Moldovei și din Depresiunea Cracău—Bistrița. Satele sînt relativ rare, multe destul de recente (Tolici). Uneori se mai păstrează aureolele de defrișare, ca la Runcu (fig. 115).

Depresiunea Ozana—Topolița (N. Bucur, 1954; G. Davidescu, 1969), numită și Depresiunea Neamțului (M. David, 1932) sau Depresiunea Nemțișorului (N. Popp, 1936), reprezintă una din cele mai caracteristice depresiuni subcarpatice, cu o lungime de circa 28 km și lățime de 3—14 km. Spre vest este închisă de Munții Stînișoarei prin înălțimile Poiana Comorii (858 m), Ruscul Neamțului (834 m), Dealul Doboreanului (883 m), Muncelul Agapia (893 m) și Dealul Mare Vărăticu (978 m). Limita între depresiune și munți se află în jurul altitudinii de 600—680 m, încît unele înălțimi mai joase, ca Dealul Filioru, deși constituite din fliș, se înscriu în nivelul subcarpatic. În sud-est, depresiunea este limitată de o serie de înălțimi ale masivului deluros Corni (Ghindăul 576 m, Dumbrăvioara 551 m, Coarnele Berbecului 469 m și Lupăria 452 m). Limita estică este marcată de capătul apusean al Dealului Boiștei, pe la circa 500 m altitudine, iar cea nord-estică trece pe la poalele Culmii Pleșului, urcînd de la 450 m la nord de Tîrgu Neamț, pînă spre 600 m în extremitatea de nord-vest a depresiunii. Linia de contact din sud-vestul depresiunii este marcată de un aliniament de așezări aproape contopite: Agapia—Filioara—Vărătec—Valea Seacă—Valea Arini—Băltătești—Ghindăoani. Și această depresiune se suprapune sinclinoriului precarpatic, în care apar diferitele etaje ale miocenului, cu predominarea helvețianului (marne cenușii și roșietice, cu intercalații de gresii, nisipuri și gipsuri, în general slab rezistente la eroziune) (fig. 116). În depozitele acvitanene, din sud-vest, este cuprins un masiv de sare care generează apele clorurate valorificate în stațiunea balneară de la Băltătești (fig. 116).

Partea centrală a depresiunii, cu altitudini sub 450 m, este formată din terasele și sesurile Ozanei și Topoliței. O a doua treaptă de relief este dată de interfluvii deluroase din partea central-sudică a depresiunii, cu altitudini în jur de 500—550 m. Acestea au aspectul de poduri sau culmi largi, ușor ondulate. Marginile de vest și nord-est au altitudini de 550—680 m și sînt

Fig. 115. Relieful, mărirea și funcțiile așezărilor din Subcarpații Neamțului. 1, Dealuri subcarpatice; 2, arii depresionare: a, dealuri joase din cuprinsul depresiunilor; b, terase și lunci; 3, șei; 4, așezări cu funcții industriale; 5, industrial-agricole; 6, agricole; 7, agricole și de servicii; 8, căi ferate; 9, drumuri. I, Depresiunea Rîșca; II, Depresiunea Neamțului; III, Depresiunea Cracău-Bistrița; IV, Bazinetul Chilia; V, Bazinetul Budești.






Fig. 116. Șaua Bălățești, între depresiunile Neamțului și Cracău—Bistrița (foto C. P. B.).

mai puternic fragmentate, sub forma unor culmi scurte, ca niște contraforturi care sprijină înălțimile Stinișoarei și Culmea Pleșului.

Terenurile arabile sînt concentrate, în cea mai mare parte, în aria centrală, utilizînd mai ales terasa de 2—6 m, din lungul Ozanei, Nemțișorului, Topoliței, Văii Seci și pîrului Netezi, care poate atinge o lățime de 1,5 km, ca și terasa de 10—15 m, de pe Ozana, Nemțișor, Topolița, mai propice pentru culturi, datorită cuverturii de luturi loessoide groase (de 4—5 m). Interfluviile deluroase din partea central-sudică înregistrează o creștere substanțială a suprafețelor folosite ca livadă sau fineată, în timp ce rama înaltă este încă împădurită sau folosită ca pășune.

Caracterul de depresiune submontană atrage după sine o climă răcoroasă și relativ umedă, cu frecvente inversiuni termice și invazii de aer rece. La Tîrgu Neamț media anuală a temperaturii este de 8,2°C, media lunii ianuarie coboară la -3,8°C, iar cea a lunii iulie nu trece de 19,5°C. Totuși, extremele termice sînt destul de îndepărtate, cu maxime care se ridică pînă la 37°C (august 1952) și minime ce coboară pînă la -27,5°C (ianuarie 1954). Cantitatea medie anuală de precipitații este în jur de 650 mm, în partea centrală, dar crește pînă la 700 mm pe rama mai înaltă. Aproximativ 44% din precipitații se înregistrează în intervalul mai-iulie.

În partea centrală, aproape complet defrișată astăzi, se mai păstrează cîteva petice de pădure de gorun și stejar, cum este Braniștea Neamțului, rezervație naturală, pe terasa de confluență de 10—15 m a Ozanei cu Nemțișorul. Pădurea de fag și carpen se menține mai bine pe marginea estică a depresiunii, între Nemțișor și Tîrgu Neamț, apoi la contactul cu Muncelul Agapia. Pădurea mixtă, de fag și rășinoase, este caracteristică extremității nord-vestice a depresiunii, în jurul Mănăstirii Neamț, iar în unele puncte mai înalte aceasta trece chiar în pădurea de conifere, cu o proporție mare a bradului, de exemplu între Văratie și Agapia.

Clima specifică a depresiunii imprimă trăsături distincte peisajului agrar, din care dispare aproape complet via, crescînd în schimb substanțial suprafețele cultivate cu cartof, in, trifoi, orz și secară.

În partea central-estică a depresiunii sînt răspîndite solurile cenușii și chiar cernoziomurile argiloiluviale, reflectînd unele influențe climatice estice și o îndelungată antropizare. Pe interfluvii domină solurile brune luvice și luvisolurile albice, cu petice de planosoluri și soluri negre clinohidromorfe, determinate de drenajul slab și substratul marnos.

Culmea Pleșului corespunde unui anticlinal în care aflorează îndeosebi conglomerate burdigaliene, cu numeroase

elemente de şistui verzi. În unele butoniere din axul anticlinalului sînt dezgolite chiar şi depozite paleogene (Valea Catrinei de la nord-vest de Tîrgu Neamţ), strate de Bisericiani, menilite inferioare şi marne bituminoase (T. Joja, 1941). Flancurile anticlinalului sînt formate din gresia de Moişa, de culoare cenuşie-verzuie, iar la poalele nord-estice ale culmii apare o fişie de depozite badeniene, cu lentile de sare, care generează slatinele de la Oglinzi, folosite în trecut în tratamentul balnear. Anticlinalul Pleşului încalecă peste depozitele badeniene, iar la rîndul lor acestea sînt împinse peste Platforma Moldovenească în lungul liniei pericarpatică.

Este o culme lungă de 24 km, dar îngustă, unitară şi cu profil longitudinal zimţat, datorat şeilor create la obirşiile văilor care îi brăzdează flancurile. Doar valea transversală a pîrîului Moişa a reuşit să străpungă culmea, pătrunzînd pînă în Depresiunea Ozana—Topoliţa. O altă strângulare a culmii este produsă de Slatina, afluent al Nemîşorului. În general, altitudinea se menţine la peste 700 m, atingînd valoarea maximă de 911 m în Dealul Ceardac, la nord de Mănăstirea Neamţ, dar coborînd în capătul sud-estic, pînă la 531 m. Flancurile sînt brăzdate de văi torenţiale, eroziunea fiind favorizată de slaba cimentare a conglomeratelor burdigaliene şi de prezenţa marnelor badeniene.

Avînd o climă răcoroasă şi umedă, Culmea Pleşului este aproape complet acoperită cu păduri de fag, de fag şi conifere sau chiar de conifere (molid, cu puţin brad). Capătul sud-estic, spre Tîrgu Neamţ, este îmbrăcat cu plantaţii de pin, iar spre poale chiar de salcîm. Pe conglomerate sînt predominante solurile brune eu-mezobazice, cu cantităţi mari de schelet. Pe rocile marnoase şi argiloase apar frecvent procese de pseudogleizare. Datorită înclinării mari a versanţilor, eroziunea solului este accentuată.

Culmea Pleşului este aproape complet lipsită de aşezări omeneşti. În afară de folosinţa forestieră, doar o mică parte din terenuri este destinată economiei pastorale.

La nord-vest de Culmea Pleşului, Subcarpaţii Neamţului capătă trăsături specifice, datorită îngustării accentuate a fişiei miocenului cutat. În aceste condiţii, între Rîşcuţa şi Suha Mare apare un sector care închide spre nord-vest Subcarpaţii Moldovei. Unitatea subcarpatică este aici mai intim legată de munte — dinspre contactul cu

flîşul carpatic coboară un contrafort, curmat de şei, format din depozite miocene, iar la nord-est de acesta, la obirşiile opuse ale pîraielor Slătioara şi Sasca Mare, se creează un uluc, cu altitudinea pînă la 600 m, dominat dinspre est de o culme mică, cu altitudine de 703 m. Totul este acoperit cu pădure de amestec (fag şi molid), precum şi cu pădure de conifere.

Pe lîngă dovezile de natură arheologică, vechimea populării Subcarpaţilor Neamţului este demonstrată de numărul mare de aşezări menţionate în primele acte de proprietate, din secolele XIV—XVI, majoritatea în Depresiunea Cracău—Bistriţa (Blăgeşti, Cîndeşti, Orbic, Beţeşti, Rediu, Mastacăn, Borleşti, Goşmani etc.), chiar dacă unele şi-au schimbat numele (Costişa, fost Hîrliceşti sau Crăcăoani, fost Pînteceşti). La nord de şaua de la Crăcăoani, satele vechi sînt, însă, mai puţine (24 din totalul de 110 menţionate în această perioadă), procesul de defrişare fiind aici ceva mai tardiv. Popularea sectorului nordic, mai izolat şi mai bine împădurit, a fost stimulată şi de numeroasele mănăstiri şi schituri înfiinţate mai ales de domnii Moldovei, transformate frecvent în sate (ca Mănăstirea Neamţ ş.a.). În secolele XVII şi XVIII, procesul de populare continuă, mai ales prin roirea unor noi aşezări din satele-matecă, primele înaintînd treptat spre cursurile superioare ale rîurilor (Slătioara, roită din Rîşca). Se obţine astfel un echilibru mai bun între cele două compartimente ale Subcarpaţilor Neamţului, din cele 139 de aşezări existente în 1789 (harta lui H. v. Oztellowitz), 34 fiind la nord de şaua Crăcăoanilor.

Ritmul cel mai mare al populării (şi defrişării) este înregistrat în secolul XIX, totuşi nu în aceeaşi măsură ca în bazinele Trotuşului şi Caşinului: de la circa 32 000 de locuitori, în jurul anului 1800, populaţia a ajuns la 91 847 de locuitori, în 1912. Acum se ocupă locurile libere din centrul Depresiunii Cracău—Bistriţa, unde se înfiinţează multe sate de impropietărire (Dumbrava Roşie, Dochia, Doina, Traian), în care se mută şi locuitorii unor sate vechi, dispărute (Troita, Virlani ş.a.). Continuă, în acelaşi timp, procesul de roire spontană, formîndu-se sate noi, spre obirşiile văilor din părţile marginale: Gropi (desprins din Văratec) sau Curechiştea (desprins din Grumăzeşti). În 1912 se ajunge la 158 de aşezări, din care 39 la nord de şaua Crăcăoanilor.

În secolul nostru, procesul de populare a fost continuu și mai rapid decât în Subcarpații Tazlăului, astfel că populația a crescut de peste două ori și a ajuns în prezent la peste 207 000 de locuitori. În prima parte a secolului, a continuat formarea de sate noi, de împroprietărire, ca Dumbrava Vale și Dumbrava Deal, acestora adăugându-li-se ulterior și așezări ale strămutaților din zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui (Humulești Noi), fără ca să înceteze total nici crearea unor sate de poienire în părțile marginale (Pădureni ș.a.). Multe sate au ajuns, astfel, să se juxtapună, dispărînd, cel puțin în nomenclatură, unele sate vechi ca Măscătești, Bahna ș.a. Ritmul cel mai înalt de creștere a populației a fost între anii 1956 și 1966, rezultînd dintr-o suprapunere a unui proces activ de industrializare peste un spor natural cu valori ridicate.

Densitatea medie a populației (156 loc./km²) este mult mai mare decît media țării și sensibil mai mare decît în Subcarpații Trotușului, în unele comune industrializate din lungul culoarului Bistriței fiind depășit nivelul de 200 loc./km² (Săvinești și Roznov).

În perioada actuală, Subcarpații Neamțului continuă să atragă populație din exterior, datorită capacității de polarizare a orașelor Piatra Neamț și Tîrgu Neamț, sporul migratoriu fiind de 0,3‰ anual. Mediul rural are, însă, un bilanț migratoriu negativ, cu plecări masive din comunele cu o poziție mai izolată, ca Mărgineni (cu un bilanț migratoriu pînă la -34,6‰). Doar în cîteva comune, ca Mălini (cu o activitate economică puternic diversificată) sau Piatra Șoimului și Reditu (cu poziție favorabilă efectuării deplasărilor zilnice), sporul natural mai reușește să compenseze deficitul migratoriu, în timp ce unele sate izolate (Deleni, Verșești, Făurei, Micșunești, Corni ș.a.) au pierdut peste o pătrime din locuitori în ultimul sfert de veac. Totuși, în comparație cu nivelul obișnuit, populația rurală se dovedește destul de stabilă, pe acest fond distingîndu-se chiar unele așezări cu creșteri peste 50% în anii 1956—1977, datorită fie structurii economice mai evolute (Roznov, Borlești, Ruseni, Căciulești), fie natalității foarte ridicate (Dumbrăveni, Poiana Negustorului).

Sporul natural este determinat de o natalitate viguroasă (19,2‰ în 1989) și de o mortalitate redusă (8,6‰), depășind astfel sensibil valoarea medie națională. Interesant este faptul că astăzi cele mai ridicate sporuri

naturale sînt în mediul urban, datorită aflului de tineri adulți, în timp ce în comunele mai izolate apare o tendință de îmbătrînire. În ansamblu, însă, structura pe grupe de vîrstă este caracterizată prin ponderea ridicată a populației tinere, cu deosebire în comunele cu natalitate mare din nordul regiunii (Mălini, Rîșca) și în cele care își rețin mai bine tineretul, datorită apropierii de centrele urbane — Piatra Șoimului, Reditu ș.a.

Deși nivelul industrializării este asemănător cu cel din Subcarpații Trotușului, totuși populația ocupată în industrie și construcții (45,0%) predomină aici în mod net asupra celei din agricultură (35,0%), fapt explicabil prin dezvoltarea unor ramuri industriale care necesită relativ multă forță de muncă (ca industria textilă), dar și prin rolul mai mare pe care-l dețin serviciile în orașul Piatra Neamț. Cea mai netă amprentă industrială o au orașul Buhuși și comunele cu preponderența populației ocupate în industrie, datorită navetei spre centrele apropiate, care este mai mare ca în Subcarpații Trotușului — Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Costișa ș.a.

Industrializarea rapidă, densitatea mare a populației rurale și dotarea satisfăcătoare cu facilități de transport au generat curenți de deplasare, care antrenează peste 15% din forța de muncă, mai ales spre gruparea Piatra Neamț—Săvinești—Roznov. Participarea navetiștilor la acoperirea necesarului de forță de muncă al centrelor din exteriorul Subcarpaților (Bacău ș.a.) este, însă, mai mică.

Agricultura este mai bine dezvoltată decît în Subcarpații Trotușului. Gradul de intensitate mai ridicat este demonstrat de faptul că, la o populație egală, se obține o valoare superioară a producției agricole (0,69% din totalul național) de pe terenuri cu folosință agricolă mai restrînsă (0,55% din totalul pe țară). Există și aici diferențieri interne, cu arii cu o agricultură foarte productivă (centrul Depresiunii Cracău—Bistrița) și altele cu rezultate mai modeste (sectorul de la sud-vest de valea Bistriței, cu relief frămîntat). Terenul arabil ocupă 45,9%, datorită suprafețelor mai mici lăsate pentru pădure, pășune și teren neproductiv. Forța de muncă din agricultură însumează 36 000 de persoane, revenind 43,4 activi în agricultură la 100 ha teren agricol convențional, valoare mai mult decît dublă față de media țării și care reflectă densitatea mare a

populației rurale. Dacă în comunele de pe contactul cu Carpații densitatea subzistențială atinge chiar valoarea de 100 (la Slătina și Piatra Șoimului), în schimb, în centrul Depresiunii Cracău—Bistrița (la Girov, Roznov, Zănești), cu sub 30 de activi în agricultură la 100 ha agricol convențional, se resimte în perioadele de vîrf un anumit necesar suplimentar de forță de muncă.

Necesitatea asigurării unei game cît mai largi de produse agroalimentare a impus culturi care întrunesc condiții ecologice mai puțin favorabile, de aceea orientarea către o agricultură cît mai adecvată la condițiile de mediu a dus la o reducere a dominanței excesive a culturilor cerealiere. Porumbul ocupă 30% din arabil, dar și aici își păstrează o importanță deosebită în zona înaltă, de contact cu Carpații. Cu grîu și secară se cultivă circa 20% din arabil, în proporții mai mari în comunele din sud, în timp ce în părțile mai înalte (Crăcăoani) grîul a dispărut complet din cultură.

Cartoful deține 8,7% din terenul de cultură, iar la nord de Culmea Pleșului trece chiar pe primul loc în structura terenului arabil. Specifică este și cultura inului pentru fuior, cu o pondere (4%) de aproape 6 ori mai mare decît media națională, mai ales în aria de aprovizionare a topitoriei de la Căciulești. Sfecla de zahăr se cultivă cu precădere în lungul căilor ferate (la Costișa, Podoleni) și al șoselor (Romăni, Făurei, Mărgineni), prin care se alimentează fabrica de zahăr din Roman. Legumicultura este în plin progres, cu deosebire pe terenurile irigate din lungul văii Bistriței (Dumbrava Roșie, Podoleni, Costișa).

Pomicultura ia locul viticulturii în jumătatea nordică a Subcarpaților Moldovei, o adevărată specializare pomicolă conturîndu-se în sudul Depresiunii Ozana—Topolița (cu 4—7% din suprafață sub livadă la Agapia, Grumăzești și Băltătești) și spre marginile Depresiunii Cracău—Bistrița (Ștefan cel Mare, Romăni). În plantațiile sistematice din comunele specializate (Băltătești, Grumăzești, Ștefan cel Mare) predomină mărul, iar prunul a rămas pe primul loc în livezile mici, tradiționale (Borlești, Piatra Șoimului). O pondere notabilă are și părul, la Dobreni și Ștefan cel Mare. Fructele sînt industrializate în unitățile din Tîrgu Neamț, Vinători-Neamț și Băltătești.

Zootehnia este mai dezvoltată decît în Subcarpații Trotușului, în special în comunele în care s-au construit ferme industriale

pentru creșterea bovinelor pentru lapte (Băltătești, Bodești, Girov ș.a.), a taurinelor pentru carne (Zănești), a ovinelor (Mărgineni, Vinători-Neamț). Însuși orașul Piatra Neamț este un puternic centru zootehnic, cu mari ferme de bovine, păsări și porcine. Zootehnia se bazează în primul rînd pe furajele cultivate și pe cele 19 000 ha de pășune și 6 000 ha de fîneață. La bovine (63 capete/100 ha teren agricol), ovine (150/100 ha) și păsări densitățile sînt mult mai mari decît pe plan național. O puternică industrie alimentară valorifică produsele animale — brînzeturi (Girov), carne și preparate de carne (Dumbrava Roșie). Creșterea tradițională a ovinelor explică dezvoltarea industriei textile a lîinii, plecînd de la vechiul artizanat casnic din feudalism.

Începuturile unei anumite industrializări datează dintr-o perioadă ceva mai timpurie decît în alte părți ale Moldovei, pe baza unor resurse naturale mai variate. Așa au apărut atelierele de postav de la Mănăstirea Neamț (1852). În 1912 industria era reprezentată de o mică rafinărie de petrol (la Roznov), trei fabrici de postav, una de sticlărie, una de mobilă, șase fabrici de cherestea, patru de ceramică și cărămidă, un abator, o fabrică de alcool și 29 de mori mecanice, pe lîngă 82 de mori de apă, din care 16 numai în satul Iapa. Astăzi, deși în Subcarpații Neamțului nu trăiește decît 0,90% din populația României, se obține totuși 1,1% din producția industrială globală.

În cadrul industriei grele, cea mai importantă ramură a devenit industria chimică, care asigură 42% din producția industrială. Aceasta este concentrată pe platforma industrială Săvinești—Roznov, unde se produce întreaga cantitate de fibre poliacrilonitrilice din țară (peste 35 000 t/an), cea mai mare parte din firele poliamidice (circa 40 000 t), aproape 10% din producția de îngrășăminte cu azot (azotat de amoniu, uree), circa 30 000 t acid sulfuric etc. Industria fibrelor sintetice de aici are strînse legături de producție cu unitățile textile din regiune (Piatra Neamț, Buhuși etc.), din țară (București, Sibiu, Timișoara) și cu partenerii externi.

Industria lemnului, ramură cu vechi tradiții, are o mult mai largă distribuție teritorială, în afară de orașe, secții producătoare de cherestea funcționînd la Vinători-Neamț, Mănăstirea Neamț, Roznov (aceasta aprovizionată, însă, din exploatările de lemn din bazinul Tazlăului), Rîșca, Bodești ș.a. În

strînsă relație cu exploatarea lemnului și cu deșeurile de la industrializarea acestuia este industria celulozei și a hirtiei. Ceva mai modestă ca nivel de dezvoltare este industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor.

În industria materialelor de construcții se pot menționa producția de cărămidă, țiglă și teracotă (Vinători-Neamț, Agapia, Mălini), ca și de prefabricate de beton (Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznów).

Industria textilă și a confecțiilor este mult mai bine dezvoltată ca în Subcarpații Troțușului, deținînd 22,5% din producția industrială. Această ramură contribuie cel mai mult la ridicarea industrială a comunelor prin unitățile de industrie mică: covoare la Băltătești, tricotaje la Crăcăoani, confecții la Bodești etc.

În interiorul Subcarpaților Neamțului nivelul urbanizării este mai scăzut, cele trei orașe, care au o poziție marginală, grupează circa 35% din populație, deși acestea au făcut progrese mari față de trecut.

Municipiul Piatra Neamț este cel mai important oraș din Subcarpații Moldovei, dezvoltarea sa fiind favorizată de poziția economico-geografică cu condiții urbane optime, la contactul Carpaților flișului cu Depresiunea Cracău-Bistrița, în punctul în care Bistrița primește, pe stînga, afluentul său Cuejdul, ceea ce deschide posibilități multiple pentru relațiile economice, atît spre munte, cît și spre dealuri. Privită în detaliu, așezarea orașului este foarte originală, vatra inițială fiind adăpostită de înălțimi cu versanți abrupti, sculptate în fliș: Cernegura în sud-vest (852 m), Cozla în nord (650 m) și Pietricica în est (531 m), în mica depresiune dintre acestea dezvoltîndu-se larg terasa de luncă de 2—4 m a Bistriței și terasa de 15—20 m, care față de Cuejdul are o altitudine relativă de numai 10 m. Această terasă are o frunte abruptă (permițînd fortificarea în trecutul istoric) și importante resurse acvifere freatice. Clima de adăpost, ferită de vînturi, cu amplitudini termice relativ mici și precipitații moderate, pădurea de fag și molid, bine conservată pe versanții înconjurători (parțial refăcută, prin plantații de pin pe Pietricica și Cozla) și apele minerale clorosodice de la poalele muntelui Cozla, adaugă valențe balneoclimatice așezării (I. Donisă, P. Poghire, 1968).

Piatra Neamț este un oraș apărut în prima parte a feudalismului, în mijlocul unei

arii de veche populare. Numeroase descoperiri de așezări întărite ale geto-dacilor, pe înălțimile din jur, cum sînt cetatea de pe Bitca Doamnei, cea de pe Cozla și cea de pe piciorul Boluhoia (N. Gostar, 1965) susțin ideea, acceptată de majoritatea istoricilor, că aici a existat antica așezare Petrodava, înscrisă pe harta lui Ptolemeu. Faptul că pe Bitca Doamnei au fost descoperite urme feudale din secolele XII—XIII (C. Scorpan, 1965), că prima mențiune a orașului, din 1388—1391, este sub forma *Piatra lui Crăciun* și existența în imediata apropiere a vechiului sat al Tătărășilor (C. Cihodaru, 1960) sînt tot atîtea argumente pentru admiterea existenței aici a unui centru urban anterior formării statului feudal moldovenesc, probabil nucleu al unei formațiuni politice locale, axată pe valea Bistriței. Vechimea funcției sale politico-defensive, în fața trecătorilor spre Ardeal, s-a transpus ulterior în organizarea de către Ștefan cel Mare a unei curți domnești, menționată pentru prima dată în 1491 (C. Turcu, 1937), curte care administra și cel mai mare ocol domnesc din Moldova medievală, cu 32 de sate (D. Ciurea, 1965).

Ca majoritatea orașelor medievale moldovenesti, Piatra a fost formată inițial din două nuclee, strîns legate unul de celălalt: curtea domnească fortificată, pe terasa de 15—20 m (acolo unde astăzi se ridică liceul „Petru Rareș”) și cartierul comercial-meșteșugăresc, pe terasa de luncă, dezvoltat pe malul drept al Cuejdului, în lungul fostei Ulițe Vechi (str. Ana Ipătescu de astăzi). În secolul XVII are loc procesul de urbanizare și de cuprindere treptată în oraș a vechiului sat Mărăței, de pe stînga Cuejdului, în paralel cu creșterea importanței funcțiilor productive, în special a prelucrării lemnului, cu bresle bine închegate, cum a fost breasla butnarilor din Mărăței, menționată în 1665 (I. Șimanschi, 1969) (fig. 117A). În secolul XVIII intensificarea exploatarea lemnului și a plutăritului în bazinul Bistriței, ca și preluarea funcției de reședință de ținut duc la depășirea de către Piatra a Tîrgului Neamț, populația atîngînd 1 245 de locuitori în 1774 și 2 020 de locuitori, în 1790. Acum se conturează, în funcție și de caracteristica spațiului construibil, începutul unei evoluții teritoriale tentaculare, cu extinderi în cartierul Precista (în jurul drumului spre Bicaz), pe valea Cuejdului, amunte de nucleul vechi (cartierul Bordeie) și pe glaciul de la poalele Cozlei, spre suburbia

Valea Viei (harta lui H. von Oetzellowitz, 1790). Secolul XIX marchează o etapă de creștere mai rapidă a orașului, reflex al începuturilor industriale (fabrica de hirtie a lui Gh. Asachi, care a funcționat între 1841 și 1867, fabrici de cherestea, fabrică de bere, moară cu aburi ș.a.), al dezvoltării comerțului și al legării la rețeaua feroviară, în 1885. Populația a crescut de la circa 2 500 de locuitori în 1820, la 3 007 de locuitori în 1832, 12 100 de locuitori în 1859 și 17 765 de locuitori în 1899. Orașul s-a extins mai ales spre vest, pe Cîmpul Borzoghianului (R. Semaca, 1938), spre nord-vest (unde este înglobată Valea Viei), și pe terasa de 10 m de pe stînga Cuejdului, accentuîndu-se aspectul tentacular al așezării. La oarecare distanță de marginea orașului, în sud-est, s-a construit prima gară (denumită astăzi Gara Veche).

În prima parte a secolului XX, Piatra Neamț și-a amplificat funcția industrială cu noi unități de industrializare a lemnului, cu două fabrici de celuloză, hirtie și mucava, o fabrică de tricotaje, mici unități metalurgice, un laborator farmaceutic. Pe plan regional a devenit primul centru al industriei cherestelei din întreaga Moldovă. În anii 1921—1924 se fac parcelări de noi cartiere de locuințe în zonele Gara Veche, Cîrtei ș.a. (Gh. Verșescu, 1971). În lunca Bistriței s-au construit, la sud de oraș, gara nouă (1901) și unități de industrializare a lemnului. Acum s-a produs și înglobarea unor sate apropiate, ca Dărmănești pe valea Cuejdului, Sărata la vest de oraș, Vinătorii Pietrei la sud-est, Chindia și Văleni pe dreapta Bistriței. Creșterea populației a fost, însă, mai lentă, în 1930 înregistrîndu-se 25 100 de locuitori, iar în 1948 — 26 303 (fig. 117A').

Perioada contemporană reprezintă o fază de evoluție o orașului deosebit de dinamică, dezvoltarea bazîndu-se pe extinderea și diversificarea funcției industriale, pe valorificarea complexă a resurselor materiale și de forță de muncă ale văii Bistriței. Acum se ridică aici ramuri industriale (în special chimia și construcțiile de mașini), crește rolul de polarizare în teritoriu și atracția exercitată de oraș asupra ariei rurale înconjurătoare, se adîncește angrenarea orașului în sistemul unitar al economiei naționale (fig. 117A).

Piatra Neamț a devenit astăzi unul din orașele cu ritmul de creștere cel mai rapid dintre orașele țării, populația crescînd la 32 648 de locuitori în 1956, 45 925 de locui-

tori în 1966, 78 100 de locuitori în 1977 și 123 175 de locuitori în 1992 (fig. 117A'). Pe lângă contribuția substanțială a sporului natural (12‰), sporul total se bazează și pe un puternic spor migratoriu (13‰). Sub aspectul structurii profesionale, dominanța industrială a orașului este evidențiată de faptul că 60,4% din populația ocupată lucrează în industrie și construcții, față de 11,3% în învățămînt, sănătate, cultură și artă sau de 8,2% în circulația mărfurilor. Cu toate acestea, necesarul de forță de muncă este suplimentat, mai ales pentru platforma industrială Săvinești, de aproape 17 000 de angajați din mediul rural (din care peste 13 000 în industrie), care pendulează centripet, zilnic sau săptămînal, provenind din comunele Săvinești, Dumbrava Roșie, Bodești, Dobreni, Girov etc.

Teritorial, orașul nu a înregistrat o creștere prea puternică (de la 722 ha în 1944, la 1 350 ha astăzi), extinderea avînd loc mai mult pe seama noilor unități industriale din sud-est, în timp ce cartierele rezidențiale s-au dezvoltat prin creșterea în densitate și înălțime. S-au construit, pînă în 1984, peste 32 000 de apartamente noi, în care locuiește peste 81% din populație (fig. 118). Au fost reconstruite aproape integral centrul vechi al orașului, cartierele Mărăței și Precista și s-a ridicat, în nord-est, noul cartier Dărmănești, singur acesta cuprînzînd 11 000 de apartamente.

Funcția industrială a orașului este axată pe industria chimică, cu unitățile de pe platforma Săvinești și cu întreprinderea de medicamente „Plantavorel”. Pe locul al doilea se situează industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, specializată în utilaj agricol, utilaj pentru industria firelor și fibrelor sintetice, construcții metalice etc. Foarte complex este profilul industriei alimentare (carne și preparate din carne, produse lactate, produse de panificație, bere, băuturi alcoolice, amidon, glucoză). În domeniul industriei celulozei și hîrtiei au fost modernizate cele două unități existente, iar fabricile de cherestea au fost completate cu secții de mobilier, plăci aglomerate ș.a. La acestea se adaugă industria textilă (tricotaje, ciorapi), cea a confecțiilor și a materialelor de construcție (produse ceramice, prefabricate de beton etc.). În felul acesta, peste 43% din producția industrială a




Fig. 118. Aspect din zona centrală a municipiului Piatra Neamț (foto C. P. B.).

judetului Neamț este concentrată în orașul reședință.

Orașul și-a consolidat foarte mult funcția politico-administrativă, mai ales după reînființarea județului Neamț, în 1968, și funcția cultural-școlar-sanitară. S-au organizat un teatru al tineretului, muzee (de istorie, artă, științe ale naturii), numeroase licee de specialitate (de chimie, industrializare a lemnului etc.), s-a construit o nouă clădire a spitalului ș.a. Funcția turistică a orașului este concretizată prin rolul de placă tur-nantă pentru întreaga regiune turistică a Neamțului și de creșterea capacității de ca-zare în hoteluri moderne.

Zonele funcționale ale orașului nu au o detașare netă. În partea centrală se menține nucleul comercial-meșteșugăresc, sistematizat și modernizat. Unitățile industriale sînt distribuite în zonele periferice, cele mai compacte fiind zona industrială din sud-estul orașului (cu noile unități ale industriei con-structoare de mașini și ale industriei lemnu-lui) și platforma industrială Săvinești. Zone

industriale mai mici se disting în jurul Gării Vechi, în lungul Bistriței, în cartierul Dăr-mănești și în periferia vestică (fig. 117B). Instituțiile culturale, școlare, administra-tive și sanitare se grupează cu o densitate maximă în zona central nord-vestică, la poa-lele parcului de pe Muntele Cozla. Orașul a făcut progrese mari și pe plan edilitar, prin generalizarea alimentării cu apă în sistem centralizat, extinderea încălzirii centrale la marea majoritate a locuințelor, sistematiza-rea tramei stradale, extinderea spațiilor verzi și organizarea transportului în comun cu autobuzele (fig. 118).

Orașul **Buhuși** este o așezare urbană dez-voltată într-o poziție geografică interme-diară, aproximativ la jumătatea distanței dintre cele două orașe mai vechi de pe valea Bistriței, Bacău și Piatra Neamț.

Premisele apariției sale se conturează în primele decenii ale secolului XIX, în faza de proliferare a târgușoarelor comerciale, generate de dezvoltarea producției-marfă în agricultura Principatelor Române. În 1819 a început organizarea unor iarmaroace pe moșia vechiului sat Bodești (București),

menționat din secolul XV, ceea ce a favorizat așezarea unor negustori și meșteșugari la sud-est de sat, în apropierea curții familiei Buhuș, aceasta dînd și un act, în 1823, de învoială cu noii țirgovetți, așezarea pîrtind, pînă în 1855, numele de Bodeștii Buhușoaiiei. Populația a crescut de la 313 locuitori în 1832, la 1 873, în 1859, iar ȧirgul s-a unit treptat cu vechiul sat. Spre deosebire de alte ȧirgușoare care au decăzut, Buhușii și-au valorificat poziția pe noua cale ferată de pe valea Bistriței construită în 1885, chiar în acest an înființîndu-se o importantă unitate industrială — fabrica de postav Alcaz, care devine treptat prima unitate din bransa industriei lîinii din întreaga țară (L. Georgescu, 1941). În legătură cu dezvoltarea fabricii se construiește un al treilea nucleu al așezării — Colonia Fabricii, pe terasa de 5 m a Bistriței. În sfîrșit, în timpul împrîrietărilor din 1921—1924 se conturează și un al patrulea nucleu component al așezării — Cartierul Nou, pe terasa de 55—60 m, la sud-est de cartierul comercial. Deși orașul a evoluat mult în direcția compactării, și astăzi fruntea abruptă a terasei de 55—60 m marchează un hiatus în țesutul urban, între cartierele înalte și cele de pe terasa joasă. În secolul nostru populația a continuat să crească, de la 3 300 de locuitori în 1899, la 21 671 de locuitori în 1992 (inclusiv localitățile componente — Ciolpani, Mocani, Runcu, Marginea, Orbic). Populația ocupată în industrie și construcții are o pondere deosebit de ridicată (75,4%); în structura pe sexe predomină în mod net femeile. În perioada contemporană, deși a continuat dezvoltarea industriei textile și a confecțiilor, care reprezintă 55% din valoarea producției industriale, s-a urmărit o dezvoltare mai complexă a industriei, în special a celei energetice, alimentare, a lemnului și materialelor de construcții.

ȧirgu Neamț este așezat într-o foarte bună poziție geografică pe valea Ozanei,

între terminația sud-estică a Culmii Pleșului și Dealul Boiștea.

Oraș vechi, menționat din 1388—1391, probabil centru al unei formațiuni politice prestatale românești, protejat ulterior de una din cele mai importante cetăți de apărare ale domnilor Moldovei, ȧirgu Neamț a jucat un rol de seamă în Moldova medievală, în calitate de centru administrativ al ȧinutului Neamț, de centru comercial și meșteșugăresc. Ajuns în 1749 în proprietatea mănăstirii Neamț (de la care s-a răscumpărat abia în 1870), și-a pierdut funcția administrativă și a rămas într-o relativă izolare prin lipsa unei căi ferate; ȧirgu Neamț se menține în rîndul orașelor mici (7 257 de locuitori în 1859, 8 948 de locuitori în 1948), iar încercările de înființare a unei industrii moderne (fabrica de postav din 1853) nu au dat mult timp rezultat.

În perioada contemporană orașul a intrat într-o fază de revitalizare economico-socială, mai ales prin construirea căii ferate care îl leagă de Pașcani. Populația a ajuns la 22 221 de locuitori în 1992. Din populația ocupată, 39,5% lucrează în diverse servicii și 41,3% în industrie și construcții, dar la aceasta se adaugă peste 5 000 de muncitori care pendulează din comunele apropiate.

Funcția industrială este orientată prioritar spre industria textilă (volvatir, fire semipieptănate, covoare), industria confecțiilor, a blănăriei, a lemnului (mobilă-corp, mobilă sculptată, scaune, cherestea, butoaie), industria alimentară (brînzeturi, semiconservă de fructe, preparate de carne), industria materialelor de construcții și industria cauciucului. Specifică este și funcția turistică, atît datorită obiectivelor de interes cultural-istoric din oraș (Cetatea Neamțului, casa natală a lui I. Creangă), cît și rolului deținut în circulația turistică din întreaga Depresiune Ozana—Topolița. În structura orașului este specifică concentrarea mai multor foste așezări rurale în jurul nucleului urban propriu-zis (Humulești, ȧuțuieni, Condreni, Pometea).



PIEMONTUL GETIC

5.1. Relieful. Geneza și trăsăturile generale

Începutul cunoașterii geografice a Piemontului Getic — în primul rând ca unitate de relief — este relativ târzie și coincide cu introducerea în literatura geografică românească atât a termenului de piemont, cât și a numelui de Piemont Getic (V. Mihăilescu, 1946) și poate că nici una dintre marile unități geografice nu a fost atât de bine caracterizată genetic prin însuși numele care i-a fost atribuit cum este Piemontul Getic. Adoptarea numelui cu peste patru decenii în urmă reflectă, pe de o parte, gradul de adâncire a cunoașterii geografice a teritoriului, iar pe de altă parte necesitatea de a se indica prin nume un conținut mai precis și mai complet decât puteau indica numele de *Platformă pericarpatică olteană*, *Platformă Getică*, *Podișul Getic*, folosite curent în manualele și cursurile vremii. Numele de *Piemont Getic* exprimă nu numai poziția unității în aria getică din fața și la marginea sudică a Carpaților Meridionali, ca treaptă de trecere între munți și Cîmpia Dunării, dar într-o mare măsură și unele trăsături morfogenetice.

Modul de utilizare a acestui nume în ultimii 35—40 de ani arată că noțiunea de piemont nu este exclusiv geomorfologică, ci a căpătat un conținut mai larg, un conținut complex, geografic. Ca realitate geografică piemontul este în primul rând un *cadru sau un complex teritorial* în cuprinsul căruia se manifestă fenomene relativ diferite (ca natură și proporții) în raport cu cele obișnuite

în regiunile muntoase și de cîmpie alăturate (T. Morariu, V. Mihăilescu, 1973, p. 10—11).

Sub numele de Piemont Getic este cuprinsă, așadar, unitatea geografică a cărei întindere nu coincide cu ceea ce genetic ar corespunde cu piemontul format la poalele Carpaților Meridionali. Numele este atribuit numai părții păstrate ca formă de acumulare piemontană (sau piemontul relict), de vîrstă villafranchiană (V. Mihăilescu, 1966), separată de munte prin apariția ulterioară a Subcarpaților Getici, ca urmare a distrugerii cuverturii piemontane și scoaterii în evidență a structurilor subcarpatice (L. Badea, 1973). Influența Carpaților (care a fost hotărîtoare pentru formarea cîmpiei piemontane inițiale de la sud) s-a menținut, de asemenea determinantă (în condițiile nou-create) și pentru evoluția ulterioară a piemontului (distrugerea lui parțială), devenit podiș piemontan supus fragmentării, o unitate bine delimitată și individualizată geografic. Piemontul Getic prezintă caractere evidente de tranziție între munte și cîmpie, nu numai din punct de vedere geomorfologic și sub raportul condițiilor și resurselor naturale, ci și sub acela al utilizării și valorificării lor, al dezvoltării rețelei așezărilor și al aspectului peisajelor, în foarte mare măsură modificate de om.

Pornind de la aceste considerente, limitele Piemontului Getic sînt acelea care arată, pe de o parte, pînă unde se întinde cuvertura piemontană formată în faza villafranchiană a evoluției reliefului (ceea pe care s-a greșit ulterior un anumit relief, indiferent dacă există sau nu o materializare morfologică clară a limitelor lui), iar pe de altă parte, care este extensiunea unui anu-

mit tip de peisaj umanizat, diferit de peisajele specifice Subcarpaților și cîmpiei, deși din multe puncte de vedere se aseamănă cu acestea amîndouă, constituind ceea ce s-a numit adesea o unitate sau o regiune de tranziție.

Piemontul Getic se întinde între Dimbovița și Dunăre, dar în extensiunea lor formațiunile piemontane nu se opresc la cele două văi. Depunerile piemontane de aceeași vîrstă se găsesc și la vest de Dunăre, în Iugoslavia, pe marginea Podișului Miroc, ca și la est de Dimbovița, păstrate în ariile sinclinale din Subcarpații Prahovei. Limita de est, pe Dimbovița, este stabilită nu numai în funcție de extensiunea cuverturii piemontane, ci și pe considerente structurale și de evoluție a reliefului (determinate de schimbările care se produc în stilul și modul de desfășurare a structurilor subcarpatice). În vest limita este reprezentată de Dunăre pe o porțiune de numai 25 km, iar în continuare spre nord-est, pînă la Motru, aceasta este precizată de culoarul depresionar Bala—Drobeta-Turnu Severin, sculptat între Podișul Mehedinți și Piemontul Motrului, și anume de șirul de cueste în unghi, destul de fragmentate, care delimitează în est aceste depresiuni (L. Badea, Mihaela Dinu, 1974; Al. Șchiopoiu, 1982).

Limita spre Subcarpați este stabilită tot în lungul șirului foarte festonat de cueste care indică cele mai nordice resturi ale piemontului villafranchian, dar numai parțial este foarte clară pentru că gradul de înaintare a eroziunii variază foarte mult local. Numai pe alocuri limita corespunde cu cuestele care închid spre sud unele depresiuni intracolinare. De la Motru limita urmărește versantul drept, abrupt, al văilor Tismanei și Jiului pînă la sud de Rovinari; de unde trece în lungul cuestei Cioianei pînă la Gilort. Între Gilort și Olt, ca urmare a fragmentării reliefului în culmi paralele și a menținerii formațiunilor pliocene în structură monoclină care a favorizat apariția unei întregi succesiuni de cueste în unghi (înscrise pe intercalațiile nisipoase și de pietrișuri), este dificil de stabilit o limită tot atît de sigură ca la vest de Gilort. Nu peste tot cele mai nordice resturi din cuvertura piemontană sînt marcate de cueste bine înscrise în relief spre a da o limită morfologică clară (fig. 120).

Faptul că pe culmile deluroase imediat de la nord de această limită cu mers în zig-zag

(cu înaintări spre nord, pe culmi și retrageri spre sud, în dreptul văilor, ocolind pe alocuri lărgirile locale, considerate schițări ale depresiunii intracolinare, ca cea de la Sinești), se mai păstrează fragmente din cuvertura piemontană, că structura este monoclină, că litologic deosebirile sînt minime, iar aspectele și dinamica actuală a reliefului au asemănări cu ceea ce este mai la sud, în piemont, toate acestea l-au determinat pe V. Mihăilescu (1966, p. 176) să admită existența unei fișii de dealuri de tranziție între Piemontul Getic și Subcarpați, dar care se integrează în unitatea mare de relief a Subcarpaților. Într-o astfel de situație se află mai ales culmile dintre Cerna și Olt într-o fișie de 8—10 km, pe aliniamentul localităților Copăcenii—Popești—Băbenii.

La est de Olt, limita are același mers frînt cu avansări spre nord, pe culmi, și retrageri spre sud, pe văi, așa cum sînt dispuse cuestele în unghi pe aliniamentul Curtea de Argeș—Retevoiești—Mihăești—Cindești.

Și în această parte estică se observă aceeași trecere treptată de la piemont la Subcarpați și în același mod se pune problema dacă se poate vorbi de o fișie de dealuri de tranziție (la contactul dintre cele două unități), ce-ar putea fi definită și delimitată ca atare. Mai ales culmea dintre Olt și Topolog (Dealul Negru), acoperită de depozite piemontane pînă în dreptul văii Simnicului, poate face obiectul unei astfel de discuții, dar dacă din punctul de vedere strict al genezei și evoluției reliefului limita trebuie pusă la valea Simnicului, considerentele geografice de ansamblu limitează Piemontul Cotmenei la Topolog.

Nici limita sudică a Piemontului Getic nu este suficient de clară pe toată întinderea sa din vestul Olteniei pînă la Dimbovița. Ținînd seama de evoluția cuaternară a întregii arii getice, de faptul că aceasta a funcționat ca un întins spațiu piemontan ușor diferențiat sub influența manifestărilor variate ale proceselor neotectonice și mai ales ale acțiunii rețelei hidrografice, este de înțeles că nu ne putem aștepta la un contact uniform între Piemontul Getic și cîmpia de la sud, cu atît mai mult cu cît această cîmpie aparține aceleiași arii de acumulare piemontană și, în ciuda prelucrărilor fluviatile mai noi, își păstrează evidente caracterele de cîmpie de acumulare piemontană (fig. 120).

Pe toată porțiunea dintre Dunăre și Desna, Dunărea, formind terasele din Oltenia, a tăiat abruptul care limitează spre sud Piemontul Bălăciței. Mai la est, piemontul se continuă pe nesimțite în cîmpie printr-o suprafață topografică unică și numai o analiză de detaliu arată că într-o fișie de cîțiva km lățime situată între Craiova (Circăa) și Balș se trece de la Piemontul Oltețului la Cîmpia Româneșului. Între Olteț și Olt, Dealul Șarului marchează evident o limită morfologică, care însă se continuă, la est de Olt, tot printr-o fișie de tranziție (argumentată numai prin detalii geomorfologice), ce se situează cu aproximație de-a lungul căii ferate Slatina—Corbu (L. Bădea, Cornelia Stăncescu, 1960).

Denivelarea dinspre valea Argeșului nu lasă nici o îndoială asupra limitei sudice a Piemontului Cindești între Pitești și Găești, dar existența teraselor întinse și coborîrea lor gradată spre sud și est, pînă se confundă cu cîmpia, nu au făcut posibilă apariția unei denivelări pe care să se poată stabili fără ezitări o limită clară între piemont și cîmpie. Argumentele geomorfologice aduse de D. Paraschiv (1965) îndreptățesc a rămîne cu limita la valea Cobiei, ceea ce, din acest punct de vedere, ar însemna extinderea cîmpiei piemontane Tîrgoviște—Ploiești la vest de Dimbovița și, în acest fel, apariția unei subdiviziuni noi, aceea a Cîmpiei Picior de Munte. Totuși, după ambianța generală și modul de utilizare a terenurilor, se include piemontului și prelungirea sud-estică, pînă la Gura Șuții, a teraselor din latura sud-estică a Piemontului Cindești.

Genetic și structural, Piemontul Getic aparține Depresiunii Getice, în care procesul de sedimentare început încă din senonian avea să continue, cu variații mari, pînă în cuaternar, stimulată de accentuarea continuă a Avandosei Carpatice, dar ceea ce interesează în mod special pentru formarea lui se reduce la faza de încheiere a ciclului de sedimentare pliocen. Punctul de referință pentru începutul genezei piemontului trebuie considerat momentul de „liniște” din ultima parte a pliocenului, dinaintea manifestării puternice a mișcărilor valahice, cele care au avut efecte determinante pentru stabilirea direcției de evoluție a acestei noi unități de relief adăugată la edificiul carpatic al teritoriului țării. Depunerile de molasă ale Depresiunii Getice nu sînt limitate la falia pericarpatică — luată ca limită între Orogenul

Carpatic și Platforma Valahă, aceasta fiind acoperită cu o stivă groasă (ce se reduce spre Dunăre), alcătuită din formațiuni ce încep cu transgresiunea din tortonian și se încheie cu regresiunea română-cuaternară. Acumulările piemontane încheie, așadar, acest ciclu (marcînd exondarea întregii arii getice) și se extind atît pe Avandosa Carpatică, cît și pe Platforma Valahă, iar pentru aprecierea genezei piemontului și a resurselor geologice ale acestuia trebuie luată în considerare întreaga arie getică, indiferent de caracterelor fundamentului pe care se află (fig. 119).

Stiva de roci a Depresiunii Getice are dimensi de mii de metri dar procesul de acumulare nu a fost continuu. Există numeroase discontinuități cu caracter regional, care arată neuniformitatea mobilității tectonice a fundamentului și variabilitatea în timp a extensiunii Bazinului Getic și a condițiilor de sedimentare, de la cele de mare adîncă pînă la cele litorale grosiere, transgresive, lagunare, lacustre de mică adîncime și de mlaștină, fapt reflectat și de existența unor zăcăminte minerale formate în astfel de condiții.

Formațiunile paleogene arată că în întreaga Depresiune Getică acumularea s-a produs în condiții de calm tectonic, iar mișcările savice de la sfîrșitul paleogenului nu au produs deformări plicative. Numai în tortonian, concomitent cu o transgresiune de proporții mari, diastrofismul stîrce schițează structurile cutate, cunoscute la zi în Subcarpații Getici. Cu toate acestea, numai mișcările moldavice din sarmatianul inferior au dus la individualizarea Depresiunii Getice ca unitate structurală (V. Mutihac, L. Ionesi, 1974, p. 485), pentru că mișcările ulterioare doar au accentuat structurile anterioare, fără a produce modificări esențiale. De aceea, formațiunile pliocene (în care s-au recunoscut numeroase discontinuități stratigrafice) sînt în general monoclinale și foarte ușor prinse în structurile cutate care se continuă și se afundă sub cuvertura nouă (pliocen-cuaternară). Mișcările din pliocen, în special cele din faza valahă, au accentuat într-o anumită măsură structurile preexistente dar ele au avut rolul mai ales de a înălța aria din fața Carpaților (odată cu acestea), determinînd exondarea și transformarea ei într-o unitate de relief accentuat supusă eroziunii.

Resursele geologice principale constau în zăcăminte de combustibili minerali (hidro-




Fig. 119. Profil geologic schematic cu direcție nord-sud prin Piemontul Cotmenei (după harta geologică 1 : 200.000 și D. Paraschiv, 1979). 1, Roci mezo- și epimetamorfice; 2, formațiuni paleozoice; 3, roci eruptive (granite, granodiorite, diorite [cuartifere) din orogeneza baikaliană; 4, formațiuni triasice; 5, formațiuni jurasice; 6, formațiuni cretacice predominant calcaroase; 7, paleogen; 8, aquitani; 9, burdigali; 10, helvețian; 11, tortonian; 12, sarmatian; 13, meotian; 14, pontian; 15, dacian; 16, romanian; 17, pliocen nediferențiat; 18, formațiuni cuaternare (depozite [piemontane, depozite loessoide); 19, bază de formațiune transgresivă; 20, falie.

carburi și cărbuni inferiori) și de sare. Acumulările de petrol și gaze au fost puse în evidență și exploatate în numeroase structuri asemănătoare cu cele din Subcarpați, dar legate și de fundamentul valah, mai ales spre periferia sudică a piemontului. Structurile productive sînt localizate în Piemontul Oltețului (Bustuchin, Hurezani—Zătreani—Tetoiu—Balș—Iancu Jianu; Ghercești—Șimnic), în Piemontul Cotmenei (Merişani, Drăganu, Cocu—Vedea—Moșoaia, Ciurești—Vața, Săpata, Cungrea, Verguleasa) și în Piemontul Cîndești (Bogați, Valea Caselor, Cobia).

Zăcămintele de lignit se găsesc aproape în toată aria de apariție a pliocenului, cu deosebire în dacian și romanian. Se consideră că aproape în întreg Piemontul Getic de la vest de Olt există strate de lignit, dar exploatabile sînt numai cele din partea sa nordică: din Piemontul Motrului, în arealul Motru—Drăgotești—Rovinari (cu trei orizonturi în dacian și patru în romanian); din Piemontul Oltețului între Gilort și Olteț (Tirgu Cărbunești—Roșia), unde se cunosc zece orizonturi în dacian și două în romanian și între Olteț și Olt (Alunu—Berbești—Copăceni, cu șase orizonturi daciene).

Urmărind pachetele de strate de vîrstă daciană și din romanianul inferior, în care sînt zăcămintele de cărbuni, este ușor de constatat că aproape întreaga arie getică a funcționat ca bazin de adîncime mică, în care au avut loc retrageri și reveniri repetate ale apelor lacustre. Este un regim caracteristic de „liniște tectonică”, dar intercalațiile de depozite mai grosiere (de nisipuri și pietrișuri din ce în ce mai consistente pînă devin întru totul dominante în romanian), indică începuturile unor manifestări tectonice și o schimbare în activitatea rețelei hidrografice carpatice. Cu timpul, aceste simptome s-au accentuat, determinînd o eroziune accentuată în regiunea de munte, supusă înălțării,

și acumularea materialelor grosiere la marginea acesteia. Sfârșitul pliocenului corespunde, așadar, cu începutul fragmentării ultimei suprafețe de nivelare carpatice și cu evacuarea unor cantități mari de materiale detritice, care vor grăbi colmatarea lacului getic și exondarea Piemontului Getic.

Această nouă unitate de relief, construită printr-un proces foarte complex de acumulare lacustră și aluvio-proluvială, care în unele porțiuni periferice a durat și după villafranchianul superior, nu trebuie văzută ca o câmpie piemontană, terminală, unică și invariabilă din marginea munților până în actuala Câmpie a Dunării. Cu toate că Piemontul Getic este considerat ca unitate de relief relativ omogenă, nu înseamnă că formarea și exondarea lui s-au făcut uniform și rapid pe toată întinderea lui, de la nord la sud și de la Dunăre la Dîmbovița. Din villafranchianul inferior până în günz nici condițiile tectonice, nici procesul de colmatare a lacului getic nu au fost uniforme (ca intensitate, în timp și regional), iar definitivarea acestei unități a decurs în etape și pe zone succesive de la nord la sud, dar diferențiate pe compartimente sub influența manifestărilor variate ale neotectonicii.

În timp ce partea nordică era definitivată și supusă modelării subaerene, partea sudică era încă în plin proces de acumulare fluvio-lacustră. Ca urmare, trebuie să admitem nu numai o vîrstă diferită a cuverturii piemontului de la nord la sud, dar și o alcătuire litologică diferită. Bolovănișurile și pietrișurile grosiere din partea nordică (evidente mai ales în Piemontul Cotmenei și Piemontul Cindești) nu se mai întîlnesc în sud, fiind înlocuite cu pietrișuri mărunte, nisipuri fine și nisipuri lutoase. Se observă o diferențiere generală a depozitelor în același fel și de la est la vest, ceea ce reflectă neuniformitatea regională a condițiilor în care s-a desfășurat acumularea. Este de presupus că formarea părții sudice a piemontului s-a făcut în mare măsură pe seama distrugerii și remanierii a însăși cuverturii piemontane mai vechi, din vecinătatea muntelui, cînd o bună parte din structurile subcarpatice au fost scoase în relief de sub această cuvertură. Sfârșitul villafranchianului coincide, deci, pe de o parte cu încheierea fazei de acumulare a Piemontului Getic, iar pe de altă parte cu detașarea lui de munte și punerea în evidență a Subcarpaților printr-un proces de eroziune, rapid desfășurat, sub influența

mișcărilor de înălțare aparținînd aceleiași faze tectonice valahe.

Avansarea eroziunii și modelarea de ansamblu a reliefului, în funcție de structurile subcarpatice scoase la zi, au dus la crearea în nord a unui ansamblu de forme cu totul diferite — subcarpatice — față de piemontul relict de la sud, în care acțiunea riurilor a fost foarte puțin influențată de condițiile geologice mai de adine, iar întreaga rețea hidrografică principală și-a menținut un caracter consecvent, creînd văi largi, adăvurate culoare care și-au pus puternic amprenta asupra modului de distribuire și dezvoltare a localităților, asupra posibilităților de circulație și stabilire a legăturilor principale, asupra modului de utilizare a terenurilor.

Nota dominantă este dată, deci, de culmile piemontane prelungi orientate nord-sud, rezultate din fragmentarea suprafeței piemontane inițiale de către rețeaua hidrografică paralelă. În nord, interfluviile sub forma unor culmi rotunjite se lărgesc treptat către sud pînă ajung ca veritabile poduri, foarte puțin sau chiar nederanjate de procesele de modelare. Ele devin atît de întinse și netede (îndiferent dacă ne aflăm în Podișul Bălăciței, în Piemontul Oltețului dintre Amara-dia și Olt sau la periferia Piemontului Cotmenei), încît, în mod justificat, au fost considerate ca reprezentînd un podiș provenind dintr-o câmpie *piemontană înaltă și fragmentată* (fig. 120).

Înălțarea continuă la care a fost supus (pînă a ajuns la altitudini de 700 m la est de Olt, de 600–650 m în Piemontul Oltețului și în jur de 400 m la vest de Gilort) a însemnat o continuă și relativ rapidă adîncire a văilor și de accentuare a fragmentării (ca densitate și adîncime), fapt favorizat de stiva de roci friabile de la marne-argile și luturi, pînă la pietrișuri. Adîncirea și lărgirea văilor reprezintă un proces continuu, dar nu cu intensitate variabilă, ci cu o anumită ritmicitate (condiționată tectonic și climatic), în urma căreia au apărut seriile de terase care însoțesc toate văile principale.

Numărul și altitudinea relativă a teraselor scad de la nord la sud în concordanță cu vechimea piemontului și cu intensitatea procesului neotectonic de ansamblu. În același fel, adică din amunte spre avale, pe măsura reducerii pantei, crește suprafața ocupată de terase, ajungînd ca aceasta să




Fig. 120. Schiță generală a reliefului Piemontului Getic. 1, Culmi piemontane cu șei și mameloane; 2, poduri piemontane; 3, cueste; 4, terase; 5, lunci; 6, culoar depresionar de contact.

aibă, spre marginea sudică a piemontului, lățime de 3—4 km la Jiu, 8—10 km la Olt (fără a adăuga luncile largi pînă la 5—6 km), iar la Argeș și la Dimbovița să se extindă atît de mult, încît să constituie o cîmpie de terase, trecînd în altă unitate de relief (Cîmpia Piteștiului, Cîmpia Picior de Munte). Altitudinea teraselor se reduce ușor nu numai spre cîmpie (unde procesul tectonic pozitiv a fost mai redus și chiar a avut un sens negativ pînă în holocen, ca în cîmpia de la est de Argeș), dar și spre vest. De exemplu, deși Motrul este rîu carpatic asemănător Gilortului și mai important decît Lunca-vățul sau Topologul, cea mai înaltă terasă are numai 90—100 m altitudine relativă (Al. Schiopoiu, 1982). După modul de distribuire a teraselor iese în evidență arile de convergență a rîurilor (de la Fîlîși și nord de Craiova, pe Jiu; de la Bălcești, pe Oltet; de la sud-est de Balș, pe Olt; de la nord de Pitești pe Argeș), în care extensiunea și altitudinea mai coborîtă a nivelelor de terasă dovedesc influența mișcărilor neotectonice (negative cel puțin pentru un timp sau pozitive mult diminuate) și în general rolul proceselor endogene asupra modelării reliefului acestei unități tinere.

Marea varietate a rocilor sedimentare neconsolidate, în condițiile unei accentuări

continue a energiei de relief prin creșterea diferenței dintre suprafața inițială a piemontului și albiile rîurilor, a favorizat considerabil o evoluție rapidă a versanților care se mențin în mare parte cu o dinamică accentuată. Procesele de versant sînt destul de active, dar scad ca frecvență și intensitate de la nord la sud, pe măsura lărgirii interfluviilor și diminuării energiei reliefului. Se poate vorbi chiar de o zonalitate a proceselor de la nord la sud, determinată de reducerea suprafețelor afectate de deplasări în masă și eroziune în adîncime (și a intensității acestora) și sporirea celor supuse eroziunii în suprafață sau stabile neafectate de degradări. Natura și repartiția solurilor ca și modul de utilizare a terenurilor sînt suficiente de concludente pentru starea actuală a versanților.

Suma particularităților geomorfologice (sinetizate în stadiul de evoluție, înfățișarea reliefului și funcționalitatea acestuia) și diversitatea lor locală și regională au permis punerea în evidență a subdiviziunilor Piemontului Getic dispuse de la vest la est, dar și de la nord la sud (în funcție de dezvoltarea de ansamblu a Piemontului). Între marginea estică a Podișului Mehedinți și culoarul Jiului în vest și pînă la valea deosebit de largă (ca o adevărată depresiune)

a Hușniței, în sud, se individualizează *Piemontul Motrului* (numit uneori și al Strehaiei), în cuprinsul căruia se separă la vest de Motru compartimentul mai coborât al *Dealurilor Coșuștei* (Al. Șchiopoiu, 1982), iar între Motru și Jiu, *Dealurile Jilului*, un

absolută de 650 m, este partea cea mai unitară păstrată, cu o rețea hidrografică autohtonă divergentă caracteristică. *Piemontul Cîndești*, de asemenea foarte clar conturat, se termină printr-un abrupt spre valea Argeșului și coboară în trepte către




Fig. 121. Diviziunile principale ale Piemontului Getic.

fascicul de culmi terminate toate spre valea Jiului prin gruiuri prelungi. La sud de Hușnița se desfășoară partea cea mai joasă și bine conservată a Piemontului Getic, *Piemontul Bălăciței*, foarte slab fragmentat de o rețea radiară, a cărei notă dominantă o dau podurile întinse (ceea ce a și făcut să fie considerată o cîmpie piemontană înaltă — Al. Roșu, 1959) (fig. 121). Între Jiu și Gilort sînt clar separate *Gruiurile Jiului*, un grup de culmi prelungi, supuse intens proceselor de modelare actuală, cu suprafețe întinse degradate iar albiile înecate în aluviuni. În continuare spre est, pînă la Olt, se întinde *Piemontul Oltețului*, cea mai mare subunitate a Piemontului Getic, o suprafață despicată în culmi paralele lungi de zeci de kilometri, dificil de străbătut transversal, care se diferențiază în patru subunități, în funcție mai ales de gradul și stilul fragmentării și de intensitatea proceselor actuale: *Dealurile Amarației* și *Dealurile Cernei*, în jumătatea nordică, *Podișul Testuului* și *Podișul Beicăi*, în jumătatea sudică. Între Olt și Argeș, *Piemontul Cotmenei*, deși înaintază mult spre nord în dauna Subcarpaților și ajunge la altitudinea

valea Dimboviței. În fine, subunitatea cea mai accentuat fragmentată, delimitată de văile Argeșului și Argeșelului, este reprezentată de *Gruiurile Argeșului*, numită așa după cele patru culmi piemontane despărțite de văile Argeșului, Vîlsanului, Rîului Doamnei, Bratiei și Argeșelului și terminate sub formă de grui (fig. 121).

Piemontul Getic este străbătut de la nord la sud de numeroase văi largi, care au facilitat separarea diviziunilor arătate, dar dintre acestea culoarele Jiului și Oltului necesită o mențiune aparte. Nu atît prin dimensiuni și prin aspectul geomorfologic, cît prin funcția lor complexă de convergență și polarizare a activităților de pe arii care depășesc limitele regiunii, cu importanță permanent manifestată în trecut ca și astăzi, ele trebuie considerate ca adevărate diviziuni geografice ale Piemontului Getic.

5.2. Clima

Fiind situat în sud-vestul țării, Piemontul Getic se află preponderent sub influența centrilor barici de acțiune din Marea Medi-

terană. Ca urmare, în cea mai mare parte a anului, deasupra acestei regiuni este prezentă circulația de componentă sudică și vestică, condițiile climatice apropiindu-se de cele din sudul Banatului. Iarna, îndeosebi la est de Olt, se resimte și influența anticiclonului siberian.

Jumătatea vestică a Piemontului Getic se caracterizează printr-o temperatură medie anuală mai mare de 10°C (la Drobeta-Turnu Severin media anuală este de 11.7°C , ca urmare a încălzirilor din anotimpurile de tranziție, prin procese foehnale, iar la Drăgășani de 10.4°C). În această parte a țării toamnele sînt lungi și călduroase. Temperatura medie a lunii octombrie este de 12.5°C la Drobeta-Turnu Severin și de 11.2°C la Drăgășani cu valori mai mari decît media anuală.

Precumpănirea influenței unuia sau altuia dintre centrul baricilor a fost pusă în evidență prin analiza unei invazii de aer rece urmărită în înaintarea sa dinspre nord-estul spre sud-vestul țării, în luna ianuarie 1965. Urmărind datele orare ale regimului termic s-a constatat că masa de aer rece a ajuns în vestul Piemontului Getic cu o întîrziere de 36 de ore, încălzindu-se în acest interval, în deplasare cu 12°C . În Gruiurile Argeșului și Piemontul Cotmenei masa de aer a ajuns cu aproape 10 ore mai devreme și a fost mai caldă decît cea inițială cu $8-9^{\circ}\text{C}$ (Gh. Neamu și colab., 1968).

În Piemontul Getic invaziile de aer polar sînt mult mai rare, comparativ cu celelalte podişuri din țară, ceea ce se reflectă prin înregistrarea unor valori extreme minime cu $7-10^{\circ}\text{C}$ mai ridicate decît cele înregistrate în Podişul Moldovei, sau cele din Podişul Transilvaniei. La est de Olt, valorile extreme minime sînt cu $2-3^{\circ}\text{C}$ mai coborîte față de cele înregistrate la vest de Olt. Se constată, de asemenea o descreștere a extremelor minime de la sud către nord.

Poziția Subcarpaților în raport cu principalii centri barici are repercusiuni în distribuția temperaturilor medii anuale care descrește evident de la vest către est (Drobeta-Turnu Severin 11.7°C , Strehăia 10.8°C , Craiova 10.9°C , Drăgășani 10.4°C , Ștefănești 10.1°C , Tirgoviște 9.8°C).

Altitudinea influențează în mod evident temperatura aerului, valorile termice fiind mai mici în partea mai înaltă a piemontului, de la contactul cu Subcarpații. Astfel, la Craiova, la marginea de sud a Piemontului Getic, se înregistrează 10.9°C , la Slatina

10.4°C , la Pitești 9.8°C , iar mai la nord, la Curtea de Argeș, doar 9.0°C .

Intensificarea circulației vestice și sud-vestice în anotimpurile de tranziție contribuie la foehnizarea maselor de aer după trecerea peste Munții Banatului. În aceste condiții, îndeosebi în lunile februarie și martie, în Piemontul Motrului și în Gruiurile Jiului, apar încălziri succesive cu creșteri ale temperaturii peste media obișnuită, ceea ce contribuie la topirea timpurie a zăpezii (în anul 1968, o asemenea topire timpurie a intervenit în intervalul 10-20 februarie). Topirile timpurii, manifestate uneori într-un interval scurt de timp, asociate cu căderi abundente de precipitații lichide favorizează creșteri, peste etiaj, la majoritatea afluenților Jiului și Oltului, cu revărsări în lunile joase.

Se poate aprecia că, în ansamblul său, Piemontul Getic prezintă o durată mai mică a intervalului mediu cu îngheț la sol (140-150 de zile), în comparație cu Podişul Birladului (160-180 de zile). Data medie a primului îngheț (t. min. $\leq 0^{\circ}\text{C}$) se înregistrează toamna, cel mai devreme la Slatina (26 octombrie) și cel mai tîrziu la Drobeta-Turnu Severin (11 noiembrie). Cel mai tîrziu îngheț se produce în medie la 3 aprilie la Drobeta-Turnu Severin și cu o săptămîină mai tîrziu la Slatina (10 aprilie), înregistrîndu-se un interval de 222 de zile fără îngheț, la răsărit de Olt, în Gruiurile Argeșului, Piemontul Cotmenei și Piemontul Cîndești.

Precipitațiile atmosferice cad, în cea mai mare parte a anului sub formă lichidă. Iarna se înregistrează în medie, 20 de zile cu ninsoare, iar stratul de zăpadă nu se menține mai mult de 15 zile la vest de Olt și 17 zile la est de Olt (pentru comparație amintim că în Podişul Birladului același fenomen are o durată de două ori mai mare: 31 de zile la Perieni și 30 de zile la Huși).

Cel de-al doilea maxim de precipitații, care se apropie cantitativ de primul maxim din mai-iunie, apare doar în jumătatea vestică a Piemontului Getic (Drobeta-Turnu Severin 71 mm în mai, 79 mm în iunie; 68 mm în noiembrie, 75 mm în decembrie; Tîngu Logrești 84 mm în mai, 91 mm în iunie, 69 mm în noiembrie, 62 mm în decembrie). Pe măsură ce ne îndepărtăm către est, cel de-al doilea maxim de precipitații, înregistrat în a doua parte a toamnei și începutul iernii, dispare (de exemplu, la

Cotmeana se înregistrează în mai 96 mm, în iunie 113 mm, în timp ce în noiembrie doar 59 mm, iar în decembrie 58 mm). Această diminuare a cantităților de precipitații din toamnă și începutul iernii trebuie pusă pe seama influenței, în mai mare măsură

mai înalte și mai bine împădurite decât restul unităților. În cealaltă extremă, aceea a verilor calde și umede se înregistrează o singură lună (august) la Drobeta-Turnu Severin, Drăgășani, Slatina, Ștefănești, Pitești și Craiova. La Dedulești și Curtea de




Fig. 122. Rozele pluviometrice de la unele posturi din Piemontul Getic.

în această perioadă a anului, a circulației de componentă estică, care aduce în jumătatea estică a Podișului Getic mase de aer mai reci, dar mai sărace în precipitații decât în jumătatea vestică (Sp. Sprinceană, 1927) (fig. 122).

Prin raportul stabilit între temperaturile medii lunare și cantitățile medii lunare de precipitații, în sistemul Ch. Péguy, în Piemontul Getic apar luni umede și reci, luni temperate, luni calde și umede, luni calde și aride (fig. 123).

Lunile reci și umede, la aproape toate stațiile meteorologice din piemont (Strehaia, Tirgu Logrești, Drăgășani, Dedulești etc.) corespund cu lunile de iarnă (decembrie, ianuarie și februarie).

La două stații care reprezintă situația din Gruiurile Argeșului și Piemontul Cotmenei apar ca luni reci și umede și lunile martie, la Dedulești, și noiembrie, la Curtea de Argeș. Prelungirea iernii în cadrul acestor subunități este datorată atât circulației, cu pătrunderi mai frecvente în anotimpul rece a maselor de la periferia vestică a anticiclonului siberian, cât și situației geografice locale, amândouă aceste subunități fiind

Argeș, lunile de vară, în totalitatea lor, sînt luni mai răcoroase, cu temperaturi medii mai mici de 20°C, dar destul de umede, cu precipitații ce variază între 70 mm în august și peste 100 mm în iunie.

Lunile aride lipsesc în Piemontul Getic. Numai la stațiile Drobeta-Turnu Severin și Slatina, situate periferic, luna august se comportă ca o lună aridă. Valorile medii termice lunare depășesc la aceste stații 21°C: 22.7°C la Drobeta-Turnu Severin, 21.7°C la Slatina. În aceeași lună precipitațiile atmosferice ating minimumul anual: 37 mm la Drobeta-Turnu Severin și 38 mm la Slatina. Aceste stații au condițiile mai apropiate de cele din cîmpie, unde fenomenul de ariditate este destul de frecvent (la Craiova, de exemplu, stație situată la limita cu Cîmpia Olteniei, lunii august i se adaugă și septembrie, iar la Caracal, la aceste două luni se adaugă și luna iulie). Excluzînd lunile reci și umede care, în majoritatea lor, sînt situate în sezonul rece, neagricol, în Piemontul Getic sînt cîte 7—8 luni, din martie și pînă în octombrie, cuprinse în categoria lunilor temperate, favorabile din toate puncte

tele de vedere desfășurării activităților economice.

Primăvara poate fi considerată de la data cînd temperatura medie zilnică are valori mai mari de 0°C . Acest eveniment se produce în vestul Piemontului Getic încă

Severin, 142 ore la Dedulești). Încălzirea, în timpul primăverii, se face prin pătrunderea aerului mediteranean în regim ciclonal, de la sud-vest către nord-est. Încălzirea în Piemontul Motrului și Gruiurile Jiului are loc concomitent cu căderea unor cantități




Fig. 123. Climograme în sistemul Ch. Péguy de la unele stații meteorologice din Piemontul Getic.

de la sfîrșitul primei decade a lunii februarie (de altfel temperatura medie multianuală a lunii februarie este la Drobeta-Turnu Severin pozitivă, 0.9°C), iar în estul Piemontului cu 10–15 zile mai tîrziu (în ultima decadă a lunii februarie). Diferențele termice medii sînt, în unele cazuri, de peste 4°C , în luna martie, între vest și est (Drobeta-Turnu Severin 6.0°C , Dedulești 1.5°C). Aceste diferențe nu pot fi puse pe seama insolației, întrucît diferența între numărul de ore de strălucire a Soarelui la Drobeta-Turnu Severin și Dedulești este nesemnificativă, fiind doar de 6 ore, în medie (148 ore la Drobeta-Turnu

de precipitații mult mai mari în comparație cu cele de la est de Olt (în martie, la Balta în Mehedinți, cad. 62.0 mm , pe cînd la Dobrogea pe Argeș numai 43.1 mm). Începînd din aprilie temperatura depășește pragul celor 10°C la marea majoritate a stațiilor, menținîndu-se sub acest prag termic doar la Dedulești, Curtea de Argeș și Bilcești, unde și altitudinile stațiilor sînt mai ridicate cu 100–150 m față de celelalte. Altitudinile influențează și căderile mai abundente de precipitații atît la Curtea de Argeș, cît și la Dedulești. Cantitățile medii lunare din luna mai depășesc 100 mm . Căderile abundente

de precipitații atât în vestul, cât și în estul podișului se datorează reînceperii în luna martie, cu intensificări în următoarele luni, a activității ciclonilor mediteraneeni.

Vara prezintă diferențieri termice apreciabile atât de la vest la est, cât și de la sud la nord. Între Drobeta-Turnu Severin (22.2°C, media lunilor de vară) și Pitești (19.7°C, media lunilor de vară), diferența este de 2,5°C, iar între Pitești și Curtea de Argeș, diferența este de peste 1° (Curtea de Argeș 18.7°C; Pitești 19.9°C media lunilor de vară).

Lunile de vară sînt mult mai umede în Grănițele Argeșului, în Piemontul Cîndeștilor și în Piemontul Cotmeana. Aici, în iunie se înregistrează cantități mai mari de 100 mm (Dedulești — 112 mm, Curtea de Argeș — 105 mm, Vlădești — 126 mm, Pitești 101 mm, Ciofrîngenii — 104 mm, Cîndești — 145 mm, Cotmeana — 113 mm, Grău — 101 mm). În aceeași lună, la vest de Olt, doar la Pesceana (aflată la cîțiva km de Olt), se mai înregistrează peste 100 mm (101 mm), în rest valorile sînt cu 20—30 mm mai scăzute (Drobeta-Turnu Severin — 79 mm, Strehaia — 68 mm, Purcăreni — 63 mm, Berbești — 94 mm etc.). Acest lucru se vede și din durata de strălucire a Soarelui, care la Drobeta-Turnu Severin (275.4 ore) este mai mare, în medie cu 23 de ore decît cea de la Dedulești (252.1). Moderarea temperaturilor lunilor de vară iese și mai clar în evidență, observînd oscilațiile de la un an la altul, ale mediilor anotimpului de vară. La Drobeta-Turnu Severin și chiar la Drăgășani se înregistrează diferențe de pînă la 5°C, în timp ce la Tîrgu Logrești, Dedulești și Curtea de Argeș aceste diferențe numai în cazuri excepționale pot atinge 3°C.

La sfîrșitul verii, îndeosebi după 15 august, apare fenomenul de briză de deal și de vale, cu frecvență mai mare în zona de la est de Olt.

Toamna predomină circulația de vest, ceea ce are ca urmare menținerea unor valori termice ridicate și apariția, în a doua jumătate a anotimpului, a ploilor specifice influenței mediteraneene. Valorile medii ale temperaturilor lunilor de toamnă sînt aici mai mari cu 2—3°, în comparație cu temperaturile înregistrate în Podișul Bîrladului (în octombrie, 11.7°C la Drobeta-Turnu Severin, 9.8°C la Vaslui, iar cantitățile de apă căzute depășesc în Podișul Getic cu 30—40 mm

(77.3 la Dumbăveni) pe cele înregistrate în Podișul Moldovei (34.0 la Vaslui) și cu peste 50 mm pe cele din Podișul Dobrogei (20.3 la Jurilovca). Toamnele sînt calde și lungi, întrucît precipitațiile abundente încep să cadă doar în ultima decadă a lunii octombrie. În septembrie se înregistrează, la marea majoritate a posturilor pluviometrice, cele mai mici cantități de precipitații. La Strehaia, de exemplu, din 60 de ani de observații, la 20 dintre ei valorile înregistrate au fost mai mici sau egale cu 15 mm. Aceleași valori mici s-au înregistrat și în estul piemontului, la Drăgășani și la Pitești.

Iarna, în partea de vest a piemontului, este la fel de blîndă ca în Banat. La Drobeta-Turnu Severin din 80 de ani de observații, în 50 de ani temperaturile medii ale mediei celor trei luni din anotimpul de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie) au avut valori pozitive. De altfel și media multi-anuală a acestui anotimp este pozitivă la Drobeta-Turnu Severin (0.8°C) și înregistrează valori destul de ridicate (—1.2... —1.5°C) în celelalte părți ale podișului de la vest de Olt. Sînt destul de frecvente cazurile cînd iarna precipitațiile atmosferice se înregistrează sub formă lichidă, iar valorile temperaturii oscilează în jur de 0°C, mărind numărul zilelor cu lapoviță la 8—10 în vestul podișului.

Cu cît se înaintează spre est și nord-est iarna este mai aspră. La Slatina toate lunile de iarnă înregistrează valori medii negative, iar la Dedulești și Curtea de Argeș, în ianuarie, valorile medii sînt cu 2°C mai coborîte decît la Drobeta-Turnu Severin (Dedulești —2.8°C, Curtea de Argeș —2.9°C, Drobeta-Turnu Severin —0.9°C).

La vest de Olt luna decembrie se comportă ca o veritabilă iarnă de toamnă, atât din punct de vedere termic (valori pozitive), cît și din punct de vedere al precipitațiilor (75 mm la Drobeta-Turnu Severin, 69 mm la Tîrgu Logrești), destul de abundente și, în marea lor majoritate, lichide.

În ansamblu, Piemontul Getic beneficiază de o climă temperat continentală cu nuanță de influență submediteraneană în vest. La est de Olt, influența submediteraneană dispăre, clima fiind specifică dealurilor cu etajarea elementelor caracteristice acestor forme de relief.

5.3. Rețeaua hidrografică

Rețeaua hidrografică a Piemontului Getic este reprezentată prin câteva riuri mari alohtone și printr-o rețea autohtonă de riuri mai mici, cu frecvente fenomene de secare. Orientarea generală a rețelei este de la nord la sud sau de la nord-vest spre sud-est cu aspect dendritic și cu două zone mai importante de convergență pe Jiu, la confluența cu riurile Motru și Gilort și pe Rîul Doamnei, la confluența cu Rîul Tîrgului. Din întreaga suprafață a Piemontului, de circa 12 940 km², cea mai mare pondere o dețin bazinele Jiului (37,7%), Oltului (28,5%), Argeșului (12,9%) și Vedei (9,5%); restul de 11,4% revine altor bazine mult mai mici.

Rîul *Jiu*, care pătrunde în Piemontul Getic la stația hidrometrică Peșteana-Jiu, cu un debit mediu multianual de 50,5 m³/s, după un traseu de 120 km; cu o pantă medie de 0,593‰, iese din regiune la Podari, cu un debit de 91,4 m³/s. În acest spațiu geografic primește pe dreapta rîul Motru, care își adună apele din regiunea de munte și intră în piemont la Apa Neagră (sat al comunei Padeș), cu un debit mediu multianual de 7,05 m³/s, pentru ca la Fața Motrului (sat al comunei Stîngăceaua), cu puțin înainte de confluența cu Jiul să aibă 14,9 m³/s. Pe stînga primește Gilortul, care intră în piemont la sud de Tîrgu Cărbunești și îl străbate pînă la confluența cu Jiul. Gilortul are la Tulburea un debit de 12,3 m³/s, dar cea mai mare parte a acestui volum de apă se realizează înainte de intrarea în limitele piemontului. Dintre cursurile de apă autohtone menționăm Jilțul și Obedinul pe dreapta Jiului și Amaradia pe stînga, toate reflectînd prin regimul lor de scurgere, cu frecvente fenomene de secare, condițiile specifice piemontului.

Rîul *Olt* intră în piemont avale de confluența cu Topologul și Bistrița. Se remarcă printr-o lungă bine dezvoltată pe toată lungimea de 79 km, cît parcurge prin această unitate de relief. Panta medie a rîului este de 1,2‰, iar debitul de apă crește în acest spațiu cu 11,4 m³/s. În piemont, Oltul primește o serie de afluenți fără prea mare importanță și care, în cea mai mare parte a cazurilor, prezintă frecvent fenomenul de secare. Oltețul este singurul rîu mai important care străbate piemontul dintre Olt și Jiu și care confluează cu Oltul în zona de cîmpie, avale de Slatina. Acesta intră

în piemont la Nistorești, unde are un debit de 2,67 m³/s și iese la Balș cu 12,7 m³/s.

Argeșul este a treia arteră mai importantă care străbate piemontul pe o distanță de 44 km, cu o pantă medie de 3,4‰. Cei mai importanți afluenți îi are pe stînga: Vilsanul și Rîul Doamnei, care drenează partea de bazin aferentă Piemontului Cîndești, fragmentat, în continuare, spre est de riurile Bratia, Rîul Tîrgului și Argeșel.

Vedea are bazinul superior în întregime în Piemontul Cotmenei, fapt care se reflectă și în regimul de scurgere prin fenomenul de secare în perioada de vară. Împreună cu Cotmeana, afluent pe stînga și cu Plapcea, afluent pe dreapta, are la ieșirea din piemont o suprafață de bazin de circa 1 200 km² și un debit de circa 5 m³/s.

În tot spațiul Piemontului Getic, rețeaua hidrografică autohtonă, deși nu asigură debite mari și prezintă frecvent fenomenul de secare, are un rol important în economia locală, în peisaj și în procesele de formare a seurgerii.

Densitatea rețelei hidrografice este în medie de 0,30—0,40 km/km², cu variații de la 0,57 km/km² în partea de nord, la contactul cu Subcarpații pînă la 0,22 km/km² în partea de sud, la contactul cu cîmpia, unde și gradul de fragmentare a reliefului este mult mai redus.

Apele subterane. Grosimea mare și permeabilitatea bună a depozitelor care alcătuiesc această unitate determină și repartitia spațială a apelor subterane. Astfel, la vest de Olt, de la limita nordică a piemontului pînă la o linie care pornind de la Hinova, trece pe la Filași pe Jiu și ajunge la Drăgașani pe Olt, stratul freatic are extensiuni reduse ca urmare a lipsei, la bază, a unui strat continuu de argilă. Fragmentarea intensă a reliefului nu permite stagnarea apelor o perioadă mai îndelungată, ele fiind rapid drenate de rețeaua de văi. Ca urmare și alimentarea stratelor acvifere din precipitații este mai redusă. Această situație se întîlnește și la est de rîul Argeș, în Piemontul Cîndești.

Apariția locală și lenticulară a stratelor de argile în depozitele villafranchiene face ca în acestea, pînă la nivelul de eroziune al văilor, să existe mai multe complexe acvifere.

Între Olt și Argeș, în Piemontul Cotmenei, practic apele freatice lipsesc. Deluviile acestei unități au o capacitate limitată de

înmagazinare, variațiile nivelului piezometric fiind cuprinse între 5 și 25 m. Ca urmare, văile au un regim de scurgere temporară, legat doar de perioadele cu precipitații, întrucât alimentarea subterană este inexistentă. Pe interfluviul dintre Jiu și Amaradia, ca și pe toate interfluviile de la vest de Jiu, apare un orizont acvifer superior, dar din cauza permeabilității mari și a lipsei intercalațiilor de argilă, orizontul este un strat freatic de mică importanță, pus în evidență prin izvoare cu debite mici (0,10 l/s). Calitativ aceste ape sînt nepotabile, avînd mineralizare și duritate mare.

Un strat acvifer mai important este cantonat în pietrișurile și nisipurile orizontului inferior, din care la baza versanților apar izvoare cu debite care variază între 0,10 și 1 l/s și care sînt surse importante pentru alimentarea cu apă a localităților. În pietrișurile de Cîndești, adîncimea nivelului freatic depășește 20 m, ajungînd chiar la 50—60 m în partea de nord, pe interfluvii cu o scădere treptată spre sud.

O notă aparte față de caracterele generale ale regiunii este dată de marile culoare de văi, cu sistemul lor de lunci și de terase. În depozitele acestora pot apărea importante resurse de ape, în cazul în care pietrișurile de terasă stau peste strate impermeabile sau pot lipsi, cînd depozitele de la baza teraselor sînt permeabile. De exemplu, din stratele acvifere din lunca Topologului se scot între 2 și 3 l/s și pe 100 m. Mai în aval însă, între Slăvitești și Slatina, unde aluviunile sînt slab dezvoltate și capacitatea stratului acvifer freatic este mai mică, nu se asigură nici necesitățile locale.

Din lunca Jiului se pot obține debite de apă importante. Astfel, de la intrarea Jiului în piemont și pînă la Filiași stratul acvifer poate debita între 25 și 45 l/s la un km lungime.

Apele de adîncime sînt cantonate în stratele de nisipuri grosiere și de pietrișuri romanene care coboară treptat spre sud. Acestea au caracter artezian în lungul văii Motrului, de la Strehaia pînă la vărsare și, apoi, pe Jiu pînă la Mofleni—Craiova. În piemontul dintre Motru și Gilort, debitul specific al acestor strate este cuprins între 0,5 și 5 l/s.

Scurgerea lichidă în Piemontul Getic scade de la nord la sud, cele mai mari valori, cuprinse între 7 și 10 l/s.km², se întîlnesc în bazinul superior al Motrului,

iar cele mai mici în partea de sud-vest, între riurile Drîncea și Desnățui, unde scurgerea este sub 1 l/s.km². Calculată pentru întregul spațiu al piemontului scurgerea medie specifică este de 3,11 l/s.km², ceea ce înseamnă că din întreaga suprafață rețeaua de riuri colectează un debit de circa 40 m³/s.

Pe bazine hidrografice se constată o creștere treptată a scurgerii medii de la sud-vest spre nord-est. Astfel, dacă bazinul Jiului în spațiul aferent Piemontului Getic are o scurgere medie specifică de 2,93 l/s.km², pentru bazinele Oltului și al Vedei, valoarea crește la 3,15, iar în cel al Argeșului la 4,53 l/s.km². Valori foarte mici are și scurgerea medie pe riurile care își au întregul bazin în regiunea de piemont. Dacă de exemplu, pentru Jilț, la stația hidrometrică Turceni, scurgerea medie specifică este de 3,33 l/s.km², pentru Amaradia la Albești de 3,28 l/s.km², pentru riul Obedin, la Breasta, scade la 2,56 l/s.km². În bazinul Oltului, pentru riul Teslui scurgerea medie specifică este de 2,78 l/s.km², iar pentru bazinul Vedea, la stația Făgețel, valorile cresc la 4,53 l/s.km². În partea estică a piemontului, singurul bazin reprezentativ este Potopul, care la stația Gura Foi are o scurgere medie specifică de 5,48 l/s.km². Aceste valori, destul de mici în comparație cu cele din regiunea carpatică, explică comportamentul rețelei hidrografice autohtone, care prezintă frecvente fenomene de secare (fig. 124).

Scurgerea maximă pe riurile principale s-a produs în anii 1940 și 1972, cînd pe majoritatea arterelor din partea de sud a țării s-au înregistrat debite foarte mari. Astfel, pe riul Jiu, la Peșteana, cele mai mari debite s-au realizat în 1940 (1 320 m³/s) și pe 11 octombrie 1972 (1 270 m³/s), cu o probabilitate de 2% (*Geografia României*, vol. I, 1983). Debite mari la Peșteana-Jiu s-au mai înregistrat și pe 22 octombrie 1964 (1 031 m³/s), în timp ce în 1975, cînd s-au produs inundații mari în partea de nord a țării, pe Jiu debitele maxime au fost doar de 500 m³/s la Peșteana și 690 m³/s la Podari.

Pe riul Olt cel mai mare debit s-a înregistrat pe 11 octombrie 1972, cînd la Stoenști (județul Olt) s-au realizat 2 570 m³/s, corespunzător unei asigurări de 5%. De asemenea la aceeași stație hidrometrică, în luna iulie 1975, maxima a ajuns la 2 220 m³/s.

Pe riul Argeș, la Malu Spart, după ieșirea din piemont, cel mai mare debit înregistrat a fost de $1\,320\text{ m}^3/\text{s}$ pe data de 3 iulie 1975. O valoare apropiată ($1\,210\text{ m}^3/\text{s}$) s-a înregistrat și în luna octombrie 1972.

meabilitate mare, cu strate groase și fără intercalații de argile și deci cu apele subterane la mare adâncime, neinterceptate de rețeaua actuală (Marcela Nițulescu, Aneta Păduraru, 1961).




Fig. 124. Resursele de apă și regimul de scurgere din Piemontul Getic. 1, Riuri cu viituri sau ape mari de primăvară și iarnă, alimentare nivo-pluvială; 2, riuri cu ape mari sau viituri de primăvară și viituri de vară, alimentare pluvio-nivală.

Pe riurile autohtone cele mai mici debite se realizează de obicei în perioada de vară, când rezervele de ape subterane, și așa foarte mici, sint epuizate. Pentru spațiul de la vest de Olt, cele mai coborite valori ale scurgerii minime s-au înregistrat în anul 1968, când pe riul Jilt, la Turceni, în lunile iunie și iulie, s-au determinat doar $0,04\text{ m}^3/\text{s}$, iar pe riul Amaradia, deși are o suprafață de aproape trei ori mai mare, s-a înregistrat fenomenul de secare în luna august din anii 1967 și 1968. Pe riul Obedin, la Breasta, în lunile septembrie și octombrie 1969, debitul minim a fost de $0,004\text{ m}^3/\text{s}$. Valori la fel de mici ($0,005\text{ m}^3/\text{s}$) s-au înregistrat și la est de Olt pe riul Potop, la Gura Foi, la 25 august 1962.

În Piemontul Getic fenomenul de secare a riurilor este frecvent. Rețeaua autohtonă are, în cea mai mare parte, o scurgere temporară sau sezonieră și numai arterele mari au apă permanent. Studiile efectuate au dovedit că principala cauză a acestui fenomen o constituie nu atât condițiile climatice, cât existența formațiunilor geologice cu per-

meabilitate mare, cu strate groase și fără intercalații de argile și deci cu apele subterane la mare adâncime, neinterceptate de rețeaua actuală (Marcela Nițulescu, Aneta Păduraru, 1961).

Scurgerea solidă. Scurgerea medie specifică de aluviuni în suspensie (t/ha.an), ca indicator al intensității proceselor de eroziune în albiile și pe versanți, variază în Piemontul Getic, atât de la nord la sud, cât și pe bazine hidrografice. Astfel, cele mai mari valori se întâlnesc în jumătatea nordică, unde scurgerea solidă atinge între 10 și 15 t/ha.an . Spre sud, valorile scad treptat pe măsura descreșterii altitudinii, a gradului de fragmentare și a pantelor, încât în Piemontul Bălăciței se ajunge la 1 t/ha.an .

Calculată pentru întreaga suprafață luată în studiu, scurgerea medie specifică de aluviuni ajunge la 6,65 t/ha.an , dar variază de la un bazin la altul. Cea mai mare scurgere de aluviuni se întâlnește pe suprafața piemontului din bazinul Argeșului, unde se realizează 9,30 t/ha.an . În spațiul piemontan aferent bazinului Vedea, scurgerea de aluviuni are valori de numai 3,63 t/ha.an , iar în bazinele Drincea și Desnățui coboară la 1 t/ha.an (fig. 124).

Pe arterele principale, cel mai mare volum al scurgerii solide s-a înregistrat în 1975

pe riul Olt, avale de confluența cu Oltețul 728 kg/s debit mediu anual și 4 218 kg/s debit mediu lunar în iulie, când s-a realizat și un debit lichid foarte mare. Pe Jiu, cea mai mare medie anuală a scurgerii solide s-a înregistrat în 1961 la Podari (244 kg/s). O contribuție importantă la realizarea acestui debit solid a avut-o scurgerea din luna iunie (o medie de 1 620 kg/s) datorită viiturilor mari. Pe afluenții mai mari ai Jiului din acest spațiu volumele maxime de aluviuni s-au înregistrat în alți ani. De exemplu, pentru riul Gilort, la Tulburea, cel mai mare debit mediu anual de aluviuni în suspensie a fost transportat în anul 1973 (71,2 kg/s) și cel mai mare volum mediu lunar, în luna mai a aceluiași an (513 kg/s). Riul Motru, la stația hidrometrică Fața Motrului, a avut debite foarte mari în anul 1969 (16,5 kg/s debitul mediu anual și 65,6 kg/s cel lunar în iulie).

Din analiza debitelor maxime de aluviuni în suspensie se remarcă faptul că cele mai mari cantități de aluviuni în suspensie sînt transportate în timpul viiturilor din sezonul cald al anului, cînd procesele de scurgere și de eroziune au cea mai mare intensitate.

Regimul termic al apei rîurilor depinde de volumul de apă și de factorii climatici care determină variația temperaturii în timp și în spațiu. Pentru principalele artere hidrografice temperatura medie anuală variază între 9 și 12°. În timpul iernii, cînd temperaturile sînt scăzute, formațiunile de gheață sînt prezente între 20 și 40 de zile pe rîurile de la vest de Jiu și între 40 și 60 de zile pe Jiu, aval de confluența cu Gilortul și în tot spațiul de la est de această arteră. Cele mai mari temperaturi ale apei rîurilor se înregistrează în luna august (medii între 20 și 23°), cînd volumul de apă este scăzut.

Din punct de vedere hidrochimic apele de suprafață din Piemontul Getic aparțin clasei bicarbonatate, cu mineralizare între 200 și 500 mg/l. Numai apele Jiului, avale de confluența cu Cioiana, la debite mici, trec în grupa apelor clorurate, cu mineralizare între 0 și 500 mg/l, ca urmare a influenței apelor de zăcămint aduse de Cioiana din regiunea petroliferă a Subcarpaților Gorjului.

Dezvoltarea socio-economică a regiunii a dus și la o modificare a calității apelor pe arterele principale în care se deversează, după epurare, apele menajere și cele folosite în industrie. Din aceste cauze, o serie de

artere, ca Motrul în cursul inferior, Gilortul avale de Tîrgu Cărbunești și Jiul pe sectorul aferent Piemontului Getic, sînt incluse în categoria a doua de calitate, cu un grad avansat de autocurățare și de mineralizare a materiilor organice. O situație aparte o au apele Jiului; ca urmare a folosirii lor la preparațiile de cărbune de la Petrila și Lupeni au o mare cantitate de materiale în suspensie, care le modifică atât culoarea, cît și calitatea.

Oltul este inclus în clasa a treia de calitate, cu materii organice în cantitate mică și cu un proces continuu de reducere și de oxidare.

Restul arterelor hidrografice cu scurgere permanentă din Piemontul Getic au ape care se includ în prima clasă de calitate, mai ales în perioadele apelor mici de iarnă și de vară. În perioada topirii zăpezilor, a apelor mari de primăvară și în timpul ploilor de lungă durată sau torențiale care dau viituri, toate cursurile de apă își modifică calitatea, ca urmare a impurificării naturale prin creșterea mare a gradului de încărcare cu aluviuni.

Folosirea resurselor de apă. Piemontul Getic fiind o regiune cu resurse mici de ape de suprafață și subterane, gospodărirea acestora pentru nevoile locale constituie o problemă majoră pentru acest spațiu geografic. Resursele locale, în special cele subterane, sînt folosite în mediul rural pentru alimentarea cu apă potabilă a populației. În Piemontul Cotmeana, unde acestea sînt și mai sărace, locuitorii au construit în trecut o serie de gropi impermeabilizate, numite local „benturi”, în care era reținută apa din topirea zăpezilor și din precipitații și refolosită în perioadele de secetă la adăpatul animalelor și la nevoi casnice.

Pentru alimentarea cu apă a centrelor urbane și industriale se folosește, în general, apele subterane din luncile și terasele rîurilor sau se aduc prin conducte din afara spațiului piemontan. Exemplul cel mai tipic în acest sens îl constituie alimentarea cu apă potabilă și industrială a zonei Craiova—Ișalnița.

S-au studiat astfel stratele acvifere de adîncime pe o rază de circa 80 km, dar granulația foarte fină a depozitelor, capacitatea redusă și calitatea necorespunzătoare a apelor nu au permis folosirea lor.

De asemenea apele de suprafață, în special ale Jiului, au un grad mare de murdărire,

cu suspensii de la preparațiile de cărbune și nu pot fi folosite.

Pentru acoperirea parțială a necesităților s-au captat apele subterane, infiltrate în albie, în lunca Jiului. În acest scop s-au efectuat pe o lungime de 8,5 km pe malul stîng și 4,5 km pe cel drept o serie de puțuri, dispuse paralel cu malul riului între Rovine și Bucovăț. Prin această captare, dată în folosință în 1960, se obține la o denivelare de 1,5 m un debit de 750 l/s din cele 140 de puțuri efectuate, apă utilizată numai pentru industrie.

șia-Jiu (9 l/s), Bileni (20 l/s), Peșteana-Jiu (10 l/s), Ploșsor (4 l/s), Ceplea (4 l/s), Brănești (3 l/s), Țintăreni (4 l/s), Filiși (21 l/s), Combinatul Ișalnița (370 l/s).

O problemă deosebită o ridică și folosirea în economie a apei principalelor riuri și adoptarea celor mai eficiente măsuri de micșorare a efectelor distructive ale inundațiilor. În acest sens, cursul Jiului de la confluența cu Tismana pînă la Văleni a fost regularizat și îndiguit în mare parte, acțiuni care s-au întreprins și în cazul Jiului de la Mătăsari pînă la confluența cu

Tabelul nr. 5

Elementele morfometrice ale lacurilor de pe Olt și Argeș din spațiul aferent piemontului

Rîul	Lacul	Anul intrării în funcțiune	F* (km ²)	H _m (m)	I _b (‰)	Volumul de apă (mil. m ³)		Barajul	
						Total	util	lungime	înălțime
Olt	Ionești	1978	340,5	625,3	166,5	24,94	8,41	80	33,5
Olt	Zăvideni	1979	156	310,4	122,5	45,0	15	112	30,5
Olt	Drăgășani	1980	294	308,1	125,3	80,0	40	102	33
Olt	Strejești	1978	527,2	269	112	202,7	136	101	18
Olt	Aricești	1980	74,3	224,3	22,1	61,6	21	73	14
Olt	Slatina	1980	530	196,7	70,2	20,0	6	114	10
Argeș	Zigoneni	1973	61,8	495	153,9	13,3	10	52	29
Argeș	Vilcelele	1976	103,2	443	156,5	41,5	40	53	35
Argeș	Budeasa	1978	341	625,3	156,5	26,4	26,4	30	27
Argeș	Bascov	1971	19,2	331,7	110,4	5,24	5	70	21

* Datele de suprafață, altitudinea medie și panta medie a bazinului sînt calculate numai pentru bazinul aferent lacului.

În final, s-a adoptat soluția de a se capta izvoarele carstice de la Izvarna—Costeni, al căror debit variază în funcție de condițiile climatice între 1 300 și 2 100 l/s. Apele au temperatură medie de 11,3°C, duritatea de 10 grade, pH-ul cuprins între 7,1 și 7,5 și reziduul fix de 200—250 g/l, deci întrunesc condițiile de potabilitate (M. Teodorescu, 1964). Din captarea acestor izvoare s-a realizat un debit de 1 125 l/s, din care se asigură necesitățile zonei industriale Craiova—Ișalnița pentru un consum mediu de 300 l/loc. zi la nivelul anului 1985.

De la Izvarna apele sînt aduse pe o lungime de 115 km printr-o conductă îngropată cu diametru de 1 m și cu o pantă medie de 0,57‰. Din cantitatea captată pe parcurs se distribuie apă și pentru o serie de localități ca : Rovinari (60 l/s), Moi (11 l/s), Ro-

Jițul Slivilești și al Motrului în sectorul bazinului carbonifer și al orașului Motru. Pe Olt și pe Argeș s-a construit o suită de lacuri de acumulare de interes hidroenergetic și pentru atenuarea undelor de viitură (tabelul nr. 5). Apele reținute în aceste lacuri, în timpul viiturilor, sînt folosite în perioadele cu debite mici, atît în scopuri hidroenergetice, cît și la irigarea terenurilor riverane. În plus ele sînt folosite pentru piscicultură și agrement, mai ales în cazul celor din preajma centrelor urbane.

Lacurile de acumulare din regiunea piemontană sînt supuse în prezent proceselor de colmatare și de reducere a volumelor utile. În această direcție se fac studii intense pentru a depista factorii care favorizează aceste procese și a se lua cele mai eficiente măsuri de micșorare a gradului de colmatare.

5.4. Vegetația și fauna

Particularitățile reliefului și ale solurilor, influențele climatice specifice determină aspectul complex al vegetației Piemontului Getic, tranziția lentă și neuniformă de la zonalitatea latitudinală la cea altitudinală, marcată prin numeroase întrepătrunderi și asocieri ale diverselor esențe forestiere dominante. Astfel, în partea sudică se desfășoară subzona cereto-girnițetelor (care la limita de sud-vest a piemontului vine în contact

adesea masiv în subetajul gorunetelor pe versanții însoriți, pe când gorunetele coboară în câteva locuri mult în sud, ajungând chiar la contactul cu lunca Dunării la Stirmina (lingă Drobeta-Turnu Severin) (fig. 125).

În același timp, pe văi și pe versanții umbriți se întâlnesc local făgete și făgeto-cărpinete, cu extindere mai mare în subetajul gorunului, dar care înaintază și în subzona cereto-girnițetelor, pe alocuri pînă la marginea piemontului (de exemplu în pădurea Stirmina, în pădurea Bucovăț de lingă Craiova, în unele păduri din împrejurimile




Fig. 125. Vegetația din Piemontul Getic. 1, Subzona pădurilor de cer și girniță; 2, subetajul pădurilor de gorun (inclusiv alternanță de gorun cu fag); 3, alternanță sau amestecuri complexe de gorun, cer și girniță; 4, vegetație azonală, predominant mezohigrofilă și higrofilă; 5, rezervații forestiere și botanice (Prelucrare după *Harta vegetației din Allosul* R. S. România, VI-2, 1976).

cu zona de silvostepă, iar în sud-est se continuă mult în regiunea de cimpie), pe când partea nordică și marginea estică a piemontului se află în subetajul gorunetelor¹. Între subzona cereto-girnițetelor și subetajul gorunetelor există o fișie largă de interferență în care se formează amestecuri complexe de girniță, cer și gorun sau alternanță de cerete cu gorunete. Ceretele pătrund

orașului Pitești). Aceste aspecte sînt complicate și mai mult de intervenția antropică, care a modificat substanțial aspectul inițial al vegetației. Pădurile, care acopereau în trecut aproape în întregime Piemontul Getic, s-au restrîns treptat. Acestea apar astăzi cu un areal puternic fragmentat, iar în jumătatea sudică a piemontului se prezintă sub formă de petice izolate. Doar în porțiunile cu relief mai accidentat sau cu condiții edafice mai puțin favorabile agriculturii, pădurile ocupă suprafețe mai mari, acoperind uneori pînă la 50-60% din teritoriul, ca de exemplu în nordul Piemontului

¹ Subzona cereto-girnițetelor aparține zonei nemorale din cadrul zonalității latitudinale, pe când subetajul gorunului aparține etajului pădurilor de foioase din cadrul zonalității altitudinale.

Oltetului. Pe suprafețe considerabile, îndeosebi în vestul Piemontului Cotmenei și în Piemontul Oltetului, după defrișarea esențelor autohtone, terenurile au suferit procese intense de degradare. Pentru stăvilirea acestora s-au făcut reimpăduriri, îndeosebi cu saleim sau cu diverse rășinoase (pin negru, pin silvestru, douglas și chiar molid).

Cu toată diversitatea și neuniformitatea vegetației forestiere, în Piemontul Getic se pot distinge câteva tipuri de pădure bine individualizate:

Pădurile de cer (*Quercus cerris*) și **gîrniță** (*Q. frainetto*) au, în general, condiții optime de dezvoltare în jumătatea sudică a piemontului, unde alcătuiesc unele dintre cele mai tipice asociații de acest gen din țară. În funcție de condițiile staționale, cele două specii edificatoare apar în proporții foarte variabile. Un aspect specific al Piemontului Getic îl constituie larga răspîndire a gîrnițelor pure sau aproape pure (în alte regiuni din țară se întîlnesc, în general, cereto-gîrnițete sau cerete pure). Această particularitate este determinată de existența solurilor grele formate pe depozite argiloase, cu textură fină în orizontul B, cu regim de umiditate alternant — la ploii apa stagnează la suprafață, pe cînd în perioadele de secetă solul se usucă și crapă (Gh. Marcu, 1962). Gîrnițetele sînt mai răspîndite în sud-estul Piemontului Bălăciței, în Piemontul Oltetului și îndeosebi în Piemontul Cotmenei, unde apar cele mai tipice gîrnițete pure, și unde gîrnița înaintează mult spre nord, în porțiunea dintre văile Oltului și Cotmenei. Spre nord și pe versanții văilor, pe soluri cu textură mai ușoară, în gîrnițete apare diseminat gorunul; în unele locuri (de exemplu, la est de valea Cotmenei) proporția acestuia crește, formîndu-se goruneto-gîrnițete. Frecvent în gîrnițete se întîlnește și cerul, ulmul (*Ulmus minor*), jugastrul (*Acer campestre*), părul (*Pyrus pyraeaster*), mărul (*Malus sylvestris*), scorușul (*Sorbus aucuparia*), sorbul (*S. torminalis*), arțarul tătăresc (*Acer tataricum*), mojdreanul (*Fraxinus ornus*). Mai rar cerul atinge o pondere apropiată de cea a gîrniței sau ajunge chiar dominant, de exemplu în vestul Piemontului Bălăciței, în Gruiurile Jiului, pe versanții cu expoziție sudică, sud-vestică și sud-estică din Piemontul Motrului, pe unele porțiuni din Piemontul Oltetului. Pe o bandă lată de 5—10 km, la nord de comuna Hurezani de pe valea Amaradiei pînă în

valea Peșceana care ajunge în Olt, cerul atinge în păduri proporții de circa 70%, fiind întovărășit de gîrniță, mojdrean, jugastru și gorun (N. Roman, 1962). În jumătatea nordică a Piemontului sînt frecvente și amestecurile de gorun cu gîrniță și cer, în diferite proporții. De exemplu, în Gruiurile Jiului acestea constituie tipul de pădure cel mai răspîndit (fig. 125).

În pădurile de cer și de gîrniță se dezvoltă un subarboret variabil ca abundență și compoziție floristică. Cele mai frecvente specii sînt *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus mas*, *Viburnum lantana*, *Prunus spinosa*, *Euonymus verrucosa*, *Rhamnus catharticus*. Pătura ierbacee este formată de obicei dintr-un amestec de specii mezofile și xerofile, în care predomină diferite specii de *Carex*, *Lathyrus niger*, *L. vernus*, *Asparagus tenuifolius*, *Heleborus odoratus*.

Pădurile de gorun sînt răspîndite îndeosebi în Piemontul Motrului, în părțile de nord și de est ale Piemontului Oltetului, Gruiurile Argeșului, partea nordică a Piemontului Cotmenei și Piemontul Cîndești, în general în partea superioară a versanților, pe expoziții însorite. Local, pe soluri cu textură ușoară și pe terenuri accidentate, coboară și în partea sudică a Piemontului (îndeosebi în Piemontul Oltetului, în sectorul dintre Oltet și Olt). Repartiția subspeciilor de gorun în Piemontul Getic este încă insuficient studiată. Cercetările întreprinse pînă în prezent arată că acestea apar în general în amestec, dar în proporții diferite în funcție de condițiile edafice. În general se constată că proporția de *Quercus polycarpa* crește spre nord, pe cînd *Q. dalechampii* este mai extins în sud. I. Birurescu (1981), studiind pădurile din ocolul silvic Peșteana, (județul Gorj), ajunge la concluzia că *Quercus petraea* ssp. *dalechampii* este mai pretențios la condițiile staționale, ocolind solurile grele și podzolite, pe cînd ssp. *polycarpa* se pare că are o amplitudine ecologică mai mare.

Pe lîngă cele două subspecii de gorun, în aceste păduri se întîlnesc diseminat cerul, uneori și gîrnița, carpenul, arțarul (*Acer platanoides*), paltinul (*A. pseudoplatanus*), arțarul tătăresc (*A. tataricum*), teiul (*Tilia cordata*), mesteacănul (*Betula pendula*). Pe terenuri argiloase, slab drenate, îndeosebi în piemonturile Cotmenei și Cîndești, este adesea abundent stejarul (*Quercus robur*). Pe versanții nordici și la

poale de versant adesea gorunul este în amestec cu carpenul sau cu fagul.

În subarboretul pădurilor de gorun predomină *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus sanguinea*, *Coryllus avellana*, iar în pătura ierbacee *Galium schultesii*, *Lathyrus vernus*, *L. niger*, *Brachypodium silvaticum*, *Melica uniflora*, *Carex pilosa*, *Poa nemoralis*. Mai rar se întâlnesc gorunete cu floră de mull. În stațiuni uscate se dezvoltă gorunete cu *Cytisus nigricans*, *C. leucotrichus*, *Genista tinctoria*.

Pădurile de fag sunt răspândite, îndeosebi în partea de nord a Piemontului Getic, pe versanții cu expoziție nordică și nord-estică și pe văile adânci, umbrite. Adesea diseminat se întâlnesc carpenul, paltinul, arțarul, sorbul, plopul tremurător sau gorunul. În pătura ierbacee predomină *Luzula albida*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Cardamine bulbifera*, *Poa nemoralis*, *Asarum europaeum*, *Asperula odorata*, *Pulmonaria officinalis*, *Sanicula europea*, *Potentilla micrantha*; uneori, pe expoziții nordice și soluri acide se întâlnește *Vaccinium myrtillus*.

În partea sud-estică a Piemontului Getic se întâlnește, local, un tip aparte de pădure — **făget cu gorun**, lei, arțar tătareșc, jogastru, cu numeroase elemente termofile în subarboret și în pătura ierbacee, prezentând afinități cu făgetele de tip iliric din Peninsula Balcanică (A. Popova-Cucu, 1980). Situația cea mai tipică o prezintă pădurea Stîmmina.

Pădurile de stejar (*Quercus robur*), probabil foarte extinse în trecut pe terenurile slab drenate, se mai păstrează astăzi numai cu totul local. Un stejăret înflorit, cu numeroși arbori seculari, este inclus în limitele parcului dendrologic Mihăiești (Gruierile Argeșului).

Zăvoaiele de luncă, deși s-au restrins ca suprafață în urma intervenției antropice, sunt încă destul de frecvente în lungul tuturor râurilor mari. Sunt alcătuite din diferite specii de salcie (*Salix alba*, *S. purpurea*, *S. triandra*), plop (*Populus alba*, *P. nigra*) și anin (*Alnus glutinosa*), cărora li se adaugă adesea sîngerul (*Cornus sanguinea*), lemnul ciinesc (*Ligustrum vulgare*), murel (*Rubus caesius*), socul (*Sambucus nigra*), ulmul (*Ulmus minor*), foarte rar stejarul (*Quercus robur*).

Formațiunile secundare de pajști, dezvoltate în urma defrișării pădurilor, prezintă o diversitate foarte mare, reflectînd varietația condițiilor staționale. În subzona cere-

to-gîrnițetelor predomină paiștile cu caracter mezoxerofil și xerofil, de *Festuca ralesiaca*, *Ventenata dubia*, *Dasypyrum villosum* ș.a., care local pătrund și în subetajul gorunetelor, pe versanți erodați cu expoziție sudică. Pe versanții puternic erodați se dezvoltă asociații de bîrboasă (*Botriochloa ischaemum*), iar în pajștile puternic degradate, datorită pășunatului excesiv, asociații de *Poa bulbosa*.

În partea de nord a Piemontului Getic, în subetajul gorunetelor predomină asociațiile de *Agrostis tenuis* cu diverse specii mezofile, alături de care apar pajști de *Poa pratensis* și de *Sieglingia decumbens*. Pe pante cu soluri podzolite și erodate în Piemontul Oltețului și Dealurile Motrului se întâlnesc asociații de *Vulpia myuros* cu *Aira elegans*. În piemonturile Cotmeana și Ciudești pe suprafețele interfluviale (martori din vechiul șes piemontan), pe soluri podzolite și pseudogleizate puternic, se întâlnesc pajști cu caracter mezohigrofil până la higrofil, în care domină *Agrostis canina* și *Nardus stricta*. Aici *Nardus stricta* se află într-una din cele mai joase stațiuni din partea sudică a țării, la 430 m (I. Dragu, 1962). În lunci și pe terase se întâlnesc de asemenea asociații cu caracter mezohigrofil, iar în locurile temporar inundate sau cu apă freatică la suprafață se dezvoltă asociații higrofile.

Sub aspect floristic se remarcă faptul că principalii edificatori ai asociațiilor forestiere sînt elemente submediteraneene relativ termofile (*Quercus frainetto*, *Q. cerris*, *Q. polycarpa*), în schimb speciile însoțitoare au în general caracter eurasiatic sau central european. Totuși unele specii însoțitoare cu caracter submediteranean sînt foarte abundente în sud-vestul piemontului, dar pe măsura înaintării spre nord și mai ales spre est numărul și ponderea lor în cadrul diverselor asociații scade simțitor, fiind destul de slab reprezentate la est de Olt. Printre cele mai caracteristice se numără ghimpele (*Ruscus aculeatus*) și cornișorul (*R. hypoglossum*) cu apariții sporadice până în baziul Gilortului și în Piemontul Oltețului, cărpinița (*Carpinus orientalis*) și scumpia (*Cotinus coggygria*) prezente în pădurile din sud-vestul piemontului, mojdreanu (*Fraxinus ornus*), cu răspîndire destul de largă în tot piemontul ca și *Potentilla micrantha*, *Lathyrus venetus*, *Tamus communis*, *Oryzopsis virescens*, *Asparagus tenuifolius*, *Arenaria agrimonoides*, stejarul pufos (*Quercus pu-*

bescens) și clocotișul (*Staphyllea pinnata*). Aceștea li se adaugă și o serie de elemente eurasiatice continentale, subtermofile, ca arțarul tătarese (*Acer tataricum*), relativ frecvent în toată jumătatea sudică a piemontului, *Crataegus pentagyna*, sporadic, la marginea pădurilor, și specii cu afinități submediteraneene ca: *Melittis mellissophyllum*, *Heleborus odorus*, *Lithospermum purpureo-coeruleum*. Local se întâlnesc și asociații de pajiste în care domină speciile submediteraneene ca sadișul (*Chrysopogon gryllus*), *Dasyphyrum villosum*, *Hordelymus asper*, sau sud-europene asiatică — *Poa silvicola*.

În pădurile umede din lunci și de pe povișuri în Piemontul Bălăciței și cel al Oltețului este răspândită mășeaua ciutei (*Erythronium dens-canis* ssp. *niveus*). În pădurile de cer și gîrniță din sud-vestul Piemontului se întâlnește sporadic o specie balcano-panonică rară, *Vicia sparsiflora*.

În ceea ce privește lumea animalelor, fondul faunistic caracteristic pădurilor de evercinee, care era predominant pe aproape întreaga regiune, a fost mult modificat, accentuându-se caracterul ei eterogen în care se interferează speciile de cîmpie cu cele montane. Cele dintii pătrund în masă mai ales pe terenurile deschise (culturi agricole, pajști), care favorizează chiar existența unor elemente tipice stepelor ca popîndăul (*Citellus citellus*), capturat în câteva locuri din Podișul Bălăciței. Elemente montane, printre care pajura (*Aquila chrysaetos*), au fost observate în regiunile mai înalte și împădurite din Piemontul Cotmenei, Piemontul Cîndeștilor și Gruiurile Argeșului iar în piemonturile Motrului și Cotmenei veșerița (*Sciurus vulgaris*).

În anumite condiții cu umiditate accentuată și temperatură mai coborîtă, unele specii montane, ca *Salamandra salamandra* ajung la altitudini foarte joase, cum este pădura Stirmina, probabil cea mai coborîtă stațiune din toată țara în care a fost cunoscută pînă în prezent.

Cu toate diversitatea taxonomică, ecologică și populațională a faunei acestei regiuni, care s-ar părea că nu are nimic particular sub aspect faunistic, câteva specii sînt cunoscute deocamdată numai în această regiune, avînd arealele foarte reduse, endemice: *Paragus ottenicus* (dipter), *Cnephasia nemesii*, *Dichrorampha niculescui* (lepidoptere), colectate de pe rama sudică a Piemontului Oltețului.

Din punct de vedere zoogeografic sînt observabile două fenomene mai importante. În primul rînd, pătrunderea în părțile sud-vestică și sudică a unor elemente mediteraneene: *Vipera ammodytes* (vipera cu corn), *Testudo hermanni* (broasca țestoasă de uscat), *Cicada plebeja* (cicoarea cenușie), *Reticulitermes lucifugus* (termită); balcanice — *Poecilimon affinis*, *Odontopodisma decipiens* (lăcuste); balcano-pontice — *Ablepharus kitaibelii stepanecki* (șopîrlită); balcano-taurice — *Callimenus oniscus* (lăcustă), ale căror efective și frecvențe se diminuează pe măsură ce înaintează spre nord-nord-est.

În al doilea rînd, și în Piemontul Getic se manifestă fenomenul separării ecologice a speciilor, fapt datorat unor condiții de viață deosebite. Astfel, *Rana ridibunda* (broasca mare de lac) ocupă ariile mai joase din sudul regiunii sau porțiunile mai înșorite din restul teritoriului, iar *Rana esculenta* (broasca mică de lac) pe cele cu înălțimi mai mari din nordul piemontului sau versanții umbriți din întregul ținut.

Fiind o regiune de veche locuire și puternic umanizată, fauna a suferit intense influențe antropice, atît directe, cît și indirecte. Astfel, unele animale au dispărut încă în vremurile istorice ca brebul (*Castor fiber*), altele sînt în regres avînd efective mici ca *Testudo hermanni* (broasca țestoasă de uscat), *Corvus corax* (corbul).

Concomitent s-a observat expansiunea unor specii, ca *Emberiza cirrus* (presura bărboasă), *Passer hispaniolensis* (vrabia spaniolă), *Dendrocopos syriacus balcanicus* (ciocănitărea de grădină), *Ondatra zibethica* (bizamul).

La toate acestea se adaugă și încercările omului de utilizare în interesul societății a tuturor posibilităților oferite de mediu prin introducerea unor noi specii ca fazanul (*Phasianus colchicus*) și lopătarul (*Dama dama*), acțiune care a dat rezultate pozitive.

5.5. Solurile

Condițiile pedogenetice zonale din cuprinsul Podișului Getic sînt favorabile formării și dezvoltării solurilor argiloiluviale brune luvice și solurilor luvice. Numai spre limita inferioară, spre cîmpie, sînt condiții

favorabile formării solurilor brune roșcate luvice, iar la cea superioară, dinspre Subcarpați, sînt condiții favorabile solurilor brune acide. Dar alți factori pedogenetici, ca înfățișarea diferită a reliefului, de la poduri aproape orizontale pînă la povîrnișuri foarte abrupte, ca și vîrsta și alcătuirea petrografică a stratelor superficiale, pe care se formează solul, la care se adaugă influențe topoclimatice și de umezeală, fac ca pe o mare parte din cuprinsul Podișului Getic să se găsească soluri intrazonale, determinate de umezeală și de argilozitatea rocilor solificate. După acestea, urmează, ca importanță, solurile mai mult sau mai puțin zonale și în cele din urmă solurile azonale.

Dintru început se deosebesc două situații: una pe podurile care se mai păstrează încă din vechiul șes al piemontului, ca și pe podul teraselor mai înalte, și alta pe povîrnișurile văilor și pe terasele din cuprinsul acestui piemont.

Astfel, pe areale întinse din vechiul șes piemontan dintre Olt și Dîmbovița, ca și la vest de Olt, în partea de sud-vest a Podișului Getic, se găsesc soluri argiloiluviale în diferite grade de podzolire de la cele brune slab luvice, pînă la luvisoluri albice (solurile podzolice) — și de pseudogleizare, de la cele pseudogleizate slab-mijlociu, pînă la solurile pseudogleice și chiar de mlaștină, formate pe un depozit argilos, practic impermeabil. Dintre acestea, cele mai evolute se găsesc în partea de nord și nord-est a podișului, pe podurile din Piemontul Cîndeștilor, unde cea mai mare întindere este ocupată de planosoluri — soluri pseudogleice luvice — pe suprafețe aproape orizontale, și soluri argiloiluviale, intens pseudogleizate. La acestea se adaugă, în partea de sud, alături de planosoluri, soluri brune luvice pseudogleizate puternic și mijlociu, iar în partea de nord, alături de luvisoluri albice pseudogleizate, se găsesc soluri luvice pseudogleizate. În marginea de sud și sud-vest a piemontului se mai găsesc, pe suprafețe apreciabile, luvisoluri albice cu un suborizont B închis, pseudogleizate mijlociu, puternic sau chiar pseudogleice și soluri argiloiluviale brune luvice (podzolite mijlociu și puternic) cu suborizont B închis, pseudogleizate mijlociu.

Pe podurile din nord-vestul Piemontului Cotîneni se găsesc luvisoluri albice și planosoluri, în partea centrală sînt soluri argiloiluviale podzolite mijlociu cu suborizont B

închis și soluri pseudogleice podzolite slab, iar în partea de sud se găsesc vertisoluri (negre sau brune, slab humifere, argiloase, compacte), care se întîlnesc și mai la sud, în cîmpie. De asemenea, pe culmile largi și podurile piemontului dintre Olt și Jiu, îndeosebi în partea sudică, se găsesc vertisoluri, alături de care sînt soluri vertice (argiloiluviale podzolite moderat, cu suborizont B închis), iar pe culmile înguste sînt soluri brune luvice podzolite. Mai la vest, între Jiu și Dunăre, mai ales la sud de linia Drobeta-Turnu Severin — orașul Motru, sînt soluri vertice argiloiluviale luvice, cu suborizont B închis, și vertisoluri.

Pe povîrnișurile din cuprinsul întregului Piemont Getic se află un adevărat mozaic de soluri, din cauza diversității condițiilor de rocă, de relief, de umezeală, de topoclimat și de vegetație, cu toate urmările care provin din această variație. Astfel, pe povîrnișurile sculptate în roci poroase și relativ acide, s-au format soluri brune în diferite stadii de dezvoltare (de la soluri brune tinere pînă la soluri podzolite puternic) de regulă aflate sub pădure; mare parte din aceste soluri sînt și pseudogleizate slab. În unele locuri din partea de nord-est a piemontului, pe povîrnișurile nordice, sculptate în pietriș și nisip, se găsesc chiar soluri brune acide, cu mull sau chiar cu moder, sub afiniș, cum e cazul în Gruniurile Argeșului dintre Argeșel și Bratîa.

Tot pe aceste povîrnișuri sculptate în roci foarte friabile, îndeosebi în pietrișuri, la obîrșia unor văi secundare, se găsesc numeroase rîpe, unde solul lipsește, ieșind „la zi” roca, din care șuvoaiele rup și depun la baza abrupturilor, pe terase sau pe lunci, trene de materiale grosiere — nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri. Pe povîrnișurile vălurite, din cauza proceselor de deplasare în masă, s-a dezvoltat de asemenea un mozaic de soluri brune podzolite pseudogleizate, unele chiar gleizate, și chiar soluri gleice și de mlaștină ca urmare a existenței unor pînze freatice, locale și temporare. În Piemontul Cîndeștilor se pot deosebi de-a lungul povîrnișurilor două fișii: una superioară, în cuprinsul căreia se găsesc soluri brune luvice relativ uniforme ca evoluție și însușiri, bine drenate, și alta inferioară, în care solul variază de la un loc la altul, depinzînd de umezeala provocată de pînzele freatice locale, dar și de vîrsta porniturilor și de statornicia povîrnișului. Pe locurile drenate sînt soluri

brune luvice, mai mult sau mai puțin pseudogleizate, depinzând de argilozitatea orizontului B. În apropierea micilor depresiuni de pe pornituri, la baza profilului de sol se manifestă și procese de gleizare, care spre interiorul depresiunii se fac simțite tot mai sus, până se ajunge la soluri gleice sau de mlaștină. Pe porniturile recente solurile sînt foarte tinere, regosoluri cu drenaj bun sau umeze, care evoluează spre soluri gleice sau de mlaștină, dacă suprafața afectată devine stabilă.

Pe locurile unde povirnișul este sculptat în marne bogate în carbonați, cum e cazul unor povirnișuri din Piemontul Cîndestilor, s-au format și soluri pseudorendzînice în diferite stadii de evoluție, care depind de vîrsta povirnișului. Pe povirnișurile tinere, sculptate în marno-argile, nisipuri și pietrișuri, se găsește suprafețe întinse cu regosoluri. În schimb, litosolurile apar numai local.

Versanții din partea de est și sud-est a Piemontului Getic, formați pe roci predominant argiloase, sînt acoperiți cu soluri brune luvice asociate cu regosoluri, iar cei din partea de sud și sud-vest cu soluri vertice și chiar vertisoluri.

Pe terase apar soluri variate, condiționate de înălțimea, de vîrsta teraselor ca și de roca de solificare de pe podul terasei. Astfel, pe terasele mai înalte, cu rocă de solificare asemenea celei de pe vechiul piemont, sînt luvisoluri albice pseudogleizate și chiar pseudogleice. Pe terasele mijlocii și inferioare predomină solurile brune luvice pseudogleizate, cu excepția teraselor inferioare de pe văle rîurilor din partea de sud-vest a Piemontului Getic, unde predomină solurile brune roșcate.

Pe lunci sînt soluri aluviale în diferite stadii de dezvoltare, de la aluviuni crude pînă la solurile zonale sau intrazonale spre care evoluează, structura lor depinzând de factorii pedogenetici determinatori. Astfel, în partea de jos a luncilor, în vecinătatea albiei, pe suprafețele inundabile la viituri obișnuite, sînt aluviuni crude și protosoluri aluviale, care conțin în genere și orizonturi solificate. În partea mai înaltă a luncilor, unde au loc inundații numai la viituri mari, sînt soluri aluviale evolute slab și mijlociu, carbonatice în genere, cu variate influențe freatice. Pe suprafețele ieșite mai de mult de sub influența inundațiilor, apar soluri alu-

viale puternic evolute, cu început de levigare a carbonaților, și chiar soluri brune aluviale, influențate pe unele locuri de apă freatică.

În sfîrșit, pe agestrela și tăpșanele clădite de apele torențiale care aduc de pe povirnișuri nisip și pietriș, sînt soluri foarte scheletice, de la cele tinere și chiar aluviuni proaspete, pînă la soluri brune scheletice. Acestea evoluează repede spre soluri relativ acide din cauza scheletului provenit din roci metamorfice acide.

5.6. Populația și așezările

Considerații de geografie istorică. Piemontul Getic, parte componentă a vetrei de locuire în care poporul român și-a înscris permanența și continuitatea, a fost locuit din cele mai vechi timpuri ale istoriei oferind condiții favorabile vieții și activităților omenești. Mulțimea urmelor arheologice sînt dovezi certe ale populării teritoriului încă din paleolitic și neolitic, oamenii folosind din plin condițiile naturale prielnice ale văilor și interfluviilor. Dărnicia naturii a oferit comunităților umane străvechi posibilitatea practicării agriculturii, creșterii animalelor, aceștia fiind purtătorii înfloritoarelor culturi de Criș, Vădastra, Sălcuța etc.

Au fost identificate, în acest sens, o serie de așezări preistorice pe văle Dîrjovului, Plapcei, în luncile Argeșului (între Pitești și Ionești), Dîmbovnicului, ca și bogate urme materiale în Piemontul Bălăciței (Gubancea, Teiu, Dobromira, Verbița și Verbicioara), în Piemontul Oltețului (Berlești, Căpreni, Vladimîr, Bugiuilești), Piemontul Cotmenei (Cremenari, Olanu, Optași-Măgura, Poganu, Raițiu etc.), care atestă pe deplin locuirea teritoriului încă din fazele timpurii ale procesului de antropogeneză și continuitatea populării în neolitic.

Civilizația hallstattiană este dovedită prin numeroase urme de așezări păstrate sub formă de mături, locuite de o populație agricolă pașnică, de la Cotofenii din Dos (Culoarul Jiului), Căciulatu, Virtop, Plopșor, Teiu (Piemontul Bălăciței), Cepari (Podișul Beicăi) etc.

Firul populării regiunii se continuă în perioada preromană, urmele materiale ale unor culturi specifice etnicului geto-dacic și ale unor așezări omenești de la Ilovăț (Pie-

montul Motrului), Bucovăț, Coțofenii din Dos (Culoarul Jiului), Brabova și Opișor (Piemontul Bălăcei), Lucieni (Piemontul Cindești), Godeni (Piemontul Oltețului) etc. fiind tot atâtea mărturii convingătoare în acest sens.

Interesele strategice și economice ale stăpînirii romane au dus la construirea unor drumuri militare și comerciale de semnificație deosebită, însoțite de o serie de castru și așezări, ca drumul Oltului, cel mai important de altfel (cu castru de la Rusidava și Pons Aluti și așezările de la Stănești, Vulturești, Rusidava etc.), drumul Jiului (cu Pelen-dava, Răcari și așezările Braniste, Răcari, Ad Nutrium etc.) ca și drumul ce urcă din-spre valea Dunării, de la Turnu Măgurele spre Roșiori de Vede—Purcăreni—Pescăreasa—Cumidava, în lungul căruia au existat castru de la Filfani, Săpata, Albota etc. Drumul continuă mai departe, peste Carpații Meridionali, spre Depresiunea Brașovului. Acestea au avut o deosebită importanță în dezvoltarea funcțiilor comerciale și dezvoltarea meșteșugurilor din această parte a țării.

Continuitatea locuirii, precum și conviețuirea și asimilarea, în secolele următoare, a populațiilor care vremelnic au trecut prin această regiune (în frământata perioadă a migrației popoarelor) sînt atestate de prezența bogatelor urme istorice (fibule, seuri de fier, săbii etc.) de la Coșoveni, Lazu, Vîrtop, Plenița, Vela din Piemontul Bălăcei, Popoveni, Țîntăreni, Răcarii de Sus, din Culoarul Jiului, Dobrușa din Culoarul Oltețului.

Așezările, tipurile de locuințe, elementele de cultură materială și spirituală descoperite în secolele III—VI la Brabova, Botoșești—Paia, Bieleș, Roșoreni (Podișul Bălăcei), Braniste, Bălcești, Gorunești, Stănești—Lunca (Piemontul Oltețului), Prisaca, Scornicești, Săpata (Piemontul Cotmenei) etc., dovedesc că populația locală a dus o viață stabilă de agricultori, păstori și chiar meșteșugari, care practicau schimburile cu Imperiul roman și Imperiul bizantin. O serie de așezări omenești de aici sînt menționate în primele documente istorice, ceea ce constituie dovada certă a continuității populației autohtone, în toate timpurile pe acest teritoriu.

Istoricii, bazîndu-se pe o serie de documente, arată că părți din teritoriul Piemontului Getic erau înglobate în diferite forma-

țiuni politice cu caracter feudal timpuriu: voievodate și cnezate aparținînd secolelor XIII—XIV (Seneslau și Litovoi, respectiv Ioan și Fărcaș).

Caracterul de arie de răsruce economică și comercială, factorii potențiali de natură geografică, o serie de cauze de esență istorică specifice secolelor anterioare, precum și prezența în apropiere a primelor capitale românești (Cîmpulung, Curtea de Argeș, Tirgoviște), cu multiplele lor legături în teritoriu, au asigurat popularea continuă a regiunii și în secolele XIV—XVII, favorizînd și apariția unor țiguri și orașe feudale în piemont și la contactul acestuia cu regiunile înconjurătoare (Țirgu Bengăi, Craiova, Strehaia, Slatina, Balș, Pitești etc.).

Materialele cartografice care cuprind și această parte a țării (Harta lui Schwantz — 1723, Harta lui Specht — 1790, Harta din 1835, Harta Szathmary din 1864 etc.) pun în evidență dezvoltarea permanentă a așezărilor (ca număr de locuitori, suprafață, număr de localități), contopirea micilor cătune alăturate, formarea satelor noi, pînă la conturarea actualei rețele de așezări.

A doua jumătate a secolului XVIII și începutul secolului XIX au reprezentat o etapă importantă în popularea Piemontului Getic și dezvoltarea așezărilor omenești și ca efect al migrației populației de peste Carpați.

Populația și potențialul forței de muncă. Piemontul Getic grupează între limitele sale peste 1,1 milioane de locuitori (1985), adică circa 4,8% din populația României. Dat fiind faptul că această populație revine unei suprafețe ce reprezintă 5,5% din teritoriul țării, reiese că Piemontul Getic se înscrie printre ariile geografice relativ bine populate. Potențialul natural și cel economic favorabil au constituit, în decursul secolelor, factori hotărîtori în creșterea continuă a populației în acest teritoriu.

Evoluția fenomenelor demografice a cunoscut intensități diferite în timp, legate de schimbările intervenite în mișcarea mecanică și mișcarea naturală a populației — ca reflectare specifică a mutațiilor petrecute în structura economică, socială și politică a regiunii. Dacă pînă la sfîrșitul secolului XVI creșterea numerică a populației s-a produs lent, majoritatea locuitorilor fiind concentrată în lungul principalelor artere hidrografice și al drumurilor care brăzdează regiunea de la nord la sud, începînd cu secolul

XVII evoluția populației cunoaște o dinamică mult mai accentuată. Se remarcă aportul deosebit al sporului migrator la creșterea numerică a fondului demografic, spor realizat mai ales pe seama populației venite din Transilvania — un important rezervor care a alimentat procesul de „colonizare” din Principate, îndeosebi începînd cu secolul XVII (fenomenul s-a înregistrat însă chiar din a doua jumătate a secolului XIII, dar cu intensități mult mai reduse).

Din analiza hărții rusei din 1835 rezultă că în acel an populația totală a Piemontului Getic se cifra la circa 300 000 de locuitori. Pînă la sfîrșitul secolului se dublează (1899), iar la recensămîntul din anul 1912 se ridicase la peste 854 600 de locuitori, ritmul mediu anual al creșterii, în tot intervalul 1835—1912, fiind de aproximativ 24‰. Odată cu sporirea numărului de locuitori au avut loc și importante schimbări în repartitia teritorială a populației, reorientarea fluxurilor migratorii și conturarea unor areale de concentrare mai accentuată a populației.

Secolul XX se caracterizează prin reducerea treptată a ritmului de creștere a numărului de locuitori, concomitent cu scăderea — pînă la eliminare — a sporului migrator, ca factor al creșterii demografice. Deși dinamica populației urmează o linie ascendentă, valorile înregistrate se situează cu mult sub valorile medii ce caracterizează fenomenul la nivelul țării. Rezultă, astfel, o reducere treptată a ponderii populației Piemontului Getic în totalul populației țării (6,7% în anul 1912 și numai 4,9% în anul 1977, respectiv 4,8% în anul 1985).

Sporul natural devine elementul constant și de bază în evoluția populației, mișcarea mecanică intervenind doar ca factor modelator, modificador al creșterii în profil teritorial. În aceste condiții, ritmul mediu anual de creștere, în intervalul 1912—1985, a fost de 3,9‰.

Analiza indicatorilor demografici în profil teritorial, la nivelul subunităților fizico-geografice sau al unităților administrativ-teritoriale de bază (comuna), relevă diferențieri considerabile și fluctuații deosebit de accentuate în evoluția acestora.

Se remarcă areale distincte de sate cu o populație în continuă creștere și cu o mare stabilitate demografică. Este cazul sectorului piemontan al Culoarului Jiului, care a ajuns să concentreze în anul 1985 circa 7% din populația totală a Piemontului

Getic, Culoarul Oltului (6,5%) și Piemontul Cindești (13%), arii geografice caracterizate prin condiții naturale mult mai favorabile dezvoltării vieții economico-sociale, cu posibilități multiple în privința legăturilor și relațiilor cu zonele înconjurătoare și chiar mai îndepărtate. Ele s-au conturat ca adevărate arii de aglomerație a populației, unde densitatea medie atinge valori de peste 125 loc./km² (Culoarul Oltului) și respectiv 103 loc./km² (Piemontul Cindești) sau 90 loc./km² (Culoarul Jiului).

Spre deosebire de acestea, în Piemontul Bălăciței, în jumătatea nordică a Piemontului Oltului, în sectorul central al Piemontului Cotmenei numărul populației scade — uneori destul de puternic — sau stagnează (prezentînd însă tendințe de scădere). Condițiile fizico- și economico-geografice mai puțin favorabile desfășurării activităților omenești (prezența apei la mare adîncime, caracterul predominant agricol al economiei, legăturile uneori anevoioase cu exteriorul, fragmentarea mai accentuată a reliefului etc.), asociate cu valorile reduse, chiar negative ale sporului natural, și plecările numeroase, cu caracter definitiv, ale forței de muncă explică prezența acestor areale cu densități mici și cu tendințe de scădere a populației. Aceste unități naturale, lipsite de centre urbane și unde circa 80% din sate prezintă fenomenul de scădere a numărului de locuitori, au densități medii între 53 loc./km² și 70 loc./km². Deși prin încărcătura lor umană aceste areale se situează sub media țării, ele sînt, totuși, bine populate în raport cu caracterul economiei lor agricole, cu un excedent de forță de muncă.

Dezvoltarea socială și economică a orașelor existente pînă în anul 1967 (Drobeta-Turnu Severin, Drăgășani și Strehaia), înființarea și dezvoltarea altora noi (Filiași, Motru, Topoloveni, Colibași, Scornicești) au imprimat o creștere mai accentuată și au impulsat aglomerația populației rurale atît în intravilanul localităților urbane, cît și în ariile lor de influență apropiate. Se remarcă, de asemenea, rolul orașelor situate în imediata apropiere a limitelor Piemontului Getic (Craiova, Rimnicu Vilcea, Curtea de Argeș, Pitești, Tirgoviște, Slatina, Balș etc.) în apariția și menținerea unor areale cu densități mai mari ale populației și o evoluție ascendentă a numărului de locuitori.

Pe ansamblul Piemontului Getic, încărcătura umană a teritoriului a sporit, în 1985, față de anul 1912, în medie, cu 19 loc./km².

Intensitatea concentrării populației în teritoriu, între anii 1912 și 1985, a înregistrat însă valori contrastante. Astfel, în timp ce în Piemontul Bălăciței densitatea locuitorilor a scăzut cu 9 loc./km², în sectorul piemontan al Culoarului Jiului a crescut cu 37 loc./km².

Îndesirea a fost mult mai susținută în mediul urban (cu 37 loc./km²) decât în cel rural, unde se înregistrează un spor de numai 4 loc./km². De fapt, creșterea mult mai accentuată a densității urbane se realizează, în mare măsură, tocmai pe seama reducerii densității populației în mediul rural, satele constituind principalele „surse de alimentare” cu forță de muncă a unităților economice de pe raza orașelor.

Scăderile cele mai puternice ale densității populației au avut loc în Piemontul Bălăciței, cea mai mare parte a Piemontului Oltețului și al Cotmenei — caracterizate printr-un spor natural redus, plecări definitive însemnate și o economie predominant agricolă — care asigură doar parțial ocuparea forței de muncă disponibile. Aceste unități se conturează ca adevărate arii exogene, surse de forță de muncă pentru orașele Craiova, Slatina, Pitești, Tirgoviște, Găești, Rîmnicu Vilcea sau exploatarea miniere și de petrol din piemont și regiunile învecinate.

Schimbări se înregistrează și în privința structurii populației pe medii, datorită sporirii locuitorilor în orașele existente pînă în 1967 (Drobeta-Turnu Severin, Drăgășani și Strehaia), construirii noului oraș Motru și trecerii în rîndul centrelor urbane a orașelor Filiași, Topoloveni (în anul 1968), Scornicești și Colibași (1989). Cu toate acestea populația urbană reprezintă în prezent numai 20% din total (în 1912 ponderea acesteia era aproape 6%), din cauză că din cele opt orașe existente aici șase au sub 25 000 de locuitori. Structura pe medii a populației indică, prin ponderea scăzută a populației urbane, gradul mai redus de urbanizare a Piemontului Getic, datorat, în primul rînd, situației economice și sociale moștenite.

Actualele orașe mici, cu o structură economică în curs de diversificare, nu pot polariza încă un număr prea mare din forța de muncă disponibilă în mediul rural.

Industrializarea și urbanizarea din ultimele trei decenii au declanșat transferul de forță de muncă tinăra din mediul rural spre cel urban (mai ales din afara piemontului), perturbarea structurii pe grupe de vîrstă și sexe a populației de la sate, reducerea contingentului fertil etc., în timp ce în mediul urban situația este inversă.

Structura pe sexe a populației este reprezentată în proporție de 51,4% de femei (1977). După o perioadă de creștere evidentă a coeficientului de feminitate, la circa 55% în 1966, determinată de migrația forței de muncă masculine spre unitățile economice situate în afara regiunii, se observă o tendință ușoară de scădere a ponderii populației feminine.

În contrast cu această situație generală, de ansamblu, în cadrul subdiviziunilor piemontului se conturează diferențieri condiționate de potențialul geografic al teritoriului, de structura economică caracteristică, de capacitatea de polarizare a forței de muncă etc. Se observă o serie de areale în care numărul populației masculine, și deci ponderea acestuia din totalul populației, scade și după anul 1966, chiar sub 45%. Este cazul așezărilor omenești din Piemontul Oltețului și al Cotmenei, în primul rînd, unități naturale cu activități predominant agricole, fără legături lesnicioase spre teritoriile învecinate, astfel încît pendularea forței de muncă masculine între locul de muncă și domiciliul permanent devine dificilă. Intervine transferul de populație activă (masculină cu precădere), cu schimbarea domiciliului, din aceste sate în orașele aflate în plină dezvoltare.

Mediul urban se remarcă prin ponderea predominantă a populației masculine (chiar 52%), în timp ce în mediul rural aceasta depășește 50% numai în cazul așezărilor rurale cu activități care solicită cu precădere forță de muncă masculină (activități forestiere, miniere, industriale).

Miscarea migratorie a jucat și joacă încă un rol deosebit de important în viața social-economică a Piemontului Getic, contribuind efectiv la evoluția numerică a populației din această parte a țării. Fluxurile migratorii au avut direcții și intensități diferite, în funcție de condițiile istorice și social-economice existente într-o perioadă sau alta.

Încă din secolele XII—XIII Oltenia, dar mai ales partea sa deluroasă, a primit multă populație „descălecată de dincolo” (I. Conea,

1939). Strămutarea acestor populații din Transilvania în regiune a fost numeroasă, din moment ce este menționată în sens de interdicție și în *Diploma Ioaniților* din 1247: „Că nu-i va primi ... din regatul nostru să se așeze în ținuturile sus-numite decât cu îngăduința regească osebită” (*Documente privind istoria României*, B, veac XIII—XIV și XV, 1953, p. 4).

În urma aplicării unor legiuri, îndeosebi a „Aprobatorilor” din 1635 și a „Compilatelor” din 1669, starea iobagilor români din Transilvania s-a înrăutățit mult, determinând o intensificare a emigrărilor la sud de Carpați.

O nouă fază de intensificare a curentului de imigrare are loc după anul 1774, când, într-o atmosferă de relativă libertate create de pacea de la Kuciuk Kainargi, cetele de români transilvăneni găseau aici condiții de viață mult mai bune.

Specificul activităților economice, corelat cu creșterea relativ puternică a volumului forței de muncă și deci a presiunii demografice asupra acestor teritorii au determinat, în prima jumătate a secolului XX, o serie de fluxuri migratorii (fie cu schimbarea domiciliului stabil, fie pendulatorii), direcționate de data aceasta dinspre piemont spre orașe și regiuni învecinate sau chiar mai depărtate, cu posibilități mai largi de ocupare a forței de muncă (București, Pitești, Sibiu, Brașov etc. pentru activități neagricole sau județele Vrancea, Maramureș pentru activități forestiere).

Fenomenul caracterizează chiar și unele orașe, o parte din populația lor deplasându-se spre alte centre urbane mai mari, cu un necesar ridicat de forță de muncă. Ele compensează, însă, pierderile prin polarizarea locuitorilor din mediul rural, soldul migrator înregistrând, în final, valori pozitive.

Mutațiile semnificative care au avut și au loc, în ultimul timp, în economia piemontului, apariția și dezvoltarea unor noi centre urbane și industriale, repartitia diferențiată a forțelor de producție în teritoriu au determinat modificări evidente în ceea ce privește mobilitatea teritorială a populației în această parte a țării.

Structurile economice, demografice și urbanistice specifice constituie, în continuare, factori cu potențe și tendințe relativ favorabile mobilității teritoriale. Domină migrația cu caracter definitiv orientată rural

—urban, participarea populației din Piemontul Getic la mobilitatea pe plan interregional micșorându-se însă simțitor, în favoarea cuantumului migratoriu pe plan local, între limitele acestei unități naturale.

Se înregistrează o mobilitate relativ accentuată a forței de muncă spre bazinul carbonifer Motru, unitățile industriale din municipiile Craiova, Tîrgu Jiu, Pitești, muncile forestiere din aria carpatică și subcarpatică etc. Migrația a antrenat și antrenează, în special, populația tinăra.

În mediul rural, populația în vîrstă de peste 60 de ani (circa 18% din populația totală) este mult mai numeroasă decât cea a grupei de 0—4 ani (8,5%), indicînd o pondere ridicată a populației vîrstnice. În mediul urban, în schimb, ponderea celor două grupe înregistrează valori aproape egale (9,5% și respectiv 9,6%), iar cea a persoanelor de 15—45 de ani este cu peste 10% mai mare decât la nivelul așezărilor rurale.

Aceste valori medii, la nivelul întregului piemont, ascund o serie de discrepanțe în profil teritorial: de la sate puternic îmbătrinite, din cauza migrației îndelungate a populației tinere, la sate cu structură relativ normală. Numărul persoanelor care și părăsesc localitatea de domiciliu înregistrează valorile cele mai ridicate în cazul satelor situate la distanțe mari față de centrele urbane și industriale, sau fără legături corespunzătoare cu exteriorul: sectorul central al Piemontului Bălăciței, Piemontul Cotmenei, Dealurile Cernei etc.

Numărul plecărilor scade în cazul localităților din apropierea orașelor, cu posibilități de practicare a navelei sau potențial economic propriu însemnat, a căror populație are posibilitatea de a-și completa veniturile din participarea la activități urbane sau chiar rurale neagricole (Gruiurile Argeșului, parțial Piemontul Cindești și Podișul Beicăi, culoarele de vale etc.). Aceste așezări dispun de posibilități mai variate de ocupare a forței de muncă, de o viață economică și socială mai dinamică.

În ultimele două decenii mișcarea nave-tistă s-a intensificat, determinînd reducerea mobilității teritoriale cu caracter definitiv.

Resursele de muncă (15—59 de ani bărbați și 15—54 de ani femei) din cadrul Piemontului Getic se cifrează la peste 738 000 de persoane (58,6% din totalul populației). Asistăm însă la îmbătrînirea generală a acestor resurse, în sensul scăderii ponderii grupei de 15—39 de ani și creșterii celei în

vîrstă de 40—59 de ani, datorită atît reducerii natalităţii, în ultimele două decenii, cît şi migraţiei tineretului din regiune, spre marile centre polarizatoare situate cu precădere în afara limitelor piemontului (Craiova, Piteşti, Govora, Slatina, Rîmniciu Vîlcea etc.).

Ponderea populaţiei în vîrstă de muncă înregistrează o scădere lentă, dar evidentă, valoarea sa (58,6%) situîndu-se sub media ţării (60,6% din total populaţie). Populaţia activă ocupată în diferitele ramuri ale economiei reprezintă circa 84% din resursele de muncă şi 49% din populaţia totală.

Deşi structura populaţiei ocupate a cunoscut şi cunoaşte, în continuare, modificări în urma dezvoltării industriei, serviciilor şi agriculturii, populaţia ocupată în agricultură deţine 44% din populaţia totală ocupată, dar în ultimul timp ponderea ei este în scădere. În mediul rural această proporţie atinge valori mult mai ridicate (circa 58%), în timp ce în mediul urban scade la 10%.

Structura populaţiei active variază de la o subunitate la alta, în funcţie de dezvoltarea economică şi socială proprie. Activităţile industriale din ce în ce mai numeroase în Piemontul Motrului, Culoarul Jiului, Culoarul Oltului, în municipiul Drobeta-Turnu Severin determină polarizarea deosebită a forţei de muncă neagricole în aceste areale. Spre deosebire de acestea, ariile cu un caracter predominant agricol se remarcă prin ponderea ridicată a populaţiei ocupată în agricultură (Piemontul Bălăciţei 78%, Dealurile Amaradiei şi Cercei peste 70% etc.).

Dezvoltarea economică şi social-culturală permanentă a aşezărilor din piemont, multiplicarea funcţiilor lor economice vor redresa, în continuare, structura demografică sub toate aspectele, vor crea noi condiţii pentru asigurarea stabilităţii populaţiei, realizării unor raporturi corespunzătoare în ceea ce priveşte structura populaţiei pe medii şi grupe de vîrstă.

Aşezările rurale. Piemontul Getic cuprinde aproape 1 550 de aşezări, din care opt centre urbane: Drobeta-Turnu Severin, Filiaşi, Drăgăşani, Motru, Strehaia, Scorniceşti, Colibaşi şi Topoloveni. Repartiţia în teritoriu a aşezărilor, forma, structura, textura, mărimea şi profilul economic sînt strîns legate de condiţiile mediului geografic, de gradul de valorificare a resurselor locale şi de dezvoltare social-economică a acestui teritoriu în decursul timpului.

Fragmentarea reliefului, dealurile acoperite în mare parte cu păduri şi greu de traversat, iar în multe locuri lipsa de apă au făcut ca aşezările omeneşti să se dezvolte mai mult pe văi, în lungul căroră circulaţia a fost mai uşoară şi condiţiile geografice mult mai prielnice vieţii umane.

Din repartiţia în teritoriu a aşezărilor se evidenţiază faptul că în lungul principalelor ape (Jiu, Olt, Argeş, Motru, Olteţ, Gilort, Amaradia, Cerna) satele se înşiră de o parte şi de alta a văilor, la contactul cu dealurile. Aproape că nu există vale (chiar fără apă permanentă) care să nu aibă în lungul ei cîteva aşezări. În schimb, pe interfluvii aşezările sînt mult mai rare, iar pe unele dintre ele lipsese, din cauza dificultăţilor de acces şi a adîncimii mari la care se găseşte apa freatică. Tipic în acest sens este Piemontul Cindeşti, unde aşezările nu s-au ridicat pe interfluvii, toate dezvoltîndu-se numai în lungul văilor care traversează această unitate (Potopul, Budişteanca, Cîrcinovul, Rîncaciovl). Aceeaşi situaţie se întîlneşte în Gruiurile Argeşului şi Gruiurile Jiului. Valea Vilsanului, Rîul Doamnei, Bratia şi Rîul Tîrgului care brăzdează Gruiurile Argeşului sînt pline de aşezări, în schimb pe interfluviiile dintre ele, acoperite cu păduri, omul a găsit foarte puţine locuri pentru organizarea vetrelor de sate. Excepţie face partea centrală a Piemontului Cotmenei dintre Argeş şi Olt, unde fragmentarea reliefului este redusă şi pantele domoale. Gospodăriile satelor dezvoltate aici (Poiana Lacului, Babana, Popeşti, Uda, Cungrea, Topana, Vedeia etc.) sînt răsfirate şi chiar risipite, cuprinzînd în interiorul vetrelor şi terenuri de cultură. O situaţie relativ aparte în privinţa formei şi repartiţiei aşezărilor o prezintă sud-vestul Piemontului Getic, respectiv Piemontul Bălăciţei, care face tranziţia între piemontul din nord şi cîmpia din sud. În acest teritoriu, cu un relief mai domol, cu văi mai puţin evoluat şi cu apa la adîncimi nu prea mari, satele s-au dezvoltat la toate nivelurile sub formă de vetre compacte, cu distanţe mari între ele, fenomen specific reţelei de aşezări din cîmpie.

Forma aşezărilor este strîns legată de poziţia lor în teritoriu. Cele din lungul principalelor ape au, în general, formă liniară, cu vetrele dezvoltate pe podul teraselor, la contactul acestora cu versanţii şi pe conurile de dejecţie ale afluenţilor (fig. 126). Multe din aşezări şi-au extins, din vatra principală,




Fig. 126. Tipuri de sate din Piemontul Getic. 1, Păduri; 2, vîi; 3, livezi; 4, terenuri arabile; 5, căi ferate; 6, drumuri.

tentacule pe ogașele care vin de pe versanți sau pe pantele domoale ale dealurilor. În zonele în care versanții sînt abrupti, iar apele provoacă inundații, la ploi mari, așezările s-au dezvoltat numai la contactul cu dealurile. Un exemplu în acest sens îl constituie satele de pe partea stîngă a Jiului, la nord de confluența cu Gilortul (Ceplea, Brănești, Văleni, Ploșoru etc.), și cele de pe dreapta Oltului, de la nord de orașul Drăgășani (Prundeni, Delureni, Călina etc.).


În locurile în care văile au terase bine dezvoltate, așezările prezintă forme poligonale, cu vetrele extinse pe podurile acestora. Așa sînt, de exemplu, satele Răcarii de Sus, Răcarii de Jos, Tatomirești, Brădești, Coțofenii din Față, Ișalnița, de pe stînga Jiului, dintre Filiași și Craiova, ca și satele Bălcești, Iancu Jianu, Obogă, Zătreni, Livezi, Grădiștea etc., din lungul Oltețului.

O caracteristică în privința formei, care se întîlnește la multe așezări din Piemontul Getic, o prezintă satele din lungul Cernei (afluent al Oltețului). Aproape toate satele situate pe această vale (Stănești, Ștefănești, Bocea, Măciuca, Drăgan, Valea Mare etc.) au extinse o serie de tentacule, din linia principală, pe pantele dealurilor înconjurătoare. De fapt, satele liniare și tentaculare sînt predominante în tot Piemontul Getic, ma-

ioritatea dintre acestea fiind dezvoltate în lungul apelor, unde pantele abrupte ale dealurilor nu le-au permis să se extindă mult în interior, iar văile inundabile le-au obligat să se retragă cît mai aproape de versanți.

Densitatea medie a așezărilor din Piemontul Getic (11,9 așezări/100 km²) este mult mai mare decît densitatea la nivelul țării (5,6 așezări/100 km²). Se constată, însă, mari diferențieri în teritoriu. În jumătatea sudică a Piemontului predomină densitățile de 6—12 localități la 100 km², dar în multe areale din partea nordică densitatea ajunge la 15—20 și chiar peste 20 așezări/100 km² (între Olt și Gilort, între Olt—Topolog și Argeș). Aceste valori sînt cele mai mari din țară și ocupă aria cea mai întinsă. În partea sud-vestică, în Piemontul Bălăciței, se înregistrează sub 3 așezări/100 km², cea mai scăzută densitate din tot Piemontul Getic, valoare ce caracterizează, în mare parte, cîmpia. De aceea Piemontul Bălăciței reprezintă o regiune de tranziție între cîmpie și piemontul din nord (fig. 127).

Mărimea așezărilor ca și repartiția acestora în teritoriu sînt strîns legate de condițiile geografice. Fragmentarea puternică a reliefului și, în general, gradul de accesibilitate redus, mai ales în partea nordică a Piemont-



[Fig. 127. Densitatea așezărilor (la 100 km²) în Piemontul Getic.

tului Getic, a impus dezvoltarea unor așezări mici. Din cele aproape 1 550 de sate (conform actualei împărțiri administrative a țării)¹, circa 55% au sub 500 de locuitori, 29% între 500 și 1 000 și numai 16% depășesc 1 000 de locuitori. O singură așezare rurală — Plenita — trece cu puțin peste 5 000 de locuitori și se află la contactul cu cimpia.

În Piemontul Cotmenei și Piemontul Motrului satele cu sub 500 de locuitori depășesc 66%, iar în Piemontul Oltețului ajung la 60%. În schimb, în Gruiurile Argeșului acestea nu reprezintă decât 28%, în culoarele Jiului și Oltului 33%. Aproape 5% din satele Piemontului Getic sînt foarte mici, avînd sub 100 și chiar sub 50 de locuitori. Cele mai multe dintre acestea sînt localizate în Piemontul Oltețului (Dealul Spirei, Boia, Zlătari, Frasină, Teiu, Gîrnicetu etc.) și Piemontul Cotmenei (Băjănești, Săndulești, Voineasa, Popești, Schitu, Isaci etc.). Majoritatea sînt așezate în locuri izolate și

¹ În cadrul Piemontului Getic ca și în aproape toate regiunile țării există un număr mult mai mare de așezări, dar care nu mai apar oficial ca sate: sînt considerate cătune și înglobate la unele localități din apropiere, cu toate că cele mai multe dintre acestea au vetre distincte, situate la diferite distanțe de satele la care au fost arondate.

au legături greoaie cu centrele comunale, iar numărul populației în continuă scădere. Așezările cu 500—1 000 de locuitori (care împreună cu cele cu sub 500 de locuitori totalizează aproape 85% din numărul sateilor Piemontului Getic) s-au dezvoltat mai mult în lungul principalelor căi de comunicație, la încrucișări de drumuri și la confluența apelor, multe dintre ele îndeplinind funcția de centre comunale.

Satele cu peste 1 000 de locuitori sînt localizate îndeosebi în apropierea marilor centre urbane, în ariile de convergență umană și în locurile unde s-au valorificat din plin, în ultimul timp, resursele economice locale, unele din ele cu importanță majoră în economia națională (cărboni, țifei). Acestea sînt cele mai dezvoltate sate din Piemontul Getic. Unele au depășit 2 500 de locuitori și au astăzi un profil agroindustrial sau chiar industrial. Așa sînt, de exemplu, în culoarul Jiului, Turceni, centru al industriei energetice și construcțiilor de mașini cu circa 4 000 de locuitori, Ișalnița, un puternic centru al industriei chimice, cu aproape 5 000 de locuitori, Iancu Jianu din Piemontul Tesluiului, un important centru agricol și de exploatare a petrolului, cu peste 4 000 de locuitori, Ștefănești, unul din principa-

lele centre viticole ale țării, cu aproape 3 500 de locuitori și Gura Șuții, centru de exploatare a țițeiului, cu circa 3 400 de locuitori.

Alte sate cu un număr mai mare de locuitori sînt: cele în care s-a dezvoltat și diversificat industria locală și care sînt situate la încrucișări de drumuri, satele în care s-a dezvoltat o agricultură intensivă sau cele localizate în apropierea unor importante centre urbane, cum sînt: Plenița din Piemontul Bălăciței, fost oraș și reședință raională, care în prezent este, după cum s-a amintit, cel mai mare centru rural din Piemontul Getic (peste 5 000 de locuitori); Bălcești din Piemontul Oltețului (cu aproape 3 000 de locuitori) situat la confluența Peșteanei cu Oltețul, fost reședință de raion, devenit centru de convergență umană, cu industrie locală; Cernele din nord-vestul orașului Craiova, cu circa 2 800 de locuitori etc. Aceste așezări împreună cu toate satele care depășesc 2 500 de locuitori sînt puține, ele reprezentînd numai 1,5% din așezările rurale ale Piemontului Getic. Cele mai multe dintre ele (15 din totalul de 23) sînt localizate în Piemontul Cîndești (Mioveni, Braniștea, Picior de Munte etc.) și Culoarul Jiului (Florești, Cernele, Ghindeni, Cîrcea, Turceni etc.).

În multe din așezările rurale ale Piemontului Getic se înregistrează o reducere a numărului de locuitori în ultimele trei decenii. O parte a forței de muncă, eliberată din agricultură, s-a deplasat spre centrele urbane, angajîndu-se în unități industriale sau în alte ramuri de producție. Cu timpul, o parte din această populație (și îndeosebi populația tinăra) și-a stabilit domiciliul în localitățile unde lucrează. S-au înregistrat, astfel, scăderi ale numărului de locuitori chiar și din unele sate mari, cu un potențial economic mai ridicat (Plenița, Bălcești, Ișalnița etc.). Unele din aceste sate cu populația în scădere sînt situate în apropierea unor mari centre urbane (Craiova, Slatina, Pitești etc.), care au atras un important număr de locuitori în unitățile lor economice. Altele sînt localizate în arii relativ izolate, cu un potențial economic mai scăzut, cu legături greoaie de circulație spre principalele centre de producție și, ca urmare, o parte din populație le-a părăsit, stabilindu-se în orașele în care aceasta își are locul de muncă. Se impun măsuri pentru revitalizarea tuturor acestor sate, prin dezvoltarea industriei mici, valorificarea resurselor locale

ale solului și subsolului și dezvoltarea unei agriculturi intensive, care să cuprindă în procesul de producție întreaga forță de muncă din cadrul acestor așezări.

Profilul economic al așezărilor rurale din Piemontul Getic era, în trecut, predominant agricol, cu diferențieri locale în funcție de condițiile de relief, de calitatea solurilor, de condițiile climatice și de poziția în teritoriu. În ultimul timp o parte a așezărilor și-a schimbat profilul economic, ca urmare a valorificării unor resurse locale și a diversificării producției agricole. Și în prezent, ca și în trecut, majoritatea așezărilor au caracter agricol, însă cu putere economică mult sporită, datorită dezvoltării și extinderii unor ramuri agricole care aduc venituri mult mai mari (legumicultură, creșterea animalelor, viticultură). Dacă în jumătatea nordică a Piemontului Getic profilul economic este dat, la majoritatea așezărilor, de cultura cerealelor (îndeosebi porumb), pomicultură și creșterea animalelor, în jumătatea sudică predomină așezările bazate pe cultura cerealelor, a plantelor tehnice și pe creșterea animalelor. Așezările din lungul râurilor și din apropierea marilor centre urbane cultivă, în prezent, pe suprafețe întinse, legume și zarzavaturi cu care aprovizionează piața zilnică a centrelor urbane din apropiere și unitățile de profil ale industriei alimentare. Astfel sînt unele așezări din lungul Jiului (din apropierea municipiului Craiova), al Oltului (de la nord de Slatina) și de pe văile altor râuri (Motru, Amaradia, Olteț, Argeș etc.), al căror profil agricol este dat, îndeosebi, de cultura cerealelor, a legumelor și zarzavaturilor. În partea centrală a Podișului Getic, pe dreapta Oltului, în zona orașului Drăgășani, se grupează un număr însemnat de așezări rurale cu profil viticol (Ștefănești, Șutești, Crețeni, Prundeni etc.), iar mai la nord așezări pomiviticele (Scundu, Glăvile, Amărăști etc.). Același profil îl au și o parte a așezărilor din Piemontul Cîndești și Grănițele Argeșului, ca de exemplu cele situate imediat la nord-est de municipiul Pitești (Ștefănești, Mărăcineni, Micești etc.).

Exploatarea și valorificarea intensă a resurselor naturale și construirea unor unități economice în apropierea centrelor de exploatare a materiilor prime au făcut ca unele așezări rurale, cu profil agricol, să se transforme în așezări agroindustriale, care concentrează în jurul lor o parte a forței de muncă din împrejurimi. Așa a fost cazul

ășezărilor rurale în raza cărora s-au descoperit și exploatat țiței, cărbune, gaze, sau a celorla în care au fost construite unități pentru industrializarea pe plan local a materiilor prime agricole, sau unități economice care să satisfacă cerințele de produse industriale la nivel național și să cuprindă în sfera de producție materială forța de muncă disponibilă din regiune. Sînt cunoscute în acest sens ășezările de exploatare a cărbunelui din Piemontul Motrului (Mătăsari, Fărcașești, Urdari, Drăgotești, Samarinești, Balota, Husnicioara, Jilțu, Valea Motrului, Leurda, Horăști, Ploștina, Lupoia, Roșița etc.), cele de exploatare a țițeiului din Piemontul Oltețului (Zătreni, Dănciulești, Iancu Jianu, Gherești etc.), din Piemontul Cotmenei (Vedea, Cungrea, Poboru, Verguleasa etc.), din Piemontul Cindești (Bogați, Leordeni, Priboeni etc.). În aceeași categorie intră și ășezările cu industrie prelucrătoare, din care unele au fost menționate mai înainte (Turceni, Ișalnița). Pe lângă acestea se remarcă prin dezvoltarea lor economică Bucovăț, din Culoarul Jiului, cu industrie alimentară și, respectiv, industria pielăriei, Corcova din Piemontul Motrului, cu industria băuturilor alcoolice etc.

Ășezările rurale cu producție industrială și cu o agricultură intensivă și diversificată sînt cele mai dezvoltate ășezări ale Piemontului Getic. În acestea s-au organizat centre civice care cuprind unitățile administrative, de învățămînt, sanitare, sociale, culturale, comerciale și blocuri de locuințe care au alimentare cu apă curentă și parțial sînt termoficate: Ișalnița și Plenița din județul Dolj, Ștefănești, Vedea și Cotmeana din județul Argeș, Bustuchin, Mătăsari și Turceni din județul Gorj, Potcoava și Iancu Jianu din județul Olt, Corcova din județul Mehedinți, Bălcești din județul Vâlcea etc. Dezvoltarea și poziția lor în teritoriu le recomandă ca centre de convergență umană, cu posibilități de coordonare a activităților economice, sociale și culturale ale celorlalte sate din împrejurimi.

În Piemontul Getic, ca și în întreaga țară, este în curs de desfășurare procesul de urbanizare a localităților și organizare a teritoriului, care se va realiza pe baza programului stabilit la nivel național și adaptat condițiilor locale pentru fiecare județ și localitate în parte. Astfel se creează premise favorabile dezvoltării economico-sociale a tuturor localităților în strînsă legătură cu

valorificarea resurselor naturale și umane locale și utilizarea mult mai rațională a spațiului rural.

Diversificarea producției agricole, valorificarea tuturor resurselor locale în cadrul unor unități ale industriei mici și dezvoltarea centrelor de convergență umană vor impune organizarea pe baze noi a rețelei de ășezări rurale.

Modificări se vor produce în structura economică a ășezărilor, în fizionomia și morfologia lor, însă liniile principale de ășezări, localizate de veacuri în lungul apelor, vor dura în continuare, acestea reprezentînd osatura de bază a întregii rețele de ășezări din Piemontul Getic.

Ășezările urbane. Dezvoltarea vieții urbane în Piemontul Getic a cunoscut o evoluție mai lentă în comparație cu alte regiuni ale țării, datorită faptului că în Subcarpații din nord și la contactul cu cîmpia din sud sînt localizate importante centre urbane (Craiova, Pitești, Slatina, Rîmnicu Vâlcea, Tirgu Jiu) care au o mare influență asupra desfășurării vieții social-economice din cuprinsul piemontului. La aceasta au contribuit și structura preponderent agricolă din trecut, valorificarea mai redusă a resurselor locale, lipsa unei industrii prelucrătoare și circulația mai greoaie pe direcția est-vest, principalele căi de comunicație fiind localizate în lungul apelor și la contactul cu regiunile vecine. De aceea și unele ășezări (Plenița, Tîntăreni, Bălcești etc.), foste țîrguri, în care în trecut se făcea comerț cu cereale, vite și produse gospodărești, nu s-au ridicat la nivelul centrelor urbane și, ca urmare, sînt menținute și în prezent în categoria ășezărilor rurale, deși în ultimele decenii au cunoscut transformări social-economice care au produs transformări în structura funcțională și în aspectul lor arhitectural.

Pînă în 1967 figurau ca orașe în Piemontul Getic numai Drobeta-Turnu Severin în extremitatea vestică, Drăgășani pe Olt și Strehaia pe Motru, menționate în documentele istorice ca vechi țîrguri ale Țării Românești. În 1967 a fost declarat oraș centrul minier Motru, construit în lunca Motrului, în bazinul carbonifer cu același nume, la intersecția căilor de comunicație Drobeta-Turnu Severin—Tirgu Jiu și Baia de Aramă—Strehaia, iar în 1968 au fost trecute în rîndul centrelor urbane Fîlîși, tot vechi țîrg la întîlnirea căilor de comunicație de la confluența Jiului cu Motrul și Gilortul și

Topoloveni, situat în aria de confluență a Circinovului cu Argeșul.

Cel mai mare centru urban din Piemontul Getic este municipiul Drobeta-Turnu Severin, dezvoltat în locul unui foarte important centru politic și economic de pe vremea dacilor și romanilor. Cunoscut în decursul secolelor mai mult ca port și centru comercial, a devenit în ultimele decenii oraș cu activitate complexă, în ansamblul căruia industria are rol preponderent, datorită construirii unor importante unități economice (construcții de mașini, industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, a confecțiilor, alimentară etc.). Ca urmare a dezvoltării din ultimele decenii, populația orașului a crescut de la 50 806 de locuitori în 1966 la 115 526 de locuitori în 1992, îndeosebi prin contribuția sporului migratoriu.

Actualele orașe Drăgășani, Filiași, Strehaia și Topoloveni, deși au îndeplinit în trecut și funcții administrative ca centre de plasă și apoi centre raionale, au cunoscut o dezvoltare lentă, majoritatea populației ocupându-se cu agricultura sau cu practicarea unor meșteșuguri ale căror produse erau valorificate pe plan local. De aceea, ele n-au reprezentat centre de atracție a populației și ca urmare sporul locuitorilor a fost redus, creșterea numărului lor bazându-se numai pe mișcarea naturală. În 1966 toate aveau sub 15 000 de locuitori (Drăgășani 13 278 locuitori, Filiași 11 546, Strehaia 10 696 și Topoloveni 5 605 de locuitori). Numai orașul Motru, care se dezvoltă ca centru al industriei carbonifere, deși oraș nou, cu o existență de numai 25 de ani, se detașează mult față de celelalte, atât în privința evoluției populației, cât și a structurii economice. Populația lui înregistrează în 1992 un spor de peste trei ori față de 1967 (de la 7 734 la 26 491 de locuitori), urmare a venirii unui număr mare de oameni din alte părți care lucrează în industria carboniferă.

În celelalte patru orașe populația a cunoscut, în aceeași perioadă de circa 25 de ani, o creștere mai mică. Ca urmare, în 1992, orașul Drăgășani ajunsese numai la 22 084 de locuitori, Filiași la 18 747, Strehaia la 12 307 de locuitori și Topoloveni la 9 455 de locuitori.

Cu excepția orașului Motru, oraș în plină dezvoltare industrială (în care funcționează combinatul carbonifer Motru, unități industriale pentru întreținerea utilajului minier, unități din cadrul industriei textile, alimen-

tare și industriei meșteșugărești), celelalte patru orașe — Drăgășani, Strehaia, Topoloveni și Filiași — mai păstrează încă din specificul lor agricol din trecut, la care s-a adăugat recent și funcția industrială prin construirea unor unități economice din diferite ramuri de producție. Orașul Drăgășani este cunoscut în prezent nu numai ca un important centru viticol al țării, ci și ca centru al industriei produselor din cauciuc și industriei chimice iar Filiași ca centru al industriei construcțiilor de mașini, nod feroviar și rutier. De asemenea, Strehaia este și centru al industriei metalurgice și industriei confecțiilor. În ultimul timp îndeplinește și funcția de nod feroviar și rutier prin construirea unor căi de comunicație care pun în legătură bazinul carbonifer al Motrului cu magistrala feroviară și rutieră București — Craiova — Drobeta-Turnu Severin — Timișoara. Orașul Topoloveni este un important centru viticol al țării, în care s-a dezvoltat, în ultimul timp, și industria alimentară.

În anul 1989, încă două așezări — Colibași și Scornicești — au fost trecute în rîndul centrelor urbane. Colibași a devenit un important centru al industriei construcțiilor de mașini (uzinele de autoturisme Dacia) și de cercetare științifică (Institutul de reactori nucleari și Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru autoturisme) și, în consecință, populația lui a crescut de la circa 5 500 de locuitori în 1966 la 33 547 în 1992. În Scornicești s-au construit fabrici ale industriei construcțiilor de mașini, industriilor confecțiilor, textile și alimentare și s-au organizat unele unități agricole. Orașul are funcție industrial-agrară și 13 986 de locuitori (1992).

Este necesar ca, în continuare, dezvoltarea economică a orașelor din Piemontul Getic să se bazeze tot mai mult pe valorificarea resurselor locale din regiune și să devină importante centre de polarizare umană pentru a cuprinde în aria lor de influență teritorii cât mai întinse. Numai astfel evoluția lor va fi în mai mică măsură influențată de dezvoltarea marilor centre urbane din apropiere. Prin restructurarea activităților economice din actualele orașe și trecerea în rîndul centrelor urbane a unor așezări rurale care se conturează în prezent ca centre polarizatoare (Turceni, Plenița, Bălcești, Potcoava etc.) se va crea o rețea urbană la

nivelul Piemontului Getic, care va produce importante modificări în structura social-economică a acestui teritoriu.

5.7. Industria

Pînă în a doua jumătate a secolului nostru, aspectul economic al Piemontului Getic a fost dominat de cîteva ramuri agricole, între care un rol mai însemnat au deţinut creşterea animalelor şi pomicultura. Resursele regiunii erau insuficient valorificate, iar industria era reprezentată prin unităţi de importanţă locală cu profil alimentar sau care produceau materiale de construcţii şi obiecte pentru uzul populaţiei.

După anul 1950, Piemontul Getic a intrat într-o etapă nouă de utilizare, trecînd de la cea monofuncţională la cea plurifuncţională. Unităţi economice din diferite ramuri de producţie au apărut nu numai în centrele urbane, ci şi în multe aşezări rurale, ceea ce a permis valorificarea mai eficientă a resurselor naturale, ocuparea unui număr tot mai mare a forţei de muncă în ramuri ne-agricole şi modificarea structurii economice a teritoriului. În prezent, Piemontul Getic deţine un loc important în cîteva ramuri ale economiei naţionale, ca de exemplu în industria cărbunelui, petrolului, energiei electrice etc. Cercetările geologice şi geofizice au identificat zăcăminte de cărbuni inferiori (lignit) în formaţiuni de vîrstă pliocenă, structuri petrolifere şi de gaze naturale, rezerve importante de roci utile şi materiale de construcţii.

Cea mai reprezentativă ramură industrială din Piemontul Getic este industria energetică, care s-a dezvoltat prin punerea în valoare a unor importante zăcăminte de combustibili minerali (cărbuni, hidrocarburi) şi construirii unora din cele mai mari centrale termoelectrice din ţară.

Bazinul carbonifer Motru—Jilt, introdus în circuitul productiv din 1955, dispune de cele mai mari rezerve de lignit din ţară (46% din rezervele de lignit ale României). Numai din exploatările de la Lupoia I şi Lupoia II, Ploştina, Roşiţa I şi Roşiţa II, Leurda, Horăşti şi Meriş, din bazinul Motrului, se livrează 21% la producţia naţională de lignit. Cea mai mare cantitate de cărbune se foloseşte la centralele termoelectrice de la Işalniţa—Craiova, Turceni şi Rogojel din lungul Jiului, pe al cărui curs s-au amenajat

lacuri de acumulare pentru reţinerea apei necesară în procesul de producţie. Termocentrala de la Turceni, proiectată la o putere instalată de 2 640 MW, este aprovizionată cu cărbune îndeosebi din bazinul Jiului, în timp ce termocentrala de la Işalniţa—Craiova, în funcţiune din 1967 şi cu o putere instalată de 1 100 MW, primeşte lignit mai mult din bazinul Motrului.

Cele mai recente exploatări carbonifere s-au deschis în sectorul Alunu—Cuceşti, din Piemontul Olteţului. Intensificarea exploatărilor din această regiune a determinat construirea căilor ferate Băbeni—Berbeşti—Alunu pe o lungime de 44 km şi Tirgu Cărbunest—Alunu, folosite pentru transportul cărbunelui şi al forţei de muncă la exploatările carbonifere.

Activitatea de exploatare a cărbunelui a impus ridicarea oraşului Motru, centru urban a cărui construcţie a început odată cu primele exploatări carbonifere în această parte a Piemontului Getic.

Petrolul şi gazele naturale se exploatează în multe localităţi din piemont, rezervele principale fiind cantonate în formaţiunile paleogene (oligocen), miocene (helveţian, sarmatian) şi pliocene (meotian) de la Bogăţi, Moşoaia, Poiana Lacului, Vedea, Oporelu, Cungrea, Iancu Jianu, Mădulari ş.a. Adîncimea maximă la care au ajuns exploatările este de 4 200 m în formaţiunile triasice din interfluviul dintre Amaradia şi Gilort (Bibesti—Săuleşti, Bulbuceni, Căpreni etc.). Alte exploatări se află în raza localităţilor Spineni, Opţişi—Măgura, la est de Olt, Hurezani, Bibesti, Tetoiu, Zătreni etc., între Olt şi Jiu, unde, odată cu ţiţeiul, sînt exploatare şi gazele de sondă.

Resursele energetice ale podişului sînt completate de hidrocentralele construite în ultimii ani pe Olt (Ioneşti, Prundu, Zăvideni, Drăgăşani, Strejeşti etc.) şi pe Argeş (Zigoneni, Merişani, Bascov).

O altă ramură industrială care se înscrie cu pondere importantă în producţia industrială a piemontului este industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor. Unităţi cu acest profil au fost construite la Drobeta-Turnu Severin, Colibaşi, Bălceşti, Filiaşi şi Strehaia. La Colibaşi s-a construit, pe baza licenţei Renault din Franţa, prima uzină de autoturisme (Dacia) din România, care a intrat în producţie în 1968. Pe măsura extinderii întreprinderii şi a amplificării pro-

cesului de producție s-a trecut la asimilarea tuturor componentelor, astfel că în prezent autoturismele Dacia sînt realizate în întregime în aceste uzine. Producția a crescut de la 2 000 de bucăți, în 1968, la circa 80 000, în 1986. Piese, subansamble și diferite repere auto se produc și în alte localități (Scornicești, Vlădești ș.a.).

La Bălcești, în Piemontul Oltețului, s-a construit o turnătorie pentru instalații sanitare și obiecte de uz casnic care folosește ca materie primă aluminiul realizat la uzinele din Slatina. Aceasta a determinat diminuarea navetismului în zonă. La Filiași funcționează în prezent două unități industriale de importanță națională care produc utilaje și piese de schimb pentru industria lemnului, motoare și transformatoare electrice. Acestea au determinat dezvoltarea industrială a orașului Filiași și modificarea fizionomiei localității. De asemenea, la Strehaia funcționează o fabrică de armături industriale de oțel.

La Drăgășani și Scornicești au fost construite unități industriale care fabrică diferite produse din materiale plastice. De această ramură se leagă și fabrica de articole tehnice și bunuri de larg consum de cauciuc de la Drăgășani, unde se produc și conducte flexibile pentru echipamente de irigații. În ultimele decenii s-au dezvoltat mult și ramurile cu existență mai veche, ca industria materialelor de construcții, bazată pe extracția nisipului și pietrișului din albiile Argeșului (Borlești, Merisani), Olteului (Ionești, Zăvideni), Oltețului, Jiului, Motrului etc., și a rocilor argiloase pentru fabricarea cărămizilor (Mofleni, Corcova, Vața etc.). În unele localități există unități de prelucrare a lemnului, care au, însă, capacități reduse și sînt profilate pe producțiile de cherestea și parchete. Cele mai importante fabrici sînt cele de la Stîlpeni, Cotmeana și Filiași, care prelucreză, cu precădere, esențe de foioase. La acestea se adaugă atelierele de tîmplărie ale cooperației meșteșugărești care realizează o gamă variată de produse pentru construcțiile de locuințe și articole de lemn pentru uzul casnic. Industria textilă și a confecțiilor este reprezentată prin întreprinderile din Drobeta-Turnu Severin, Scornicești, Strehaia, Motru și Drăgășani, profilate pe confecții și prin întreprinderea din Bălcești,

profilată pe prelucrarea lînii. La Strehaia se face o prelucrare primară a inului cultivat în vestul piemontului. O răspîndire mai mare o are industria alimentară care se bazează, îndeosebi, pe prelucrarea produselor agricole specifice regiunii. Localizarea unităților cu acest profil este mult mai echilibrată și orientată în funcție de centrele de consum și de ariile de producție agricole.

O concentrare mai mare a subramurilor industriei alimentare se înregistrează în orașele Drobeta-Turnu Severin, Drăgășani, Strehaia, Filiași, Topoloveni, Motru, Scornicești și în centrele rurale cu potențial economic și uman mai ridicat (Bălcești, Vedeia etc.). Precumpănesc unitățile de morărit, panificație și produse făinoase (Drăgășani, Strehaia, Motru, Filiași, Bălcești, Scornicești etc.), de industria vinului, a rachurilor naturale (Drăgășani, Corcova) și a berei (Scornicești), industria conservelor de legume și fructe (Topoloveni, Scornicești, Strejești), industria produselor lactate (Drăgășani, Scornicești), industria cîrnii și produselor din carne (Drăgășani) etc.

În multe din centrele rurale s-au dezvoltat ramuri industriale din necesitatea valorificării resurselor funciare și miniere, a realizării unui grad mai ridicat de ocupare a forței de muncă, de reducere a cheltuielilor de producție și de transport. Trecerea la o valorificare intensivă a resurselor miniere, forestiere, a produselor accesorii ale pădurii, a florei spontane cu utilizări terapeutice, a unor deșeuri sau materiale rezultate din procesul de producție al unor unități industriale din municipiile situate în imediată vecinătate a Piemontului Getic (Pitești, Slatina, Tîrgu Jiu, Craiova etc.) și la cooperarea în producție cu marile întreprinderi industriale pentru repere cu tehnologie simplă au contribuit la dezvoltarea așezărilor rurale, din care unele au devenit centre agroindustriale. Valorificarea resurselor spațiului rural și construirea unor unități economice în apropiere au exercitat o influență pozitivă asupra dezvoltării economico-sociale a satelor și au contribuit la diminuarea navetismului. Schimbarea profilului economic al așezărilor în funcție de necesitățile actuale și modernizarea căilor de comunicație facilitează dezvoltarea organică a economiei din Piemontul Getic.

5.8. Agricultura

Piemontul Getic aparține în întregime etajului pădurilor de foioase, dar prin lărgirea spațiului cultivat, pe seama defrișării pădurilor și pajistilor, și-a schimbat continuu înfățișarea, mai accentuat către sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Ca urmare, suprafața agricolă a devenit mult mai întinsă decât aceea a pădurilor. În prezent din întregul teritoriu (care ocupă 5,5% din suprafața țării) 64% îl reprezintă domeniul terenurilor agricole, pădurii revenindu-i doar 28,4% (fig. 128). Terenurile arabile dețin 42% din întreaga întindere a Piemontului Getic și 66% din aceea a suprafețelor agricole.

Repartiția în teritoriu a terenurilor arabile prezintă diferențieri imprimate de varietatea reliefului. Astfel, partea nordică, din imediată apropiere a regiunii subcarpatice, unde relieful este accidentat, cu întinse suprafețe afectate de procese de versant, se caracterizează printr-o proporție mai mică a terenurilor arabile. Dar pe măsură ce înaintăm spre sud, odată cu reducerea energiei reliefului, proporția terenurilor agricole crește. De aceea, pe o mare parte din Piemontul Motrului și din Piemontul Oltețului, terenurile arabile ocupă 40–60% din suprafața agricolă, iar în Piemontul Bălăciței proporția acestora este chiar mai mare.

Suprafețe arabile însemnate se află în lungul apelor principale — Jiu, Olt și Argeș —, mai ales în ariile de convergență hidrografică (Filiași, Ișalnița, Balș și nord de Pitești) cu soluri aluviale fertile, unde frecvența terenurilor arabile ocupă 70–80% din suprafața agricolă.

Terenurile arabile din Piemontul Getic, a căror întindere trece de 500 000 ha, au cunoscut, date fiind condițiile naturale favorabile, o utilizare variată și diversificată. Culturii cerealelor, care pînă la mijlocul secolului XX ocupa aproape în exclusivitate terenurile arabile, îi revine și astăzi partea cea mai mare (4/5). Între cereale predomină grîul și porumbul, iar orzul și ovăzul ocupă suprafețe restrînse.

Grîul se cultivă cu bune rezultate în Podișul Bălăciței, Piemontul Oltețului, Piemontul Cotmenei, preferînd terenuri însoțite și zvîntate, pe cînd porumbul este întîlnit în întreg spațiul piemontan, în luncile riurilor pe soluri aluviale, unde se obțin producții ridicate. Cultura secarei ocupă întinderi

reduse. Ea se întîlnește mai ales în partea de vest a piemontului (Piemontul Motrului și Podișul Bălăciței).

Cele mai însemnate cantități de cereale se obțin în cuprinsul Podișului Bălăciței, Piemontului Oltețului și Piemontului Cotmenei, care dau împreună 3/5 din producția întregii unități.

Culturile furajere, puțin practicate în trecut, au cunoscut o extindere importantă în special în cadrul unităților ce dispun de un sector zootehnic dezvoltat. Aceste culturi au înlocuit în bună parte pășunile naturale slab productive. Cultivate și în partea nordică din vecinătatea Subcarpaților, planțele furajere ocupă cele mai mari întinderi în Podișul Bălăciței, Piemontul Oltețului și Piemontul Cotmenei. În structura plantelor furajere se remarcă preponderența plantelor perene (50%), urmată de plantele anuale pentru fîn și cele utilizate pentru însilozare. Anual se realizează o producție de nutrețuri (exceptînd cele grosiere) de peste 200 000 t, remarcîndu-se în mod deosebit trifoiul și lucerna cu randamente ridicate.

Cultura legumelor este practică în aproape toate localitățile. Cele mai mari suprafețe legumicole se întîlnesc în luncile Jiului, Oltului, Argeșului și Oltețului, aici concentrîndu-se jumătate din suprafața legumicolă a Piemontului Getic. Cele mai importante suprafețe cu legume se află în lunca Jiului, care furnizează produse pentru centrele urbane și industriale ale Olteniei, pentru bazinul carbonifer al Văii Jiului, ca și pentru centrele siderurgice Hunedoara și Călan. La producția de legume în aer liber se adaugă cea obținută prin extinderea sistemului de solarii și sere, precum și cea realizată în sistem industrial pe lângă marile orașe.

Plantele tehnice (floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, tutun, ricin) ocupă suprafețe reduse, cultivarea lor practicîndu-se în special în latura sudică a piemontului. Floarea-soarelui este cultivată îndeosebi în partea extrem sudică a Piemontului Bălăciței și Piemontului Oltețului și izolat în Piemontul Cotmenei. Sfecla de zahăr apare pe întinderi reduse, în aceleași areale ca și floarea-soarelui, iar tutunul în cîteva localități din partea centrală a Piemontului Getic (Negomir, Turceni).

Piemontul Getic beneficiază de condiții ecologice favorabile dezvoltării pomiculturii, astfel că livezile ocupă 68 000 ha, ceea




Fig. 128. Utilizarea terenurilor în Piemontul Getic. 1, Terenuri arabile; 2, pășuni și fânețe; 3, vii; 4, livezi; 5, păduri; 6, terenuri agricole și păduri; 7, păduri, livezi și alte terenuri agricole.

ce reprezintă 5% din întreaga suprafață și 7,9% din terenul agricol.

Această regiune de dealuri piemontane, cu o populație numeroasă, cu o tradiție străveche în îngrijirea pomilor, constituie una din principalele arii de cultură a arborilor fructiferi din țara noastră. În cadrul piemonturilor Oltețului, Cotmenei și Cindești este concentrată 65% din întinderea totală a livezilor din Piemontul Getic (fig. 128).

Impulsionarea acestei activități a fost urmată de crearea unor plantații în masiv, intensive, de mare productivitate, care au fost extinse pe terenurile degradate, mai puțin propice altor culturi. Pentru realizarea acestor plantații și în vederea asigurării lor cu un material săditor de bună calitate s-au creat stațiuni și pepiniere de profil la Voinești, Ștefănești, Mărăcineni.

Organizarea pomiculturii s-a tradus și printr-o schimbare în structura soiurilor: prunul, care ocupa în trecut suprafețe foarte întinse, a fost înlocuit treptat cu alte specii: măr, păr, cireș, vișin. Aportul Piemontului Getic în producția pomicolă a țării este deosebit de mare, acesta furnizând importante cantități de prune, mere și pere,

folosite în consumul centrelor urbane din regiune, la export și ca materie primă pentru industria alimentară (dulcețuri, siropuri, compoturi).

Cultura viței de vie, ca și a pomilor fructiferi, a găsit aici condiții bune de dezvoltare pe aproape tot cuprinsul Piemontului Getic, această cultură ocupând o suprafață ce reprezintă 2,1% din întreaga întindere totală și 3,3% din suprafața agricolă. Găsind aici condiții climatice favorabile (cu mici excepții viile nu se îngroapă în timpul iernii), plantațiile au preferat versanții cu expoziție sudică și sud-estică.

Trecând prin perioade de înflorire și regres în urma atacului filoxerei, viticultura a cunoscut o orientare nouă prin efectuarea unor plantații în masiv, prin utilizarea unor versanți sau terenuri mai puțin propice altor culturi. Asemenea lucrări au fost realizate îndeosebi în Piemontul Cindești, Piemontul Cotmenei și Piemontul Oltețului.

Suprafața viticolă se ridică la aproape 30 000 ha, cele mai mari întinderi aparținând Piemontului Oltețului cu circa 10 000 ha (această unitate cuprinde o parte a renumitei podgorii a Drăgășanilor), Podișului Bălăciței cu 5 300 ha, Culoarului Oltului cu

3 400 ha (parțial cuprinde podgoria Drăgășani), Piemontului Cotmenei cu 3 350 ha, Dealurilor Coșuștei (Corcova), Piemontului Cindești (Ștefănești). În tot Piemontul Getic există suprafețe mari cu vii de hibrizi, care s-au extins în special odată cu refacerea viilor distruse de filoxeră, care dau însă o producție de calitate inferioară. Cea mai mare producție de struguri este furnizată de podgoria Drăgășani și centrele viticole ale Piemontului Getic de la vest de Olt. Cea mai de seamă podgorie a piemontului este Drăgășani (specializată în vinuri albe seci și material săditor); în ultimele decenii s-a dezvoltat podgoria Ștefănești—Leordeni, în Piemontul Cindești, pe stînga Argeșului. Producția sa se vinifică la Goleasca (județul Argeș), unde funcționează un modern combinat de vinificație, conservare și îmbuteliere a vinurilor.

În întregul piemont frecvența medie a pășunilor și fînețelor naturale este de 22,2% din terenul agricol. Se înregistrează, însă, deosebiri destul de mari: dintr-o parte în alta a piemontului (frecvența scăzînd de la nord la sud), în funcție de condițiile naturale. Astfel, în părțile sudice, cu relief de cîmpuri înalte și dealuri joase, sînt mai răspîndite culturile agricole decît pășunile și fînețele naturale care ocupă suprafețe reduse. Acestea se extînd mai cu seamă în lunci și pe pantele mai puțin propice culturilor agricole. În structura șeptelului, în această parte, pe primul loc se află bovinele urmate de porcine și păsări. Partea centrală a Piemontului Getic, cu o fragmentare mai accentuată, cuprinde importante suprafețe cu pășuni și fînețe amplasate în cuprinsul luncilor sau pe pantele și culmile prelungi ale dealurilor. În acest teritoriu se cresc îndeosebi bovine, ovine, porcine și păsări.

În partea nordică suprafețele ocupate de pășuni și fînețe sînt mult mai întinse, oferînd o bază furajeră însemnată pentru șeptelul format din ovine, bovine și caprine. Pe întreg cuprinsul Piemontului Getic se cresc circa 220 000 de bovine, 230 000 de porcine, 680 000 de ovine și caprine, 18 000 de cabaline și circa 2,7 milioane de păsări. Creșterea animalelor se face și în sistem intensiv în complexe speciale și îngrășătorii (Virtopu, Filiași, Brădești, în județul Dolj,

Galicea, Drăgășani, Făurești, Prundeni și Lăpușata, în județul Vilcea, Scornicești, în județul Olt etc.).

5.9. Căile de comunicație

Căile de comunicație urmăresc cu precădere văile care traversează piemontul de la nord la sud, și care au reprezentat, din cele mai vechi timpuri, axe de circulație în lungul cărora se făcea legătura între principalele centre umane din regiune. Circulația pe direcție est—vest este mult mai greoaie din cauza structurii orografice, a adîncimii văilor și a pădurilor care ocupă mari suprafețe pe unele interfluvii. De aceea și așezările, cu puține excepții, s-au dezvoltat mai mult în lungul apelor și îndeosebi în lungul acelor pe care circulația se făcea mai ușor (Argeș, Olt, Olteț, Amaradia, Jiu, Motru etc.). Toate așezările rurale și urbane sînt legate, în prezent, între ele, prin căi rutiere, comunale, județene sau naționale, multe dintre acestea modernizate sau în curs de modernizare. Căile ferate servesc numai o parte din așezările Piemontului Getic, acestea avînd o densitate mult mai redusă. Drumurile comunale pătrund pe toate văile unde s-au dezvoltat așezări omenești și ureă pe multe dealuri, deși unele dintre acestea sînt destul de greu de traversat. În schimb, căile ferate își au traseul în lungul apelor. Singura cale ferată care străbate acest teritoriu de la est la vest este cea dintre Drobeta-Turnu Severin și Craiova (o parte din magistrala Timișoara—București) care, la est de Craiova, se menține cu aproximație la contactul Piemontului Getic cu Cîmpia Română. De la Craiova spre Drobeta-Turnu Severin această linie, electrificată și dublă, merge pînă la Filiași pe valea Jiului, iar mai departe pînă la Strehaija, pe valea Motrului, de unde se angajează pe văile Hușniței și Ghelmeioaiei printr-o porțiune cu un relief mai fragmentat.

Din linia București—Pitești—Craiova—Drobeta-Turnu Severin se ramifică cîteva căi ferate care pornesc spre nord în lungul apelor și fac legătura cu partea de nord a piemontului și cu principalele centre din regiunea subcarpatică. Astfel, din municipiul Pitești și din Golești (comuna Ștefănești) pornesc pe valea Argeșului și, respectiv, pe Riul Tîrgului, căile ferate care ajung




Fig. 129. Căile de comunicație din Piemontul Getic. 1, Drumuri modernizate; 2, căi ferate; 3, căi ferate electrificate.

la Curtea de Argeș și la Cîmpulung (fig. 129).

Alte două căi ferate care traversează piemontul spre nord se desprind din magistrala Pitești — Craiova — Drobeta-Turnu Severin la Piatra Olt și Filiași. Cea care urmează valea Oltului prin Drăgășani — Băbeni — Rîmnicu Vilcea traversează munții prin Defileul Oltului și ajunge la Podu Olt. Cea laltă, care pleacă de la Filiași, electrificată pe tot parcursul ei, merge pe o distanță de circa 10 km (pînă la Tîntăreni) pe valea Jiului, iar în continuare pe valea Gilortului pînă la Tîrgu Cărbunestî, de unde se îndreaptă spre vest, pînă la Tîrgu Jiu și în continuare pe valea Jiului pînă în Depresiunea Petroșani.

Darea în exploatare a zăcămintelor de cărbuni din bazinele dintre Motru și Jiu și punerea în funcțiune a termocentralelor Rogojel și Turceni au impus construirea unor căi ferate pentru transportul cărbunelui din locurile de exploatare la centrele de consum și deplasarea forței de muncă. În această categorie intră calea ferată din lungul Jiului: Tîrgu Jiu — Rogojel — Turceni — Filiași (77 km), electrificată pînă la Rogojel (18 km); cea de pe Jilț: Turceni — Drăgotești (28 km) și cea de pe Motru: Strehaia — Motru (31 km), linie electrificată. În trecut această

parte a Piemontului Getic era lipsită de căi ferate, transporturile făcîndu-se numai pe căi rutiere, ca urmare legăturile cu zonele învecinate erau destul de dificile.

Piemontul Getic este pus în legătură directă și cu cîmpia de la vest de Jiu, prin linia ferată Craiova — Calafat, care traversează pe o mică porțiune partea cea mai sud-estică a Piemontului Bălăciței. Într-o situație asemănătoare este și calea ferată Băbeni — Berbești — Alunu (44 km), dată în folosință în ultimii ani, care traversează extremitatea nordică a Piemontului Oltețului dintre Lunca-văț și Olteț pentru a deschide bazinul carbonifer de pe Olteț, spre valea Oltului.

În prezent este în construcție linia ferată Vilcele (Curtea de Argeș) — Rîmnicu Vilcea, care, făcînd legătura directă între Rîmnicu Vilcea și Pitești, va descongestia linia ferată de pe valea Oltului dintre Piatra Olt și Rîmnicu Vilcea, ca și secțiunea Pitești — Piatra Olt de pe magistrala București — Craiova.

Piemontul Getic are, din ceea ce s-a văzut, o rețea relativ redusă de căi ferate, în schimb rețeaua de drumuri este mult mai deasă. Toate văile principale sînt însoțite de șosele modernizate, dar s-au realizat și legături transversale, pe direcția generală est — vest. Se observă existența unor puncte de conver-

gență a căilor rutiere mai bine puse în evidență în ultimele decenii prin construirea unor șosele noi, modernizate.

Pe Jiu, în marginea de sud a piemontului, rețeaua de comunicații are ca punct de convergență Craiova. Aici se întâlnesc drumurile care vin din partea nordică a Olteniei, din piemontul de la vest de Jiu, unele drumuri din Piemontul Oltețului, ca și multe drumuri care vin din cîmpia de la sud. Către valea Oltului se îndreaptă o parte a drumurilor din Piemontul Oltețului și Piemontul Cotmenei, dar în mai mică măsură orașul Drăgășani se conturează ca punct de concentrare a căilor de comunicație. În schimb, la est de Olt, pe valea Argeșului, la contactul piemontului cu cîmpia, se află municipiul Pitești, spre care se îndreaptă majoritatea drumurilor care brăzdează piemontul dintre Olt și Dimbovița. Cele mai multe drumuri din Piemontul Cotmenei, din Gruiurile Argeșului și o parte a celor din Piemontul Cîndești ajung direct, sau prin intermediul altora, în Pitești sub influența căruia se desfășoară aproape întreaga activitate umană din teritoriile limitrofe.

O importanță deosebită pentru circulație și legăturile de producție ale Piemontului Getic cu alte regiuni ale țării o au cele trei drumuri modernizate care traversează de la est la vest, prin sud, centru și nord o parte a Piemontului Getic și intersectează toate drumurile care coboară din Subcarpați spre cîmpie. Cele trei drumuri, care pornesc din Pitești, traversează Oltul prin cele mai importante centre din lungul lui (Slatina, Drăgășani, Rîmniciu Vîlcea) și ajung în valea Jiului, unde fac legătura cu vechiul drum de importanță națională, care vine din Depresiunea Petroșani și străbate toată Oltenia pînă la Dunăre.

Drumul Pitești—Slatina—Craiova, al cărui traseu urmărește contactul dintre cîmpie și piemont, mergînd aproape paralel cu magistrala feroviară, este cel mai circulat drum din această parte a țării.

Drumul care traversează partea centrală a Podișului Getic între Argeș și Jiu pornește din Pitești, ajunge în valea Oltului la Drăgășani, de unde se îndreaptă spre nord-nord-vest pentru a traversa Oltețul prin regiunea petroliferă de la Zătreni, Amaradia la Hurezani, Gilortul la Tîrgu Cărbunestii și face legătura la Scoarța, cu cel care vine de la Rîmniciu Vîlcea la Tîrgu Jiu în lungul Subcarpaților Olteniei. Acest drum, care repre-

zintă principală axă de legătură a tuturor așezărilor din partea centrală a Piemontului dintre Argeș și Jiu cu centrele umane din împrejurimi, are o deosebită importanță pentru mișcarea populației din acest teritoriu în diferite direcții și exploatarea unor resurse ale solului și subsolului intens valorificate în ultimul timp (petrolul de la Vedea, Cîngrea, Zătreni, Bustuchin; cărbunii de la Albeni etc.).

Părțile de nord ale Piemontului Cotmenei și Piemontului Motrului sînt străbătute de drumul național Pitești—Rîmniciu Vîlcea—Tîrgu Jiu—Motru—Drobeta-Turnu Severin, al cărui traseu se desfășoară mai mult în Subcarpații Olteniei. Acest drum istoric are o deosebită importanță turistică și economică, crescută considerabil în conjunctura actuală a legării unor arii de exploatare a lignitului cu unitățile energetice consumatoare.

5.10. Potențialul turistic

Valorile turistice ale Piemontului Getic sînt reprezentate îndeosebi de vestigii ale trecutului, monumente istorice, muzee, opere de artă, monumente de arhitectură, unități economice etc. și mai puțin de elemente ale cadrului natural, dar nici acestea nu lipsesc întru totul.

Relieful, variat și acoperit pe mari suprafețe cu păduri, ape care traversează piemontul (Motrul, Jiul, Amaradia, Oltețul, Oltul, Argeșul etc.), unele izvoare de ape minerale care au fost exploatate și în interes turistic, multe locuri fiind amenajate pentru recreere și odihnă, iar unele ca stațiuni balneoclimaterice. În centrele urbane, în unele localități rurale situate în zone de interes turistic și în cele mai pitorești locuri ale Piemontului Getic s-au construit unități de cazare (hoteli, moteluri, hanuri, campinguri etc.) și au fost amenajate popasuri turistice. Așa sînt unitățile turistice de pe Olteț de la Bălcești (județul Vîlcea), de pe Motru, de la Strehaia și Gura Motrului (județul Mehedinți), de pe Jiu de la Almăj (județul Dolj) și din zăvoia din vestul Craiovei; de asemenea, cele construite în pădurea de stejari de lângă Scornicești (județul Olt) pe șoseaua Pitești—Slatina și în pădurea Sarului aproape de orașul Balș, apoi la Drăganu (județul Argeș), la ieșirea din comuna cu același nume,

pe șoseaua spre Rîmnicu Vilcea, la Bașcov (comuna Sopot, județul Dolj), la Izvoarele (comuna Ploșoru, județul Gorj), pe șoseaua Fîlîași—Tîrgu Jiu etc.

În partea vestică a Piemontului Getic, în culoarul Malovăț—Bala, unde au fost descoperite izvoare cu ape minerale, a fost înființată stațiunea balneoclimaterică Bala, care are însă mai mult o importanță locală, complexul balnear Bala dispunînd de instalații pentru băi și spații de cazare în vile care totalizează peste 200 de locuri.

Natura Piemontului Getic nu este exploatată turistic, pînă în prezent, la adevărata ei valoare. În multe locuri din lungul apelor și din apropierea centrelor umane se pot amenaja zone de agrement cu terenuri sportive, plaje, iazuri, lacuri pentru practicarea sporturilor nautice etc. Obiectivele umane și locurile de interes turistic sînt numeroase, dar multe din ele încă puțin cunoscute sau vizitate, datorită și faptului că în unele părți ale piemontului accesul este mai greu, circulația făcîndu-se mai mult în lungul văilor orientate, în general, de la nord la sud. În lungul acestora s-au dezvoltat și cele mai importante centre umane din Piemontul Getic, care suscită și un anumit interes turistic, datorită poziției lor în teritoriu, obiectivelor de care dispun și posibilităților pe care le oferă pentru cazare și aprovizionare, fiecare fiind dotate cu unități hoteliere și de alimentație publică: Drobeta-Turnu Severin pe Dunăre, Fîlîași pe Jiu, Motru și Strehaia pe Motru, Drăgășani pe Olt etc. În aceste orașe baza de cazare totalizează peste 900 de locuri, din care mai mult de 600 în Drobeta-Turnu Severin, unde s-au construit două hoteluri moderne cu restaurante și baruri. Municipiul Drobeta-Turnu Severin este de fapt și cel mai important centru turistic și de agrement din Piemontul Getic prin obiectivele de importanță istorică pe care le prezintă: urmele castrului roman Drobeta, ruinele podului lui Traian, muzeul „Porțile de Fier”, Cetatea Severinului, Palatul Culturii, monumentul eroilor căzuți în timpul războiului din 1916—1918 etc.

Și în alte locuri din piemont se păstrează urme care dovedesc existența milenară a poporului român, precum și monumente istorice din diferite etape ale dezvoltării vieții social-culturale a țării, care reprezintă și importante obiective turistice. Astfel sînt: în culoarul Oltului, ruinele castrului roman Rusidava de la Drăgășani și Pons Aluti de

la Ionești (județul Vilcea); în culoarul Jiu lui, urmele cetății romane Pelendava de lângă Craiova și mănăstirea Coșuna (sec. XVI) de la Bucovăț; în Piemontul Oltețului, mănăstirea Manul (sec. XVII) de la Lungești (județul Vilcea) și mănăstirea Căluș (sec. XVI) din localitatea cu același nume (com. Oboga, județul Olt); în Piemontul Motrului, mănăstirile Gura Motrului (sec. XVI) și Strehaia; în Piemontul Cotmenei, mănăstirea Cotmeana din aceeași localitate (județul Argeș); în Gruiurile Argeșului, mănăstirea Tutana (sec. XVI) de la Băiculești (județul Argeș); în Piemontul Cîndești, mănăstirea Butoiul (sec. XIV) de la Hulubești (județul Dimbovița) și mănăstirea Cobia (sec. XVI) din aceeași localitate (județul Dimbovița) etc.

În localitățile de origine a unor personalități marcante din viața istorică și culturală a poporului român sînt organizate muzee și case memoriale: Muzeul Tudor Vladimirescu din Vladimir (județul Gorj); Muzeul memorial N. Bălcescu, în localitatea cu același nume (județul Vilcea), Muzeul Alexandru Macedonski din satul Pometești (com. Goiești, județul Dolj) etc. La Golești (com. Ștefănești, județul Argeș) se află Muzeul Goleștilor și Muzeul viticulturii și pomiculturii din România. Toate aceste obiective turistice, la care se adaugă și altele care oglindesc arhitectura construcțiilor rurale, obiceiurile și datinile populației (nedei, tîrguri), specificul etnografic etc., atrag, în ultimul timp, un număr tot mai mare de vizitatori din diferite părți ale țării.

Un mare centru de atracție turistică și pentru populația din Piemontul Getic este municipiul Craiova, situat pe Jiu, la contactul piemontului cu cîmpia, datorită importanțelor obiective turistice pe care le prezintă (Muzeul Olteniei, Muzeul de artă, Casa Bănei, Palatul Administrativ, Parcul Romanescu, Grădina botanică etc.).

5.11. Unitățile regionale

5.11.1. Piemontul Motrului

Piemontul Motrului se întinde din marginea estică a Podișului Mehedinți (de care este despărțit prin culoarul depresionar Drobeta-Turnu Severin—Bala—Comănești), asemenea unui triunghi limitat de văile Tismaniei și Jiului în nord și est și de văile Huș-

nitei și Motrului (care îl despart de Piemontul Bălăciței) în sud.

Datorită reliefului său deluros este cunoscut și sub numele de Dealurile Motrului, Gruurile Motrului sau Piemontul deluros al Motrului și ocupă o suprafață de 1 837 km² (14,2% din suprafața Piemontului Getic).

Relieful, fragmentat de afluenții Motrului și Jiului (Coșuștea, Coșușița, Hușnița, Jițul Mare, Jițul Mic etc.) se prezintă sub forma unor largi interfluvii cu direcție nord-vest—sud-est, conforme cu înclinarea generală a stradelor și orientarea generală a văilor convergente către aria de adunare a apelor de la Filiași. Morfologia primară a regiunii a fost ulterior schimbată de acțiunea râurilor cu caracter temporar: Peștenuța, Crainici, Husnicioara, Cotoroia, Tehomir, Valea Racilor etc., care au fragmentat interfluviile.

Văile prezintă un aspect de evoluție înaintată datorită lărgimii și acumulărilor laterale, iar în sectoarele de confluență (confluențele Coșuștei și Hușniței cu Motrul, Motrului și Jițului cu Jiul) se extind mult, formând adevărate cimpuri pe care așezările omenești și-au extins vetrele, iar culturile agricole au găsit condiții favorabile.

Valea Motrului străbate piemontul pe direcția nord-vest—sud-est și îl împarte în două părți distincte: *Dealurile Coșuștei* (Gruurile Coșuștei sau Piemontul Strehaiei) la vest de Motru, cu înălțimi mai joase (de 200—300 m) și *Dealurile Jițului*, la est, mai înalte (peste 300 m), cu aspect de dealuri prelungi fragmentate de o rețea de văi aproape paralele, orientate în conformitate cu înclinarea generală a piemontului. Dealurile Coșuștei apar ca un ansamblu de culmi prelungi despărțite de văi largi, în general un relief mai evoluat, relativ mai domol, care poartă urmele unei denudări mai puțin violente decât la est de Jiu (A. Schiopoiu, 1982). Văile sînt puțin adînci, iar culmile mai maturizate. Deși relieful dă impresia unei maturități avansate față de stadiul de evoluție al regiunii, procesele de versant sînt totuși active, cu maximă intensitate pe cei cu povișuri accentuate și defrișate. Procesele de pantă au fost înlesnite de natura rocilor, toate foarte favorabile denudării, retragerii rapide a denivelărilor spre axul interfluviilor, ceea ce a contribuit la lărgirea văilor și extinderea luncilor.

În părțile de vest și nord-vest ale Piemontului Motrului, la contactul cu Podișul Mehedinți se individualizează *ulucul depresionar Drobeta-Turnu Severin—Bala—Comănești*, cu caractere fizico- și economico-geografice diferite de ansamblul Piemontului Motrului. Acesta este format dintr-un lanț de șapte mici depresiuni de eroziune, de contact, axate pe râurile care ies din Podișul Mehedinți: Crainici, Rudina, Șovarna, Coșuștea, Coșușița, Topolnița etc. (L. Badea, Mihaela Dinu, 1974).

Lărgirile care compun acest uluc au numirile date după cele mai mari localități din lungul culoarului, dezvoltate în părțile mai largi și cu aspect de cimpuri întinse: Drobeta-Turnu Severin, Malovăț, Crăgăști, Illovăț, Șovarna, Bala, Bratîvoești. După altitudinea și aspectul general al reliefului șirul acestor mici depresiuni pare a reprezenta o continuare spre sud-vest a Subcarpaților Gorjului, dar fără a avea trăsături structurale și de evoluție asemănătoare. Modul de fragmentare, sculptarea în formațiuni cuaternare și pliocene monocline și alte caractere morfologice care impun legături de comunicație foarte dificile în lungul culoarului, pe direcția nord-est—sud-vest, dovedesc că aceste depresiuni nu reprezintă o continuare a Subcarpaților Gorjului. Circulația leșnicioasă s-a făcut numai în lungul văilor (Iupca, Șovarna, Coșuștea etc.) care taie pieziș acest culoar. Longitudinal a fost înlesnită numai parțial prin șei, dar și acestea greu accesibile, pe drumuri secundare create prin locuri aproape impracticabile. Dar fiecare mică depresiune prezintă suprafețe slab fragmentate, au ape de importanță locală și culmi cu altitudini de pînă la 100 m. Adăpostul natural, prezența apei și fertilitatea solului au constituit factori favorabili pentru o veche locuire și pentru dezvoltarea unei economii agricole mixte, reprezentată în egală măsură prin culturi de cîmp, pomicultură și creșterea animalelor.

Partea cea mai dezvoltată a culoarului de contact — Depresiunea Drobeta-Turnu Severin — are un rol cu totul aparte nu numai pentru regiunea piemontană de la vest de Jiu și Podișul Mehedinți, ci și pentru o arie mult mai întinsă pentru că reprezintă o adevărată verigă de legătură între culoarele de circulație din partea de nord-vest a Olteniei și valea Dunării. Iar importanța este cu atît mai mare dacă se are în vedere că prin intermediul ei se face trecerea de la

sectorul Defileului Porțile de Fier la sectorul de terase din avale (*Geografia văii Dunării românești*, 1969, p. 373—375) și facilitează legăturile și cu regiunile din dreapta Dunării. Succesiunea teraselor create de Dunăre și de Topolnița (între care mai dezvoltate sînt cele de 45—50 și 10—13 m) a oferit cadrul favorabil apariției și dezvoltării unui centru populat — Drobeta-Turnu Severin — destinat asigurării legăturilor și schimburilor economice. Faptul că împrejurările istorice au întrerupt pentru o perioadă lungă funcția urbană a acestuia nu infirmă realitatea geografică a poziției pe Dunăre la întîlnirea drumurilor care străbat regiuni foarte variate ca potențial economic. Importanța sa este legată puternic de Dunăre, de unitățile geografice între care se află, dar și de depresiunea care i-a permis extinderea și i-a favorizat dezvoltarea funcțiilor complexe cu o pondere economică prin care se evidențiază ca centrul principal de coordonare în regiune. Premisele geografice ale apariției și dezvoltării portuare, comerciale și industriale ca centru puternic sînt foarte clar puse în evidență de amploarea și structura activităților actuale, ca și de diferențierea zonelor funcționale din cadrul vetrei.

Solurile predominante din Piemontul Motrului sînt cele brun-roșcate de pădure, tipice, brun-roșcate-luvice, luvisoluri albice, trădînd într-un fel existența de odinioară a întinselor masive păduroase. În prezent, solurile brun-roșcate luvice sînt folosite cu precădere pentru culturi de grîu, porumb, floarea-soarelui și pentru cultura pomilor fructiferi (renumite fiind bazinele pomicole Prunișor, Corcova, Florești) și a viței de vie (podgoriile Corcova și Halंगा). Celelalte soluri — brune, luvisoluri albice, ca și cele aluviale din luncile largi ale rîurilor (Hușnița, Coșuștea, Motru, Jilt) — sînt mai fertile și dau recolte bune de grîu, porumb și legume. Modul de folosință a terenurilor evidențiază predominarea suprafețelor agricole (60%), care în proporție de aproape 50% sînt reprezentate prin terenuri arabile cu culturi de cereale (90%, din care porumbul ocupă 50%). Terenurile agricole s-au extins pe seama reducerii treptate a fondului forestier. Acesta reprezintă circa 25% și ocupă astăzi doar culmile dealurilor și versanții abrupti. Versanții dealurilor sînt acoperiți cu fînețe naturale în intercalație cu diferite culturi agricole (porumb, plante furajere, vii și livezi) (fig. 130).

Cele mai extinse terenuri arabile se întîlnesc în Dealurile Jilțului, pe teritoriul comunelor Butoiești, Grozești, Văgiulești, Samarinești, Negomir, Mătăsari, Drăgotești și pe teritoriul localităților Strehaia, Corcova, Șișești, Prunișor din Dealurile Coșuștei sau la Bala, Izvoru Bîrzii, Malovăț din ulucul depresionar de contact. Suprafețelor arabile li se alătură terenurile cu pomi fructiferi de pe raza localităților Șișești, Strehaia, Timna, Prunișor, Drăgotești, Grozești, cu viță de vie din Corcova, Strehaia, Menți, Văgiulești, Borăscu etc. Cele mai mari furnizoare de fructe (prune și mere) sînt comunele Florești, Timna, Broșteni, Slivilești, iar de struguri Corcova, Strehaia, Borăscu, recunoscute pentru viile altoite și indigene producătoare a soiurilor de vin Risling, Cabernet și Fetească, medaliat la diferite concursuri internaționale.

Fragmentarea reliefului relativ accentuată și îndeosebi stilul fragmentării, cu predominarea culmilor prelungi despărțite de văi paralele relativ largi, au condiționat nu numai distribuirea populației într-un număr mare de așezări mici, dar și predominarea așezărilor cu vetrele înșirate în lungul văilor. Celelalte așezări, situate în largiri locale, pe versanții domoli, în bazine de obîrșie sau șei sînt, în majoritate, răsfirate, manifestînd chiar o tendință de risipie.

În general există o deosebire evidentă între așezările din Dealurile Jilțului și Dealurile Coșuștei, cele din culoarul depresionar Drobeta-Turnu Severin—Bala—Comănești și cele din valea Motrului. În Dealurile Jilțului și în Dealurile Coșuștei, tipul de așezare dominant este cel cu aspect de stradă, înșirate pe mai mulți kilometri pe o parte sau alta a văilor. Aceste așezări alungite sînt legate, în multe cazuri, unele de altele; așa sînt cele de pe văile Motrului, Coșuștei, Jilțului sau micilor lor afluenți, dezvoltate precumpănitor pe terasele acestor rîuri: Olteanu, Samarinești, Văgiulești, Zegujani, Peșteana, Broșteni, Cordun, Imoasa, Măru Roșu, Croica, Mătăsari, Bolboși, Drăgotești, Corobăi, Trestioara, Șișești, Căzănești, Ciovrinașani, Severinești, Corcova etc.

Pe valea Hușniței, cu un regim hidrologic instabil și cu un curs puternic meandrat (parțial regularizat), centrele umane s-au dezvoltat îndeosebi pe terasele și versanții dealurilor cu înclinare redusă. Sînt cunoscute aici așezările: Hușnicioara, Pru-

șor, Fața Cremenii, Valea Ursului, Tîmna, Ciochiuța, Strehaia etc.

Valea Coșuștei, care are o orientare nord-vest—sud-est și împarte Dealurile Coșuștei în două, prezintă un profil transversal asi-

Așezările din culoarul depresionar de contact sînt, în general, închegate și bine reprezentate în teritoriu. Unele sînt situate pe conurile de dejecție ale principalelor cursuri de apă sau în luncile, deseori inundabile, ale




Fig. 130. Piemontul Motrului. Utilizarea terenurilor. 1, Păduri; 2, vii; 3, livezi; 4, arabii; 5, vetre de așezări; 6, exploatarea de lignit; 7, căi ferate; 8, drumuri principale.

metric prin dezvoltarea teraselor mai ales pe versantul drept.

Terasele au oferit locuri foarte bune pentru extinderea vetrelor de sate care în general au structură răsfrată cu tendință de adunare: Căzănești, Severinești, Valea Alunului, Gîrbovățu de Sus, Gîrbovățu de Jos, Pîrvulești etc.

Valea Motrului are o luncă bine dezvoltată (2—2,5 km lățime), care se accentuează mai mult la confluența cu Hușnița (pînă la 3,5—4 km) și este însoțită de terase, mai ales pe stînga, ceea ce dă văii un caracter general asimetric (Al. Șchipoiu, 1982). Mai mult decît celelalte văi importante, concentrează mai multe așezări și mai mari, pentru că a funcționat ca un culoar de legătură și a oferit locuri bune de cultură și de așezare.

acestora (Rudina, Iupea, Cîmpu Mare, Halînga, Cernetești etc.), iar altele pe fețele sudice ale dealurilor ce domină bazinele depresionare: Izvoru Bîrzii, Malovăț, Șovarna de Sus etc.).

Cea mai mare parte a așezărilor din Piemontul Motrului prin localizare, structură și grad de dezvoltare economică prezintă condiții favorabile pentru modernizare continuă, pentru o dotare și o organizare spațială corespunzătoare. Multe au o structură răsfrată cu tendință de adunare de-a lungul principalelor ape sau în zonele de confluență a lor. Cele alungite, ca și cele răsfrate pe versanți, ridică probleme dificile în privința dotărilor edilitare, instalațiilor electrice etc., din cauza desfășurării gospodăriilor pe spații mari. O mare parte au profil cerealier (Jirov, Cernaia, Butoiești, Stîngăceaua), altele

dominant pomiviticol (Balota, Timna, Corcova, Menți) și chiar minier, în bazinele de exploatare a cărbunelui, și de creștere a animalelor (Lurda, Cătunele, Roșița, Ploștina, Lupoia, Mătășari, Drăgotești, Negomir, Zegujani).

După numărul locuitorilor, satele Piemontului Motru prezintă o evidentă proporționalitate între grupele de mărime. Astfel, așezările rurale cu o populație cuprinsă între 250 și 500 de locuitori reprezintă 33%, cele între 500 și 1 500 de locuitori de asemenea dețin 33% din total, iar cele cu sub 250 de locuitori 34%. Doar o singură așezare rurală depășește 1 500 de locuitori (Halinga 1 587 de locuitori) (fig. 131).

Densitatea și mărimea așezărilor arată că, în ansamblu, Piemontul Motrului este relativ bine populat. Aici sint localizate circa 200 de așezări, rezultând o densitate medie de 9 așezări la 100 km², valoare care depășește media țării (de 5,5 așezări la 100 km²). Acest aspect corelat cu densitatea populației care este de 68 loc./km² (sub densitatea medie a țării), arată că în Piemontul Motrului sint așezări numeroase, dar mici, cauza principală fiind fragmentarea reliefului.

Densitatea relativ crescută a localităților în teritoriu a oferit și oferă și în continuare dezvoltarea unor centre polarizatoare (Corcova, Timna, Prunișor, Mătășari) și o evoluție ascendentă a rețelei de așezări.

De-a lungul timpului, potențialul natural și cel economic, favorabile, au constituit factorii hotărâtori în concentrarea populației, asigurând creșterea permanentă a încărcăturii umane. Intensitatea evoluției numerice a cunoscut însă diferențieri de la o etapă social-economică de dezvoltare la alta, în funcție de schimbările intervenite în mișcarea naturală și cea migratorie a populației.

Populația Piemontului Motru, în general, crește după anul 1912, într-un ritm diferit și lent, înregistrările efectuate la recensăminte arată o creștere de numai 3‰ locuitori pe an. În anul 1912, trăiau în Piemontul Motrului aproape 105 000 de locuitori, în 1966 numărul lor ajunge doar la 108 000, iar în anul 1977 la 115 000 de locuitori. Din cele trei subunități geografice ale Piemontului Motrului, numai Dealurile Jilțului au cunoscut în perioada 1912—1977 o creștere a populației, celelalte două înregistrând ușoare scăderi. Această creștere a fost de circa 13 000 de locuitori (de la

43 000 la 56 000 de locuitori). Aici densitatea populației (77 loc./km²) este peste media întregului piemont al Motrului (68 loc./km²). Cele mai mari densități se înregistrează pe teritoriul administrativ al orașului Motru (391 loc./km²), centru industrial-agrar și în comunele: Glogova, Cătunele (79 loc./km²), Negomir (71 loc./km²), Borăscu, Bolboși (70 loc./km²), Mătășari, Drăgotești (68 loc./km²). În Dealurile Jilțului cele mai mici valori ale densității populației nu coboară sub 40 loc./km².

În același interval (1912—1977), în Dealurile Coșuștei, populația a scăzut cu circa 130 de locuitori (de la 41 277 de locuitori la 41 149 de locuitori). O parte din așezările situate în Dealurile Coșuștei (Șișești, Ciovrnășani, Lupșa etc.) au cunoscut scăderi ale populației datorate în principal dezvoltării industriei miniere în bazinul carbonifer al Motrului, care a atras locuitori din întreaga zonă. Densitatea populației (64 loc./km²) este sub valoarea densității piemontului (68 loc./km²). Cea mai mare densitate a populației se întâlnește pe teritoriul orașului Strehăia (150 loc./km²) și în comunele: Corcova (96 loc./km²), Broșteni (72 loc./km²), iar cea mai mică în comunele: Husnicioara (38 loc./km²), Prunișor (39 loc./km²) etc.

Scăderi accentuate ale populației s-au înregistrat în ulucul depresionar de contact dintre Podișul Mehedinți și Piemontul Motrului (de la 20 500 de locuitori în 1912 la 18 200 de locuitori în 1977). Acesta are cea mai mică densitate a populației (55 loc./km²) în raport cu celelalte subunități ale Piemontului Motru. Populația comunelor din acest uluc depresionar înregistrează importante scăderi în secolul XX: Ilovăț de la 3 790 de locuitori în 1912 la 2 644 în 1966 și 1 737 de locuitori în 1992, Șovarna de la 2 523 de locuitori în 1912 la 2 107 de locuitori în 1966 și 1 553 de locuitori în 1992 etc. Cele mai mari scăderi ale numărului de locuitori se înregistrează îndeosebi la așezările din partea sudică a piemontului Motru, care se găsesc sub influența orașelor Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Strehăia și Filiași. Descreșterea numărului populației în sate ca: Jugastru, Poșta Veche, Stingăceaua, Butoiești, Arghinești, Calopăru, Șușița etc., sate cu vechi tradiții agricole, se datorește mai ales plecării unui număr de locuitori spre

orașul Craiova, cel mai puternic centru economic din Oltenia. Satele situate în bazinul hidrografic al Hușniței (Cremenea, Lumnicea, Lacu, Fața Cremenii, Vlădărești, Valea Bună, Peri, Cervența, Prunaru, Alunișu etc.) cunosc, de asemenea, o scădere a populației, scădere generată îndeosebi de forța de polarizare a municipiului Drobeta-Turnu Severin și mai puțin a orașului Strehaia. Aceeași tendință de scădere s-a manifestat și la așezările din apropierea perimetrelor carbonifere ale cursului mijlociu al Jiului (Borăscu, Ohaba-Jiu, Valea Racilor, Corobăi, Timișeni, Brădețel, Miculești etc.).

În Piemontul Motrului, în afara centrelor urbane Motru și Strehaia care prezintă creșteri sensibile ale populației în intervalul 1966—1977, atât pe seama sporului natural, cât mai ales a celui migrator (fenomen care se manifestă îndeosebi la orașul Motru), se cunosc și așezări rurale, cum sînt: Cătunele, Drăgotești, Glogova, Negomir (din Dealurile Jilțului), Broșteni, Corcova, Florești (din Dealurile Coșuștei), care înregistrează sporuri mai ridicate ale populației în același interval de timp. Populația acestor așezări, care sînt localizate în cel mai important areal carbonifer al Olteniei (Motru—Jilț—Rovinari) și în regiunile de interferență periurbană Motru—Strehaia—Tîrgu Jiu a crescut în medie cu 200—500 de locuitori. Locuitorii așezărilor care lucrează în centrele de exploatare a cărbunelui sau în unitățile economice din orașe, unde își desfac și o parte a produselor agricole, și-au menținut reședința în satele de origine, de unde fac naveta zilnică. Asemenea evoluții ascendente ale numărului de locuitori se remarcă și la satele: Slivilești, Cojmănești, Tehomir (din bazinul carbonifer Rovinari), Ploștina, Lupoia, Horăști etc. (din bazinul carbonifer Motru).

În general, Piemontul Motrului se caracterizează din punct de vedere geodemografic, începînd cu prima jumătate a secolului XX, prin intensificarea mobilității teritoriale intra- și extraregionale, mai ales a grupelor tinere de populație și cu precădere masculine, conferindu-i în ultimele decenii caracterul de regiune geografică afectată treptat de exodinamismul rural-agricol.

Ca și în alte regiuni din țară, are loc o accentuare a mobilității populației în vîrstă de muncă în cuprinsul Piemontului Motrului (de la sate spre centrele miniere ale bazinelor carbonifere: Motru, Rovinari etc.), cât și în afara lui îndeosebi spre Craiova și Drobeta-

Turnu Severin. Ca o consecință a acestor plecări de populație mai ales din comunele situate în părțile rîdică și centrală ale Piemontului Motrului (Grozești, Stîngăceaua, Butoiești, Voloiaș, Șişești etc.), populația lor, în continuă scădere, a ajuns în decurs de numai cîteva decenii (1950—1985) să înregistreze un evident proces de îmbătrînire și feminizare.

În Piemontul Motrului industria minieră constituie principala ramură a economiei. Lucrările de exploatare a lignitului au început în anul 1960, cînd s-au deschis minele Horăști, Leurda și Ploștina. În continuare au intrat în producție minele de la Roșița și exploatarea la zi din bazinul Rovinari. Producția de cărbune a zonei carbonifere Motru—Jiu se ierarhizează pe bazine, astfel: Motru — peste 50%, Rovinari — circa 40%, Jilț — sub 10%. Destinația producției este exclusiv energetică, consumul populației deținînd doar 5%; restul revine celor trei mari termocentrale din Oltenia — Turceni, Rogojel și Ișalnița (Gh. Iacob, I. Ianoș, 1980).

În Dealurile Jilțului sînt localizate unele din cele mai importante resurse de lignit ale Olteniei, în perimetrul minier Jilț, Mătășari, Drăgotești, Tehomir și Cojmănești, concurat ca bazin minier după anul 1977, predominînd exploatarea în subteran (fig. 130).

Exploatarea de cărbune au generat creșterea unei dense rețele de căi ferate și șosele modernizate, rețele care asigură legături lesnicioase atât în cadrul zonei miniere, cât și între aceasta și regiunile limitrofe. Bazinul carbonifer Motru a fost legat prin calea ferată Strehaia—Motru (31 km) de magistrala feroviară București — Timișoara, bazinul carbonifer Rovinari de orașul Tîrgu Jiu, cu prelungire, apoi, spre Turceni și de aici spre Filiași. Dezvoltarea bazinului carbonifer al Jilțului și necesitățile de cărbune pentru termocentrala Turceni au dus la construirea căii ferate Turceni — Drăgotești (28 km). Rețeaua rutieră s-a modernizat între localitățile Strehaia—Motru, Turceni — Tîrgu Jiu, Turceni—Drăgotești—Ciuperceni, Slivilești—Miculești—Motru etc.

În Dealurile Coșuștei s-a dat în exploatare bazinul carbonifer de lignit care se extinde din valea Coșuștei (în nord-est) pînă în apropierea Dealului Balota (în vest) și văii Hușniței (în sud), cuprinzînd perimetrul Hușnicioara — Prunișor — Fîntîna

Domnească—Zegujani. În industria minieră lucrează populație din localitățile de exploatare a cărbunului sau venită din alte așezări ale Piemontului Motrului, Podișului Mehedinți, Subcarpaților Gorjului și chiar din Cîmpia Olteniei. În exploatarea miniere

luționarul de la 1821, care a străbătut aceste ținuturi. Mănăstirea-cetate Strehaia, ctitorie din 1645 a lui Matei Basarab, stă mărturie a evenimentelor istorice de pe aceste meleaguri și reprezintă astăzi unul din principalele obiective turistice ale Olteniei, alături




Fig. 131. Piemontul Motrului. Mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Dealuri piemontane; 2, culoare depresionare, parțial cu lunci și terase; 3, așezări agricole; 4, agroindustriale; 5, balneoclimaterice; 6, industrial-agrare; 7, industriale; 8, complexe.

din bazinul carbonifer al Motrului lucrează îndeosebi locuitori din comunele Căzănești, Corcova, Bala, Șovarna, Glogova, Cătune etc., în cele din bazinul Jilțului locuitori ai comunelor Slivilești, Borăscu, Bolboși, Văgiulești, Samarinești, iar în cele din bazinul Hușniței locuitori ai comunelor Timna, Voloia, Livezile, Poroina, Prunișor, Breznița, Greci etc.

Orașul Strehaia, cunoscut în trecut ca Țirg, așezat în zona de confluență a Hușniței cu Motru, s-a evidențiat prin rolul jucat în istoria țării. Are peste 500 de ani de existență documentară și mai mult de jumătate de secol de prezență urbană. De viața orașului Strehaia se leagă numele domnitorului Mihai Viteazu, care în timpul cînt a fost bănișor de Mehedinți a avut reședința în

acest loc și a lui Tudor Vladimirescu, revode mănăstirea de la Gura Motrului din apropiere. Orașul, cu o economie puțin dezvoltată, avea 12 307 de locuitori în anul 1992. În trecut avea funcție predominant agricolă și juca un rol important ca Țirg de vite și piață de desfacere a cerealelor din cîmpia de sud-vest a Olteniei. În prezent în oraș funcționează Întreprinderea de armături industriale din oțel, întreprinderea de prelucrare a tulpinilor de in și o întreprindere de confecții. Orașul îndeplinește astăzi și funcția de nod de comunicație rutier și feroviar, prin acest loc făcîndu-se legătura spre depresiunea Drobeta-Turnu Severin în vest, bazinul carbonifer Motru în nord și cîmpia Olteniei în est-sud-est.

Orașul **Motru** face parte din generația orașelor noi, avînd 26 491 de locuitori (în 1992). Apare ca centru urban în anul 1967, ca urmare a dezvoltării industriei carbonifere în această parte a Olteniei.

Orașul, cu funcții de rezidență a forței de muncă, industrială și de servicii, a fost construit în lunca Motrului, pe axele de legătură Drobeta-Turnu Severin—Tîrgu Jiu și Baia de Aramă—Strehaia. La început s-a dezvoltat ca loc de rezidență al minerilor din bazinul carbonifer cu același nume, care s-a impus ca cel mai important oraș minier al Olteniei. Cu timpul s-au construit în el întreprinderi ale industriei textile, alimentare și meșteșugărești, cu scopul folosirii forței de muncă locale feminine. Aceste unități industriale, ca și cele de întreținere a utilajului minier, alături de edificiile edilitar-gospodărești, social-culturale, administrative și de locuit au făcut ca acest oraș să devină un important centru urban al țării, cu largi perspective de dezvoltare în viitor.

Municipiul **Drobeta-Turnu Severin**, centrul administrativ-politic al județului Mehedinți, este situat pe terasele dispuse în amfiteatru create de Dunăre și de Topolnița, la întâlnirea drumurilor care urmăresc Dunărea cu cele care vin din nord prin Culoarul Timiș—Cerna, din Podișul Mehedinți și de presiunea subcarpatică, apoi cu cele care vin dinspre valea Jiului prin Piemontul Motrului. Importanța sa este legată puternic de Dunăre, de unitățile geografice între care se află, dar și de presiunea care i-a permis extinderea și i-a favorizat amplificarea funcțiilor complexe, cu un potențial economic prin care se evidențiază ca centru principal de coordonare în regiune.

În perioada veche, centrul urban Drobeta, peste care s-a dezvoltat mai târziu orașul de astăzi, a fost fereastra ținutului dac la Dunăre, port oficial al Daciei, nod de comunicație, puntea de legătură cu sudul, municipiu sub Hadrian și colonie în vremea lui Septimiu Sever. Incontestabile dovezi atestă vechimea orașului și valențele urbigene ale locului în care a apărut, s-a dezvoltat și a persistat. În perioada constituirii Banatului de Severin (sec. XI), localitatea devine cetate feudală, iar în secolele XII—XIII, o însemnată cetate pe linia Dunării, reședință a banilor (documentele menționează în secolul XIII cetatea medievală a Severinului). Cu toate că împrejurările istorice au făcut ca cetatea din evul mediu să-și mai piardă

din importanța funcțională (cînd localitatea Cernetei din apropiere a preluat pentru mai mult de trei secole funcția de capitală de județ), din anul 1841 devine capitala județului Mehedinți. În secolul XIX orașul s-a dezvoltat ca port, centru industrial și centru administrativ. În anul 1930 populația orașului număra 24 171 de locuitori. În 1956 a ajuns la 34 070, iar după 10 ani la 50 806 de locuitori. La recensămîntul din 1977 avea 76 955 de locuitori, iar în 1992 intrase în categoria orașelor mari ale țării, depășind 115 526 de locuitori¹.

Creșterea populației pînă în anul 1956 a fost lentă și era bazată aproape în totalitate pe sporul natural. După anul 1968 (cînd a fost declarat municipiu și reședință a actualului județ Mehedinți) dinamica populației se accentuează pe seama sporului migratoriu, urmare firească a dezvoltării industriale și social-culturale.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin este cel mai important centru industrial din Piemontul Motrului, aici concentrîndu-se numeroase întreprinderi industriale, din care o mare parte realizate în ultimele decenii: întreprinderi de construcții navale și prelucrări la cald, întreprinderea de vagoane, întreprinderea electrocentrale „Portile de Fier”, combinatul chimic, întreprinderea de anvelope auto, întreprinderea de prelucrare a lemnului, combinatul de celuloză și hirtie, întreprinderea de prefabricate din beton armat, întreprinderile de confecții, de industrializarea cărnii, a laptelui, de produse zaharoase, morărit și panificație, de spirit și bere, viei și vinului, ca și unități ale industriei locale.

Dezvoltarea industrială și-a găsit corespicient și în dezvoltarea sa edilitar-gospodărească și social-culturală. Au fost construite numeroase spații de locuit ce au dat un nou și modern contur unor cartiere de locuințe (Cartierul Crihală). Structura urbană reflectă direct originea, creșterea și evoluția funcțiilor îndeplinite de acest oraș.

Trama stradală, caracteristică orașelor concepute în urma Regulamentului Organic prin trasee regulate, rectangulare, a fost menținută, ca și obiectivele de mare semnificație istorică. Noile construcții industriale, social-culturale, edilitar-gospodărești au fost

¹ De la 16 mai 1972 municipiul Turnu Severin se numește Drobeta-Turnu Severin. Numele s-a dat cu prilejul aniversării a 1850 de ani de existență atestată documentar.

concepute pe baza unui plan de renovare urbană, astfel încît, în prezent, în vatra oraşului se disting mai multe zone funcţionale (fig. 132).

Partea centrală, în mare măsură reconstruită, concentrează unităţile principale

datorită prezenţei a numeroase şi valoroase vestigii istorice cu adînci rezonanţe în istoria poporului român (urmele castrului roman Drobeta, ruinele Podului lui Traian, muzeul „Porţile de Fier”, cetatea Severinului, Palatul Culturii, monumentul eroilor căzuţi în




Fig. 132. Municipiul Drobeta-Turnu Severin. Zonele funcţionale. 1, Zonă industrială; 2, zonă de transporturi (feroviare şi navale); 3, zonă rezidenţială; 4, zonă mixtă — administrativă, culturală şi comercială; 5, spaţiu verde; 6, străzi principale; 7, şosea; 8, cale ferată.

administrative şi social-culturale (Primăria, Institutul de proiectare, Centrul de calcul, poştă, Palatul Culturii, Parc-Hotel, Liceul Traian, Întreprinderea de gospodărire locativă etc.) şi marile magazine. În partea sud-vestică se conturează zona industrială veche, ce şi-a mărit arealul în ultimii ani prin apariţia a noi unităţi de producţie (întreprinderile de construcţii navale şi prelucrări la cald, de vagoane, de anvelope auto, de industrializare a cărnii, întreprinderea horticolă etc.). În estul şi nord-estul municipiului s-a dezvoltat o altă arie industrială reprezentată prin întreprinderile de industrializarea lemnului, de celuloză şi hirtie, chimice, de confecţii, alimentare etc. În partea sudică este localizată zona de transporturi navale, feroviare şi de depozite, care, ca urmare a construirii hidrocentralei de la Ostrovul Mare (Porţile de Fier II) a cunoscut modificări prin reorganizarea întregului mal al Dunării. În nordul oraşului se află cel mai mare cartier de locuinţe (Cribala), evidenţiat printr-o arhitectură nouă şi dotări comerciale, social-culturale şi de agrement.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin este cunoscut şi ca important centru turistic,

timpul războiului din 1916—1918 etc.), ca şi a frumoaselor parcuri şi edificii.

Poziţia la Dunăre, la întretăierea unor importante căi de comunicaţie din regiune, conferă oraşului şi calitatea de localitate de tranzit turistic spre numeroasele şi variatele obiective turistice din apropiere (Defileul Dunării, sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, ostrovul Şimian cu ruinele cetăţii Ada-Kaleh, relieful carstic din Podişul Mehedinţi — Podul natural de la Ponoare, peştera Topolniţa —, mănăstirea Vodiţa, cula lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi etc.).

5.11.2. Piemontul Bălăciţei

Piemontul Bălăciţei se întinde la vest de Jiu şi la sud de văile Motrului şi Huşniţei, cuprinzînd partea sud-vestică a Piemontului Getic, care trece spre Cimpia Olteniei pe aliniamentul localităţilor Vinju Mare, Oprisor, Plenita, Perişor, Radovanu şi Podari. Relieful tabular, mult mai puţin fragmentat decît în piemontul din nord, depăşind cu puţin 300 m şi reţeaua de văi largi, în mare parte a anului cu curs intermitent, eviden-

țiază Piemontul Bălăciței ca o unitate geografică care se aseamănă prin numeroase trăsături cu cimpia de la sud.

Ca urmare a unei ușoare înălțări în partea centrală și a înclinării de la nord spre sud, rețeaua hidrografică este orientată în două direcții principale. Văile care fragmentează partea de la est de valea Drincei au direcția de scurgere de la nord-vest spre sud-est, îndreptându-se fie către Jiu (Argetoaia, Rasnic, Meretel, Urdinița, Brabova etc.), fie către Dunăre, trecând în cîmpie (Desnățuiul și cîteva pîraie — Baboia, Teiu). Aceeași orientare sudică o au și văile din partea vestică a piemontului, dintre care Drincea și Blahnița sînt cele mai importante, ele colectînd aproape toate pîraiele din regiune.

Climatul, caracterizat prin veri călduroase, primăveri timpurii și toamne lungi, cu media anuală a precipitațiilor de 550—600 mm, este favorabil dezvoltării culturilor cerealiere, plantelor tehnice, culturilor legumicole, viței de vie și pomilor fructiferi (fig. 133).

Văile sînt largi și puțin adînci, cu albies intens colmatate și pe unele locuri înmlăștinite. Datorită pantei de scurgere reduse, adesea, în timpul perioadelor ploioase, se produc inundații. Din această cauză luncile sînt folosite mai mult ca terenuri pentru pășunat și mai puțin pentru culturi agricole. Pe unele văi (Drincea, Desnățui, Argetoaia, Rasnic, Brabova etc.) s-au întreprins amenajări (regularizarea albiei, terasări, asanări etc.), care au oferit noi posibilități de valorificare agricolă a terenurilor. În lungul unora dintre acestea, și îndeosebi în lungul Drincei și Desnățuiului, s-au extins culturile legumicole. Versanții văilor, bine însoriți, au fost plantați cu viță de vie și pomi fructiferi. Interfluviile sînt cultivate cu cereale și plante tehnice. În unele locuri și, îndeosebi, în partea nordică a piemontului, în lungul Motrului și Hușniței și în partea sud-vestică (la nord de Segarcea) se găsesc suprafețe întinse acoperite cu păduri de cer și girniță (fig. 133).

Condițiile naturale oferă posibilități largi pentru regularizarea întregii rețele de văi, construirea de canale, diguri și bazine de retenție, ceea ce va înlesni practicarea unei agriculturi intensive în lungul tuturor văilor și dezvoltării pisciculturii și aviculturii.

Terasările făcute pe versanții însoriți ai văilor Drincei, Desnățuiului, Brabovei, Gogoșului etc. au permis extinderea suprafețe-

lor cultivate cu viță de vie și conturarea, în această unitate geografică, a unor centre viticole, cum sînt Plenița, Breasta, Brabova.

Solurile brune, brune roșcate, brune podzolite și argilonisipoase permit dezvoltarea, în condițiile de temperatură și de precipitații proprii acestei regiuni, a tuturor plantelor agricole cultivate în România. Creșterea animalelor se practică în toate satele, dar mai dezvoltată este în jumătatea nordică, unde suprafețele cu pășuni sînt mai extinse (fig. 133).

Deși Piemontul Bălăciței se prezintă, în general, ca o unitate de relief cu caractere fizico- și economico-geografice relativ unitare, există, totuși, unele diferențieri care permit separarea următoarelor diviziuni (Al. Roșu, 1959): *Piemontul colinar al Argetoaiei*, cu văi orientate pe direcție aproape est—vest, care despart culmi înguste, prelungi și netede și cu o energie de relief în jur de 70 m; *Piemontul Desnățuiului* (suprapus bazinului hidrografic al Desnățuiului), se prezintă sub forma unor cîmpuri netede, din ce în ce mai largi cu cît înaintează spre sud, și cu energia de relief redusă (40—50 m); pe suprafața cîmpurilor apar crovuri, în care stagnează apa; *Podișul Bălăciței*, corespunzînd cu aria de divergență a apelor, are, în adevăr, înfățișarea de cîmp larg și neted, cu fragmentare și energie de relief reduse, pe suprafața căruia apar crovuri de dimensiuni mari, unele puternic umezite, chiar înmlăștinite prin menținerea apei din precipitații; *Dealurile Drincei* reprezintă partea vestică a regiunii, alcătuită din cîmpuri netede și largi, dar cu energie a reliefului pronunțată (în jur de 90 m) (fig. 134).

Descoperirile arheologice și documentele istorice atestă că populația acestor locuri s-a ocupat, din cele mai vechi timpuri, cu cultivarea pămîntului și creșterea animalelor și a practicat diferite meșteșuguri. Vestigii ale paleoliticului și neoliticului au fost scoase la iveală la Verbița, Verbicioara, Săleuța și în alte locuri. Cultura Coțofeni cu epoca de bronz, reprezentată prin vase de lut și unelte de bronz, a fost descoperită în cîteva locuri și îndeosebi la Verbicioara, unde au fost găsite și brăzdare de corn de cerb. Satul Verbița este menționat în documente istorice încă din secolul XIV (1387). Puțin mai tîrziu (1399) sînt menționate, în legătură cu unele evenimente petrecute în regiune, satele Poroinița și Poroina. În unele documente din secolul XVI se vorbește




Fig. 133. Piemontul Balăceștii. Utilizarea terenurilor. 1, Păduri; 2, livezi; 3, vii; 4, vii cu pomi fructiferi; 5, terenuri arabile și vii; 6, vette de așezări; 7, căi ferate; 8, drumuri.




Fig. 134. Piemontul Bălăcești. Subunitățile de relief, mărimea și funcțiile așezărilor. I, Piemontul Argetoaiei. II, Piemontul Desnățuiului. III, Podișul Bălăcești. IV, Dealurile Drincei. 1, Podiș piemontan fragmentat; 2, văi, culoare cu lunci și terase; 3, limitele subunităților; 4, așezări agricole; 5, agroindustriale; 6, industrial-agrar; 7, industrial-agrar și de transport; 8, industriale.

despre o producție agricolă deosebită (grâu, brinză, miere etc.) la 25 de sate, confirmând, astfel, că agricultura, bazată pe cultura cerealelor și creșterea animalelor, se practica de populația locală, cu rezultate bune, încă din vechime. În continuare, pe măsură ce ne apropiem de secolul nostru, agricultura s-a dezvoltat mult, populația s-a înmulțit și satele și-au extins vetrele îndeosebi în lungul văilor. În urma războaielor și a epidemiilor unele sate au dispărut, altele s-au mutat în locuri mai favorabile dezvoltării, dar numărul lor a crescut continuu.

Harta lui Fr. Schwantz de la începutul secolului XVIII (1723) înregistrează în Piemontul Bălăcești 34 de sate, pentru care nu se cunoaște numărul de locuitori. În schimb, Harta rusă din 1835 a dat pentru fiecare sat și populația. Din datele înregistrate în această hartă rezultă că aici trăiau peste 55 000 de locuitori, grupați într-un număr mai mare de sate în comparație cu cel dat de harta din 1723. Până la începutul secolului XX populația s-a dublat. Recensământul din

1912 arată că în cele peste 160 de localități din Piemontul Bălăcești (de aproape 5 ori mai multe față de anul 1723) trăiau peste 137 700 de locuitori. În secolul XX numărul satelor se menține același, dar populația lor a scăzut. Fenomenul nu este specific numai acestei unități. El se înregistrează, începând cu a doua jumătate a secolului XX, și în alte părți ale țării în care industria este mai puțin dezvoltată. Mecanizarea agriculturii a făcut disponibil un număr însemnat de brațe de muncă care a migrat spre marile centre urbane din apropiere — Craiova și Drobeta-Turnu Severin — (mai ales în industrie și construcții). Deși sporul natural este pozitiv, în multe sate cu valori chiar peste media țării, totuși, datorită plecării în număr mare, populația din unele centre rurale s-a redus. Din datele recensămintelor 1966 și 1977 reiese că în peste 130 de așezări, din cele 160 existente, se înregistrează scăderi ale numărului de locuitori. O reducere mai accentuată a populației au cunoscut, în acest interval de

timp, comunele : Bicleș, Virvor, Vlădaia, Oprișor, Livezile, Poroina, Dumbrava, Gogoșu etc. Se impune dezvoltarea unor unități economice în principalele centre comunale (Plenița, Bălăcița, Bicleș, Brabova, Argetoaia, Timna etc.), care să valorifice materiile prime locale și diversificarea activităților agricole. Numai astfel procesul de deplasare a populației în alte locuri se va diminua și numărul locuitorilor din sate nu va scădea. În prezent majoritatea satelor are un număr mic de locuitori. Din cele 160 de sate 46,5% (75 de sate) au sub 500 de locuitori și 28,7% (46) au între 500 și 1 000 de locuitori (fig. 134). Nu depășesc 1 000 de locuitori decât 40 de localități, adică sub 25% din totalul lor. Cea mai mare localitate rurală (de fapt din întreg Piemontul Getic) este Plenița, care trece cu puțin peste 5 000 de locuitori. Acest centru, vechi târg, a făcut parte, într-o perioadă, din categoria centrelor urbane. Datorită stagnării economice a fost trecut, după anul 1950, în rândul așezărilor rurale. În ultimul deceniu, Plenița a cunoscut o evoluție social-economică mai rapidă în comparație cu așezările din jur, datorită dezvoltării unor unități ale industriei alimentare și construcțiilor de mașini. Face parte din așezările rurale ale țării care au perspectiva de a deveni centre urbane cu profil agroindustrial. În Piemontul Bălăciței nu există nici un centru urban, fapt care are influență asupra dezvoltării social-economice a acestei unități. În unele sate există unități economice de importantă locală pentru prepararea produselor lactate, a vinului și a băuturilor alcoolice sau unități de întreținere și reparare a mașinilor agricole (Plenița, Bălăcița, Oprișor, Gogoșu, etc.).

Legăturile Piemontului Bălăciței cu regiunile înconjurătoare se fac numai prin drumuri. Nici o cale ferată nu-l traversează. Principalele drumuri care pornesc spre est ajung în Craiova, cel mai important centru de convergență umană din Oltenia, iar cele care merg spre vest, în Drobeta-Turnu Severin, prin intermediul șoselei naționale care vine de la Craiova prin Filiași—Strehaia. Majoritatea dintre ele sunt modernizate. Piemontul Bălăciței este singura subunitate din Piemontul Getic în care rețeaua de drumuri are direcția predominantă vest—est, datorită configurației reliefului și orientării de ansamblu a văilor, care au, în cea mai mare parte, această direcție. Un rol important în orientarea

principalelor drumuri pe direcția vest—est l-au avut și cele două mari centre urbane — Craiova de la extremitatea estică și Drobeta-Turnu Severin de la cea vestică — care au fost întotdeauna importante centre de desfacere a produselor agricole din acest teritoriu, iar în prezent și de atragere a forței de muncă.

5.11.3. Gruiriile Jiului

Cunoscute local și sub numele de „Dealul Lung” sau „Dealul Muierii”, grupul de dealuri piemontane de forma unui triunghi cu vârful în jos se întinde de la sud de Valea Cioiane (care le desparte de Dealul lui Bran) până la confluența Jiului cu Gilortul, acolo unde s-a instalat satul ce poartă, semnificativ, numele de Capu Dealului. Aceste dealuri, care se prezintă sub forma de gruiuri — culmi prelungi, cu o înclinare generală de la nord-vest spre sud-est — au o altitudine care scade de la 426 m în Culmea Vilsanului la 310 m, la nord de Brănești. Deși sunt în mare parte împădurite, au, totuși, suprafețe intens degradate de procese actuale. Ca urmare, albiile văilor care fragmentează Gruiriile Jiului (Valea Purcarului, Sterpoaia, Groșerea etc.) sunt înecate de aluviuni. Toate aceste văi, cu obirșia în partea de nord a unității, ajung în Gilort. Spre Jiu nu coboară decât mici văi torențiale și ogașe al căror fir se pierde la contactul luncii cu versanții. Ambele margini, de vest și de est, respectiv în lungul Jiului și Gilortului, sunt marcate de șiruri de sate. Cele situate pe stînga Jiului (Peșteana-Jiu, Cocoreni, Olari, Plopșoru, Văleni, Cursaru, Brănești etc.) s-au putut dezvolta sub forma unui șir continuu, pe o distanță de peste 30 km în lungul drumului care însoțește valea Jiului. În contrast cu acestea, cele dezvoltate pe Gilort (Socu, Bărbătești, Pêrești, Săulești, Bibești, Aninoasa, Groșerea etc.) sunt întrerupte, în unele locuri, de văile care fereștruesc gruiurile și se îndreaptă spre albia Gilortului. În interiorul gruiurilor, datorită fragmentării reliefului, existenței apei la adîncimi mari și întinselor suprafețe acoperite cu păduri (fig. 135) nu s-au putut dezvolta sate decât în lungul unora dintre aceste văi, în locurile mai puțin afectate de degradări de teren. De aceea, numai opt sate (Deleni, Piscuri, Bădești, Gilortu, Costești, Sterpoaia, Socu și Purcaru) din cele 32 situate între Gilort și Jiu, la sud de




Fig. 135. Gruiurile Jiului. A, Mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Dealuri; 2, văi largi cu lunci și terase; 3, râuri canalizate; 4, așezări agricole; 5, agroindustriale; 6, industrial-agrare și de transport; B, Utilizarea terenurilor. 1, Terenuri agricole; 2, păduri; 3, așezări; 4, căi ferate; 5, drumuri principale; 6, râuri canalizate; 7, exploatare de cărbune; 8, de țifet; 9, de gaze.

Dealul lui Bran, își au vetrele organizate pe văile din interiorul Gruiurilor Jiului. În așezările din interiorul dealurilor trăiește numai 22% din populație, iar în cele din lungul celor două văi circa 78%. Toate satele au formă liniară și profil economic predominant agricol. Cele mai multe dintre ele au sub 1 000 de locuitori. Numai Peșteana-Jiu, de pe rama vestică a gruiurilor, cuprins de fapt în Culoarul Jiului, în raza căruia se exploatează zăcămintele de cărbune, depășește 2 000 de locuitori și cunoaște o creștere continuă a populației.

Pe lângă cărbune, din Gruiurile Jiului, se exploatează țiței la Aninoasa și gaze naturale la Bărbătești, Săulești și Aninoasa, situate pe dreapta Gilortului. Populația satelor se ocupă, în cea mai mare parte, cu agricultura, dar mulți dintre locuitori, în ultimii ani,

lucrează în exploatarea carboniferă din bazinul Rovinari. În terenurile afectate de degradări s-au întreprins lucrări ameliorative, iar pe raza unor comune lucrări care fac posibilă irigarea a circa 600 ha terenuri agricole.

5.11.4. Culoarul Jiului

Valea Jiului reprezintă în egală măsură o axă de legătură între bazinele intracarpătice ale Petroșanilor și Hațegului cu partea sudică a țării, o axă de concentrare a așezărilor dar și de convergență a activităților din regiunile învecinate. Condițiile geografice au făcut ca în lungul ei să se concentreze un număr mare de așezări omenești, unele din ele devenite cu timpul importante centre economice ale țării (Petroșani, Tirgu Jiu,

Craiova). Marile unități de relief străbătute de Jiu au imprimat văii caractere geografice diferite în raport cu structura geologică, cu particularitățile morfologice și cu posibilitățile de valorificare a resurselor solului și subsolului. Ca urmare, în lungul Văii Jiului se diferențiază câteva sectoare, adevărate individualități geografice locale, ce se încadrează organic în marile unități geografice străbătute de Jiu. Dacă în marea depresiune subcarpatică Jiul prezintă o vale largă, cu terase bine dezvoltate pe partea stângă, care se pierd în aria joasă din nordul Dealului Bran, unde se concentrează cele mai multe ape care coboară din dealurile subcarpatice, mai la sud, după ce trece printre Dealul lui Bran și Dealul Vîrului și intră în Piemontul Getic, începînd de la confluența cu Cioiana, valea Jiului se înfățișează ca un culoar care se lărgeste de la 3—4 km în partea nordică la 5—6 km, în apropiere de Craiova. Pînă în preajma confluenței Jiului cu Motrul, valea prezintă o ușoară asimetrie, cu versantul stîng abrupt și cel drept ceva mai prelung și cu terase. Mai departe această asimetrie se inversează și devine mai accentuată. Terasa apar numai pe stînga (cu dezvoltarea cea mai mare între Filiași și Craiova), iar versantul drept devine cu adevărat un abrupt, în mare măsură afectat de eroziune și de alunecări (Al. Roșu, 1956). Piraiele și torenții care vin de pe versanți nu ajung de apele în Jiu, ci se revarsă în luncă, unde depun materiale și formează bălți și mlaștini. Multe dintre acestea au fost amenajate și drenate. Singura vale care își varsă apele direct în Jiu, înainte de dubla confluență de la nord de Filiași cu Gilortul și Motrul, este valea Jilțului, care adună aproape toate piraiele din dreapta culoarului. La gura torenților s-au format conuri de dejecție în bună parte asociate într-un glaciș favorabil dezvoltării așezărilor. Datorită pantei de scurgere mică (1 m/km) și depunerii de materiale aluvionare, cursul Jiului formează multe meandre. Întreaga luncă este cultivată cu cereale, legume, zarzavaturi și plante furajere.

Aria de lăsară de la Filiași, în care se adună riurile principale din nord-vestul Piemontului Getic, a favorizat formarea celor mai întinse terase din tot culoarul piemontan al Jiului. Tot aici se concentrează și drumurile principale care însoțesc aceste văi și fac legătura cu celelalte căi de comunicație care vin din regiunile înconjurătoare. De

aceea, în această arie s-au dezvoltat unele din primele târguri de vite și cereale din Oltenia (Filiași și Țințăreni), care, alături de Craiova, apar în documentele istorice ca centre vechi de convergență umană.

Așezările se înșiră în tot lungul culoarului, la contactul cu versanții, pe podul teraselor, pe agestre și tăpșane aluvio-proluviale. La nord de confluența cu Motrul și Gilortul, unde versanții au înclinare accentuată și sînt mai puternic fragmentați, iar lunca de multe ori inundată în perioadele ploioase, satele s-au dezvoltat numai la contactul văii cu dealurile, în lungul drumurilor care o însoțesc (Fărcășești, Peșteana de Jos, Urdari, Strimba-Jiu, Murghești, Turceni, Ionești etc. pe dreapta și Peșteana-Jiu, Plopșoru, Văleni, Ceplea, Brănești etc. pe stînga). Linia de sate, care se înșiră pe zeci de kilometri, este întreruptă, în acest sector, numai de valea Jilțului, care confluează cu Jiul la nord de Turceni, unde s-a construit una dintre cele mai mari termocentrale electrice din țară, care funcționează pe baza lignitului exploatat în bazinele carbonifere ale Motrului și Jilțului. În prezent, localitatea Turceni, prin dezvoltarea sa ca important centru al industriei energetice, a devenit una din cele mai mari așezări rurale din acest sector al Culoarului Jiului, cu perspectiva de a fi trecut, într-un viitor apropiat, în rîndul așezărilor urbane. Numai în 15 ani populația comunei Turceni a crescut de peste 1,5 ori, ajungînd de la aproape 4 800 de locuitori, în 1975, la peste 8 500 în 1992. În unitățile economice din Turceni lucrează circa 5 000 de persoane, din care mai mult de 2/3 sînt ocupate în industrie și construcții.

Între Filiași și Craiova așezările s-au putut extinde mult în suprafață, formînd vetre de sine stătătoare, cu spații largi între ele (Filiași, Răcari, Tatomirești, Ișalnița etc.). Dezvoltarea așezărilor sub această formă a fost favorizată de podul larg al teraselor care a reprezentat cel mai propice spațiu pentru organizarea lor. În lungul versantului vestic, abrupt și fragmentat, cele mai mari sate (Brăloștița, Scăești, Breasta etc.) s-au dezvoltat pe agestrelor de la gura văilor secundare sau au pătruns în lungul acestora, întinzînd ramificații în toate locurile bune pentru construcții. Ca urmare a condițiilor geografice oferite de relief, aceste sate au altă formă, altă structură și textură, în comparație cu cele din partea nordică a

culoarului, care se prezintă numai sub formă liniară.

Multe din aşezările de astăzi din Culoarul Jiului sînt consemnate în documente cartografice vechi. Harta lui Fr. Schwantz din 1723 dă în acest teritoriu aproape 40 de sate (L. Badea, 1971), cele mai multe localizate în apropierea Craiovei, care se detaşează ca cel mai important centru nu numai din Culoarul Jiului, ci şi din întreaga Oltenie, încă de la sfîrşitul secolului XV, cînd a devenit reşedinţă a banilor.

Rolul jucat de Culoarul Jiului în decursul timpului ca axă de legătură între toate regiunile pe care le străbate şi condiţiile geografice favorabile dezvoltării unei agriculturi complexe au determinat concentrarea aici a unei populaţii mult mai numeroase în comparaţie cu unităţile deluroase vecine. În acest sens, Culoarul Jiului face parte dintre regiunile ţării în care populaţia a cunoscut o continuă creştere. Unele dintre aceste aşezări deţin în prezent importante ponderi în anumite ramuri de producţie ale economiei naţionale. În afara municipiului Craiova, intrat în categoria celor mai mari centre urbane ale ţării (cu peste 300 000 de locuitori), se detaşează oraşul Filiaşi şi aşezările rurale Turceni, Işalniţa, Cernele, Podari şi Bucovăţ.

Oraşul Filiaşi, situat pe stînga Jiului (pe terasa de 8—10 m), la sud de confluenţa cu Gilortul, acolo unde se întretaiau vechi drumuri comerciale ale Ţării Româneşti, care făceau legătura în nord cu Tîrgu Jiu şi, mai departe, peste pasul Vilcanului, cu Depresiunea Petroşani, iar în vest, pe Valea Motrului, cu Dunărea la Drobeta-Turnu Severin, a fost cunoscut în trecut ca un important tîrg de cereale şi vite din această parte a ţării. El s-a dezvoltat mai mult după construirea liniei ferate Craiova—Drobeta-Turnu Severin şi mai ales după ce s-a făcut legătura feroviară prin Defileul Jiului, cu bazinul carbonifer Petroşani (1948), care a dus la intensificarea activităţilor legate de transporturi. Pînă în 1968, cînd a fost declarat oraş, activitatea lui economică a fost legată mai mult de dezvoltarea sa ca nod rutier şi feroviar. În continuare, însă, în Filiaşi s-au dezvoltat cîteva unităţi economice din domeniul industriei lemnului (cherestea şi parchete) şi industriei alimentare (panificaţie, morărit, produse din carne, băuturi) şi s-au construit două mari întreprinderi care produc utilaje şi piese de schimb

pentru industria lemnului (1971) şi transformatoare electrice mici (1972). Numărul mediu al personalului ocupat în industrie a crescut de la numai 740 de persoane, în 1970, la aproape 5 000 în 1985, iar populaţia a ajuns de la 11 914 de locuitori la 18 747 în 1992, consecinţă atît a sporului natural, cît şi a celui migratoriu, pozitiv, după anul 1975.

Dintre aşezările rurale din apropierea municipiului Craiova cea mai puternică dezvoltare a cunoscut-o Işalniţa, care a devenit un important centru al industriei chimice şi industriei energetice din ţară (centrala electrică de termoficare are o putere instalată de 1.100 MW). Aici se produc îngrăşăminte chimice de origine organică, îngrăşăminte fosfatice şi azotoase, materiale plastice şi răşini sintetice pe baza gazului metan din regiune. În Işalniţa lucrează aproape 14 000 de persoane, din care circa 9 000 în industrie, majoritatea veniţi din alte localităţi (îndeosebi din Craiova).

Localitatea Cernele s-a dezvoltat ca un centru al industriei materialelor de construcţie, reprezentat de întreprinderea de prefabricate din beton (în 1964). Localitatea Bucovăţ, situată la vest de Craiova, pe dreapta Jiului, este cunoscută ca centru al industriei pielăriei, blănăriei şi încălţămintei prin extinderea şi diversificarea producţiei tăbăcăriei, care a fost construită în anul 1938. La sud de Craiova, Podari a devenit, după 1950, un important centru al industriei alimentare.

Construirea unor importante unităţi economice în aceste aşezări a făcut ca ele să devină aşezări-satelit ale Craiovei¹ şi să cunoască o dezvoltare economică şi social-culturală la nivelul localităţilor urbane. Astfel, s-a redus mişcarea masivă a populaţiei spre acest mare centru urban al ţării şi s-a înregistrat o creştere continuă a locuitorilor în majoritatea aşezărilor din Culoarul Jiului. Numai în Bucovăţ, Cernele, Işalniţa şi Podari trăiesc în prezent peste 21 000 de locuitori. Craiova, datorită puternicei ei dezvoltări social-economice exercită însă o influenţă din ce în ce mai mare nu numai asupra aşezărilor din culoar, ci şi din aproape întreaga parte centrală şi sudică a Olteniei

¹ Oraşul Craiova, situat la contactul Piemontului Getic cu Cîmpia Olteniei, va fi tratat în volumul următor împreună cu celelalte oraşe situate la marginea de nord a Cîmpiei Române.

în privința evoluției populației lor, structuri economice, aprovizionării cu produse agro-alimentare etc. O mare parte din producția agricolă a acestor așezări este prelucrată în unitățile industriei alimentare din Craiova sau valorificată pe piață, pentru aprovizionarea populației locale. Concludentă în acest sens este și evoluția populației din culoar. Aceasta a crescut de la 106 000 de locuitori la începutul secolului (1912) la 342 500 în prezent, majoritatea fiind concentrată însă în municipiul Craiova 303 520 de locuitori în 1992). Dar, dacă în 1912 Craiova deținea numai 52,5% (56 000 de locuitori) din populația Culoarului Jiului, în prezent ea concentrează peste 87%, datorită atragerii unui număr mare de locuitori din alte locuri, care a făcut ca sporul migratoriu să depășească cu mult pe cel înregistrat în toate celelalte localități din culoar.

Privit sub aspectul dezvoltării sale socio-economice, Culoarul Jiului a cunoscut profunde transformări în anii postbelici, care au dus la importante modificări în structura sa economică. Pe lângă construirea unor unități industriale de importanță națională bazate pe valorificarea resurselor locale (cărbone, gaz metan, produse agricole și animale) s-a dezvoltat agricultura prin cultivarea pe scară largă a legumelor și zarzavaturilor, a viței de vie și a plantelor tehnice și creșterea unui număr mare de animale. Producția agricolă a fost adaptată necesităților de consum ale populației din Craiova și din centre industriale din apropiere. Dezvoltarea unor ramuri agricole a fost favorizată și de prezența terenurilor cu soluri nisipoase fertile și de existența unor izvoare bogate la nivelul terasei inferioare, care au putut fi amenajate pentru irigarea culturilor. De asemenea energia termică degajată de termocentrala de la Ișalnița a fost factor hotărâtor în construirea, la nordul acestei localități, a unor întinse suprafețe de sere, care produc legume și zarzavat atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă.

Toate acestea, la care se adaugă legăturile lesnicioase pe șosele și căi ferate cu municipiul Craiova în sud și municipiul Tîrgu Jiu în nord, au dus la stabilizarea populației în satele din culoar și organizarea unora dintre așezări la nivelul centrelor urbane (Turceni, Ișalnița, Tîntăreni, Podari etc.). Prin construirea căii ferate Fîlîși—Turceni—Rovinari—Tîrgu Jiu, Culoarul Jiului și-a pus

mai bine în evidență una din funcțiile principale care i-o conferă poziția și particularitățile morfologice: aceea de axă de convergență a drumurilor de pe un teritoriu întins și de culoar de legătură între regiunile subcarpatice, de piemont și de cîmpie.

5.11.5. Piemontul Oltețului

Situat în partea centrală a Piemontului Getic și reprezentînd mai mult de 1/3 din întinderea acestuia, Piemontul Oltețului, prin ansamblul caracterelor geografice, se individualizează ca o treaptă larg dezvoltată între Subcarpați și cîmpie. Acesta face trecerea de la Subcarpații Gorjului și Subcarpații Vîlcii, spre care limita este puțin tranșantă datorită interferenței caracterelor celor două unități vecine, la Cîmpia Românilor, unde limita este considerată o fișie de întrepătrundere a caracterelor cîmpiei și a piemontului.

Deși o unitate relativ omogenă, Piemontul Oltețului prezintă unele diferențieri de la nord la sud și de la vest la est. Aceasta exprimă modul în care a avut loc formarea regiunii pe suportul geologic oferit de joncțiunea Platformei Moesice cu Depresiunea Getică, exprimată între Jiu și Olt prin intermediul unei falii extracarpatică ce se poate urmări pe linia localităților Drăgășani—Bălcești—Fîlîși. Depunerile de materiale (pietrișuri, nisipuri de diferite categorii, argile) au caracter eterogen și discontinuu. În general, se constată o înlocuire treptată, de la nord la sud, a formațiunilor predominant argiloase cu cele predominant nisipoase, care acoperă o bună parte din jumătatea sa sudică.

În limitele lui se detașează două subunități morfostructurale: dealuri piemontane, în partea nordică și podișuri colinare, în jumătatea sudică.

Dealurile piemontane, mai înalte și puternic fragmentate, se desfășoară aproape neîntrerupt de la nord spre sud, sub forma unor culmi prelungi, cu măguri și înșeuări (Dealul Muierii), despărțite prin culoarele largi și adînci ale văilor principale. Altitudinea lor scade de la nord la sud cu aproape 250 m. Înălțimea medie este de 400 m dar în multe locuri depășește 500 m (Dealul Birzei 501 m, Obîrșia 548 m, Rugetu 549 m etc.). Au versanți abrupti, reprezentînd în mare parte o succesiune de cueste, de obicei dispuse în

unghi, pe distanțe mari, succedate într-un anume paralelism și din ce în ce mai puțin evidente, de la contactul cu Subcarpații spre sud. Ele sînt întrerupte sau estompate pe alocuri datorită stadiului mai avansat de modelare a piemontului prin acțiunea intensă a proceselor actuale de degradare (alunecări, spălări), mai ales în bazinele Amaradiei, Cernei și Pesceanei.

Rețeaua principală de văi, aproape paralelă, cu orientare generală nord-sud, constituie o trăsătură specifică a acestei unități. Înguste și adînci în nord, unde energia reliefului depășește 250 m, acestea se lărgesc spre sud, unde sînt deosebit de evidente cîteva arii de convergență a apelor: la nord de Filiași și de Craiova pe Jiu, la Bălcești și la nord de Balș pe Olteț și la Drăgășani pe Olt.

În cadrul treptei nordice se diferențiază două subunități delimitate de valea Oltețului: Dealurile Amaradiei (între Gilort și Olteț), în interiorul cărora, la obîrșile Amaradiei s-au schițat cîteva mici depresiuni intracolinare (Pojaru, Roșia, Sinești), înșeuări deluroase și lărgiri suspendate la obîrșia văilor secundare (Rugetu, Roșioara) și Dealurile Cernei (între Olteț și Olt), numite și Dealurile Sasca-Pesceana, cu înălțimi frecvent de peste 500 m (Dealul Tugube 532 m, Dealul Zugubea 512 m), separate de văi înguste și adînci, înscrise într-un paralelism general cu interfluviile, ca trăsătură morfologică dominantă.

Podișurile colinare, care formează treapta sudică, mai joasă, a Piemontului Oltețului (200–300 m), reprezintă un ansamblu de culmi netede care devin poduri întinse, pe măsura înaintării spre marginea de sud, separate de văi largi, mai puțin adînci, cele mai mari însoțite de terase. Geneza piemontului, constituția și evoluția lui ulterioară au fost favorabile formării unui relief uniform în ansamblul lui, dar variat în formele de detaliu, mai ales în privința morfologiei versanților. În afara văilor rîurilor principale (Olteț, Amaradia), există o generație proprie de văi (Mamu, Beica, Geamărtălu, Burlui etc.). După aspectul general și felul de utilizare economică această parte a Piemontului Oltețului apare ca o cîmpie piemontană înaltă, despărțită de Olteț în Podișul Tesluiului, în vest și Podișul Beicăi, în est.

Podișul Tesluiului este o regiune joasă (sub 300 m), cu interfluvii plane întinse și o orientare generală a văilor de la nord-vest la sud-est, ceea ce a generat cîteva cueste (Coasta Mare, Dealul Înalt, Dealul Pietrosul, Dealul Rotarului), afectate de degradări, favorizate și de utilizarea agricolă a terenurilor. Podișul Beicăi, alcătuit din interfluvii de 3–4 km lățime, are o ușoară înălțare (boltire) a sectorului nord-vestic, dintre Amaradia și Jiu, ce poate fi considerat ca o subunitate distinctă, cunoscută sub numele de Dealurile Brădești-Melnești.

Rețeaua hidrografică a Piemontului Oltețului (culeasă în proporție de 2/3 de către Olt) are un caracter consecvent, vizibil pentru văile principale (Olt, Gilort, Amaradia, Olteț, Cerna) și pentru o serie de văi afluențe (Plosca, Șasa, Glămana) și alte rîuri mai mici. Văile principale au origină carpatică, debite mari și variații reduse de nivel, doar Amaradia dezvoltîndu-se în totalitate bazinele hidrografice în cadrul piemontului. La nord de linia Filiași-Drăgășani majoritatea afluenților din piemont ai Amaradiei, Oltețului, Cernei și Oltului au debite mici, iar în timpul verii prezintă scurgere temporară.

Terasele sînt bine dezvoltate pe văile Oltețului, Cernei și Amaradiei și parțial pe Teslui, Geamărtălu și Pesceana, cele mai înalte apărînd numai pe Cerna și Gilort (versantul vestic al Dealului Cărbuneștilor).

În regimul precipitațiilor se resimte cel de-al doilea maxim de toamnă, caracteristic pentru partea de vest a Piemontului Getic, iar în anotimpul cald sînt frecvente aversele cu caracter local care accentuează procesele de denudare, între care alunecările au o frecvență destul de mare, cu deosebire în jumătatea nordică a regiunii.

Solurile zonale sînt reprezentate prin cambisoluri: soluri brune eu-mezobazice (în sud) și soluri brune eu-mezobazice și brune luvice (în nord). Azonal, pe interfluvii se dezvoltă soluri brune luvice (podzolite), la care, în sud, se adaugă și planosoluri. Pe suprafețele înclinate se fac simțite procesele de eroziune care au dus la scăderea calității solurilor, mai ales sub influența activității antropice. În general, terenurile se pretează la pomicultură, viticultură și cultura unor cereale. Cele mai fertile terenuri se află în sud-estul regiunii iar cele cu potențial natural mai scăzut sînt localizate sub forma unor areale în perimetrul unor comune

din estul văilor Gilortului, Oltețului și în sud-vestul Luncavățului (Turburea, Melinești, Licurici).

Vegetația caracteristică Piemontului Oltețului este pădurea de everceinee, extinsă în secolele trecute pe aproape întreaga sa suprafață. Reflectind etajarea pedoclimatică și influențele submediteraneene, ea trece gradat de la pădurea masivă de gorun balcanic, în amestec cu fag spre limita subcarpatică și cu unele elemente termofile spre sud, constituind mai mult de jumătate din fondul forestier al unității piemontane dintre Olt și Gilort, la pădurea de gârniță sau de gârniță în amestec cu cer și cu alte elemente termofile, ce caracterizează jumătatea sudică, de podișuri colinare, a Piemontului Oltețului.

Tăiată intens în ultimul secol, pădurea se menține sub formă de areale masive pe interfluviile din nordul piemontului și în Podișul Beicăi până aproape la nord-est de Balș și apare doar insular, pe suprafețe reduse, în Podișul Tesluiului. În locul pădurii s-au extins pajiștile stepizate și fânețele sau culturile agricole, mai ales în partea de sud-vest (cereale) și spre valea Oltului (vii, livezi).

Data fiind configurația reliefului și întinderea mare a pădurilor de foioase, Piemontul Oltețului a fost, în trecut, mai greu accesibil, ceea ce a avut o mare importanță în istoria acestor locuri. Dispunerea aproape paralelă a dealurilor, ce se continuă aproape neîntrerupt din Subcarpați până la limita cu cîmpia și a văilor pe direcție generală nord-sud au dus la dezvoltarea rețelelor de drumuri mai mult pe această direcție, în lungul apelor. Numai două artere principale (Drăgășani—Măciuca—Hurezani—Țirgu Cărbunești și Craiova—Bălcești—Lădești—Șirineasa—Rîmniceu Vilcea) traversează în diagonală această regiune, intersectîndu-se în valea Cernei (la Măciuca). Căile ferate, de-a lungul văilor Oltului și Jiului și la contactul piemontului cu cîmpia sau, mai recent, cu Subcarpații, ocolește Piemontul Oltețului.


Descoperirile arheologice și documentele istorice confirmă faptul că Piemontul Oltețului este o străveche regiune de locuire umană. Cercetările istorice au scos în evidență urme foarte timpurii ale activității umane în paleoliticul inferior la Bugiulești (comuna Tetoiu, județul Vilcea) pe Olteț, cît și existența unor așezări din perioada daco-romană (Stănești, din județul Vilcea)

situate pe văile apelor sau din a doua epocă a fierului (Grădiștea, județul Vilcea), localizate pe înălțimi (D. Berciu, 1939).

Deși în secolele următoare, datorită unor cauze istorice și sociale, satele au evitat valea Oltului și spațiul deschis spre cîmpie, expus invaziilor străine, căutînd văile adăpostite, în documentele secolului XVI sînt menționate deja aproape 200 de așezări, majoritatea acestora apărînd în lungul principalelor ape și la contactul piemontului cu cîmpia (*Piemontul Getic*, 1971, p. 237). Pînă la sfîrșitul secolului XVI se conturaseră deja marile linii de aglomerare a populației, care, în general, corespund cu cele actuale. În limitele Piemontului Oltețului sînt dezvoltate 400 de sate care totalizează circa 192 000 de locuitori (în 1985), reprezentînd aproape 1/3 din numărul locuitorilor din tot Piemontul Getic. În secolul XX, populația a înregistrat, între 1912 și 1956, o creștere relativ mică, cu numai 18%, urmată de o continuă reducere, între 1956—1985, cu —18,6%. Scăderea populației între 1912 și 1985 (—4,0%) și mai ales în ultimele decenii se leagă, în mare parte, de reducerea sporului natural și de o intensă mișcare migratorie către orașele apropiate (Craiova, Balș, Slatina, Rîmniceu Vilcea, Țirgu Jiu) și spre alte județe.

Evoluția numerică a populației prezintă mari diferențieri teritoriale. În prima jumătate a secolului nostru are loc o creștere cu precădere a populației din părțile de nord-est și de nord-vest (comunele Căpreni, Hurezani și Licurici, din județul Gorj, Lădești și Măciuca din județul Vilcea), între 1966 și 1977, însă, cea mai mare parte a comunelor înregistrează o descreștere, intensitatea acestui proces accentuîndu-se de la margini spre interiorul piemontului, unde, în 1985, populația unor comune se reduce cu 1/4 sau chiar mai mult față de 1966 (Bălcești, Ghioroiu și Zătreni, din județul Olt, Fîrtățești și Măciuca din județul Vilcea etc.). În consecință, în satele regiunii se accentuează caracterul de îmbătrînire și de feminizare a populației, cele mai multe dintre acestea, cu excepția celor din sudul piemontului și din valea Oltului, prezentînd astăzi o populație feminină majoritară. În unele sate din interiorul piemontului, mai izolate, ponderea femeilor ajunge chiar la 55—60% (Fîrtățești, Ghioroiu, Zătreni din județul Vilcea, Stoina, Logrești, Dănciulești din județul Gorj etc.). În ultima jumătate de

Fig. 136. Piemontul Oltețului. Mărimea și funcțiile așezărilor. 1, Văi cu lunci, parțial terase; 2, așezări predominant viticole; 3, pomicole și de creșterea animalelor; 4, cerealiere și de creșterea animalelor; 5, de creșterea animalelor, culturi agricole și pomicole; 6, agroindustriale; 7, drumuri principale.



secol densitatea populației în interiorul piemontului înregistrează scăderi. Cele mai mici densități se înregistrează pe interfluviul Amaradia—Olteț (sub 50 loc./km²) și în lungul văilor Cerna—Olteț (sub 75 loc./km²). O ușoară creștere a densității are loc în comunele din sud (Iancu Jianu, Oboga, Baldovinești din județul Olt) și din estul Piemontului, ca urmare a dezvoltării viticulturii în regiunea Drăgășani și a influenței orașelor din valea Oltului (Slatina, Rîmnicu Vilcea).

Particularitățile cadrului natural (în special ale reliefului, cu văile aproape paralele și mult adâncite în raport cu interfluviile) se reflectă și în configurația rețelei de așezări care formează adevărate culoare liniare,

uneori duble (satele de pe ambele maluri ale Cerneli, Oltețului, Amaradiiei, Ploscăi). Mărimea medie a așezărilor este de 500 loc./sat. Cele mai numeroase, și care predomină în partea central-vestică a regiunii, au între 250 și 500 de locuitori (38% din numărul total). Satele cu sub 250 de locuitori (aproape 20% din totalul rețelei) sînt frecvente pe interfluviile din partea central-nordică, în timp ce așezările cu 500—1 000 de locuitori sînt dispersate în întreaga regiune (fig. 136). Satele cu 1 000—2 500 și peste 2 500 de locuitori sînt situate în sud-estul acestuia (regiunea viticolă Drăgășani) și în partea de sud, la contactul piemontului cu cîmpia. Satele viticole sau cerealiere-viticole au o structură mai adunată și forme alungite

(Iancu Jianu, Bălcești, Șușani), ca și cele de la contactul cu cîmpia, unde tendința spre structura adunată este evidentă. Unele sate mari, de la confluența apelor sau care au avut funcții administrative ori de schimb mai importante (Zătreni, Bălcești, Lădești etc.) au un centru civic organizat, o structură adunată sau chiar compactă, cuprinzînd suficiente dotări social-culturale, ceea ce evidențiază rolul lor de centre de polarizare locală în cadrul regiunii.

Satele din Piemontul Oltețului sînt așezări agricole. Unele au funcții predominant cerealiere și de creștere a animalelor: Goiești, Mischii (județul Dolj), Baldovinești, Morunglav (județul Olt), Laloșu (județul Vilcea); altele viticole și cerealiere: Crețeni, Sutești, Amărăști, (județul Vilcea), iar o parte au funcții mixte, agroindustriale: Iancu Jianu (județul Olt), Bustuchin (județul Gorj), Grădiștea, Bălcești (județul Vilcea) etc. Funcțiile satelor au cunoscut unele modificări datorită dezvoltării industriei extractive (gaze, petrol) în partea central-sudică și sud-vestică (Turburea, Stoina, Iancu Jianu, Vulpeni, Cîrlogani). Modificări mai importante au fost produse de influența puternică exercitată de orașele Craiova, Slatina și mai puțin Rîmnicu Vilcea, asupra unor sate din sudul, estul și nord-estul Piemontului (Șimnic, Baldovinești, Bobicești, Orlești etc.), unde s-a înregistrat un proces mai accentuat de modernizare, reflectat în echiparea mai bună a vetrelor reședințelor comunale și chiar a unora dintre sate.

Din suprafața totală a Piemontului Oltețului circa 2/3 o reprezintă terenurile agricole, în cadrul cărora arabilul deține aproximativ 40%. Ponderi mult mai ridicate (peste 70%) au comunele din partea sudică: Laloșu (județul Vilcea), Baldovinești, Morunglav și Oboga (județul Olt), Bulzești, Goiești, Mischii, Melinești, Șimnic (județul Dolj), unde se fac culturi ceva mai extinse de cereale (porumb, grâu), plante tehnice (floarea-soarelui) și, în apropierea orașelor, de legume (ceapă, ardei, roșii etc.).

Cele mai scăzute suprafețe arabile (sub 40%) se găsesc în nord, acolo unde relieful este mult mai fragmentat și acoperit în mare parte cu fînețe, pășuni, păduri și pomi fructiferi (pruni), ca de exemplu în comunele: Crețeni, Lădești, Lăpușata, Glăvile, Pesceana și Scundu (județul Vilcea).

Viile ocupă 25% din suprafața totală a piemontului și peste 1/3 din cea a terenu-

rilor agricole. Comunele cu suprafețe viticole mai mari (Sutești 27%, Cîrlogani 12,0%, Măciuca 14,5%, Lunghești 13,0%, Glăvile, Pesceana 12,0%, Crețeni 21,5%) fac parte din renumita podgorie Drăgășani (județul Vilcea), care ocupă peste 6 000 ha (11% din terenurile cultivate cu vii ale Olteniei). Aceasta este una dintre cele mai de seamă și străvechi podgorii ale țării, menționată documentar încă de pe vremea lui Mircea cel Bătrîn. Se extinde, în cea mai mare parte (3/4 din suprafața totală), în limitele Piemontului Oltețului, unde ocupă versanții cu terase special amenajate pentru plantarea viței de vie, cum este cazul la vest de Drăgășani, unde se conturează linia satelor Sintești, Vedeia, Mitrofani, iar la vestul acestora, linia Crețeni, Nemoiu, Aninoasa, Olteanca.

În podgoria Drăgășani predomină viile nobile cu struguri pentru producerea vinurilor albe seci, albe demiseci, aromatizate și vinuri roșii de tip Cabernet—Sauvignon.

În Piemontul Oltețului se cultivă pe suprafețe mari și pomi fructiferi (pruni, meri și nuci), care dau rezultate bune în majoritatea teritoriului. Importante suprafețe plantate cu pomi (peste 10% din terenul agricol) au comunele: Glăvile, Pesceana, Tetoiu, Berbești, Măciuca, Scundu, din județul Vilcea, Dănciulești, Berlești din județul Gorj, Vulpeni din județul Olt etc. De asemenea, creșterea animalelor, ocupație de veche tradiție, se înscrie printre activitățile de bază ale populației. În partea nordică o importanță mai mare o are creșterea ovinelor și vacilor pentru lapte, carne și lînă. În partea centrală se cresc îndeosebi ovine, bovine și păsări, iar în sud, creșterea animalelor devine mai diversificată, căpătînd și un anumit caracter preorașenesc.

Piemontul Oltețului dispune și de resurse minerale. Unele structuri petrolifere și gazeifere se află în exploatare la Bălcești, Zătreni, Stoina (Virteju), Grădiștea, Iancu Jianu, Melinești, Șimnic, Căpreni, Hurezani, Tetoiu, Făurești. Acestea, însă, nu au determinat transformări radicale în economia și fizionomia așezărilor respective și nici transformarea lor în centre industriale. Mai recent, după anii 1980—1982, s-au dat în exploatare unele zăcăminte de lignit energetic în nordul piemontului, la contactul cu Subcarpații, în aria comunelor Albeni, Prigoria, Alunu, Berbești, Cernișoara, exploatarea care au produs modificări importante

în structura populației active și în baza economică a localităților piemontane apropiate. Piemontul Oltețului a rămas pînă în prezent o arie de divergență umană și social-economică, în cadrul lui tirgurile locale vremelnice (Lădești, Bălcești, din județul Vilcea) nu au ajuns la nivelul centrelor urbane. La această situație a contribuit și faptul că piemontul, care se prezintă unitar sub raportul condițiilor naturale, a fost, de secole, împărțit între patru județe (Gorj, Vilcea, Olt și Dolj), teritoriul acestuia avînd, pentru fiecare în parte, rol de regiune de margine. Orașele, ca puncte de convergență a vieții social-economice, s-au dezvoltat în lungul Oltului și Jiului și la zona de contact a Piemontului cu celelalte trepte de relief, rămînînd periferice acestuia.

Gravitarea populației active spre centre urbane exterioare piemontului a generat o serie de urmări asupra mărimii așezărilor umane și a structurii lor, ca și asupra profilului și dinamismului bazei economice. În consecință, viața umană se menține în trăsături predominant rurale, diferențiate însă în funcție de gradul de valorificare a resurselor locale și de specificul condițiilor geografice. Modificările cele mai importante s-au produs în partea limitrofă văilor Oltului și Jiului și spre contactul lui cu Subcarpații și cîmpia, unde spațiul rural este în plin proces de modernizare.

5.11.6. Culoarul Oltului

Valea Oltului, cea mai importantă și străveche arteră de circulație a Piemontului Getic, se prezintă ca o adevărată depresiune-culoar, sculptată între Piemontul Oltețului și Piemontul Cotmenei, cu terase bine dezvoltate și o luncă largă, care au oferit populației condiții bune de locuire, din cele mai vechi timpuri. Prin extensiunea ei, apare ca o adevărată cîmpie fluvială, prelungită din sud pînă în Subcarpați și foarte clar delimitată de versanți cu înclinare accentuată, pe alocuri chiar abruptă. Pe toată lungimea din dreptul confluențelor Luncavățului și Topologului pînă la Slatina (unde Oltul intră în cîmpie) valea prezintă o ușoară asimetrie, dar neuniformă. Dacă în partea de nord, pînă aproape de Drăgășani, terasele se desfășoară numai pe stînga iar versantul drept este abrupt, treptat terasele se dezvoltă și pe dreapta, astfel încît

spre cîmpie se ajunge la inversarea asimetriei: terasele inferioare sînt foarte larg dezvoltate pe dreapta și lipsesc pe stînga. În general, valea este adîncită în nord cu 200—300 m și în sud cu 70—80 m, față de nivelul general al suprafeței piemontane și are o dezvoltare laterală de la 9—10 pînă la 17—18 km.

Sculptarea văii a fost ușor influențată de mișcările neotectonice care au determinat, în ultima parte a cuaternarului, o deplasare accentuată a cursului spre est, avale de Drăgășani. Sistemul de terase, în profil longitudinal, prezintă modificări ușoare — de structură, neotectonice, de contribuții laterale — ceea ce creează dificultăți în stabilirea și delimitarea lor (N. Aur, 1976, p. 120). Pînă la Drăgășani, terasele se dezvoltă numai pe sub versantul estic. Pe cealaltă parte se pot urmări numai unele resturi de terase greu de diferențiat. La sud de Drăgășani valea se lărgeste, lunca ajunge la Slatina la 6—7 km lățime, iar terasele se dezvoltă pe ambele maluri. După aspectul general al văii și ansamblul caracterelor geografice în lungul acesteia se pot delimita două părți distincte: în nord, *culoarul propriu-zis*, din dreptul Luncavățului și Topologului pînă la Drăgășani, în sud, o adevărată *cîmpie de terase* cu lățime de aproape 20 km, pînă la linia Slatina—Piatra Olt.

În partea nordică, numai pe stînga se dezvoltă un sistem de opt terase, din care cele inferioare sînt mai slab reprezentate, puternic fragmentate, în bună parte acoperite cu depuneri deluvio-proluviale. Versantul drept, abrupt, prezintă fenomene active de pantă. Ca urmare a pantei reduse și a acumulărilor intense, în lunca riului au avut loc frecvente deplasări laterale ale cursului și o meandrare puternică. O dezvoltare deosebită o au și glacisurile de contact. Văile afluate, aproape perpendiculare pe cursul colectorului, sînt înguste și adînci, deseori adîncite în propriile lor agestre.

Partea sudică, largă pînă la 17—18 km, prezintă un profil asimetric ca urmare a dezvoltării teraselor inferioare, mai mult pe versantul vestic, iar cele superioare pe latura estică.

Oltul prezintă caracteristici hidrologice apropiate celorlalte riuri ale Piemontului Getic. Scurgerea medie specifică de aluviuni în suspensie în sectorul piemontan ajunge la 5—10 t/ha.an, temperatura medie multi-anuală a apelor oscilează în jur de 8—10°C




Fig. 137. Culoarul Oltului. Mărimea și funcțiile așezărilor (A). Utilizarea terenurilor (B). 1, Lunci; 2, terase joase; 3, terase înalte; 4, lacuri antropice; 5, așezări viticole; 6, pomi-viticole și de creșterea animalelor; 7, cerealier-legumicole și de creșterea animalelor; 8, păduri; 9, vii; 10, livezi; 11, terenuri arabile; 12, vetre de așezări; 13, căi ferate; 14, drumuri.

(la Slatina fiind de 10.4°C), iar durata medie de menținere a unor formațiuni specifice anotimpului rece (gheață la mal, pod de gheață etc.) este de 40—45 de zile.

În ultimele decenii s-au produs modificări radicale în valea Oltului. Prin lucrări de amploare efectuate în cursul mijlociu și inferior s-a realizat în sectorul piemontan al Oltului un sistem unitar de amenajări hidrotehnice, care a dat albiei o nouă configurație (fig. 137). Între anii 1977 și 1981 au fost construite șase baraje cu centrale

hidroelectrice la Ionești, Zăvideni, Drăgășani, Strejești, Arcești și la Slatina, ceva mai la sud de limita piemontului, cu o putere instalată între 25 și 50 MW fiecare (în total 224 MW), cu lacuri în suprafață totală de peste 5 700 ha, reprezentând peste 8% din suprafața întregului culoar. Între noile acumulări realizate, cea de la Strejești (2 203 ha) este cea mai mare de pe întreg riul Olt.

Fiind o adevărată punte de legătură între regiunile de la sud și nord de Carpați, Valea Oltului a fost din cele mai vechi timpuri

mult mai umanizată decât regiunile învecinate. De-a lungul ei s-au construit castru și cetăți întărite, aici avînd loc o puternică colonizare romană. Urmele vechiului drum roman din dreapta Oltului se regăsesc cu ușurință în traseul actual al șoselei, iar cele ale vechiului val de pămînt (*limes transalutanus*) se pot urmări și astăzi pe tot sectorul piemontan al acestuia.

În istoria Țării Românești valea Oltului a jucat un rol deosebit de important. Rîmnicul (Rîmnicu Vilcea) și Ocna (Oenele Mari de mai tîrziu), vechi centre urbane ale țării, s-au dezvoltat la intrarea rîului în culoarul piemontan, iar Slatina, la ieșirea în cîmpie.

În prezent, în limitele Culoarului Oltului sînt incluse aproape integral teritoriile a 11 comune și un oraș (Drăgășani), care totalizează peste 635 km². În ansamblul ei, valea Oltului este un teritoriu agricol, dar cu un pronunțat caracter de dezvoltare intensivă. Procesul de industrializare și urbanizare s-a manifestat cu putere în ultimele decenii îndeosebi asupra orașului Drăgășani.

Dimensiunile luncii și teraselor, poziția și forma, ca și condițiile favorabile dezvoltării economiei agricole și rețeaua de drumuri și-au pus amprenta pe mărimea, fizionomia și funcționalitatea așezărilor omenești. Forma cea mai simplă de vatră este cea liniară, satul-stradă, de peste 2—3 km lungime (Călina, Strejești, Mamura, Colibași etc.). Satele urmăresc însă frunțile teraselor și deseori caută locul unde vilcelele străpung terasele pentru a ajunge la Olt. În acest caz, satele au o textură ramificată și o formă poligonală, cum este cazul unor sate de pe malul estic (Dumitrești, Curtișoara, Pietrișu, Dobrotinet). Satele situate pe malul vestic, în partea nordică a culoarului, includ terenuri agricole în vatră și au densități reduse de populație (comuna Ionești). Unele sate mari, cu o economie viticolă sau pomicolă (Prundeni, Orlești, Drăgoești, Olanu), au o formă polinucleară mai adunată, altele, care urcă pe văile afluențe Oltului (Dobroteasa pe Cunga, Dienci pe valea Sterpul, Casa Veche pe Trepteanca ș.a.), sînt ramificate. Satele din lunca Oltului (Vulturești, Buciumeni, Scăioși, Aurești etc.) sînt în general mici și adunate (fig. 137B).

Comparativ cu unitățile piemontane vecine, satele din Culoarul Oltului sînt mai mari. Cele mai numeroase (2/3) au peste 500 de locuitori. Satele cele mai mari, cu peste 1 500 de locuitori, sînt situate toate

pe dreapta Oltului: Călina Mare, Strejești de Sus, Prundeni, Orlești etc. (fig. 137A).

În tot culoarul, de la confluența cu Lunca-vățul pînă la Slatina, locuiesc aproximativ 71 500 de persoane (1985), ceea ce înseamnă un spor de peste 21 000 de persoane față de începutul secolului. În cadrul acesteia peste 3/4 o formează populația rurală.

Creșterea populației a înregistrat valori mai mari decît a celei din Piemontul Oltețului. În ultimele decenii se constată, însă, o stagnare și chiar o descreștere a acesteia (cu 10% în 1985 față de 1977). Creșteri importante și continue a înregistrat populația satelor apropiate orașelor Slatina și Rîmnicu Vilcea și a celor din regiunea viticolă Drăgășani. În general, culoarul este mai dens populat (100—150 loc./km² în partea centrală), decît unitățile piemontane vecine, unde valorile densității populației rămîn sub 100 loc./km². În ultimele decenii densitatea populației continuă să crească în aria viticolă Drăgășani, în timp ce pe versantul estic (comunele Verguleasa și Vulturești) scade ușor (sub 75 loc./km²).

Structura pe sexe a populației indică valea Oltului ca o arie echilibrată, în multe comune ponderea bărbaților depășind 50%. Acest aspect este o rezultantă a structurii economice mai complexe (viticultură, legumicultură, cultura cerealelor și creșterea animalelor) și a practicării navetismului spre orașele apropiate, ceea ce exclude sau diminuează necesitatea de a se schimba domiciliul stabil al populației ocupate în industrie.

Peste 2/3 din suprafața culoarului o reprezintă terenurile agricole. În partea sudică a văii și mai ales pe versantul estic, unde au o dezvoltare mare terasele inferioare, ponderea terenurilor agricole depășește chiar 4/5 din suprafața totală a comunelor (Pleșoiu 86,5%, Strejești 82,8%). În general 60—70% din suprafața comunelor și chiar a orașului Drăgășani este ocupată de terenuri agricole. Suprafața arabilă deține, mai ales în partea sudică, peste 80% din terenul agricol (Curtișoara 89,1%, Găneasa 84,7%, Strejești 87,4%, Olanu 81,8%).

Pe terenurile arabile se cultivă cereale (grâu, porumb), unele plante tehnice (floarea soarelui) și furajere, legume (ardei, ceapă, roșii, varză), mai ales în perimetrul comunelor din apropierea orașelor (Curtișoara, Strejești, Pleșoiu etc.). Creșterea animalelor

(bovine, porcine) are ponderi importante în comunele Strejești, Pleșoiu, Vulturești, Ionești etc.

În condițiile specifice de amenajare ale văii Oltului, terenurile ocupate cu ape reprezintă peste 8% din suprafața totală a regiunii și ajung la 10–20% în cazul comunelor Strejești, Grădiștea, Ștefănești și Prundeni. De asemenea, suprafețele ocupate cu păduri dețin, în unele comune, ponderi de peste 20% (Grădiștea 31,3%, Verguleasa 27,8%, Vulturești 22,4%). Masive compacte păduroase se află numai în partea de nord-vest a comunei Ionești, spre valea Luncăvătului. Pădurile (gorunete și fâgete în nord și cereto-girnițete în sud) ocupă, în general, versanții și terenurile mai accidentate dinspre Piemontul Oltețului și Cotmenei și unele terenuri din luncă (zăvoaie cu esențe moi). Pe partea estică a văii pădurea apare numai sub forma de petice izolate.

În lungul văii Oltului, pe versanți și pe terase se cultivă pe suprafețe întinse viță de vie și pomi fructiferi (fig. 137B). Încă la începutul secolului, referindu-se la această parte a Piemontului Getic, Emm. de Martonne (1902) arăta că orice grup de case era înconjurat de livezi. „Pe versanții expuși spre est prunii în plantații dense se amestecă cu viile. O impresie de viață, de bogăție, de abundență se degajă din toată această regiune” (*La Valachie*, p. 158). Cele mai mari suprafețe viticole se găsesc pe versantul vestic, unde se extinde podgoria Drăgășani. Aici viile urcă pe versanții piemontului la 200 m și chiar pe dealurile piemontane la aproape 300 m. Cele mai mari și compacte suprafețe viticole sînt cuprinse în limitele orașului Drăgășani (800 ha) și ale comunelor Prundeni (800 ha) și Orlești (500 ha), unde reprezintă 20–30% din suprafața totală. Vița de vie se cultivă și pe partea stîngă a Oltului, dar pe suprafețe mai mici (Verguleasa 189 ha, Vulturești 209 ha) și dispersate în teritoriu.

Cultura pomilor fructiferi (mai ales pruni și meri) are o tradiție veche în multe comune din valea Oltului, unde ocupă între 200 și 300 ha (Grădiștea, Dobroteasa, Strejești), reprezentînd de la 5% la 13% din suprafața totală a acestora. Ca și în cazul viței de vie, suprafețele cele mai importante cu pomi fructiferi se află pe terasele înalte și versanții cu expunere spre soare. Suprafețele cele mai mari le dețin unele comune de pe malul stîng, situate la nord de Drăgășani

(Dobroteasa, Vulturești, Verguleasa) și unele comune de pe malul drept de la sud de Drăgășani (Grădiștea, Strejești, Pleșoiu).

Culoarul Oltului se distinge ca o subunitate geografică aparte a Piemontului Getic, cu un specific propriu al economiei și vieții sociale. La aceasta a contribuit în mare parte caracterul lui de culoar de trecere accesibil, deschis, ușor de străbătut de la nord la sud, pe cînd unitățile vecine, cu un relief mai fragmentat au fost, în trecut, mai greu de străbătut și mai puțin valorificate economic. În lungul lui, preferînd malul drept al Oltului, se canalizează, încă din antichitate, legăturile comerciale rutiere ce legau ținuturile dunărene cu cele de peste Carpați. Același traseu îl împrumută la sfîrșitul secolului trecut și calea ferată ce leagă Corabia, prin Piatra Olt, de Rîmnicea Vilcea și de Sibiu.

Partea de nord a culoarului (inclusiv orașul Drăgășani) gravitează spre centrele urbane din valea Oltului subcarpatică, pe cînd partea de sud se orientează cu putere spre Slatina.

Singurul centru urban din această parte a văii Oltului este orașul Drăgășani, a cărui influență în teritoriu este restrînsă, spre el gravitînd doar comunele cu pregnant caracter viticol din apropiere (Prundeni, Orlești, Vulturești).

Orașul Drăgășani (22 084 de locuitori în 1992) s-a dezvoltat în culoarul Oltului ca centru comercial-agricol, în primul rînd ca centru viticol, în jurul lui extinzîndu-se podgoria, cu peste 12 000 ha, care îi poartă numele. Peste 25% din suprafața agricolă a orașului este cultivată cu viță de vie. Dezvoltat pe locul fostului castru roman Rusidava, orașul este menționat documentar ca așezare încă din secolul XVI (1535), iar ca centru urban începînd cu secolul XVIII. Drăgășani își păstrează caracterul de oraș agricol (viticol) pînă în deceniul șapte al secolului nostru. În prima jumătate a secolului XX creșterea populației a fost deosebit de lentă și a cunoscut chiar o ușoară scădere între cele două războaie mondiale. După 1960, aflat în plin proces de industrializare, înregistrează o creștere puternică, dublîndu-și numărul locuitorilor între 1956 și 1992. În limitele administrative ale orașului intră încă trei localități: satele Zlătărei, Valea Caselor și Zărneni. Între acestea, Zlătărei are peste 1 500 de locuitori, în timp ce celelalte două mai puțin de 200.

O impulsie a dezvoltării oraşului a fost dată de funcţia lui administrativă dintre 1956 şi 1968 (reşedinţă de raion) şi mai ales de apariţia unor activităţi industriale prin construcţia unui combinat de vinificaţie, a unor fabrici de talpă şi încălţăminte de cauciuc (1969), de mase plastice (1981) şi de jenţi pentru automobile, iar recent printr-o unitate de mecanică fină. Valoarea producţiei globale industriale a oraşului a crescut de 5—6 ori în 1985 faţă de anul 1970. Aproape 3/4 era dată de industria chimică şi 10—13% de industria alimentară. S-au produs schimbări importante în structura demografică (aproape 1/4 este provenită din comunele vecine), ca şi în fizionomia lui. Dintr-o aşezare cu aspect cvasiurban, alungită pe terasa Oltului şi traversată de căile de comunicaţie (rutiere şi feroviare), care leagă centrul de sudul ţării, oraşul Drăgăşani s-a transformat treptat într-o aşezare urbană modernă, cu cartiere noi de locuinţe (Tudor Vladimirescu, Rahova etc.) şi un centru civic restructurat, cu unităţi administrative, social-culturale şi comerciale adecvate.

5.11.7. Piemontul Cotmenei

Piemontul Cotmenei este situat între văile Topologului şi Oltului la vest, valea Argeşului la est, Cîmpia Boianului şi Cîmpia Piteştiului în sud (pe aliniamentul localităţilor Valea Mare, Potcoava, Corbu) şi Muscelele Argeşului în nord. Are forma unui triunghi, asemenea unui uriaş con de dejecţie, care are ca trăsături principale divergenţa reţelei de văi, panta în scădere continuă şi lărgirea interfluviilor netede de la nord la sud, prezenţa pinzei de apă la mare adâncime, predominanţa terenurilor agricole şi existenţa unor activităţi industriale pe baza resurselor naturale locale.

În peisaj se reflectă clar interferenţa pronunţată atât a caracterelor de cîmpie, cât şi a celor de podiş. Ca urmare, procesele pedogenetice şi înveliul vegetal prezintă caracter asemănătoare cu cele ale cîmpiei. Numai extremitatea nordică — apropiată de dealurile subcarpatice — se evidenţiază printr-o altă utilizare a terenurilor, respectiv pomicolă, viticolă şi păşuni, precum şi printr-o altă structură a aşezărilor (răsfirată şi adunată).

Altitudinile maxime în jur de 500 m sînt situate în extremitatea nordică, iar cele minime scad sub 200 m în sud. Cea mai extinsă treaptă hipsometrică este de 300—400 m (bine reprezentată între Vedeia şi Vedeia, unde lăţimea interfluviului depăşeşte 8 km, şi între Vedeia şi Cotmeana, pe interfluviul lat în jur de 10 km). La altitudini mai mari de 400 m, interfluviile se îngustează (între obârşia Vedei şi a Vedei, la 3 km, iar între Vedeia şi Cotmeana la circa 1 km). Partea sudică a Piemontului Cotmenei oscilează în jur de 200 m şi este marcată de obârşile unei noi generaţii de văi.

Treimea de nord a unităţii reprezintă o regiune piemontană înaltă, deluroasă, cu procese frecvente de degradare a versanţilor, care se continuă spre sud cu un podiş piemontan relativ uniform, ale cărui caractere, şi mai la sud, devin de adevărată cîmpie piemontană. Partea înaltă este puternic fragmentată de o reţea temporară, adîncită în cuvertura de pietrişuri şi nisipuri. Această adîncire contribuie la crearea unor dezechilibre de versant evidente pe văile Cotmenei, Vedei şi Vedei. Constituţia litologică a dat posibilitatea înaintării regresive rapide a obârşilor. Degradările cele mai intense se întîlnesc către Topolog şi Olt, adică acolo unde nivelul de bază local, mai coborît, a stimulat reţeaua torenţială.

Partea centrală a piemontului, relativ uniformă, are extensiunea cea mai mare şi reprezintă o arie de divergenţă hidrografică, favorizînd degradările de teren, aşa cum se înregistrează pe versanţii văilor Cîngrea Mare, Cîngrea Mică, Teslui, Plapcea, Vedeia, Vedeia etc. Regimul de torenţialitate al apelor explică, în mare măsură, intensă modelare a văilor şi lăţimea mare a acestora, în raport cu cursurile actuale (valea Teslui depăşeşte 500 m, a Vedei 600 m, iar a Cotmenei 800 m). Toate par înecate în aluviuni şi au un nivel de terasă de 5—8 m, cărui în aval se adaugă încă unul, pe care sînt dezvoltate aşezările omeneşti şi cuprind importante spaţii agricole.

Contactele dintre piemontul înalt şi piemontul central (pe aliniamentul Pogănu, Oporelu, Vedeia) sau contactul dintre acesta şi cîmpie (între obârşia Călmăţuiului, Vedeia şi Vedeia) se înscriu cu pantă cu valori mai mari, în general peste 5°, local chiar 10°. În aceste sectoare spălarea este mult mai activă. S-au făcut terasări, care au diminuat

numai în parte procesele de pantă, acestea fiind activate, în multe locuri, de practicarea aratului în lungul pantei. Spre marginea sudică, dinspre cîmpie, înaintează culoarele văilor largi, cu lunci extinse pe mai bine de un kilometru lățime și cu nivele de terase. Scăderea grosimii depozitelor piemontane, în această zonă, explică prezența apei mai aproape de suprafață și apariția unor izvoare la limita cuverturii de pietrișuri și nisipuri.

. Cuverturile groase de pietrișuri și nisipuri din Piemontul Cotmenei, cu o dispunere monoclină, permit infiltrarea apelor și deplasarea lor pe direcția nord-sud. Pinzele de apă se găsesc la adîncimi variate, în funcție de prezența stratului impermeabil. Apa este localizată și sub formă de lentile, ceea ce explică adîncimile diferite la care se găsește (de la 5—6 m. pînă la 30—40 m). Prezența, în general, a apelor la adîncimi mari face ca alimentarea subterană să fie, în cea mai mare parte, inexistentă, iar riurile autohtone să aibă caracter intermitent. Lacurile de acumulare de pe Olt sînt supuse unui proces activ de colmatare, ca urmare a debitului solid foarte ridicat al tuturor organismelor hidrografice din Piemontul Cotmenei și din Piemontul Oltețului. Se impune amenajarea tuturor văilor, întrucît regimul torențial creează posibilitatea declanșării unor importante degradări de teren.

Temperaturile medii anuale ating valori de peste 10°C, media lunii iulie fiind de 22°C, iar a celei mai reci de -2.4°C. Precipitațiile medii anuale sînt cuprinse între 580 și 600 mm, cu valori scăzute în timpul verii, cînd se instalează frecvent perioade de secetă. Temperaturile maxime absolute depășesc uneori 40°C, iar minimele absolute ajung la -33°C. Optimul termic se diminuează către extremitatea nordică a Piemontului Cotmenei, în raport și de desfășurarea treptelor hipsometrice. Temperaturile medii, în perioada de vegetație a culturilor agricole, se ridică la 18—20°C (tetraterma Mayer), ceea ce permite dezvoltarea culturilor cerealiere iubitoare de căldură. Fragmentarea reliefului determină formarea unui topoclimat, în lungul culoarelor de vale, favorabil culturilor vitipomicole (Teslui, Vedea, Plapcea etc.).

Interfluviile din nord sînt acoperite de gorunete, în care sînt frecvente, în proporții diferite, în funcție de factorii locali, inter-

calații de fag, tei, frasin, ulm etc., dînd acestor formații o nuanță de păduri de amestec.

În partea de sud a Piemontului Cotmenei apar formații vegetale reprezentate de stejărete sub formă de pilcuri, care aparțin subzonei pădurilor de stejari mezofili. Asociat stejarului pedunculat se remarcă ulmul, carpenul, teiul alb etc. Pot fi identificate frecvent și păduri de cer și gîrniță, acestea aparținînd pădurilor de stejari submezofili — termofili. Interfluviile, relativ netede și cu soluri predominant argiloase, sînt ocupate cu pilcuri extinse de păduri de gîrniță. Cea mai extinsă pădure de gîrniță se află la Seaca-Albești, care constituie cel mai compact areal de gîrniță din țară (2 000 ha) (fig. 138).

Defrișările făcute în vederea valorificării lemnului și a extinderii spațiului agricol au dus la degradarea asociațiilor vegetale și la mărirea intensității denudării. În prezent s-au creat perimetre de protecție în cadrul arealelor forestiere și se accentuează procesul de împădurire al versanților și al unor suprafețe interfluviale în vederea limitării proceselor de degradare. Și în viitor vor interveni mutații importante în structura învelișului vegetal, condiționate de amenajările integrale ale bazinelor hidrografice.

Uniformitatea relativă a suprafeței topografice permite apariția zonality latitudinale a solurilor și vegetației. În acest fel este evidentă succesiunea de soluri brun-roșcate de pădure în extremitatea nordică, continuate către sud cu solurile silvestre brune, brune podzolite și podzolice argilo-iluviale. Introducerea în circuitul agricol a terenurilor pe care se dezvoltă astfel de soluri a impus măsuri de fertilizare, aplicarea unor asolamente specifice.

În funcție de condițiile locale, solurile au cunoscut transformări radicale atît la nivelul interfluviilor, cît și al văilor. Ponderea ridicată a materialului argilos în cadrul depozitelor piemontane, regimul hidric din sol, gradul diferențiat de înclinare al suprafeței topografice etc. condiționează apariția a o serie de procese pedogenetice specifice. În zona de la est de Olt, mai ales la nivelul teraselor, apar soluri brun-roșcate de pădure, regosoluri și soluri erodate pe interfluvii, iar în zonele mai înalte, soluri silvestre podzolice. Frecvente sînt și procesele de pseudogleizare, acolo unde apele găsesc condiții de stagnare.




Fig. 138. Piemontul Cotmenei. Utilizarea terenurilor. 1, Teren arabil; 2, pășuni și fânețe; 3, livezi; 4, vii; 5, utilizări mixte; 6, păduri; 7, vetre de așezări; 8, exploatare de țifet; 9, de gaze naturale; 10, drumuri.

Acest mozaic de soluri impune o serie de măsuri agroameliorative în vederea ridicării fertilității lor, a introducerii în circuitul agricol a noi suprafețe. Acest lucru este solicitat și de faptul că eroziunea terenurilor este accentuată atît sub forma ablației, cît și a celei torențiale. Limitarea ei este o acțiune în curs de desfășurare, ea necesitînd, însă, studii cu caracter prospectiv care trebuie să vizeze întregul complex de factori. Astfel, sînt cunoscute lucrările experimentale din cadrul stațiunii de la Albota, sau cele care au condus la fixarea versanților prin planificații bine organizate pe văile Plapcei și Dîrjovului, ca și în lungul văii Oltului.

Piemontul Cotmenei, teritoriu de vechi locuire (dovadă vestigiile paleolitice de pe valea Dîrjovului, cele neolitice de pe valea Plapcei și din alte areale geografice), a cunoscut o intensă și continuă populare. Încă din prima jumătate a secolului XIX populația se ridică la 45 000 de locuitori (1835), iar în continuare, timp de 77 ani, a sporit cu 20 600 de persoane. Între recensămintele din 1956 (211 547 de locuitori) și 1977 (214 449 de locuitori) se înregistrează o creștere redusă a populației, datorită deplasării definitive a unor locuitori în orașele Slatina, Pitești, Rîmnicu Vilcea ș.a.

Așezările rurale sînt concentrate cu precădere în lungul văilor (Teshui, Oporelu, Curtișoara, Tătulești, Optași-Măgura etc.) și în bună măsură pe spațiile interfluviale (Potcoava, Drăganu, Morărești, Priseaca etc.), unde sursele de apă se află la mare adîncime, ceea ce a determinat populația să construiască banturi de retenție (fig. 138).

În Piemontul Cotmenei predomină satele ce au între 500 și 1 000 de locuitori. Acestea, în număr de 114, existente în părțile centrală și vestică ale piemontului (Jitaru, Constanținești, Verguleasa, Vitomirești, Comănița, Deleni ș.a.) însumează peste o treime din totalul populației (37%). Satele cu 250—500 de locuitori, cele mai numeroase (134 sate), grupează aproape 23% din numărul total de locuitori al piemontului. Acestea, ca și cele cu sub 250 de locuitori (în număr de 114, care totalizează în jur de 8% din populație) sînt localizate, cu precădere, în extremitatea nordică a piemontului, unde fragmentarea reliefului și gradul de împădurire sînt mai ridicate, iar posibilitățile de extindere și organizare a vetrelor de sat sînt limitate de procesele de degradare a tere-

nurilor (Tomulești, Bunești, Drăgoești ș.a. care au fiecare sub 120 locuitori) (fig. 139).

Așezările cu 1 000—1 500 de locuitori, în număr de 32 (peste 18% din totalul populației) și cele 12 cu 1 500—2 500 de locuitori, ce însumează 11% din numărul populației, ca și cele cu peste 2 500 de locuitori se găsesc concentrate în extremitatea sudică a piemontului, la contactul cu Cîmpia Boianu (Scornicești, Optași-Măgura, Valea Mare, Potcoava, Stolnici etc.) și în lungul văii Oltului (Curtișoara, Teshui, Dumitrești, Pogănu, Vulturești etc.). Din cele 408 așezări, doar două depășesc 2 500 de locuitori (Vitănești 3 000 de locuitori, Bascov 3 345 de locuitori, în 1985).

Tipurile funcționale de așezări rurale reflectă diversitatea sistemelor agroproductive, potențialul resurselor energetice (petrol, cărbune) și miniere (materiale de construcții), gradul de dezvoltare economică a localităților rurale și a celor urbane existente la periferia piemontului (Slatina, Pitești), dar care au o puternică influență în teritoriile limitrofe sub raport economic, al atragerii resurselor de muncă.

Funcția agrară a Piemontului Cotmeana este predominantă; circa trei pătrimi din totalul satelor sînt profilate pe activități cerealiere, pomicole și de creșterea animalelor. Un număr redus de așezări (Poiana Lacului, Potcoava, Verguleasa ș.a.) au funcții agroindustriale (extracția petrolului). Comunele Vedea, Cotmeana, Moșoaia, Albota au funcții agroindustriale și de servicii, determinate de practicarea agriculturii, de exploatarea petrolului (Vedea, Moșoaia), de prelucrarea lemnului (Cotmeana) sau de unele activități de servicii. O parte a populației active din satele Piemontului Cotmenei se deplasează zilnic pentru lucru în orașele Slatina, Pitești, Curtea de Argeș și Rîmnicu Vilcea.


Modificarea bazei economice, prin construirea unor unități industriale și agroindustriale, intensificarea exploatarea petrolului, a modernizării agriculturii și căilor de comunicație au dus la reprofilarea multor localități, unele din ele evoluînd spre forme urbane (Scornicești, Vitomirești, Vedea, Potcoava ș.a.).

Activitățile productive sînt în deplină concordanță cu structura și repartitia teritorială a categoriilor de folosință a terenurilor. Economia animalieră, cu caracter intensiv, a fost predominantă pînă în a doua

jumătate a secolului XIX, când se extind tot mai mult aşezările rurale pe versanţi şi pe unele interfluvii, ceea ce a produs modificări spaţiale şi funcţionale ale fondului funciar.

sînt alcătuite cu precădere din plantaţii de prun, după care urmează cele de măr şi păr. Cele mai importante centre pomicele sînt: Vedeia (peste 1 200 ha), Cocu, Moşoaia, Săpata, Băbana etc. cu cîte 500–800 ha.

Fig. 139. Tip de sat din Piemontul Cotmenei. 1, Pădure; 2, livezi; 3, teren arabil.



Reducerea arealului forestier şi al pajiştilor naturale s-a făcut în favoarea culturilor agricole. Documentele cartografice de la sfîrşitul secolului XVIII (1790) şi din prima jumătate a secolului XIX (1835) consemnează prezenţa terenurilor arabile şi pomiviticele în preajma vetrelor de sat. După un interval de numai 22 de ani, pe harta din 1857, Piemontul Cotmeana apare cu un grad mai avansat de despădurire şi desfele-nire. Acţiunea de extindere a terenurilor agricole a continuat şi în deceniile următoare, pe măsura creşterii numărului de locuitori. Ca urmare se schimbă şi caracterul economiei, devenind predominant agricol.

Terenurile arabile (peste 115 000 ha) sînt cultivate îndeosebi cu cereale (porumb, grîu, orz), cele mai mari frecvenţe întîlnindu-se în părţile centrală şi sudică ale piemontului.

Cultura pomilor fructiferi s-a extins mai ales în jumătatea nordică a piemontului şi pe versanţii văilor. Cele peste 20 000 ha livezi

Cultura viţei de vie, extinsă pe numai 4 200 ha, apare în general dispersată în teritoriu şi mai ales în limitele vetrelor de sat. Areele compacte se întîlnesc pe versanţii cu expunere sudică şi estică din extremitatea sudică a piemontului, în lungul văilor Teslui, Cotmeana, Vedeia, Vedeia. La Simbureşti şi împrejurimi s-a constituit un areal vitipomicol, cuprinzînd 800 ha vii şi pepiniere viticole şi 1 560 ha plantaţii pomicele. Cea mai reprezentativă unitate este la Simbureşti cu un total de 155 ha vii din soiuri roşii superioare (Cabernet şi Sauvignon 80%, Pinot Noir şi Merlot 20%) şi 6 ferme pomicele organizate în sistem intensiv şi super-intensiv.

În condiţiile generale de organizare a teritoriului se înscriu şi lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice. Lucrări hidrotehnice au fost executate pe văile Teiuş, Şuica, Plapcea Mică ş.a., asigurîndu-se astfel apa necesară pentru centrele populate, industrie, piscicultură şi dezvoltarea activităţilor de

agrement, pentru irigarea terenurilor agricole.

Pe valea Teiuşului, s-a construit în 1961 un lac de acumulare ce se extinde pe 22 ha şi cu un volum mediu de apă de 860 000 m³. De asemenea, lacul Şuica, construit în 1969 pe riul cu acelaşi nume, cuprinde o suprafaţă de 15 ha şi un volum mediu de apă de 320 000 m³. Cel mai extins şi cu utilizarea cea mai complexă este lacul Rusciori de pe Plapcea Mică, situat la nord de localitatea Scorniceşti. Acest lac, format în 1976, are o suprafaţă de 72 ha şi un volum mediu de apă de 280 000 m³; îndeplineşte funcţii multiple, fiind folosit la irigarea terenurilor agricole, alimentarea cu apă a unităţilor industriale din Scorniceşti şi pentru piscicultură.

Activităţi industriale şi social-culturale au fost dezvoltate în multe localităţi (Scorniceşti, Potcoava, Vitomireşti, Vedea etc.), care au contribuit la accentuarea profilului lor agroindustrial şi la ridicarea nivelului de trai material şi social-cultural al populaţiei.

În anul 1989, comuna Scorniceşti a fost trecută în rîndul centrelor urbane, devenind astfel prima (şi singura) aşezare din Piemontul Cotmenei cu statut de oraş. Aici funcţionează o întreprindere de piese şi subansamble auto, o fabrică de sticlă pe bază de deşeuri, o secţie de mase plastice, o întreprindere de confecţii şi unităţi de industrie alimentară profilate pe valorificarea resurselor agricole locale. Oraşul Scorniceşti avea, în 1992, 13 986 de locuitori, din care o mare parte sînt angajaţi în activităţi neagricole. Devenind un centru de convergenţă umană, în unităţile sale economice lucrează şi forţa de muncă venită din aşezările rurale apropiate.

În procesul de organizare a teritoriului se înscrie şi reţeaua rutieră, care a fost modernizată şi orientată în raport cu necesităţile economiei. Au fost modernizate drumurile Piteşti—Vedea—Drăgăşani, Piteşti—Cotmeana (la periferia piemontului) şi Piteşti—Coloneşti, Scorniceşti—Slatina. De asemenea, s-au aplicat îmbrăcămînti asfaltice de tip uşor pe drumurile Scorniceşti—Poboru, Curtişoara—Deleni—Oteştii de Jos, Teslui—Oporelu—Vultureşti—Vitomireşti ş.a., ceea ce a permis atragerea în activităţi economico-sociale a unui număr mai mare de locuitori din satele aflate la distanţe de drumuri naţionale şi de cele judeţene, la

intensificarea legăturilor economice şi a influenţelor reciproce dintre localităţi.

Procesul de integrare a agriculturii cu industria a produs unele modificări în funcţia şi fizionomia unor aşezări rurale. Organizarea reţelei de drumuri, captarea izvoarelor, corecţia torenţilor şi terasarea versanţilor vor duce, în continuare, la extinderea suprafeţelor agricole şi la noi modificări în structura social-economică a Piemontului Cotmenei.

5.11.8. Gruirile Argeşului

Unitatea geografică cunoscută sub numele de Gruirile Argeşului (denumire atribuită de V. Mihăilescu, 1966) are forma unui triunghi cu virful în jos, delimitat de Argeş la vest şi de Argeşel la est (confluenţa lor constituind virful triunghiului), iar la nord, linia desfăşurată pe direcţia est—vest, între localităţile Hîrtieşti şi Băiculeşti, precizează contactul cu Subcarpaţii. Se întind pe o suprafaţă de aproape 580 km² şi au, în ansamblu, aspectul de culmi netede, cu altitudini de 400—600 m, alungite pe direcţia nord-sud şi care se termină cu „gruiuri” însoţite de terase în dreptul punctelor de confluenţă ale Argeşului, Vilsanului, Rîului Doamnei, Brătiei, Rîului Tîrgului şi Argeşelului.

Datorită energiei de relief cu valori însemnate şi constituţiei geologice reprezentată de o cuvertură de depozite piemontane fluvio-lacustre, pliocen-cuaternare ce acoperă formaţiuni mio-pliocene, procesele de degradare sînt intense, mai ales în perioadele ploioase, şi afectează suprafeţe apreciable în raza comunelor Mălureni, Coşeşti şi Mihăeşti.

În formaţiunile sarmaţianului şi helveţianului, ca şi în cele paleogene sînt cantonate, la adîncimi cuprinse între 1 000 şi 3 500 m, zăcăminte de petrol, exploatate în apropierea localităţii Merişani.

Riurile principale au regim hidric permanent, cu ape mai bogate în prima parte a primăverii şi în cea de a doua a toamnei — ca urmare a alimentării lor pluvio-nivale —, în timp ce afluenţii au regim hidric temporar (activ în perioadele cu ploi abundente sau torenţiale). Cel mai mare debit mediu îl are Rîul Doamnei (22 m³/s), după care urmează Rîul Tîrgului (12 m³/s) şi Vilsanul (4 m³/s). Volumul maxim de scurgere (50—

60%) are loc în martie, iar cel minim în octombrie (1—2%). Densitatea medie a rețelei hidrografice este de 0,3 km/km² în partea de nord și de 0,5 km/km² în partea de sud — în zona de înmănunchere a râurilor ce străbat Gruirile Argeșului.

Această regiune a întrunit condiții favorabile vieții omului, care a locuit aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri. Vestigiile arheologice dovedesc o locuire intensă a văilor, cum sînt cele puse în evidență la Țițești încă din perioada Hallstatt, sau cele de la Micești și Țițești din epoca romană. Documentele istorice atestă prezența unor așezări bine conturate și dezvoltate, care, fără îndoială, au o existență mult mai veche decît perioada de timp cînd au fost consemnate documentar. Astfel, Micești este atestat în 1456, iar Țițești în 1464.

Evoluția numerică a populației scoate în evidență o continuă creștere a numărului de locuitori, de la circa 12 000 în 1835, la 26 000 în 1912, la 33 000 în 1930, la 50 000 în 1977 și la 54 000 în 1985. Aceasta înseamnă că rata medie anuală a creșterii a fost de 12—13‰ în perioada 1835—1912, de 15‰ între 1912 și 1930, de 9—10‰ între 1930 și 1977 și de 8‰ în perioada 1977—1985. În ultimii 15 ani, deși rata natalității a fost în general de peste 10‰, totuși, datorită faptului că rata mișcării migratorii a fost ușor negativă, a rezultat o scădere a sporului total.

Structura profesională este net dominată de activitățile agricole în mai toate comunele (60—80% din populația activă); în Stîlpeni populația activă este în majoritate ocupată în industrie, iar în Țițești și Băiculești, alături de agricultură, o pondere însemnată are și populația (navetistă) din industrie.

Densitatea medie a populației este de aproape 90 loc./km², dar se înregistrează deosebiri locale apreciabile. Astfel, în timp ce comunele mai bine dezvoltate economic, situate în sud-est, au densități ce depășesc 100 loc./km² (Țițești, Stîlpeni, Dîrmănești ș.a.), cele cu profil net agricol au densități sub 70 loc./km² (Davidești, Mălureni).

În cadrul Gruirilor Argeșului sînt 64 de sate. După așezarea lor, în funcție de formele de relief, sînt sate de vale sau de terase; după formă sînt în general liniare — alungite în lungul văii; după structură sînt adunate sau risipite (pe văile Vilsanului, Rîului Doamnei și Bratiei).

În general, sînt așezări mici, peste 2 000 de locuitori avînd numai Mihăești, Stîlpeni, Mălureni, Băiculești și Țițești. Cu excepția localităților Stîlpeni și Băiculești, care au un profil industrial-agricol, toate celelalte au profil agricol — cu nuanțe pomicole (Bălilești, Dîrmănești), zootehnice (Davidești), și pomicole și zootehnice (Mălureni, Mihăești, Coșești) (fig. 140).

Olima este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 7—9°C, mediile lunare ale iernii coborînd pînă la -3°C, iar cele ale verii atingînd 21°C. Cele mai scăzute temperaturi se înregistrează pe podul interfluvioilor (gruiurilor), pe văi înregistrîndu-se uneori inversiuni ușoare de temperatură. Înghețul apare în general în a doua jumătate a lunii octombrie, iar ultimul îngheț se înregistrează în luna aprilie. Precipitațiile medii anuale ajung pînă la 800 mm, fiind mai bogate primăvara (mai și iunie). Cele mai frecvente vînturi sînt cele de nord-est și nord, care, uneori, se canalizează pe văi, luînd direcția acestora.

Solurile predominante sînt cele argilo-iluviale podzolice și argiloiluviale brune podzolite, brune și brune acide, ale căror arii se desfășoară în lungul gruiurilor, deci cu orientare nord—sud.

Condițiile pedoclimatice și caracterele morfohidrografice și-au pus amprenta și asupra utilizării teritoriului, în care domină terenurile forestiere (51% din suprafața totală a Gruirilor Argeșului), după care urmează terenurile agricole (41,8%).

Suprafața forestieră, de peste 28 000 ha, constituie o particularitate, ea reprezentînd mai mult de 60% din teritoriul administrativ al unor comune (Mălureni, Coșești, Bălilești, Davidești, Micești). Existența rezervației forestiere (parc dendrologic) de la Mihăești conferă o valoare în plus fondului forestier al Gruirilor Argeșului.

Pădurile sînt alcătuite în cea mai mare parte din fag în jumătatea nordică și din stejar în cea sudică. Fondul forestier, în afara lemnului pentru industrializare, construcții și foc, oferă și unele produse secundare, precum ciuperci, coarne, mure, măceșe.

Cele peste 23 000 ha terenuri agricole au următoarea structură: 40,5% pășuni și fi-nețe naturale, 32,3% arabil, 27,2% livezi (vile ocupă numai 28 ha).

Terenurile arabile, mai întinse în comunele Băiculești, Mălureni, Mărăcineni, Micești și Mihăești (între 1 300 și 800 ha),

sînt cultivate în proporții de 60—70% cu cereale (în special porumb), cu plante furajere și cu cartofi.

Livezile, prin suprafețele însemnate răspîndite în tot teritoriul, constituie o caracteristică în Gruiurile Argeșului. Repartiția

Pitești—Curtea de Argeș și Pitești—Cîmpulung și pe drumurile naționale modernizate ce însoțesc căile ferate menționate, care leagă Gruiurile Argeșului de orașul Pitești și de regiunea de la nord (orașele Curtea de Argeș, Cîmpulung). De asemenea,




Fig. 140. Gruiurile Argeșului. Mărimea așezărilor și utilizarea terenurilor. 1, Terenuri agricole predominant arabile; 2, suprafețe împădurite; 3, terenuri agricole cu predominanța livezilor și fînețelor; 4, drumuri; 5, căi ferate.

pe comune a terenurilor pomicole evidențiază însemnătatea lor în economia tuturor localităților. Astfel, cele mai mici suprafețe sînt de 250—375 ha (Țițești, Davidești, Micești), iar cele mai mari suprafețe pe comune depășesc 1 000 ha (Mihăești, Băilești). Cei mai numeroși sînt prunii, după care urmează merii, apoi perii și nucii.

Beneficiind de o bază furajeră bogată — pășunile și fînețele naturale ocupă mari întinderi în comunele Mălureni, Mihăești, Coșești și Băiculești (între 3 400 și 1 100 lia), care concentrează, de altfel, aproape 3/4 din suprafața de pășuni și fînețe a Gruiurilor Argeșului —, creșterea animalelor are o dezvoltare apreciabilă în toate localitățile, ovinele și bovinele înregistrînd efective mari în toată regiunea. La Davidești este un mare complex pentru creșterea bovinelor.

Industria, bazată pe prelucrarea unor materii prime locale, este prezentă la Stîlpeni (prelucrarea lemnului), Băiculești (conserve de legume și fructe), Coșești (prelucrarea lemnului).

Transportul de produse și de călători se efectuează cu precădere pe drumurile de pe văile principale longitudinale, pe căile ferate

drumurile modernizate Merișani—Brădet și Piscani—Domnești au o deosebită importanță pentru transportul intraregional.

Potențialul turistic, reprezentat de Parcul dendrologic de la Mihăești, mănăstirile de la Valea Mănăstirii (mănăstirea Valea) și de la Băiculești (mănăstirea Tutana), Conacul Budiștenilor și Casa Hagi Tudoraचे de la Budeasa Mare, articolele artistice de la Coșești (olărit, obiecte din lemn) etc., atrage un număr însemnat de turiști.

5.11.9. Piemontul Cîndești

Unitate geografică clar delimitată de văile Argeșului, la vest, Dîmboviței, la est și de lunca Argeșului, la sud (contactul făcîndu-se pe linia localităților Ștefănești, Topoloveni, Leordeni și Mislea), Piemontul Cîndești se caracterizează prin existența unui relief tabular, cu aspectul unui uriaș con de dejecție, fragmentat de afluenții Argeșului de pe stînga, avale de Argeșel, și Sa-barului din cursul său superior. Altitudinea coboară treptat din nord de la 745 m (în Dealul Perilor) pînă la 200 m în sud, dar

suprafața piemontului prezintă și o ușoară înclinare de la nord-est spre sud-vest. Suprafața piemontană inițială a fost disecată de văi, astfel că relieful apare ca o succesiune de poduri, cu lățimi de 1 la 3 km, în mare parte împădurite și cu un înveliș de soluri argiloiluviale podzolice, negre argiloase și argiloiluviale pseudogleice podzolice. Pe unele dintre ele se semnalează mici arii înmlăștinite.

Constituția geologică reflectă în mod evident evoluția piemontului și explică aspectul actual al reliefului. Sub stratul lutos de la suprafață, gros de 5–8 m, se află un orizont de pietrișuri — pietrișurile de Cindești —, cu grosimi ce scad de la 15 m în nord, la 3–4 m în sud-est, iar sub acestea apar alternanțe de nisipuri, marne și argile pliocene. În formațiunile meoțiene și helvețiene sînt cantonate zăcămintele de petrol — într-o structură sub forma unui anticlinal faliat între Dragomirești și Ludești —, ca și în formațiunile meoțiene și sarmațiene — în zona Lucieni—Crîngurile—Bogați. Principalele exploataări de petrol se fac în raza localităților Ludești, Hulubești, Lucieni, Cobia, Crîngurile, Bogați, Topoloveni, Leordeni, Priboeni, Călinești etc.

Adîncirea puternică a văilor în cuaternar a dus la accentuarea energiei de relief și la crearea unor interfluvii alungite de la nord spre sud. Datorită acestei energii de relief, ca și naturii rocilor, alunecările sînt frecvente și au intensitate mare.

Rețeaua hidrografică (piraele afluențe Argeșului și Argeșelului și obîrșile Sabarului și Potopului) are orientare generală nord—sud și regim temporar.

Particularitățile morfohidrografice ale Piemontului Cindești au favorizat stabilirea populației de-a lungul văilor, unde existau condiții pentru extinderea vetrelor, alimentarea cu apă, practicarea agriculturii și creșterea animalelor. Interfluviile au fost evitate în cea mai mare parte, datorită lipsei apei (pinza freatică aflîndu-se la adîncimi mari) și dificultăților de circulație.

Din punct de vedere climatic, Piemontul Cindești se înscrie cu temperaturi medii anuale cuprinse între 8 și 10°C, mediile de iarnă fiind de -2...-4°C, iar cele de vară între 20° și 22°C. Temperaturile mai scăzute apar pe podul interfluviilor, văile fiind arii de adăpost și nu de producere a inversiunilor termice. Precipitațiile au valori medii anuale cuprinse între 600 și 800 m, mai bogate în

nord decît în sud și în cantități mai mari primăvara.

Dominante sînt vînturile de nord-est și nord în tot timpul anului, dar primăvara și vara se manifestă și din sud-vest.

Vestigiile arheologice, puse în evidență la Beleți-Negrești, dovedesc existența unor așezări bine conturate și a unei populații stabile încă de la sfîrșitul Hallstattului. În perioada daco-romană și mai tîrziu, pe tot timpul migrației popoarelor, aici au existat numeroase așezări, cu un număr însemnat de locuitori. Faptul că pe văile Argeșului și Dimboviței treceau în secolele XIII—XV două drumuri comerciale ce făceau legătura între portul Giurgiu și orașele Sibiu și Brașov atestă că aici au existat unele așezări mari cu funcție de tîrg sau de popas (poștă). În diferite documente istorice (*Documenta Romaniae Historica*, B. Țara Românească, I (1247—1500), 1965) sînt menționate Călinești (1388), Cîrstieni (1498) (com. Călinești), Ștefănești (1452), Izvorani (1493) (com. Ștefănești), Topoloveni și Vitichești (1464), înglobat în prezent la orașul Topoloveni.

Numărul locuitorilor din Piemontul Cindești era la prima mențiune statistică din 1835 de peste 20 000, crescînd apoi la 51 000 în 1912, la 62 000 în 1930, la aproape 90 000 în 1977 și la peste 98 000 de locuitori în 1985.

În perioada 1835—1912 rata medie a creșterii anuale a fost de aproape 20‰, iar în perioada 1912—1930 de peste 12‰, datorîndu-se atît sporului natural, cît și celui migrator, în aceste perioade aici venind multe elemente transilvănene, care s-au stabilit mai ales în ariile despădurite din sudul piemontului. În perioada 1930—1977, creșterea medie anuală a fost de 9,5‰, iar în perioada 1977—1985 de peste 11‰. Dacă pînă în 1966 principalul rol l-a avut sporul natural, în perioadele următoare sporul migrator a înregistrat un aport substanțial, mai ales în comunele din apropierea orașelor.

Structura profesională este dominată de cei ocupați în agricultură (60—80%), apoi în industrie (extractivă și prelucrătoare), construcții și servicii diferite. Deplasările navetiste pentru lucru se înscriu cu valori apreciable, mai ales în partea de sud și sud-est, spre Pitești și spre unitățile industriale și agricole din localitățile de la

contactul cu cîmpia (Colibași, Găești, Ștefănești, Topoloveni etc.).

Densitatea medie a populației este în prezent de aproape 104 loc./km², prezentînd, însă, diferențieri: în părțile de nord și centrală se întîlnesc densități de 50–60 loc./km²

nești, Gorănești, Paraschivești, Valea Neniei, Beleți, Glimbocelu, Schitu Scoicești), iar în partea centrală a piemontului cu structuri răsfirate (Zgripcești, Botеști).

Mărimea așezărilor este strîns legată de evoluția teritorială și funcțională și de dez-




Fig. 141. Piemontul Cîndești. Mărimea așezărilor și utilizarea terenurilor. 1, Păduri; 2, livezi; 3, vii; 4, pășuni și fînețe; 5, teren arabil; 6, exploatare de țiței; 7, drumuri.

(Beleți-Negrești, Dobrești, Botеști, Ludești), în timp ce în sud și sud-est densitățile depășesc 100 și chiar 200 loc./km² (Ștefănești și Topoloveni, peste 200, Colibași, Leordeni, Călinești, Mănești, peste 100 loc./km²).

Așezările omenеști sînt în număr de 90, din care două orașe — Colibași și Topoloveni. Acestea sînt amplasate în cea mai mare parte pe văile ce străbat piemontul sau la contactul celor care îl mărginesc. Numai cîteva localități: Cîndești-Deal, Moșteni-Greci (com. Botеști), Picior de Munte (com. Dragomirna) sînt situate pe podul interfluviilor (fig. 141).

După amplasarea lor, se deosebesc așezări de interfluviu (cele menționate mai înainte), de terasă (Colibași, Mioveni, Racovița) și de vale și de versant (restul așezărilor).

După formă, predomină așezările uniliniare, alungite pe fundul văilor, cu texturi simple și structuri în general adunate (Vră-

voltarea economică, cele mai mari sate fiind situate în sudul și sud-estul piemontului (peste 1 000 de locuitori — Ștefănești, Călinești, Hulubești, Ludești, Leordeni, Bogăți).

Structura funcțională a localităților este dominată de tipul agricol cu nuanțe de specializare: viticol, pomicol (Botеști, Dobrești, Priboieni, Cîndești, Mănești, Ludești), zootehnic (Beleți, Tătărani, Hulubești), apărînd și cîteva localități agricol-industriale (Leordeni, Călinești, Cobia, Ștefănești, Bogăți) sau industrial-agricole (Topoloveni, Colibași).

Orașul Colibași (declarat centru urban în 1989) este cunoscut îndeosebi prin industria construcțiilor de mașini. Aici funcționează uzinele pentru fabricarea autoturismelor Dacia. În ultimele decenii a atras un număr mare de muncitori și ca urmare populația a atins, în anul 1992, 33 547 de locuitori.

Orașul Topoloveni, format în 1968 din localitățile Topoloveni, Goleștii Badii și Vitichești, este așezat la contactul luncii Argeșului cu Piemontul Cindești, în aria de confluență a Circinovului. Menționată documentar în 1464, localitatea se dezvoltă din ce în ce mai mult, impunându-se atât ca număr de locuitori, cât și ca centru economic de polarizare între așezările apropiate. Apariția industriei (conserve de legume și fructe, producerea vinurilor) a constituit o nouă etapă în dezvoltarea localității, atât funcțională (ca centru de convergență), cât și teritorială. În cadrul agriculturii, viticultura și pomicultura dețin un rol însemnat. Centru urban și industrial-agrar, orașul Topoloveni avea 9 455 de locuitori în 1992 (în 1835 număra 560 locuitori, iar în 1912 depășise 3 500 locuitori).

Vegetația este reprezentată de păduri întinse de fag, gorun, cer și gârniță și de pajiști de silvostepă, iar solurile cele mai frecvente sînt cele argiloiluviale podzolice pseudogleizate și pseudogleice, argiloiluviale brune podzolite și brune (eubazice și mezobazice).

Condițiile pedoclimatice și de relief, ca și cele social-economice au făcut ca principala ramură de activitate a Piemontului Cindești să fie agricultura. Industria, mai puțin dezvoltată, se axează pe exploatarea petrolului și a unor materii prime de importanță locală (lemn, produse agricole).

Particularitățile morfohidrografice și pedoclimatice au influențat mult și structura utilizării terenurilor, în care pe primul loc se înscriu terenurile forestiere (cu 44,3%), după care urmează terenurile agricole (43,4%).

Terenurile forestiere mai întinse odinioară — harta Szathmary din 1857 arătînd o netă predominanță a acestora în întregul piemont — acoperă o suprafață totală de peste 40 000 ha. Suprafețele forestiere au ponderi majoritare în ariile administrative ale comunelor Dobrești și Ludești (65%), Hulubești (61%) și orașului Colibași (55%). Pădurile din partea nordică a piemontului, situate în general la peste 400 m altitudine, sînt formate din fag, iar cele din sud din stejar și gârniță. Exploatarea forestieră se face în raza comunelor Bogăți, Dobrești, Cindești, Ludești, Hulubești, Călinești, lemnul fiind prelucrat la Stilpeni și la Pitești sau livrat ca lemn de construcții și pentru foc în diferite regiuni ale țării. Din păduri, anual

se recoltează cantități însemnate de ciuperci (20—30 t), măceșe (30—40 t), coarne (40 t), mure (15—20 t), iar fondul de vînătoare asigură peste 1 000 kg carne de iepure.

Terenurile agricole însumează peste 39 000 ha, ponderi mai însemnate, din suprafețele totale, deținînd comunele Valea Mare și Leordeni (peste 60%), Crîngurile, Ștefănești și Bogăți (peste 50%); ponderi reduse se înregistrează în Cobia (27%) și Dobrești (sub 30%).

În cadrul terenurilor agricole, cele mai întinse suprafețe revin categoriei arabile (45%), după care urmează pășunile și fînețele naturale (26%), livezile (22,2%) și pe ultimul loc viile (6,8). Cu caracter local, însă, unele arii se evidențiază prin importanța mai mare a pomiculturii (Bogăți) sau viticulturii (Călinești, Topoloveni, Ștefănești), alături de culturile de cîmp ca și a pășunilor și fînețelor naturale.

Din suprafața arabilă, de peste 17 500 ha, circa 70% sînt cultivate cu cereale (mai mult porumb și mai puțin grâu), cele mai însemnate suprafețe aflîndu-se în comunele Crîngurile, Leordeni, Valea Mare, Călinești, Ștefănești și în orașul Colibași. Culturile furajere dețin aproape 10% din suprafața arabilă, avînd o frecvență mai mare în partea sudică a piemontului (Crîngurile, Valea Mare, Călinești, Leordeni, Ștefănești, Colibași).

Cartoful, cu o pondere generală de peste 7% din suprafața arabilă, ca și legumele, cu peste 5%, sînt localizate cu precădere pe văi și la contactul piemontului cu Lunca Argeșului.

Terenurile pomicole dau o notă cu totul aparte Piemontului Cindești. Cu excepția comunei Crîngurile, toate comunele acestei regiuni au suprafețe pomicole de peste 250 ha (Bogăți, 1 120 ha, Călinești, Leordeni, Ludești peste 600 ha, Ștefănești, Beleți—Negrești peste 500 ha), neexistînd din acest punct de vedere diferențe mari între părțile de nord și de sud. Ca frecvență în cadrul suprafețelor agricole, livezile înregistrează valori mai însemnate în comunele Dobrești, Mănești, Priboieni (peste 35%).

Soiul predominant este prunul, fructele fiind folosite mai mult pentru fabricarea țuicii, dar și pentru producția de compoturi și „pulpe”, ca și pentru uscat și afumat (este, pentru această regiune, un mod caracteristic de conservare și prelucrare). În ultimul deceniu, însă, o mare răspîndire au

luat merii și apoi perii, livezile intensive create fiind alcătuite din soiuri de mare productivitate care dau producții de calitate superioară. Pentru dezvoltarea intensivă a pomiculturii de aici un rol de seamă l-au avut stațiunile de la Voinești și Mărcineni. Cireșii și vișinii, apoi nucii întregesc gama de pomi fructiferi ai livezilor. Piemontul Cindești este cunoscut nu numai în țară pentru producția unor soiuri de mere și pere de calitate, ci și peste hotare.

Terenurile viticole în suprafață totală de peste 2 700 ha sînt concentrate, în proporție de 85%, în extremitatea sud-estică a piemontului, în fișia de contact cu valea Argeșului. Terenurile însoțite de aici, cu soluri favorabile, au constituit și în trecut arii viticole cunoscute, însă plantațiile masive efectuate după 1960, mai ales prin terasarea pantelor, au înseris această regiune printre cele mai renumite și apreciate podgorii ale țării.

Cele mai răspândite soiuri pentru vin sînt Feteasca regală, Sauvignon alb, Riesling, Tămîioasă românească și Pinot, iar de masă Chasselas Doré, Hamburg, Afuz Ali. Centrele viticole de bază, Ștefănești, Călinești, Topoloveni și Leordeni, însumează o suprafață de 2 230 ha. Stațiunea de cercetări de la Ștefănești a avut un rol de seamă în crearea de soiuri adaptate la condițiile naturale ale regiunii și la extinderea viilor.


Întinzîndu-se pe o suprafață totală de peste 10 200 ha, pășunile și fînețele naturale ocupă în cîteva arii suprafețe întinse. Astfel, în comuna Cindești pășunile și fînețele dețin peste 50% din terenurile agricole, iar în comunele Ludești, Priboieni, Domnești, Bogați și Hulubești peste 30%. Pe seama pășunilor și fînețelor naturale și a culturilor furajere (10% din suprafața arabilă), mai întinse în sud, s-a dezvoltat creșterea animalelor, ca o practică de tradiție, cu o importanță mai mare în comunele din părțile

centrală și nordică. Efective importante de ovine se cresc în comunele Cindești, Ludești, Bogați, de bovine în Călinești, Cindești, Ludești, Hulubești, Bogați, de porcine în Valea Mare, Cîmpurile, Ludești, Cindești, Leordeni, Călinești, Ștefănești, Bogați, iar de păsări în toate localitățile din partea sudică. La Călinești este amplasat un mare complex avicol, iar la Clucereasa (orașul Colibași) unul de ovine.

Activitățile industriale sînt, în general, bazate pe valorificarea unor resurse naturale locale, prezența orașului Pitești în imediată apropiere estompînd dezvoltarea industriei. Dealtfel, orașul Colibași s-a dezvoltat ca un „satelit” al Piteștiului. Industria prelucrătoare este concentrată în cea mai mare parte la Colibași, unde se produc autoturismele „Dacia”. La Topoloveni se produc conserve, iar la Crîngurile se extrag materiale de construcții.

Căile de comunicație se desfășoară de-a lungul văilor, fiind mai dense în partea sudică, unde, dealtfel, se află și cea mai mare parte a drumurilor modernizate. Aria petroliferă este legată prin drumuri modernizate de principală arteră rutieră Pitești — Găești — București și de drumul național Găești — Tirgoviște — Pitești — Cîmpulung. Traficul de produse cel mai intens se desfășoară în aria petroliferă și în cea a exploatărilor forestiere, cel mai important trafic de mărfuri și călători făcîndu-se către (și dinspre) Pitești.

Potențialul turistic prezintă o importanță atît regională, cît și națională, alături de peisajele naturale atrăgătoare fiind reprezentate de obiective social-culturale de certă valoare, ca: Mănăstirea Vieroși — datînd din 1545 (de la Păgetu), Biserica din lemn de la Cindești, Casa memorială Liviu Rebreanu de la Valea Mare — Podgoria, precum și obiectele artizanale din lemn din aria localității Cindești.



PODIȘUL MOLDOVEI

6.1. Caracterele geografice generale

6.1.1. Poziția și limitele

Podișul Moldovei, parte nord-estică a spațiului carpato-danubiano-pontic, podiș cu aspect deluros și colinar, este situat între Obcinele Bucovinei, Subcarpații Moldovei, nord-estul Cîmpiei Române și riul Prut. Legătura cu Carpații este subliniată, între altele, de structura monoclină și constituția petrografică a depozitelor de cuvertură, precum și de distribuția cu întrepătrunderi a componentelor peisajului său natural. Poziția geografică favorizează prezența, în cuprinsul său, a multor aspecte central-europene, est-europene, chiar baltice și balcanice, reflectate îndeosebi de condițiile climatice, de contactul dintre domeniul forestier, silvostepă și stepă, ori dintre zona solurilor argilo-iluviale și zona solurilor molice (cernozomurilor).

Ca și în celelalte regiuni pericarpatiche, se remarcă originea și vechimea multimilenară a populației și vetrelor de așezări ca și dezvoltarea unitară a vieții economice și sociale. În cuprinsul multor localități se găsesc vestigii ale fostelor cetăți traco-getice, ale vestitelor „dave” dacice, dovezi ale continuității de locuire neîntreruptă până în zilele noastre.

Spre nord-vest, podișul vine în contact cu Obcinele Bucovinei pe linia așezărilor Straja, Vicov, Marginea, Solca, Cacica, Păltinoasa, marcată printr-o denivelare de 300–500 m. Mai la sud, limita este, de asemenea, clară, pentru că urmărește valea Moldovei și în continuare valea Siretului. Elementele fizico-geografice arată unele asemănări între Podișul Sucevei și dealurile din dreapta

Moldovei, dar discontinuitatea fenomenelor produsă de văile Moldovei și Siretului și importanța umană și economică a acestora — manifestată puternic de-a lungul istoriei și accentuată în perioada actuală — desemnează culoarele Moldovei și Siretului ca individualități geografice care separă Podișul Moldovei de Subcarpați. De aceea, limita vestică a Podișului Moldovei merge în lungul versantului drept al Culoarului Moldova — Siret (fig. 142).

Începînd de la nord-est de Mărășești, Podișul Moldovei se mărginește cu partea nord-estică a Cîmpiei Române (Cîmpia Tecuciului), limita sa fiind abia schițată de denivelarea ușoară dintre Piscu Corbului și Nicorești, continuată pe la sud de Teșu, prin aria de confluență Berheci — Birlad și apoi pe marginea stîngă a luncii Birladului, pînă dincolo de Ghidigeni (Vizureni). Pentru porțiunea dintre Birlad și Prut problema stabilirii limitei este și mai dificilă, datorită unor treceri aproape insesizabile ale podișului spre Cîmpia Siretului. Se consideră că, începînd de la Vizureni, limita podișului trebuie trasată pe la est de Corod, Valea Mărului, Băleni, Firțănești, Măstăcani (fig. 142).

6.1.2. Alcătuirea geologică și etapele formării unității

Podișul Moldovei se suprapune pe trei unități structurale: Platforma Moldovenească (pînă la falia Fălciu — Plopana), Platforma Birladului (între faliile Fălciu — Plopana și Sfîntu Gheorghe — Oancea — Adjud) și Promontoriul nord-dobrogean îngropat (la sud de falia Oancea — Adjud), prezentînd fiecare un soclu cu formațiuni




Fig. 142. Limitele și diviziunile Podișului Moldovei.

cutate, acoperit de o cuvertură, cu formațiuni nedeformate prin cutări (fig. 143). Fundamentul reprezintă etapa de geosinclinal, în care s-au manifestat intense procese geodinamice (orogeneze, metamorfism, magmatism), finalizată în sisteme orogenice, iar cuvertura, o etapă de stabilitate, în care s-au acumulat depozite ce n-au fost deranjate tectonic.

Etapa geosinclinală s-a desfășurat pe intervale stratigrafice diferite. Astfel, pentru Platforma Moldovenescă (cu excepția părții vestice), această etapă s-a menținut până în proterozoicul mijlociu și s-a finalizat cu apariția unui sistem muntos, peneplenizat și devenit rigid. Este format din gnaise și granite (Dan Giuscă și colab., 1974) și nu apare la zi, fiind interceptat numai în forajele de la Todireni (la -950 m), Bătrânești (la -1 008 m), Iași (la -1 121 m).

Partea de la vest de riurile Siret și Moldova a funcționat ca geosinclinal un interval mai îndelungat, până în baza cambrianului.

După mișcările assyntice și această parte devine rigidă, trecind la stadiu de platformă. Este alcătuită din șisturi verzi, similare cu cele din Dobrogea Centrală, ce apar la sub 3 000 m adâncime (D. Paraschiv, C. Paraschiv, 1978).

Platforma Birladului, ce reprezintă segmentul vestic al Platformei Scitice (M. Săndulescu, 1984), s-a menținut ca arie geosinclinală până în devonianul inferior, consolidându-se după mișcările caledonice. Fostul orogen, adus în stadiu de peneplenă, este alcătuit din șisturi cristaline proterozoice și paleozoice inferioare, formațiuni sedimentare siluriene, devoniene inferioare și magmatite.

Partea sudică a Podișului Moldovei a evoluat ca arie geosinclinală până în faza




Fig. 143. Unitățile tectonice ale Podișului Moldovei. 1, Platforma Moldovenescă; 2, Platforma Birladului; 3, Promontoriul nord-dobrogean îngropat (Platforma Covelului); 4, fălii (F.P. — falia periarpatică; F.P.C. — falia Peceneaga — Camena; F.F.I. — falia Fălciu — Ivănești; F.G.O.A. — falia Sfintu Gheorghe — Cancea — Adjud).

neochimmerică a orogenezei alpine, după care a devenit rigidă, sudindu-se cu Platforma Bîrladului. Orogenul respectiv, rămînînd exondat pînă în badenian, a fost peneplenizat și are o alcătuire similară cu a Dobrogei de Nord: șisturi cristaline, formațiuni sedimentare (silurian, devonian, carbonifer inferior, triasic) și magmatite. Fiind acoperit de o cuvertură necutată (badenian—romanian), promontoriul nord-dobrogean îngropat s-a transformat într-o platformă tină, alpin timpuriu—Platforma Covurluiului.

Rezultă, așadar, că fundamentul Podișului Moldovei nu este uniform și s-a format din sudarea a patru sisteme orogenice: hudsonian ori elsonian, assyntic, caledonice și alpin timpuriu.

Etapa de platformă. După pierderea mobilității, fostele orogene, aduse în stadiu de peneplenă, au trecut la etapa de platformă rigidă, suferind doar oscilații pe verticală, fără cutarea depozitelor acumulate deasupra. Pe Platforma Moldovenească cele mai vechi depozite aparțin vendianului, pe Platforma Bîrladului, posibil, permianului, iar pe promontoriul nord-dobrogean, badenianului. Formațiunile cuverturii aparțin la trei mari cicluri de sedimentare (vendian — carbonifer inferior, permian(?) — triasic — paleocen, badenian — romanian) cu unele întreruperi locale sau generale¹.

Ciclul vendian — carbonifer inferior este propriu Platformei Moldovenești. Desigur, a existat sedimentare și în ariile geosinclinale limitrofe, dar depozitele respective au fost cutate, în parte metamorfozate, fiind încorporate fundamentului. Prima transgresiune s-a produs în vendianul superior iar sedimentarea, cu unele întreruperi, s-a menținut pînă în carboniferul inferior. Grosimea depozitelor conservate variază între 700 — 1 700 m. Devonianul mediu și carboniferul inferior apar numai în partea vestică a Platformei, unde stau direct pe fundamentul de șisturi verzi. (N. Macarovici, 1971, D. Patrulius și M. Iordan, 1974; Magdalena Iordan, 1975; I. Pătruț, 1982; I. Prodan 1985).

Ciclul permian(?) — triasic — paleocen corespunde cu sedimentarea, începută, pro-

¹ Prezența carboniferului este infirmată de I. Pătruț și Th. Dăneț (1987), încît primul ciclu de sedimentare nu ar depăși devonianul. Gh. Bombiță (1987), pe baza unor asociații de foraminifere, mari (numuliți, assilina etc.), demonstrează că depozitele dintre cretacic și badenian, de pe marginea vestică a Platformei Moldovenești, revin în cea mai mare parte eocenului inferior și mediu.

tabil, în permian și continuată în triasic, în urma căreia s-au acumulat depozite detritice (nisipuri și argile roșii) și lagunare (dolomite și calcare cu intercalații de sare și anhidrit). După întreruperea provocată de mișcările neochimmerice sedimentarea s-a reluat în liasicul superior, continuîndu-se fără întrerupere pînă în tithonic (M. Moldovan, 1982). S-au depus mai întîi, depozite argiloase, parțial bituminoase (peste 800 m), și apoi calcare și dolomite (peste 500 m). Probabil, după depunerea jurasicului a urmat o scurtă exondare. În tot acest timp Platforma Moldovenească a rămas uscat. La începutul cretacicului, în berriasian, se reinstalează regimul marin, atît pe Platforma Bîrladului, cît și pe Platforma Moldovenească. Noul ciclu, cu dese întreruperi, s-a menținut pînă în paleocen. Grosimea însumată a depozitelor cretacice este de circa 1 000 m. Paleocenul a fost recunoscut numai pe marginea vestică a Platformei Moldovenești. Posibil să fi cuprins suprafețe mult mai mari, dar a fost îndepărtat de eroziune. Pe marginea vestică, în unele foraje, s-au găsit în baza badenianului și calcare cu numuliți de vîrstă eocen mediu, dar care sînt considerate ca remaniate. După paleocen (eventual eocen), Platforma Moldovenească și Platforma Bîrladului devin, în totalitate, uscat.

Ciclul badenian — romanian începe în badenianul superior printr-o transgresiune generală. Sedimentarea, relativ uniformă, s-a menținut pînă în romanian. În depozitele acestui ciclu este modelat relieful actual, motiv pentru care acestea vor fi prezentate detaliat.

Badenianul aflorează numai în malul Prutului, între Oroftiana și Liveni. Sedimentarea a început în badenianul superior cu depozite detritice (gresii, nisipuri, argile), în grosime pînă la 130 m. În partea de nord-est, mai înălțată, sub influența unui uscat podolic apropiat, s-au acumulat conglomerate cu galeți de silix și nisipuri cuarțoase de Miorcani-Alba (circa 15 m). În continuare instalarea unui climat cald și uscat a favorizat depunerea într-un regim lagunar, de gips și anhidrit (circa 60 m). În final s-a revenit la o sedimentare argilo-marnoasă (250 m), iar în sectorul nord-estic mai înalt s-au depus calcare și marne, cu *Lithothamnium* și pectinide.

Depozitele sarmațiene apar la zi pe cea mai mare parte a Podișului Moldovei și




Fig. 144. Secțiune geologică între Iași și Lunca Veche (după P. Jeanrenaud). 1, Formațiuni basarabiene; a, formațiunea de *Cryptomactra*; b, gresii și nisipuri de Scheia, calcare de Repedea, nisipuri de Blrnova; 2, nisipuri și argile chersoniene; 3, nisipuri; argile și cinerite meoțiene.

arată că apele s-au extins treptat spre sud, ocupînd în întregime promontoriul nord-dobrogean. La fel ca pe întreg Paratethysul, salinitatea a scăzut, marea devenind salmastră. Pe uscatul eliberat de ape (în chersonian) au trăit și vertebrate mari (*Hipparion sebastopolitanum*, *Aceratherium incisicum*). După asociațiile fosile s-au separat toate cele patru subetaje: buglovian, volhinian, basarabian și chersonian, ce află, în ordinea vechimii, de la Nord spre Sud (Gr. Cobălcescu, 1883 a; I. Simionescu, 1906; I. Atanasiu, N. Macarovici, 1950; Bica Ionesi, 1968; P. Jeanrenaud, 1971).

În sarmațian s-au acumulat, mai ales, argile, siltite și nisipuri, iar, din timp în timp, calcare oolitice, calcare biosparitice și gresii, sub forma unor strate pînă la 4—5 m grosime. Pe seama acestor roci mai dure în Podișul Sucevei și Podișul Central Moldovenesc au fost modelate platouri structurale și cueste. În intervalul buglovian — basarabian inferior, în partea estică a Platformei Moldovenești (posibil pe tot Podișul Moldovei) s-au acumulat mai ales argile, cum sînt argilele bentonitice de Darabani—Mitoc (buglovian) și argilele cu *Cryptomactra* (basarabian), pe seama cărora, în bazinul văii Jijiei, s-a creat un relief domol. În buglovian, sincron cu argilele bentonitice, pe o fișie îngustă, înălțată, cu ape puțin adînci, s-au format bioherme cu *Serpula*, ce reprezintă extremitatea sudică a unei bariere biohermice, dezvoltată în Podolia (fig. 144). Tot în buglovian, în zona Hudești, apare o lentilă de conglomerate cu fragmente din flișul paleogen, probabil aduse prin curenți sau alunecare din zona litorală, situată mult mai la vest. Sînt cele mai vechi vestigii ale edificării unui relief și a unei rețele hidrografice în Carpați, după mișcările moldave (L. Ionesi, V. Băcăuanu, 1985). Pe marginea vestică a Podișului Moldovei, la contactul cu uscatul orogenului carpatic, s-au acumulat, episodice, pietrișuri și nisipuri fluvio-deltaice (Clit, Ciungi, Boiș-

tea, Corni). În volhinianul inferior, din regiunea Boroaia—Baia—Fălticeni, s-au acumulat 3—4 strate de lignit, de grosimi mici (sub 1 m). Grosimea însumată a depozitelor sarmațiene variază între 800 m (în est) și 3 000 m (în vest).

Meotianul află pe aceeași suprafață cu chersonianul. Salinitatea reducîndu-se foarte mult a apărut o faună ușor salmastră, iar pe uscat au trăit *Hipparion moldavicum*, *Dinotherium gigantissimum*, *Gazella deperdita* etc., care indică un climat cald și o vegetație bogată. După P. Jeanrenaud (1969), meotianul începe cu cineritele andezitice de Nușca — Ruseni (10—80 m), urmate de nisipuri și argile cu intercalații de gresii în plăci și conglomerate, ce însumează între 80 și 500 m (în partea de sud-vest a Platformei Birladului).

Pontianul află pe Platforma Birladului și pe orogenul nord-dobrogean. În bază este format din marne și nisipuri (C. Ghenea, 1968), iar în partea superioară, mai ales din nisipuri. Grosimea depozitelor pontiene crește de la est spre vest, respectiv 150 m pe Prut, 400 m pe Birlad.

Peste nisipurile pontiene se așterne o formațiune continentală, cu argile și argile nisipoase roșii, în grosime de 5—10 m, care, după C. Ghenea (1968) ar reveni pontianului superior și dacianului. În această interpretare rezultă că în intervalul respectiv s-a instalat un regim continental, favorabil proceselor de laterizare.

Romanianul apare în părțile centrală și sudică ale Platformei Birladului și pe Promontoriul nord-dobrogean prin formațiuni continental-lacustre (nisipuri, pietrișuri, argile), cu faună de vertebrate (Mălușteni, Berești) și moluște. Există unele variații litofaciale. Astfel, între Prut și Birlad, argilele roșii sînt acoperite de nisipuri gălbui (< 70 m) cu textură încrucișată și concrețiuni grezoase, care prin aglomerare capătă aspect de conglomerate. Din astfel de conglomerate, la Berești și Mălușteni, provine

fauna cu : *Anancus arvernensis*, *Zygotophodon borsoni*, *Equus* cf. *robustus* etc. (S. Athanasiu, 1915; I. Simionescu, 1930, 1932). La sud de Umbrărești, fauna de vertebrate este substituită prin moluște de apă dulce. În continuare urmează pietrișurile de Bălăbănești (V. Sficlea, 1960), în care, la Tulucești, s-au găsit resturi de *Anancus arvernensis* și *Archidiscodon meridionalis* (S. Athanasiu, 1915).

Între Birlad și Siret s-au depus, mai întâi, marne și nisipuri cu moluște lacustre (*Unio*, *Melanopsis*, *Viviparus*), în grosime de 300 m, apoi nisipurile și pietrișurile de Poiana-Nicorești, cu elemente de origine carpatică. Molarii de *Archidiscodon meridionalis* găsiți lângă Nicorești (I. Sircu, 1953) ar pleda, într-o oarecare măsură, pentru vîrsta pleistocen inferior, dar caracterul neevoluat al lor face puțin probabil acest lucru. Ca atare ele sînt mai vechi, fiind sincrone cu pietrișurile de Cîndești și cele de Bălăbănești.

Toate formațiunile mai vechi sînt acoperite în partea de sud a Podișului Moldovei de o pătură de depozite loessoide, reprezentate prin nisipuri prăfoase gălbui, cu o grosime pînă la 70 m. Prezența în ele a unei faune reci cu *Mammutus primigenius* și *Coelodonta antiquitatis* arată că depunerea acestor depozite s-a produs în pleistocen.

Între Prut și Lozova, sub depozitele loessoide se găsește formațiunea de Barboși, alcătuită din argile și nisipuri cu o bogată faună de moluște fluviatile și salmastre (*Didacna pontocaspia*, *Unio tumidus* etc.). V. Sficlea (1980) le consideră depozite fluviolimanice, depuse între gînz și mindel (din care cele mai vechi ar fi probabil echivalente cu stratele de Frătești), concomitent cu depozitele de terasă. După E. Liteanu și colab. (1961) provin în urma transgresiunii stadiului paleoeuxin al Mării Negre, produsă în mindel, care a cuprins și partea de sud-est a Podișului Moldovei.

În cuaternar, în partea de nord a Podișului Moldovei, la Dersca—Lozna (jud. Botoșani) și Poiana—Zvoriștea (jud. Suceava) s-au format turbării.

Fundamentul celor trei unități structurale are imprimat, în alcătuirea sa, etapele labile geosinclinale, prezentînd formațiunile intens cutate, parțial metamorfizate și străbătute de intruziuni magmatice.

Trecerea de la etapa labilă la etapa stabilă, de platformă, fenomen diferit în timp, repre-

zintă momentul principal în evoluția celor trei unități. Astfel, după proterozoicul mijlociu s-a consolidat Platforma Moldovenească. Mult mai tirziu, după orogeneza caledonice, s-a consolidat și sudat la ea Platforma Scitică, iar după mișcările neochimmerice, Dobrogea de Nord. În urma mișcărilor orogenetice respective au apărut sisteme muntoase, asupra cărora au acționat procesele de denudare pînă la declanșarea primului ciclu de sedimentare în vendianul superior pe Platforma Moldovenească, în permian pe Platforma Birladului și în badenian pe Promontoriul nord-dobrogean.

Datele de foraj și cele geofizice arată că fundamentul și cuvertura Platformei Moldovenești și a Platformei Birladului coboară în trepte spre vest și sud, în lungul unor fracturi. Spre exemplu, soclul Platformei Moldovenești a fost atins la Todireni la 950 m, iar la Iași la 1181 m. Badenianul pe Prut apare la zi, în schimb, în fața orogenului carpatic, este întilnit la adîncimea de 800 m (Marginea, jud. Suceava). Promontoriul nord-dobrogean coboară, în ansamblu, către nord și vest. Dacă planele de cădere, atît a platformelor, cit și a promontoriului pot fi moșteniri vechi, fenomenul de afundare este mult mai nou, deoarece sînt implicate formațiunile neogene. În neogen afundarea s-a declanșat în badenianul superior și a funcționat pînă la sfîrșitul pontianului, după cum o atestă grosimea mult mai mare a formațiunilor în partea vestică, în fața orogenului, decît în partea estică.

În opoziție cu afundările menționate formațiunile care apar la zi prezintă o înclinare slabă (sub 1°) de la nord-vest spre sud-est. Această ușoară înclinare, în medie de 4—6 m/km, afectează inclusiv pietrișurile de Bălăbănești (V. Sficlea, 1960). Ea este efectul unei mișcări de basculă, produsă după depunerea pietrișurilor de Bălăbănești, în romanianul superior, în faza valahă.

Datele de foraj au demonstrat că marginea vestică a vorlandului este prinsă sub șariajul orogenului Carpaților Orientali. În acest sens este concludent forajul de la Frasin (valea Moldovei), în care Platforma Moldovenească a fost interceptată la 3340 m. Șariajul amorsat în badenianul superior s-a desfășurat pînă la începutul volhinianului, fiind provocat de mișcările moldave. Ulterior, apele mării sarmatiene au acoperit și masele falie pericarpatică.

În geneza reliefului actual din Podișul Moldovei, ultimul ciclu de sedimentare, fenomenul de basculare din faza valahă, și apariția reliefului de orogen al Carpaților Orientali în urma mișcărilor moldave au avut un rol determinant. Elementele structurale vechi, preneogene, și-au pierdut semnificația ca factori generatori de relief în noile condiții.

6.1.3. Relieful

Odată cu exondarea mio-pliocenă a Podișului Moldovei, vechile cursuri ale râurilor carpatice (Succava, Moldova, Ozana, Cracău, Bistrița ca și altele mai mici — a căror vîrstă sarmatică este dovedită de formațiunile fluvio-deltaice de pe marginea vestică a Podișului Moldovei) s-au prelungit spre sud-est, urmărind retragerea și oscilațiile liniei de țarm. În același fel, dinspre nord înaintau Siretul și Prutul. Celelalte văi s-au format ulterior prin transformări și remanieri reflectate, adesea, de relief și de configurația bazinelor hidrografice.

Factori Activitatea apelor curgătoare, intensificată mult în urma mișcărilor de înălțare de la sfîrșitul pliocenului și din cuaternar, s-a împletit strîns cu procesele de modelare a versanților și a interfluviilor, astfel că s-a ajuns la distrugerea vechilor cîmpii de acumulare marină (cu excepția părții de sud a Moldovei, unde interfluviile mai păstrează, încă, unele fragmente ale cîmpiei romanian-pleistocene) și la înlocuirea lor cu un relief derivat, predominant sculptural, cu aspect deluros, în cuprinsul căruia se pun în evidență particularitățile litologice și structurale ale substratului geologic.

Podișul Moldovei reprezintă un ansamblu de interfluvii întinse cu aspect de poduri, dealuri și coline separate de văi largi, sculptate în cuvertura sedimentară monoclinală. Suprafața generală a reliefului, ca și fiecare interfluviu în parte, coboară domol spre sud — sud-est, în același sens cu orientarea văilor mai importante, reflectînd o evidentă adaptare la structură. Structura monoclinală a favorizat apariția asimetriei formelor pozitive și a văilor subsecvente.

Altitudinea medie pentru întregul podiș este de 250 m, iar pe subunitățile principale este în jur de 350 m în Podișul Sucevei, 250 m în Podișul Birladului, 150 m în Cîmpia Moldovei și 140 m în Podișul Cîmărușului. Treptele principale, care se impun în mor-

fologie, au valori de 350—500 m în nord-vest, 300—400 m în partea centrală, 150—200 m în nord-est și sud și au o distribuție relativ echilibrată, chiar în cadrul fiecăreia dintre subunitățile amintite. Altitudinile de peste 500 m sînt puține și izolate, devenind puncte de reper dintre cele mai reprezentative: Ciungi 504 m, Virful Dealului 614 m, Poiana Ciungilor 689 m, Teișoara 528 m, Dragomirna 522 m, Dealul Mare-Tudora 587 m din Podișul Sucevei; Dorosanu 652 m și Arinoasa 522 m din Podișul Birladului ș.a. Cotele cele mai coborîte se întîlnesc în lungul culoarelor Siretului și Prutului, precum și în lungul văii Birladului: 300 m la intrarea Siretului în țară, 239 m la confluența Sucevei cu Siretul, 170 m la vărsarea Moldovei; 148 m pe Birladul superior, 54 m la întîlnirea Tutovei cu Birladul; 130 m pe Prut la Oroftiana, 32 m în apropiere de Ungheni și sub 15 m în zona Brateșului.

Densitatea fragmentării reliefului este cuprinsă între 700 și 900 m/km² în cea mai mare parte a Podișului Moldovei. Energia medie este 125 m, iar geodeclivitatea este, în general, redusă, predominant sub 10°. Doar pe versanții cu intercalații de gresii, calcare sau cinerite andezitice, pe cueste, în lungul unor abrupturi de desprindere și al celor sculptate în luturi loessoide, pantele au 15—20°, pe alocuri chiar mai mult.

În varietatea accentuată a reliefului ies în evidență numeroase forme determinate de structura monoclinală și de prezența orizonturilor grezoase ori calcaroase, mai rezistente la eroziune. Ca urmare, platourile structurale și cuestele reprezintă o caracteristică principală a Podișului Moldovei. Platourile sau „platformele structurale”, situate la altitudini de peste 300—400 m, au lărgimi ce pot ajunge la 3—5 km și sînt limitate spre nord și nord-vest de cueste. Astfel de forme apar în partea înaltă a Podișului Dragomirnei, în Podișul Fălcișenilor, în Dealul Mare—Hirlău și Podișul Central Moldovenesc. Cuestele sînt legate de evoluția văilor subsecvente și le găsim în lungul tuturor râurilor cu orientare mai mult sau mai puțin apropiată de direcția vest — est. În această categorie se încadrează multe sectoare locale din lungul Siretului, Prutului, Sucevei, Moldovei, Jijiei, Bahluiului, Birladului, Racovei, Vasluiului, Crasnei și Lohanului. La contactul dintre suprafețele protejate de orizonturi mai rezistente și cele constituite din roci mai moi,

s-au format cueste și abrupturi importante sculptate exclusiv de către procesele de versant. Așa este Coasta Iașilor cu o lungime de aproape 100 km. (Strunga — Sinești — Voinești — Birnova — Tomesti).

În Podișul Moldovei domină complexele litologice formate dintr-o succesiune de roci argilo-nisipoase și marnoase, cu intercalații de nisipuri, gresii și calcare. Din această cauză, încercarea de stabilire a unor tipuri clasice de relief litologic — în afara celui argilos — se poate face numai pentru areale reduse.

O morfologie care exprimă destul de fidel natura substratului argilos caracterizează îndeosebi Cîmpia Moldovei. De asemenea, dominarea nisipurilor în partea sudică a Podișului Birladului se reflectă în microformele mereu înprospătate de eroziunea torențială, în frecvența glacisurilor de la baza versanților și în colmatarea activă a albiilor, fenomen care contribuie la îmbătrânirea prematură a rețelei hidrografice (M. Filipescu, 1950).

În afară de înălțarea pliocen-cuaternară a întregului podiș (ceea ce explică energia văilor și prezența teraselor cu înălțime până la 170 și chiar 210 m), s-ar mai putea pune problema unor influențe ale tectonicii în schimbarea direcției unor cursuri de apă din sudul Moldovei, explicată prin subsidența din nord-estul Cîmpiei Române (G. Valsan, 1916; M. David, 1921). Există apoi părerea că prin înălțarea, la sfîrșitul pliocenului, a unui bloc structural corespunzător fundamentului Podișului Central Moldovenesc s-ar fi produs o deviere mai accentuată a Prutului spre sud-est (avale de Ungheni) și a Siretului spre sud-vest (avale de Roman) (M. Păucă, 1968).

Miscările tectonice actuale care, în nord, ating 3—5 mm/an, descreșcînd treptat spre sud, până la 1 mm/an, influențează desigur unele procese și forme din cuprinsul versanților, luncilor și albiilor, dar în această privință nu există încă studii de amănunt.

În funcție de manifestarea teritorială predominantă a diferiților agenți externi, se pot deosebi cîteva tipuri de relief dominante, între care se impun cel fluvial și deluvial.

Primele forme care s-au schițat pe suprafața cîmpiilor sarmato-pliocene inițiale au fost cele create de riuri și, cu toate oscilațiile climatice care au avut loc, ele și-au menținut prioritatea pînă astăzi. Evoluția îndelungată a rețelei hidrografice este dove-

dită de existența, pe marginea vestică a podișului, a unor formațiuni fluvio-deltaice vechi, sarmatiene și de terasele înalte ale văilor principale. Acestea arată că trăsăturile morfo-hidrografice actuale schițate la sfîrșitul pliocenului, s-au desăvîrșit de-a lungul pleistocenului și în holocen.

În peisajul Podișului Moldovei, văile principale, îndeosebi ale Siretului și Prutului, se prezintă ca veritabile culoare, ale căror particularități le conferă o anumită distincție regională.

Vechimea, evoluția și ierarhizarea văilor este clar pusă în evidență de distribuția, numărul și altitudinea teraselor. Ele se remarcă printr-o succesiune de poduri fragmentate care păstrează un paralelism evident cu profilul longitudinal al albiilor, printr-o racordare perfectă a treptelor din lungul văilor principale și al afluenților, ca și printr-o diminuare a numărului și altitudinilor spre generațiile de văi mai tinere. S-a stabilit existența a două — trei trepte de luncă și 7—8 terase cu altitudini relative pînă la 200—210 m în valea Siretului mijlociu, 160—170 m în valea Prutului, 180—190 m în valea Sucevei, 160—170 m în valea Moldovei, tot 160—170 m în lungul Bahluiului.

Regimul tectonic de platformă, cu ușoare ridicări epirogenetice pleistocene, se reflectă și în menținerea neschimbată a altitudinilor relative ale teraselor pe distanțe de zeci și chiar sute de kilometri. Așa de exemplu, terasele de 15—20 m, 50—60 m, 120 m, 160—170 m ș.a. sînt prezente, în valea Siretului, atît amonte de Bucecea, cît și în apropiere de Mărășești, iar cele ale Prutului, cu altitudinea relativă de 10—15 m, 20—25 m, 30—40 m, 60 m, 110 m, au fost identificate din nord-estul Cîmpiei Moldovei pînă în apropiere de Galați. Spre extremitatea sudică a văii Prutului, însă, terasele de 10—15 m și 20—25 m coboară sub nivelul luncii, iar cele de 115—120 m, 75—80 m și 57—65 m, din amonte de Tulucești, se racordează „Complexului de Babele” din regiunea orașului Galați (V. Sficlea, 1980). În general, toate terasele cu altitudini pînă la 60—70 m sînt bine păstrate, mai largi și mai extinse în apropierea confluențelor. Între treptele cele mai evidente se pot aminti cele cu altitudine relativă de 20—25 m, 50—60 m și 100—120 m, în timp ce treptele de 10—15 m, 70—90 m ș.a. sînt abia schițate și au o întindere limitată.

Sintezele și generalizările din ultimul timp ajung la concluzia că treptele de luncă cu altitudini sub 5 m sînt holocene, iar terasele cuprinse între 5 și 40 m sînt pleistocen superioare (T 5–15 m = würm III; T 20–30 m = würm II; T 35 m = würm I). Pleistocenului mediu îi sînt atribuite nivelurile cu altitudini în jur de 50–70 m, pleistocenului inferior și perioadei de trecere de la pliocen la pleistocen îi aparțin terasele de 100 m, 120 m și 140 m, iar cele de 150–160 m și mai înalte s-au format în pliocen. Luncile s-au format în holocen, dar au înregistrat transformări remarcabile și în perioada contemporană, cînd agraarea este deosebit de evidentă. Dimensiunile variază în funcție de mărimea riurilor și au lățimi de la cîteva zeci sau sute de metri, în cazul celor secundare, pînă la 5–10 km și chiar mai mult, ca în partea mijlocie și inferioară a Siretului și Prutului. Grosimea aluviului crește spre avale de la 2–5 m pînă la 30–40 m în luncile Siretului și Prutului și de la 2 la 10 m pe majoritatea celor afluate.

Sub raportul compoziției granulometrice și al mobilității albiilor se pot delimita trei arii (Diana Urziceanu, 1967). Cea mai mare parte a albiilor dintre Siret și Prut sînt constituite din nisipuri fine (0,1–1 mm), au un ridicat coeficient de meandrare, de deformare în suprafață și în adîncime. În lungul Siretului, ca și în porțiunile dinspre vîrsare a Moldovei și Bistriței predomină acumulările de pietriș și nisip (1–10 mm), iar albiile au o stabilitate mai mare decît spre est. Luncile Sucevei și Moldovei ca și ale altor riuri mai mici, situate la ieșirea din munte, se caracterizează prin intense acumulări de nisipuri și prundișuri carpatice (cu diametre medii de 10–50 mm), prin albiile despletite.

În luncile riurilor principale apar pe alocuri două-trei trepte cu altitudini relative între 1 și 7 m, tăiate în același complex aluvionar. Pe întinsul lor se schițează numeroase meandre vechi și brațe părăsite, popine, microdepresii de tasare, areale mai joase cu exces de umiditate. Semnificative sînt, între altele, vechile cursuri numite „Sirețel”, „Pruteț”, „Jijia Veche” etc. Procesele și formele naturale sînt modificate din ce în ce mai puternic prin lucrările de hidroameliorații, de exploatare a balastului, prin amenajarea și valorificarea judicioasă a terenurilor (pe Bistrița interioară, Siret, Prut, Jijia, Birlad etc.).

Aproape toți versanții cu înclinare de 5–10° (cu excepția spațiilor împădurite) sînt atacați de organisme torentiale care au o frecvență mai mare în dealurile de la marginea vestică a Podișului Moldovei, în sectoarele cu fațes psamito-psefitice, în lungul cuestelor, în Colinele Tutovei și ale Covurluiului, cu o constituție mai nisipoasă.

2. Deplasările de teren constituie una dintre caracteristicile peisajului și ale modelării actuale a reliefului.


Ele afectează areale largi, impresionînd atît prin amploare și dinamică, cît și prin consecințele negative asupra economiei agrare, clădirilor, căilor de comunicație.

2. Multiplele și variatele aspecte ale alunecărilor au fost prezentate detaliat în multe studii regionale și speciale (C. Martiniuc și V. Băcăuanu, 1961; V. Tufescu, 1964, 1966; V. Băcăuanu, 1968 ș.a.). Unele trăsături geologice și fizico-geografice proprii subunităților Podișului Moldovei se reflectă adesea și în specificul deplasărilor de teren. Pe versanții văilor din Podișul Sucevei și Podișul Central Moldovenesc, ca și pe cuestele cu orizonturi de gresii și calcare oolitice, se întîlnesc două generații de alunecări: unele mai vechi, de la sfîrșitul pleistocenului și începutul holocenului, sub formă de trepte ori pachete masive, cu dislocări profunde, relativ stabilizate și altele recente, suprapuse, cu suprafețe și grosimi mai mici, sub formă de cuiburi, monticuli, valuri. În Cimpia Moldovei, cu substrat predominant argilos, alunecările sînt, de obicei, superficiale, cu fragmentare mixtă, dar care acoperă uneori versanți întregi. Doar acolo unde versanții secționează depozitele unor terase înalte, suprapuse formațiunilor sarmatice, se dezvoltă alunecări complexe mai profunde. Partea sudică a Podișului Moldovei, constituită din depozite nisipo-argiloase pliocene, se caracterizează prin alunecări dispersate, cu dimensiuni reduse, subordonate celorlalte procese de versant. Implicațiile practice ale proceselor actuale constituie probleme de mare actualitate, care fac obiectul preocupării multor colective și instituții specializate, cu scopul găsirii soluțiilor adecvate pentru prevenirea și combaterea lor.

6.1.4. Clima

Analiza distribuției temperaturii aerului din luna ianuarie scoate în evidență că în nord-vestul podișului, pe văile Siretului și

Fig. 145. Temperatura medie anuală (A) și precipitațiile medii anuale (B), (după Atlas R. S. România, pl. IV, 3,5).



Birladului mijlociu, ea și în cea mai mare parte a Cîmpiei Moldovei, urmare a condițiilor favorabile acumulării aerului rece, temperatura scade sub -4°C . Au existat însă și ani (1940, 1942, 1963), cînd datorită invaziilor frecvente de aer rece, de origine arctică, mediile termice ale lunii ianuarie au coborît la multe stații sub -10°C (I. Gugiuman și colab., 1963). De aceea, valorile amplitudinilor termice medii sînt mari în jumătatea sudică (Birlad 25.2° și Galați 25.3°), în partea centrală a podișului, în regiunile depresionare sau de confluență a văilor principale (Botoșani, Roman, Bacău cu 24.7° ; Huși, Vaslui cu 24.8° ; Iași cu 24.9°). Amplitudinile medii permit încadrarea celei mai mari părți a Podișului Moldovei în regiunile cu amplitudini termice anuale mari (peste $24-25^{\circ}\text{C}$), care corespund unui climat temperat tipic continental. Nordul și centrul Podișului Sucevei au amplitudini medii mai reduse ($23-22^{\circ}\text{C}$), corespunzătoare unui climat temperat continental de tranziție, spre climatul munților (fig. 145).

Datorită interacțiunii dintre procesele advecive și cele de circulație locală, generate de bilanțul caloric al suprafeței active, tem-

peratura aerului poate urca în timpul verii la peste 35°C , cu totul excepțional ajungînd la peste 40°C (Huși 40.2° în iulie 1938, Iași 40.0° în iulie 1909) în timp ce, iarna coboară în toate subunitățile podișului sub -25°C , chiar sub -30° (Rădăuți -31.7° în ianuarie 1963, Dorohoi -32.5° în februarie 1911, 1937 și ianuarie 1940, Botoșani -30.3° în ianuarie 1963, Iași -35.0° în februarie 1937, Roman -33.2° în februarie 1954, Birlad -30.5° în ianuarie 1942 și 1963). Întrucît amplitudinea termică absolută depășește 75°C înseamnă că în această unitate continentalismul termic este evident.

Vara pot să apară perioade cînd temperatura scade sub 10°C , iar iarna apar perioade călduroase, în timpul cărora temperatura urcă peste 10°C , producînd dezghețul și topirea bruscă a stratului de zăpadă. În general, temperaturile medii lunare sub 10° , cu excepția părții extrem sud-estice a podișului, sînt caracteristice din octombrie pînă în aprilie. Bineînțeles că, în mod cu totul accidental, astfel de perioade reci se întîlnesc și în lunile septembrie sau mai.

Fenomenul de îngheț, în funcție de cauzele sale genetice (radiative, advecive, mixte)

și de particularitățile reliefului variază foarte mult ca moment de apariție și ca număr anual de zile cu îngheț care scade, în general de la nord la sud: 140 de zile la Rădăuți, 132 de zile la Suceava, 125 la Roman, 123 la Bacău, 111 la Iași, 108 la Birlad și 92 la Galați. Mai puțin evident se remarcă scăderea numărului mediu anual de zile cu îngheț de la vest spre est. Înghețurile cele mai frecvente și cele mai intense se produc în ariile depresionare și în văi, ca urmare fie a frecvențelor inversiuni de temperatură, fie urmare a canalizării și stagnării aerului rece. Data medie a producerii primului îngheț este la 12 octombrie, la Suceava și la 2 noiembrie, în sud, la Galați. Data medie a producerii ultimului îngheț este 22 aprilie la Rădăuți și 4 aprilie la Galați. Tot în nord s-a produs și cel mai timpuriu îngheț, 22 septembrie la Rădăuți — în timp ce în sud a avut loc la 18 octombrie (Galați). Cel mai târziu îngheț de primăvară s-a produs la data de 5 mai la Rădăuți și la 20 aprilie la Galați. Față de aceste date medii, datele extreme ale producerii ultimului îngheț (considerate ca deosebit de dăunătoare) au avut loc, la majoritatea stațiilor, la începutul decadei a treia a lunii mai (intervalul 21—24 mai 1952).

Excesivitatea climei Podișului Moldovei mai este exprimată și de numărul ridicat al zilelor de vară și tropicale ce însumează în medie pe an, de la nord la sud, 50—100 de zile și, respectiv, 20—40 de zile.

Regimul anual al umezelii relative este caracterizat prin valori cuprinse între 80% în extremitatea nord-vestică și 74% în sud-estul Cîmpiei Moldovei, pe valea Prutului, în Depresiunea Hușilor, Cîmpia Fălcușului, în sudul Podișului Birladului, în partea nordică și centrală a Podișului Covurlui. Se constată existența a două perioade (decembrie și iunie), cu valori medii lunare maxime care variază între 82—90% și a două cu valori minime (aprilie—mai și iulie) cu scăderi pînă la 60—65%. Cele mai ridicate valori ale umezelii relative corespund, în decursul întregului an, regiunilor mai înalte, cu temperaturi mai scăzute.

Nebulozitatea prezintă valori medii anuale cuprinse între 5 și 6 zecimi, iar acestea cunosc o creștere dinspre sud-est (5—5.5 zecimi) spre nord-vest (5.6—5.7).

În anotimpul rece cu circulație ciclonică-frontală dinspre Marea Mediterană, este caracteristică formarea norilor stratiformi,

în special în regiunile depresionare și în sectorul mijlociu al văii Siretului, unde și frecvența inversiunilor de temperatură este mai mare. În intervalul decembrie — februarie, nebulozitatea înregistrează valori medii maxime ce depășesc 7 zecimi (Iași, Roman, Bacău). Valorile minime din cursul anului se observă peste tot în lunile august — septembrie, caracterizate prin activitate anticiclonică, cu mult cer senin. În aceste luni, în partea de sud-est a podișului, nebulozitatea medie lunară se reduce în jur de 3 zecimi (la Huși, Birlad), iar în nord-vest în jurul a 5 zecimi.

Ca urmare a poziției sale în regiunea extracarpatică, departe de influența maselor de aer atlantic, larg deschisă acțiunii maselor de aer de origine continentală din est, nord-est și nord, teritoriul Podișului Moldovei primește cantități anuale de precipitații moderate. Se observă o evidentă reducere a acestora dinspre nord-vest, din regiunile mai înalte, spre cele de sud-est, mai joase. În Podișul Sucevei depășesc, pe alocuri, 600 mm, în cel al Birladului 500 mm, iar în Podișul Covurlui scad între 500 și 450 mm. Se constată că în lungul văilor principale și în arii depresionare cantitățile de precipitații sînt mai mici decît în regiunile înalte (Roman 516.3 mm, Bacău 541 mm, Birlad 454.7 mm, Huși 521.5 mm). În Cîmpia colinară a Moldovei, expusă direct circulației maselor de aer continentale, în care aerul dinspre sud sau vest la coborîrea înălțimilor podișurilor înconjurătoare suferă frecvent procese de foehnizare, cantitățile de precipitații sînt reduse, oscilînd în genere, în jurul a 500 mm (Botoșani 564.7 mm, Avrămeni 468.9 mm, Ștefănești 505.5 mm, Bivolari 465.4 mm, Iași 529.4 mm). Cele mai mari cantități anuale de precipitații au căzut în anii în care activitatea ciclonică a fost deosebit de intensă și advecția maselor de aer umed frecventă (1900, 1912, 1933, 1940, 1941, 1950, 1963, 1969, 1970), cantități care au reprezentat preintindeni aproape dublul mediei multianuale. Cele mai mici cantități anuale de precipitații s-au înregistrat în anii caracterizați prin activitatea îndelungată a ariilor barice anticiclonale și prin advecția de aer cald, tropical sau polar, continental. În astfel de situații (1904, 1937, 1943, 1945, 1946, 1949, 1953, 1961, 1967), cantitățile anuale de precipitații s-au redus, într-o serie de cazuri, la circa jumătate din media multianuală.


Cele mai mari cantități medii în lunile de sfârșit de primăvară, cu un maxim în luna iunie, variază între 61.8 la Galați și 95.0 mm la Fălțiceni. Cele mai mici cantități de precipitații (20 — 25 mm) cad, de obicei, în luna februarie, pentru nordul și centrul podișului sau martie, pentru sudul acestuia.

Exceptând podișurile înalte din nord-vest, aportul principal este dat de ploile din perioada caldă a anului, de natură convectivă, ce cad sub formă de averse, cu un pronunțat caracter continental, cu variații mari de la o lună la alta. În Podișul Sucevei predomină, însă, ploile frontale, ca urmare a activității ciclonice din Europa Centrală.

acuma înregistrându-se și cel mai mare număr de zile cu ploaie (în mai — iulie, 10 — 15 zile lunar). În regiunile înalte ale podișului este asigurată umezeala necesară dezvoltării normale a plantelor, în timp ce, în Cîmpia Moldovei și în jumătatea sudică a acestuia se înregistrează un deficit de umiditate care trebuie compensat prin irigații. În genere, perioadele secetoase cele mai numeroase sînt specifice anotimpurilor de primăvară, toamnă, iarnă, deși sînt numeroase cazuri, cînd și în timpul verii, sînt perioade fără precipitații măsurabile și deci utile plantelor (fig. 146).

Deoarece distribuția numărului mediu lunar și anual al zilelor cu ninsoare și strat de

Fig. 146. Climograme caracteristice. T — temperatura medie anuală; P — precipitații medii anuale; TM — temperatura maximă anuală; Tm — temperatura minimă anuală; 1, temperatura medie lunară; 2, precipitațiile medii lunare la scara 1/2; 3, precipitațiile medii lunare la scara 1/3; 4, perioade umede; 5, perioade uscate; 6, perioade secetoase.



Cantitățile maxime de precipitații căzute în timp de 24 de ore au depășit, în frecvente cazuri, media lunii în care s-au produs (peste 100 mm, de exemplu, la Săveni, Frumușica, Iași, Podu Iloaiei, Filipeni).

În sezonul cald (aprilie — octombrie) cad peste 60% din precipitațiile anuale, tot

zăpadă este în strînsă corelație cu latitudinea și altitudinea, cel mai mare număr mediu anual al zilelor cu ninsoare (43—47) și cu strat de zăpadă (peste 75), ca și cea mai mare grosime medie a acestuia (peste 25 cm) se înregistrează în regiunile înalte din

nord-vest, după care urmează cele din părțile central-estică și sudică.

În Podișul Moldovei sînt dominante vînturile de nord-vest și cele de sud-est, pentru jumătatea nordică și pentru estul părții centrale, direcții determinate, în bună parte, de orientarea interfluviilor și a văilor adiacente. În restul teritoriului sînt dominante vînturile pe direcțiile nord-sud și nord-est — sud-vest. Cea mai mare frecvență o au vînturile de nord-vest, iar cea mai redusă cele din direcțiile de vest și sud-vest.

Valorile vitezei vîntului sînt mai mari în regiunile podișurilor Sucevei și Bîrladului, unde se mențin între 2,5 și 3 m/s, ca și în sudul podișului ori în Cîmpia Moldovei. În general, cele mai mari viteze se înregistrează primăvara și iarna, iar cele mai mici la sfîrșitul verii și începutul toamnei, cînd gradientii barici orizontali au valori reduse.

6.1.5. Rețeaua hidrografică

Structura rețelei hidrografice din Podișul Moldovei, prin drenajul general spre sud și asimetria de ansamblu a bazinelor reflectă în foarte mare măsură condițiile de formare, evoluția și constituția geologică a acestuia. În egală măsură, caracterele hidrologice ale rîurilor, într-un regim est-continental cu umiditate deficitară și moderată, reflectă trăsăturile climei, natura substratului și condițiile fizico-geografice, în general. Nu mai puțin apele subterane sînt o consecință a constituției geologice — cu alternanțe de strate permeabile și impermeabile — și a condițiilor de alimentare, ceea ce face ca în afara apelor freatice să se găsească la diferite adîncimi și ape subterane captive.

Apele subterane captive sub presiune apar datorită înclinării spre sud-est a suporturilor impermeabile pe care se sprijină. Alimentarea acestora se face din surse superficiale prin capetele de strat intersectate de suprafața topografică. Cele mai importante ape de adîncime sub presiune sînt cuprinse în formațiuni presiluriene, siluriene și neogene. În general, ele au un grad ridicat de mineralizare, fiind clorosodice, sulfuroase, bromo-iodurate, calcice.

Apele subterane captive lipsite de presiune sînt acumulate în depozitele nisipoase intercalate între stratele argilo-marnoase sarmatice și pliocene. Fiind deschise, ele au

o zonă de alimentare, prin capătul ridicat și una de drenare, prin capătul coborît; se alimentează din precipitații și din apele freatice iar la rîndul lor alimentează stratele freatice și chiar rîurile. Ele au un grad de mineralizare ridicat și sînt curative: apele sulfatate, magneziene-sodice de la Breazu-Iași (formate în nisipuri sarmatice) cu peste 10 g/l săruri (cu 6,3 g/l SO_4); apele bicarbonatate, calcice, magneziene, sulfuroase, sodice, sulfatate, cu mineralizare de 2,6 g/l, din nisipurile sarmatice de la Strunga, la care se alătură cele de la Drînceni care apar la zi, ca izvoare clorosodice sulfuroase cu o mineralizare de 7,5 g/l.

Apele freatice sînt acumulate în depozite cuaternare, iar volumul lor suportă variații importante sub influența elementelor climei.

În funcție de condițiile morfologice și litologice, apele freatice din Podișul Moldovei se grupează în mai multe unități hidrogeologice, deosebite între ele prin rezerva de apă pe care o cuprind și prin adîncimea la care se găsesc.

La suprafață, Podișul Moldovei este drenat de rîuri prinse în sistemele hidrografice ale Siretului și Prutului, avînd o densitate medie de 0,45 km/km². Sursele de alimentare cu apă a rîurilor sînt formate în proporție de 75—90 % din precipitații și de 10—25 % din stratele acvifere subterane. Față de volumul sursei superficiale, zăpezile participă cu 28 % în partea de nord-vest a podișului, cu 52 % în partea de sud, iar ploile cu 42—48 %. Ca urmare, rîurile din părțile de vest, nord-vest și centrală ale podișului au alimentare de tip pluvial moderat și subteran moderat, iar cele din extremitatea sudică au alimentare de tip nivo-pluvial și subteran moderat.

Scurgerea lichidă teritorial înregistrează variații mari. Este mai mare de 2 l/s.km² (depășind frecvent 3 l/s.km²) în partea de vest și centrală a podișului și coboară sub 1 l/s.km² în cea de est și de sud. Coeficientul scurgerii este mai ridicat (peste 0,20) pentru rîurile din partea de vest și centrală a podișului și se reduce (sub 0,10) spre est și sud prin creșterea gradului de permeabilitate a rocilor.

Din analiza bilanțului se observă că în ariile cu precipitații puține umezirea totală a solului este redusă. Componentele umezirii solului arată că peste 85 % din umezeală se reîntorc în atmosferă, prin evapotranspirație, iar 15 % contribuie la alimentarea apelor subterane. Față de alte regiuni ale țării,

în Podișul Moldovei evapotranspirația este relativ mică, dar în raport cu cantitatea de precipitații căzută aici ea reprezintă foarte mult (peste 70%).

Variația scurgerii în timpul anului depinde de cantitatea și calitatea surselor de alimentare. Astfel, iarna, datorită stărilor de vreme, în formarea scurgerii lichide predomină alimentarea din surse subterane. Din volumul anual proporția scurgerii în acest anotimp crește cu suprafața bazinelor și cu reducerea latitudinii, oscilând între 9 și 16% în nordul podișului și depășește 20% în partea de sud.

Primăvara, scurgerea lichidă depășește de 3—4 ori pe cea înregistrată iarna, cu excepția extremității de nord-vest a podișului, unde topirea zăpezii se produce cu întârziere, precum și a părții sudice, unde o mare parte din zăpada căzută se topește în sezonul rece. În restul podișului se înregistrează scurgerea anotimpuală maximă, reprezentând 40—50% din volumul anual. Vara, prin plasarea maximului pluviometric la începutul anotimpului, volumul de apă transportat de riuri este încă ridicat în părțile de nord-est, centrală și de sud ale podișului, reprezentând 20—30% din volumul anual. În acest anotimp, cel mai mare volum de apă se transportă de riurile din nord-vestul Podișului Moldovei, unde precipitațiile de convecție termică sînt frecvente și abundente (depășind uneori 30 mm/24 ore). În anotimpul de toamnă alimentarea superficială fiind redusă, cantitatea de apă transportată de riuri este mică, reprezentând între 4% pe Sitna și 16% pe Covurlui. În comparație cu celelalte anotimpuri, cu excepția riurilor din partea de nord-vest, unde scurgerea lichidă este încă ridicată (reprezentind 13—15% din volumul anual), acum se înregistrează și aici cele trei faze caracteristice ape mari, viituri, ape mici.

Temperatura medie anuală a apei este foarte apropiată de cea a aerului, marcînd o scădere de la sud și est spre nord și vest. S-au înregistrat 10.7°C pe Prut la postul Oancea și 8.1°C pe Siret la postul Siret, 9.7°C pe Bahlui la Iași și 8.2°C pe Solonet la Părhăuți.

Temperatura medie lunară cea mai coborîtă se înregistrează în ianuarie, la riurile din bazinul Siretului și în februarie la riurile din bazinul Prutului; aceasta este de 0°C în ianuarie și de 0.3°C în februarie pe Suceava la Ițcani și, respectiv, de 0.2°C

și 0.3°C pe Berheci la Feldioara; pentru același interval de timp temperatura medie este de 0.2°C în ianuarie și de 0°C în februarie pe Bașeu la Săveni și de 0.4°C și 0.2°C pe Prut la Oancea. În luna iulie se înregistrează temperatura medie cea mai ridicată, cu diferențe valorice impuse de altitudine și latitudine: pe Suceava la Ițcani sînt 17.5°C, pe Siret la Răcătău 20.4°C, pe Bahlui la Iași 21.2°C, iar pe Prut la postul Oancea 23.8°C. Temperatura maximă absolută a apei este, în general, mai coborîtă pe riurile din bazinul Siretului (28°C pe Suceava la Ițcani, în august 1962 și de 27.4°C pe Moldova la Roman, în august 1961) și este mai ridicată în bazinul Prutului (30°C pe Bahlui la Iași, în iulie 1958).

Scurgerea solidă se înfăptuiește în cea mai mare parte (circa 95%) sub formă de suspensii. Turbiditatea medie anuală variază între 1 000 și 2 500 g/m³. Este mai ridicată (peste 2 000 g/m³) în sudul Cîmpiei Moldovei, în Podișul Bîrladului (cu excepția văii Bîrladului avale de Vaslui) și în valea Siretului. Valori reduse (sub 1 000 g/m³) se înregistrează în partea de nord-vest a podișului, unde, în constituția litologică, predomină materialele grosiere. De asemenea, valori reduse apar în cursul mijlociu și inferior al Bîrladului, ca și pe cursurile inferioare ale afluenților, unde panta foarte redusă permite decantarea în bună parte a suspensiilor. În intervalul 1969—1972 pluviozitatea ridicată a determinat înregistrarea unor valori deosebit de mari în volumul suspensiilor. De exemplu, în 1969 (după un șir de ani cu precipitații reduse) riul Rîșca, la postul Boroaia a transportat în medie 10,7 kg/m³, iar Bahluiul, la Iași, 5,8 kg/m³. Pe Zeletin la postul Galbeni, în 1972, turbiditatea medie a fost de 24,2 kg/m³.

Mineralizarea, depinzînd de scurgerea lichidă, înregistrează ca și aceasta, o variație în raport cu altitudinea. Ca urmare, cele mai reduse valori (circa 500 mg/l) sînt caracteristice riurilor din Podișul Sucevei, Podișul Central Moldovenesc și din partea înaltă a Colinelor Tutovei, respectiv acolo unde scurgerea specifică lichidă depășește 3 l/s km². Mineralizarea crește spre estul și sudul podișului, acolo unde precipitațiile sînt mai puține (de circa 500 mm/an), iar scurgerea lichidă este redusă (sub 1 l/s.km²). Se ajunge, astfel, la peste 1 000 mg/l în partea de sud-est a Podișului Bîrlad și la

peste 1 500 mg/l în sud-estul Cîmpiei Moldovei.

În timp, mineralizarea apei râurilor a înregistrat fluctuații importante în funcție de regimul scurgerii lichide, fiind redusă la ape mari și deosebit de ridicată în timpul apelor mici. De exemplu, mineralizarea apei râului Bahlui, la postul Iași, a oscilat între 486 mg/l (28.IV. 1961) și 3 530 mg/l (4.XI. 1963), iar pe Elan, la postul Tupilați, a variat între 411 mg/l (la 31.VII.1963) și 1 712 mg/l (25.III. 1961).

Rîurile din cea mai mare parte a Podișului Moldovei au ape bicarbonatate. Pe unele râuri din Podișul Sucevei apele sînt bogate în cloruri și sulfatî (Sucevița, Soloneț, Solca), dar fără a modifica caracteristica chimică a râului Suceava. Rîurile din jumătatea de est a Cîmpiei Moldovei sînt sulfatate, iar cele din Cîmpia Fălciului sînt mixte cu predominarea sulfatului.

Duritatea apelor din râuri variază, în general, între 8° dhG și 25° dhG. Cele mai reduse valori, sub 16° dhG, sînt caracteristice râurilor din partea mîltă a podișului, cu altitudini peste 300 m și cu pante accentuate, unde se face un drenaj rapid. Cele mai mari valori, peste 25° dhG, sînt specifice râurilor din estul Cîmpiei Moldovei, din Cîmpia Fălciului și din partea de nord a Podișului Cuvîrului, unde apele au un grad ridicat de mineralizare.

Caracterele morfologice ale Podișului Moldovei au fost favorabile formării lacurilor (naturale și artificiale), determinînd apariția mai multor tipuri genetice (de tasare, de baraj natural, de albie majoră etc.).

Lacurile de tasare pe loess s-au format pe interfluvii aflate, în general, la maximum mai mari de 150 m. Aceste lacuri au o formă circulară sau ușor alungită, au suprafețe reduse (cîțiva zeci de m²), sînt puțin adînci (frecvente sub 1 m), adesea sînt invadate de vegetație higrofilă și sînt alimentate în principal din precipitații. După perioade îndelungate lipsite de alimentare superficială multe se usucă. Astfel de lacuri se întîlnesc în tot Podișul Moldovei unde, în laturile loessoide, se găsesc intercalații argiloase. Ele au o frecvență mai mare pe interfluvii Cîmpiei Moldovei (de exemplu, Balta lui Ciocan, Balta Arsă, Balta Roșie etc.).

Lacurile de baraj natural se întîlnesc mai frecvent pe versanții cu deplasări în masă, în spatele valurilor de alunecare. De cele mai multe ori aceste lacuri au o formă

alungită și adîncimi reduse (sub 1 m). Se alimentează atît din precipitațiile căzute direct sau drenate de rețeaua torențială, cît și din apele subterane, ceea ce le asigură o durată mare. În Podișul Moldovei acest tip de lac este frecvent dar, prin volumul redus de apă pe care îl conțin, prezintă importanță cu totul locală. Sînt rare cazurile în care valurile de alunecare barează fiul văii (cum este, de exemplu, Iazul lui Dumnezeu din valea Miletinului) sau în care un val de alunecare se alătură unui con de dejecție, formînd împreună un baraj natural (de exemplu, Iazul Minzuului de pe râul Mărișca, cuprins în bazinul Sitnei).

Lacurile de albie majoră (bălțile), localizate între denivelările dintre grinduri și versant, se alimentează din surse de suprafață (rîuri și precipitații) și din surse subterane (din stratul acvifer de versant). Aceste lacuri au suprafețe mari (de zeci și sute de hectare), dar au adîncimi mici, sub 1 m, mai rar peste 2 m. Tot în albiile majore se întîlnesc și lacuri de meandru cu formă liniară, de semilună sau de potcoavă. Sînt înguste și relativ adînci (circa 2 m). Deoarece la nivele medii râul mai păstrează legătura cu brațul părăsit, lacurile respective, în general, au apă permanent.

Ultimele două categorii de lacuri se întîlnesc frecvent în luncile Prutului (Balta Popii, Balta Lată, Balta Cărășelu, Balta Proboata, Balta Cîlbui, Balta Golăești etc.), Jijiei (Balta de la Vlădeni-Larga), Bîrladului (bălțile de la Crasna, Frunzeasca, Trestiana) etc.

Eleșteele sînt specifice cu deosebire în Podișul Sucevei. În general ele se formează în preajma izvoarelor, pe versanți sau la baza acestora, primînd apa și din precipitații. Apa lor se folosește la irigarea culturilor de legume și în piscicultură. Cînd sînt localizate în apropierea iazurilor sînt folosite pentru reproducerea peștilor și cîșterea puietului. Renumite în acest sens sînt eleșteele din Depresiunea Rădăuți.

Lacurile de baraj antropice sau iazurile constituie tipul cu frecvența cea mai mare. Adîncimea maximă este de 2—5 m, iar adîncimea medie de 1,5—2 m. Din această categorie sînt de amintit iazurile Horodnic (în bazinul Pozenului), Dornești (în valea Negostinei), Șerbănești (în bazinul Hătnuței), Dragomirna (pe râul Dragomirna), iazurile de la Fălticeni (pe Șomuzul Mare), Hăbășești

(de la Mielăușeni), Solești (în bazinul Vasluiului), Pușcași (în bazinul Racovei).

Cele mai favorabile condiții fizico-geografice pentru această categorie de lacuri se întâlnesc în Cîmpia Moldovei, unde au și densitatea cea mai mare. Mai cunoscute sînt iazurile Sulița-Drăceșani (pe Sitna), Podu Iloaiei (pe Bahluiet), Ciurbești (în bazinul Nicolinei), Negreni, Tătărașeni, Hănești (în bazinul Bașeuului), Gropnița (pe Jijicara) etc.

6.1.6. Vegetația și fauna

Floristic și geobotanic, Podișul Moldovei aparține regiunii euro-siberiene, iar în cuprinsul lui se interferă, prin părțile lor periferice, provinciile central-europeană (Al. Borza și colab., 1960) sau dacică (Tr. Săvulescu, 1940) și balcano-moesică (Al. Borza) sau sarmato-pontică (Tr. Săvulescu). Provincia central-europeană est-carpatică, cu specific predominant forestier, are cea mai mare extindere, ocupînd toată partea centrală și nord-vestică a podișului, în timp ce provincia sarmato-pontică, cu peisaj silvestepic și stepic, este localizată în părțile mai joase din estul și sud-estul acestei unități. Aspectul actual, atît de variat al vegetației spontane, ca și bogăția și coabitarea elementelor floristice de origini atît de diferite (central-europene, estice și sudice — pe fondul celor general europene și eurasiatice), sînt o rezultantă a evoluției pliocen-cuaternare și a poziției de răscruce fitogeografică a podișului. Aceste elemente se asociază în diverse fitocenozes, zonale sau intrazonale, în funcție de preferințele lor ecologice.

Vegetația zonală este reprezentată prin păduri de foioase, asociații de silvestepă și de stepă, dispuse în zone ce se succed, aproximativ în aceeași ordine, de la nord-vest la sud-est, ca o consecință a coborîrii reliefului și a modificării climatului în aceeași direcție. Limitele dintre zone sînt sinuoase, datorită pătrunderii adînci a vailor în podiș și netransante, din cauza tranzițiilor difuze și modificărilor antropice.

Zona (etajul) de pădure este în continuare directă cu cea din Carpații Orientali și Subcarpații din vestul podișului, cu care are strînse filidții singenetice și întrepătrunderi de elemente, mai ales în zona de contact. Fitoclimatic, această zonă ocupă peste 50% din suprafața podișului, respectiv părțile nord-vestică și centrală, cores-

punzătoare treptei celei mai înalte, cu climat mai umed și mai răcoros și cu soluri argiloiluviale. Față de codrii cei vechi, care acopereau cea mai mare suprafață a acestei zone, pădurile actuale nu totalizează mai mult de 15—20%, fiind înlocuite cu pajiști (15—20%) și, îndeosebi, terenuri arabile (60—70%). În acest spațiu se pot distinge trei subetaje.

Subetajul de fag—conifere, extins pe culmile piemontane de 500—600 m de la extremitatea nord-vestică a podișului, este reprezentat prin fragmente de păduri, formate din fag (*Fagus silvatica*) asociat cu molid (*Picea abies*) și brad (*Abies alba*), la care se mai adaugă carpenul (*Carpinus betulus*), gorunul (*Quercus petraea*), ulmul de munte (*Ulmus montana*), paltinul (*Acer pseudo-platanus*) ș.a. Pajiștile sînt dominate de asociații de iarba vîntului (*Agrostis tenuis*) și chiar de păiuș roșu (*Festuca rubra*).

Subetajul fagului, situat în continuare mai spre sud-est, la 400—500 m altitudine, cuprinde făgete și păduri de fag în amestec cu gorun, carpen, paltin, arțar (*Acer platanoides*), tei pucios (*Tilia cordata*), ulm (*Ulmus montana*, *U. foliacea*), frasin (*Fraxinus excelsior*) etc. Pajiștile prezintă asociații mai variate, formate din păiușcă (*Agrostis tenuis*), pieptănărită (*Cynosurus cristatus*), păiuș (*Festuca pratensis*), timoftică (*Phleum pratensis*) ș.a.

Subetajul evercineelor, corespunzător reliefului între 250 și 400 m, este cel mai extins și caracteristic pentru peisajul forestier al Podișului Moldovei. În afara stejarului (*Quercus robur*) și gorunului (*Q. petraea*), care sînt esențe dominante în majoritatea arboretelor (pe alocuri formînd chiar arborete pure), participă frecvent carpenul, teiul, frasinul, arțarul, jugastrul (*Acer campestre*), gladeșul (*A. tataricum*), ulmul de cîmp (*Ulmus foliacea*) ș.a. La altitudini mai mari se amestecă și fagul cu însoțitorii săi, iar spre limita inferioară și pe expoziții mai favorabile se insinuează diverse esențe termofile. Pajiștile sînt formate preponderent din asociații mezo-xerofite de păiuș (*Festuca valesiaca* și *F. sulcata*), firuță (*Poa pratensis*), iar pe pantele degradate prin pășunat și eroziune se instalează asociații de bîrboasă (*Botriochloa ischaemum*), păiuș (*Festuca pseudovina*), firuța cu bulb (*Poa bulbosa*), pirul gros (*Cynodon dactylon*) ș.a.

După frecvența stejarului și gorunului, ca și a unora din însoțitoarele lor obișnuite, se disting două areale cu caractere diferite. Un areal nordic, ce corespunde Podișului Sucevei, caracterizat prin răspîndirea largă a stejarului (*Quercus robur*), în arborete pure sau în amestec cu alte esențe, între care teiul pucios (*Tilia cordata*) se impune ca element de facies specific, iar elementele termofile lipsesc. Prezența masivă sau dominantă a stejarului are o explicație fitoistică (se pune problema remanenței sale din „optimul climatic” postglaciar) și edafică (fiind favorizat față de gorun de către substratul marno-argilelor sarmatene).

Cel de-al doilea areal, sudic, corespunde Colinelor Tutovei și Dealurilor Fălciului; nota specifică o dă prezența gorunului (*Quercus petraea*), mai rar în arborete pure și frecvent în amestec cu celelalte esențe, inclusiv cu gorunii sudici (*Q. dalechampii*, *Q. polycarpa*) — apoi a teiului argintiu (*Tilia tomentosa*) și, sporadic, spre periferia sud-estică, a esențelor termofile pătrunse din silvostepa vecină. Prezența gorunului în mai toate silvocenozele de aici se explică prin revenirea din refugiiile sudice odată cu încălzirea climatului postglaciar, favorizat fiind în fața concurenților de substratul predominant nisipos al sedimentelor pliocene.

Zona (etajul) de silvostepă apare sub forma unei benzi de lățimi diferite pe dealurile și colinele din estul și sud-estul podișului, cu altitudini în jur de 250 m. Ea corespunde climatului de un continentalism accentuat și substratului pedologic reprezentat, mai ales, prin cernoziomuri cambice. Peisajul natural de pajiști și pădurici se păstrează numai pe suprafețe reduse și adesea intens modificate de om, peste 80% fiind transformat în terenuri de cultură.

În cadrul ei se impune o netă separare în două areale. Un areal nordic, ce corespunde silvostepii din Cîmpia deluroasă a Moldovei, caracterizat prin bogăția elementelor estice și prin specificul structural al pîlcurilor de pădure. Acestea din urmă apar ca arborete pure sau, mai ales, ca amestecuri (șleauri) ale aceluiași arbori ca și în pădurile învecinate de la vest, esențele termofile fiind absente (sau cu totul sporadice în sud-est). Arbuștii au o frecvență apreciabilă, mai ales spre periferia pădurilor. Pe lângă cei specifici zonei forestiere vecine

— corn (*Cornus mas*), sînger (*C. sanguinea*), clocotiș (*Staphylea pinnata*), vonicer (*Evonymus europaea*), lemn rîios (*E. verrucosa*), verigar (*Rhamnus cathartica*), alun (*Corylus avellana*), porumbar (*Prunus spinosa*), măcieș (*Rosa canina*), păducel (*Crataegus monogyna*), soc (*Sambucus nigra*) —, în partea sud-estică se asociază arbuști est-continențali — voniceriul pitic (*Evonymus nana*), migdal pitic (*Amygdalus nana*), cireș pitic (*Cerasus fruticosa*) — și sudici: scumpia (*Cotinus coggygria*), verigariul (*Rhamnus tinctoria*). Pajiștile (în special pășuni) sînt formate din asociații de păiuș (*Festuca valesiaca*) și, mai rar, de colilie (*Stipa lessingiana*, *S. capillata*).

Arealul sudic cuprinde părți importante din Cîmpia colinară a Fălciului și Podișul Covurluiului, ambii versanți ai văii Bîrladului în avale de Crasna, sud-estul Colinelor Tutovei și are caracteristic prezența relativ bogată a esențelor termofile în componența pîlcurilor de pădure și a speciilor pontice în alcătuirea pajiștilor. Esențele termofile — stejarul pufos (*Quercus pubescens*), stejarul brumăriu (*Q. pedunculiflora*), mai rar gîrnița (*Q. frainetto*) — formează arborete pure sau participă, împreună cu celelalte esențe din pădurile vecine, la formarea șleaurilor de silvostepă de pe versanții sudici și sud-estici. O frecvență mai redusă au scumpia (*Cotinus coggygria*), cîrpinița (*Carpinus orientalis*), verigariul (*Rhamnus tinctoria*), mojdreanul (*Fraxinus ornus*).

Zona (etajul) de stepă ocupă suprafețe mult mai restrînse. În accepția ei tipică o întîlnim numai în jumătatea sudică a Cîmpiei Covurluiului (la sud de linia Vameș — Fîntînele — Vinători), unde condițiile de climă și cernoziomurile îi justifică existența. Condiții pedoclimatice apropiate și vegetația stepică apar în insule și pe versanții însoriți din zona de silvostepă sau sub formă de fișii în lungul văilor din sudul și estul podișului, ca cel mai coborît etaj de vegetație din cadrul acestuia. Vegetația spontană de stepă se întîlnește numai în puținele pășuni care se păstrează, sărăcite, însă, în specii prin degradare și ruderalizare. Pe pășunile mai puțin degradate întîlnim asociații de colilie (*Stipa lessingiana*, *S. joannis*, *S. pulcherrima*), negară (*S. capillata*), păiuș (*Festuca valesiaca*, *F. pseudovina*, *F. sulcata*), pir (*Agropyrum cristatum*, *A. intermedium*).

Vegetația intrazonală se diferențiază, conform condițiilor speciale locale, în vegetația luncilor, mlaștinilor și sărăturilor.

Vegetația luncilor este foarte variată. Făcând abstracție de microformele pozitive (grinduri, terase de luncă etc.) cu vegetație zonală sau de tranziție spre aceasta, precum și de microforme negative (microdepresiuni, cursuri și meandre părăsite) cu vegetație de mlaștină sau de sărătură — pe cea mai mare parte a luncilor se dezvoltă o vegetație de pajiști mezofile (inclusiv mezo-xerofile și mezo-higrofile) și, local, arborete specifice. Pajiștile sunt alcătuite predominant din graminee, la care se adaugă leguminoase (în special *Trifolium repens*) și diverse alte dicotiledonate. Vegetația lemnoasă este formată, cel mai adesea, din esențe slabe, grupate în sălcisuri, răchitișuri, plopisuri și aninișuri, sau în arborete de amestec ale acestor specii. În sectoarele mai puțin umede ale luncilor podișului, esențele moi se amestecă cu cele tari (indeosebi stejar, ulm, frasin), acestea din urmă putând forma chiar arborete pure.

Vegetația mlaștinilor are apariții insulare, frecvente pe lunci, rare pe versanți și accidentale pe unele interfluvii, iar vegetația sărăturilor apare tot sub formă de petice, insulare sau bandiforme, mai frecvente în luncile Prutului, Birladului și afluenților principali (Bașeu, Jijia, Bahlui, Sărata, Crasna, Tutova), mai rare pe versanții dealurilor din Cimpia Moldovei, acolo unde sunt intersectate intercalațiile de marne salinizate ale sarmațianului. Între halofitele mai obișnuite sunt menționate: *Camphorosma annua*, *Salicornia herbacea*, *Suaeda maritima*, *Artemisia salina*, *Aster tripolium*, *Statice gmelini*, *Kochia prostrata*, *Petrosimonia triana*, *Taraxacum bessarabicum*, *Puccinellia distans*, *Juncus gerardi*, *Leuzea salina* ș.a.

Pădurile și pajiștile, care mai acoperă în prezent doar ceva peste 30% din suprafața podișului, constituie încă importante resurse economice, îndeosebi acolo unde sunt întreținute și exploatate rațional. Pădurile, în majoritatea lor din clase mijlocii și superioare de producție, furnizează cantități importante de material lemnos pentru industrie, construcții și alte sectoare ale economiei, substanțe colorante și tanante, fructe, plante melifere și medicinale etc. Pajiștile naturale, cu o producție de 3 000—6 000 kg/ha pentru pășuni și 8 000—12 000 kg/ha pentru fânețe, sunt încă departe de potențialul pedoclimatic

și de necesitățile dezvoltării sectorului zootehnic. Prin măsuri corespunzătoare de întreținere, fertilizare, ameliorare, raționalizare a pășunatului, se poate ajunge la o evidentă îmbunătățire calitativă și la dublarea sau chiar triplarea producției medii — așa cum au demonstrat stațiunile experimentale de la Perieni-Birlad, Podu Iloaiei, Suceava etc. Acolo unde pădurile și pajiștile au fost menținute, eroziunea solului și degradările de teren au fost frinate. Dezechilibrele la care s-a ajuns în multe părți ale podișului au avut ca principal punct de plecare intervenția nerațională a omului prin defrișări masive de păduri și destelenirea exagerată a pajiștilor. Aceste acțiuni au declanșat reacții negative în lanț asupra calității celorlalți componenți ai mediului natural, manifestate prin eroziune intensă și degradări de teren, continentalizarea accentuată a climatului, imputinarea alarmantă a faunei, reducerea debitului apelor freactice și regimul capricios al celor de suprafață. Eforturile deosebite ce se fac în prezent, de mărire a suprafețelor forestiere (îndeosebi prin împădurirea versanților degradați), de întreținere și exploatare rațională a pădurilor și pajiștilor, de mai bună gospodărire a apelor și solurilor, au în vedere refacerea echilibrului natural, conservarea și valorificarea rațională a mediului înconjurător.

Fauna terestră din Podișul Moldovei este cea specifică zonelor de vegetație (forestieră, silvostepă, stepă), cu mențiunea că ea și-a restrins mult arealul și numărul, din cauza accentuatei reduceri și degradării formațiunilor vegetale cu care formează biocenoză și că amestecurile interzonale de faună sunt mult mai frecvente, datorită mobilității și spectrului ecologic mai larg al componentelor sale.

Fauna pădurilor de foioase este reprezentată în primul rind prin cervide — caprioara (*Capreolus capreolus*), cerbul carpatin (*Cervus elaphus*), mai puțin cerbul lopătar (*Dama dama*); suide — porcul mistreț (*Sus scrofa*); canide — lupul (*Canis lupus*), vulpea (*Canis vulpes*), ciinele enot (*Nyctereutes procyonoides*), venit din colonizările făcute în Ucraina; mustelide — nevăstuica (*Mustela nivalis*), hermelina (*M. erminea*), dihorul (*M. putorius*), jderul de piatră (*Martes foina*), jderul de copac (*M. martes*), bursucul (*Meles meles*); felide — pisica sălbatică (*Felis silvestris*) și rozătoare. Este o mare bogăție de păsări: picide — ciocâni-

toarele (*Dendrocopos majos*, *D. medius*, *D. minor*) și gheonoaiele (*Picus viridis*, *P. canus*, *Dryocopus martius*) și apoi strigide (răpitoare de noapte), paridele, columbidele și falconiformele. Sitarul (*Scelopax rusticola*) este pasăre de pasaj, iar fazanul (*Phasianus colchicus*), colonizat. Cu o frecvență apreciabilă întâlnim: cucul (*Cuculus canorus*), pupăza (*Upupa epops*), dumbrăveanca (*Coracias garrulus*), graurul (*Sturnus vulgaris*), grangurul (*Oriolus oriolus*), presurile (*Emberiza calandra*, *E. hortulana*, *E. citrinella*), lipitoarea (*Caprimulgus europaeus*), cojoaica (*Certhia familiaris*), țicleanul (*Sitta europaea*), mătăsarul (*Bombycilla garrulus*) etc. Reptilele au puține specii caracteristice acestei regiuni, iar amfibii ce populează ochiurile mlaștinoase-băltoase sînt mult mai numeroase. Mai rar, prin pădurile de fag îndeosebi, întâlnim și salamandra (*Salamandra salamandra*). În nord-vestul podișului sînt semnalate unele elemente caracteristice regiunilor submontane și montane: broasca de mlaștină (*Rana arvalis*), broasca de pădure (*R. temporaria*) și broasca rîioasă brună (*Bufo bufo*), iar în vecinătatea silvostepii pătrunde și broasca brună de pămînt (*Pelobates fuscus*).

Fauna silvostepii și stepii este mai săracă decît a pădurilor, ea avînd cel mai mult de suferit de pe urma activităților umane. Mamiferele cele mai reprezentative sînt din grupul rozătoarelor: popîndăul (*Citellus citellus*), cățelul pămîntului (*Spalax leucodon*), șoarecii (*Microtus arvalis*, *Micromys minutus*, *Mus musculus*, *Apodemus agrarius*, *Sicista subtilis*), hîrciogul (*Cricetus cricetus*), iepurele (*Lepus europaeus*) etc., multe din ele constituind hrana preferată a mustelidelor (dihorul, nevăstuica). Lor li se alătură și unele mamifere caracteristice zonei silvestre vecine (căprioara, mistrețul, vulpea, lupul, bursucul), iar în sudul extrem al podișului își face uneori apariția șacalul (*Canis aureus*). Păsările specifice sînt prepelița sau pitpalacul (*Coturnix coturnix*), potîrnicea (*Perdix perdix*) și, sporadic, în sud-estul podișului, spurcaciul (*Otis tetrax*). În sudul Moldovei au pătruns și unele reptile stepice est-europene: șarpele rău (*Crotalus jugularis*), șopîrla de stepă (*Lacerta taurica*), iar dintre amfibii broasca verde de pămînt (*Pelobates syriacus*), element est-mediteranean.

Dintre mamiferele acvatice din apele stagnante, comune sînt șobolanul de apă (*Arvicola*

la terrestris) și chițcanul (*Neomys fodiens*), la care se adaugă bizamul (*Ondatra zibethica*), pătruns recent în mlaștinile și bălțile din estul podișului, și vidra (*Lutra lutra*) pe cale de dispariție. Avifauna biotopurilor acvatice este încă numeroasă și variată. Cel mai bine reprezentate sînt anseriformele (prin rațele și gîștele sălbatice), rallidele (lișița, gănușa de baltă, cristei etc.), charadriiformele (prundărașul, becaținele, sitarul, nağıțul etc.), ciconiiformele (stirci, berze, mai rar egrete) etc. Acestea li se adaugă, ca oaspeți de vară: pescărușul albastru (*Alcedo atthis*), lăcarii (*Acrocephalus arundinaceus*, *A. palustris*), lăstunul de mal (*Riparia riparia*), iar ca oaspeți de iarnă: eufundacii (*Gavia arctica*, *G. stellata*), feres-trașul (*Mergus albellus*). Între păsările de pradă mai comune sînt: heretele de stof (*Circus aeruginosus*), vulturul pescar (*Pandion haliaetus*), codalbul (*Haliaetus albicilla*), acvila țipătoare (*Aquila pomarina*), șoimul dunărean (*Falco cherrug*) ș.a.

Ichtiofauna, relativ bogată și variată, este distribuită în zone, ce pot fi urmărite de la nord-vestul spre sud-estul podișului și în lungul rîurilor care-l străbat: zona păstrăvului, limitată la cîteva pîraie mici de la extremitatea nord-vestică, reprezentată prin păstrăv (*Salmo trutta fario*), zglăvec (*Cottus gobio*), boiștean (*Phoxinus phoxinus*), giindel (*Noemacheilus barbatulus*) — relict glaciar; zona lipanului și moioagei, corespinzătoare părții vestice a Podișului Sucevei, caracterizată prin prezența lipanului (*Thymallus thymallus*) și mreței vinete sau moioagei (*Barbus meridionalis*), în asociere cu specii coborîte din zona păstrăvului și cu unele specii ale zonei scobarului; zona scobarului include cursurile inferioare ale Sucevei, Moldovei și Bistriței, cursul Siretului de la graniță pînă spre Adjud și al Prutului pînă în amunte de gura Jijiei, fiind reprezentată prin scobar (*Chondrostoma nasus*), însoțit cu cleanul (*Leuciscus cephalus*), mreana (*Barbus barbus*), moioaga, lipanul, porcușorul comun (*Gobio gobio*), morunașul (*Vimba vimba*), oblețul (*Alburnus alburnus*) etc.; zona mreței, specifică sectoarelor nisipoase de pe cursul inferior al Siretului și Prutului, în care se întîlnește un amestec variat de mreană (*Barbus barbus*), somn (*Silurus glanis*), plevușcă (*Leucaspis delineatus*) și diverși reprezentanți ai zonelor scobarului, cleanului și păstrăvului; zona cleanului corespunde cursurilor superioare

și mijlocii ale râurilor din părțile estică și centrală ale podișului (Cîmpia Moldovei și Podișul Birladului), unde cleanul (*Leuciscus cephalus*) se asociază cu scobarul, mreana, bibanul și alți pești din zonele acestora; zona bibanului, o continuare spre sud-est a celei precedente (îndeosebi pe cursurile inferioare ale Jijiei și Bahluiului), în care bibanul (*Perca fluviatilis*) este însoțit de clean, obleț, mreană etc., crap și asociații acestuia; zona crapului este caracteristică cursurilor terminale ale râurilor (Prut, Siret, Birlad, Dunăre) și bălților adiacente din extremitatea sud-estică a podișului. Specia dominantă și cu cea mai mare importanță economică este crapul (*Cyprinus carpio*), asociat cu șalăul (*Lucioperca lucioperca*), știuca (*Esox lucius*), somnul (*Silurus glanis*), plătica (*Abramis brama*), văduvița (*Leuciscus idus*), zvirloga (*Cobitis taenia*), roșioara (*Scardinius erythrophthalmus*), carasul (*Carassius auratus*), avatul (*Aspius aspius*), țiparul (*Misgurnus fossilis*) etc. Peștii din zona crapului pot urca, în proporții tot mai reduse, pînă în zona mreiei (și chiar a scobarului), după cum compoziții ai acestor zone coboară pînă aici. Creșterea densității și intensificarea activității umane au dus și aici la restrîngerea, degradarea sau dispariția mediilor de viață favorabile faunei spontane (păduri, pajiști, mlaștini, bălți), cu efect asupra reducerii numerice și chiar dispariției unor specii, verigi importante în echilibrul geosistemic. Au dispărut astfel bourul (*Bos primigenius*), castorul (*Castor fiber*), antilopa (*Antilopa*


și zoogeografică, de răscruce a provinciei central-europene (cu faună predominant forestieră) cu cea sarmato-pontică (cu faună predominant stepică), la care se adaugă unele elemente est-mediteraneene și balcanice în partea sa sudică, boreale și relict glaciale în partea nordică, precum și numeroase specii de pasaj. De aici necesitatea conservării acestui veritabil mozaic faunistic. Prin legislația actuală se reglementează vînatul și pescuitul, se încurajează colonizarea de specii utile, se ocrotesc animalele reduse sub necesitățile de echilibru biologic sau devenite rarități științifice (vidra, spurcaciul, corbul, acvila ș.a.).

6.1.7. Solurile

Trăsătura esențială a învelișului pedologic din Podișul Moldovei o constituie dispoziția zonal-etajată a principalelor tipuri și subtipuri de sol, începînd cu cele mai puțin evoluate din est și sud-est (soluri cernoziomice) spre cele mai evoluate din vest și nord-vest (soluri argilo-iluviale). Prezența insulară sau bandiformă a solurilor intrazonale, condiționate de factorii locali ai solificării, complică, dar nu desființează zonalitatea de bază a fondului pedologic (fig. 147).

Zonele (etajele) de sol corespund la două principale clase de sol: molisoluri (soluri cernoziomice) și argiluvisoluri, dificil de delimitat între ele datorită întrepătrunderilor și faciesurilor de tranziție. Ambele zone

Fig. 147. Profil complex între vîlele Moldovei și Prut. Tipuri genetice zonale de sol: SP — soluri albice; BP — soluri brune albice; BM — soluri brune; CN — soluri cenușii; CC — cernoziomuri cambice; CZ — cernoziomuri.



saiga), dropia (*Ovis tarda*). Pe cale de dispariție este spurcaciul (*Ovis tetra*) și au scăzut sub limita echilibrului biologic sau necesarului economic unele mamifere (lupul, vulpea, iepurele, jderul, vidra), păsări (prepele, potîrnicea, rața, gîsca, lișița, sitarul ș.a.) sau răpitoare (unele falconiforme, strigiforme, paride, silviide, fringilide etc.) ce se hrănesc cu dăunători animalii și vegetali.

Importanța științifică deosebită atribuită faunei Podișului Moldovei rezultă din pozi-

prezintă două sau mai multe subzone (subetaje), după tipul de sol predominant.

Solurile cernoziomice (molisolurile), situate în estul și sudul podișului, cuprind ca principale tipuri de sol: cernoziomurile, cernoziomurile cambice și cernoziomurile argiloiluviale. Cernoziomurile se întîlnesc numai în Cîmpia Coveluiului, unde coincid cu arealul stepei propriu-zise. Au o fertilitate potențială ridicată, datorită bogăției în humus (3—5,5%), cu o netă dominare a celui

humic, în azot (0,15—0,25%), fosfor (0,12—0,20%). Soluri analoage sau în diverse stadii de evoluție spre cernoziomuri se mai întâlnesc, în arealele disjuncte, pe formele joase de relief din lungul Prutului, Birladului inferior și afluenților principali, reprezentând etajul pedologic cel mai coborât sau, extra-zonal, pe versanții afectați de eroziunea slabă și moderată din aria cernoziomurilor cambice și argiloiluviale. Acestea sînt solurile cele mai extinse și cele mai reprezentative ale silvostepii din Podișul Moldovei. Doar pe versanții supuși eroziunii accentuate și pe văi sînt înlocuite cu soluri de evoluție (regosoluri, cernoziomuri) sau intrazonale. Cernoziomurile cambice și argiloiluviale se caracterizează printr-o fertilitate potențială și efectivă ridicată, consecință a conținutului apreciabil de humus (3—5%) și a calității acestuia (predominant huminic), bogăției elementelor de nutriție și climatului mai bogat în precipitații (480—550 mm). Un tip specific de sol, cu caractere și de molisoluri și de argiluvisoluri, îl constituie solul cernoziomoid (cunoscut în trecut mai ales sub numele de pratoziom). Acesta deține areale importante în Podișul Fălțiceniilor (sectorul Fălțiceni—Liteni—Suceava) și în șele Bălcauți, Bucecea, Ruginoasa. Se caracterizează printr-o fertilitate apreciabilă, datorită conținutului ridicat de humus și de elemente nutritive.

Solurile argiloiluviale ocupă părțile centrală și nord-vestică ale podișului, corespunzînd pădurilor de foioase. Ca tipuri principale apar soluri cenușii, soluri brune, luvisoluri albice (soluri podzolice).

Solurile cenușii se găsesc sub forma unei fișii de lățimi diferite în partea sud-estică și în cea estică, aproximativ între 200 și 300 m altitudine. Cea mai mare extindere o au în Podișul Birladului (îndeosebi în sud-estul Colinelor Tutovei, în Dealurile Fălciului și Crasnei), de unde se continuă spre nord în lungul Coastei Moldave și al Coastei Ibăneștilor. Areele insulare de soluri cenușii mai întîlnim pe dealurile de peste 180—200 m din Cîmpia Moldovei și pe formele joase sau cu expoziții favorabile din interiorul podișului înalt de la vest. Solurile cenușii fiind eubazice slab-moderat acide, cu conținut mijlociu de humus (în jur de 3%), au o fertilitate mijlocie spre bună. Spre deosebire de cele tipice și care au cea mai mare răspîndire, solurile cenușii închise (molice) au o fertilitate mai ridicată, apropiată de

a solurilor cernoziomice spre care fac tranziția, în timp ce cele cenușii deschise (podzolite) sînt de o fertilitate mai scăzută.

Solurile brune sînt cele mai răspîndite (spre vest-nord-vest de cele cenușii și la altitudini mai mari, 300—450 m) și corespund pădurilor de foioase cu sau fără fag. Față de solurile brune argiloiluviale cu fertilitate apreciabilă, cele brune luvice sînt mult mai răspîndite și se caracterizează printr-o evidentă podzolire (în orizontul superior) și argiloiluvierie (în orizontul intermediar). Prin proprietățile lor (conținut redus de humus și de substanțe nutritive, drenajul îngreuiat cu prezența fenomenelor de pseudogleizare și anaerobioză) sînt soluri cu fertilitate naturală scăzută.

Luvisolurile albice sînt localizate în nord-vestul podișului, pe dealurile înalte (în jur de și peste 450 m) din Podișul Sucevei. În areale izolate mai apar în Dealul Mare — Hirău și Podișul Central Moldovenesc. Împreună cu planosolurile, sînt solurile cele mai evolute și mai sărace din regiune, consecință a precipitațiilor bogate (600—700 mm) și a pădurilor de fag sau fag-conifere, care determină o argiloiluvierie și podzolire intensă. Orizonturile superioare (A și E) se caracterizează printr-un conținut sărac în humus (1—2,5%, predominant fulvic), intensă debazificare și levigare pînă la valori oligomezobazice și oligobazice (V : 20—60%), puternică acidifere (pH : 4,5—5,5), iar orizontul intermediar (B) printr-o intensă argiloiluvierie, ceea ce îl face greu permeabil și favorabil proceselor de anaerobioză și pseudogleizare. Se explică, astfel, fertilitatea nativă redusă.

Solurile intrazonale și slab dezvoltate au apariții insulare sau în benzi (ce totalizează circa 17% din Podișul Moldovei) și sînt reprezentate prin regosoluri și erodisoluri, dispersate în areale reduse pe versanții supuși eroziunii; soluri aluviale, în lungul văilor și coluviale, la baza versanților; soluri hidromorfe (de exces local de umiditate), între care freatic hidromorfe (lăcoviști, soluri gleice), frecvente pe șesurile văilor, și pluvial-hidromorfe, frecvente în partea umedă, forestieră a podișului; soluri halomorfe (solonețuri, solonceacuri), caracteristice văilor și versanților din estul și sud-estul podișului, cu climat arid, ce favorizează concentrarea sărurilor; soluri litomorfe, cu prezențe sporadice pe aparițiile la zi ale cal-

carelor (rendzine) și marelor argiloase bogate în carbonați (pseudorendzine).

Făcând abstracție de solurile acoperite cu păduri (16—17%) și de construcții social-economice (2—3%), rezultă că circa 80% din învelișul de sol este folosit în agricultură. Pe criteriul fertilității native de care dispun pentru agricultură, solurile pot fi grupate în următoarele categorii:

Solurile cu potențial ridicat de fertilitate, în care se includ cernoziomurile, cernoziomurile cambice și argiloiluviale, solurile cernoziomoide, solurile cenușii și brune molice, pseudo-rendzinele și solurile negre de fineață, unele soluri aluviale (bogat humifere) etc., atunci când nu sunt afectate de eroziune și de alți factori negativi. Aceste soluri se pretează la tot felul de utilizări agricole, dar cele mai ridicate note bonitative le primesc pentru culturi de plante cerealiere și tehnice.

Solurile cu potențial moderat de fertilitate sunt solurile brune și cenușii tipice sau slab podzolite, rendzinele, majoritatea solurilor aluviale, precum și solurile slab-moderat erodate din prima categorie. Au o pretabilitate aproximativ egală pentru culturi cerealiere, pașiști și plantații viti-pomicole (diferențierea făcându-se pe criteriul pantei, expoziției și altor factori ecologici), cu excepția celor aluviale (slab și moderat humifere) apte pentru cereale, plante tehnice, legume și zarzavaturi, pașiști.

Solurile cu potențial scăzut de fertilitate, respectiv, solurile erodate (erodisoluri) și slab dezvoltate (regosoluri) — cu pretabilitate limitată pentru pașiști, plantații viti-pomicole și forestiere; solurile acide (brune și cenușii luvce, luvsoluri albice, planosoluri), valorificabile pentru pașiști, plantații pomicole și mai puțin pentru culturi de cîmp, dintre care doar câteva se înscriu cu valori bonitative mari (cartoful, secară, plantele furajere, unele soiuri timpurii de porumb, grâu etc.); solurile hidromorfe (lăcoviști, soluri gleice și pseudo-gleice), bonitabile cu valori mai mari doar pentru finețe; solurile halomorfe (solonceacuri și solonețuri) — cu fertilitate naturală aproape nulă.

Dacă pentru solurile din prima categorie necesitățile de intervenție a omului se limitează la măsuri de punere în valoare a calităților native (prin irigații, agrotehnică corespunzătoare), cele din a doua și îndeosebi a treia categorie solicită măsuri complexe ameliorative (antierozionale, agrochimice, agrofii-

zice, agrotehnice) pentru a aduce aceste soluri la un nivel corespunzător de fertilitate și productivitate și pentru a le lărgi gama pretabilității.

6.1.8. Populația

Podișul Moldovei, prin particularitățile dinamicii, repartiției, mobilității și structurii populației și prin sporul natural mare, apare ca un important rezervor de forță de muncă. În toată perioada postbelică numărul de locuitori a fost în continuă creștere. Din 1966 populația totală a crescut de la 2,5 mil. la aproape 3 mil. locuitori.

Dezvoltarea industriei, cu implicațiile ei directe în procesul de urbanizare și al mobilității populației a imprimat ritmuri diferite dinamicii celor două medii. Între anii 1948 și 1956 cele mai importante creșteri au revenit mediului rural (84,4%). În continuare, pînă în 1966, raportul s-a schimbat în favoarea mediului urban, în cadrul căruia s-a realizat peste 50% din creșterea populației.

Între 1970 și 1990 intensificarea exodului rural a dus la schimbarea raportului dintre cele două medii, populația rurală a Podișului Moldovei reducându-se de la 2 074 000 la 1 872 000 locuitori. Schimbarea acestui raport este rezultatul evoluției diferențiate a populației în cele două medii, iar în interiorul mediului urban a diverselor categorii de orașe. Datorită aportului masiv de populație rurală, șapte dintre orașe au crescut de 3 pînă la 8 ori (Iași, Suceava, Bacău etc.). De asemenea, opt orașe (Birlad, Roman, Rădăuți ș.a.) și-au sporit numărul de locuitori de 1,5 pînă la 3 ori. Cele mici însă (Berești, Tîrgu Bujor ș.a.), ale căror creșteri de populație se realizează exclusiv prin spor natural, au evoluat mai lent iar unele chiar și-au redus numărul populației (Săveni), deoarece plecările au depășit rata sporului natural.

În mediul rural creșterile au fost mai mici, în unele cazuri apărînd chiar deficite. Sporuri între 10 și 20‰, în unele cazuri și mai mari, se realizează, în primul rînd, în localitățile periurbane. Municipiul Iași, de exemplu, cu o mare capacitate de atracție a forței de muncă, fiind și un loc de convergență a căilor de comunicație din partea de sud a Cîmpiei Moldovei, are în jurul său localități cu creșteri ale populației cu-

prinse între 20 și 26‰. Aproximativ aceleași valori apar și în jurul Sucevei sau în lungul văii Siretului.

Creșteri mai mici (5–10‰) se întâlnesc în Podișul Sucevei. Aici, pentru unele localități, agricultura diversificată, asociată cu o serie de activități de prelucrare primară a fructelor sau legumelor, de industrializare a sfecei de zahăr, a inului și cînepei, a lemnului, pentru altele dezvoltarea funcției de transport, le transformă în centre de polarizare locală.

Deși sporul natural mare este dominantă demografică a Podișului Moldovei, se întâlnesc, totuși, și arii cu descreșteri ale numărului de locuitori. Astfel apar unele arii din Colinele Tutovei cu deficite de 15 până la 30‰, iar din Dealurile Fălciului de 15 până la 20‰. Ariile de descreșteri sînt bine conturate în partea nordică a Cîmpiei Moldovei, unde chiar unele orașe, ele însele deficitare (Săveni), sînt înconjurate de localități cu descreșteri ale numărului de locuitori între 20 și 30‰ din totalul populației acestora.

Natalitatea în Podișul Moldovei prezintă cele mai mari valori din țară: între 16 și 21‰. Rata natalității este de 18,5‰, valoare mult peste media țării (11,8‰). Circa 60% din localități au valoarea natalității de 15–25‰, dar destul de des apare și rata de 25–30‰. Acestea formează arcale continui în partea de sud a Cîmpiei Moldovei, în Podișul Birladului și insular pe valea Siretului. În Colinele Tutovei, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Covurluiului apar izolat și valori de peste 30‰.

Rata medie a mortalității la nivelul întregii unități este de 9,0‰, inferioară mediei naționale (10,3‰). Valorile cele mai mici (între 5 și 7,5‰) apar în preajma marilor centre urbane, iar cele mari sînt proprii Colinelor Tutovei, Dealurilor Fălciului, Podișului Central Moldovenesc, regiuni mai izolate și cu o structură economică predominant agrară.

Podișul Moldovei este unitatea geografică din țară cu cele mai mari valori ale *sporului natural*: 9,5‰, adică de aproape de 1,8 ori mai mare decît media națională. În părțile sudice ale Cîmpiei Moldovei, în Podișul Sucevei, valea Siretului și parțial în Podișul Birladului, frecvența cea mai mare o au valorile de 15–20‰. În unele locuri se înregistrează valori de peste 20‰, cu o frecvență mai mare în județele Iași și Vaslui, care au și

cele mai mari creșteri medii la nivel național. Rata cea mai mică (de 5–7‰) se întâlnește în nordul Podișului Sucevei.

Podișul Moldovei este o regiune cu o pondere mare a populației rurale (54 %) și cu un foarte activ proces de mobilitate teritorială a locuitorilor. Județele Botoșani și Vaslui, care revin în întregime Podișului Moldovei, cu posibilități mai limitate de polarizare pe plan local a forței de muncă, au cel mai mare procent al plecărilor în alte județe din țară.

Caracteristice în mediul rural sînt, în general, valorile negative moderate ale migrației definitive, cuprinse între 5 și 10‰ din totalul populației pe comune. Pe fondul lor se intercalează arcale, reduse ca întindere, cu valori negative mari, cuprinse între 10 și 15‰ și chiar > 15‰. Acestea apar mai frecvent în nordul Cîmpiei Moldovei și mai puțin în Podișul Central Moldovenesc.

Valorile ușor negative se întâlnesc în jurul orașelor sau în lungul axelor de circulație, acestea înlesnind migrația pendulară. Sporul migratoriu este pozitiv numai în cîteva localități ce dispun de un nucleu industrial sau în comunele din apropierea orașelor.

Migrația pendulară a căpătat o intensitate deosebită și se leagă în special de orașele mari spre care fac naveta mulți locuitori din satele Podișului Moldovei: Iași (9 000 persoane), Suceava (10 000 persoane), Bacău (7 500 de persoane), Vaslui (4 500 persoane). Amplitudinea acestei categorii de migrații este mai mare la est de Siret decît la vest, dată fiind densitatea mai redusă a centrelor de polarizare. De aceea, se fac eforturi pentru crearea aici de noi centre de polarizare locală (Răducăneni, Tîbănești, Podu Iloaiei etc.).

Migrațiile în afara regiunii prezintă cele mai mari valori din țară. Județele Vaslui și Botoșani au înscris între 1966 și 1977 deficite de peste 89 000 și, respectiv, 86 000 de persoane. De asemenea, valori mari ale plecărilor au și județele Bacău (52 000 de persoane) și Suceava (42 000 de persoane). Această forță de muncă a fost absorbită de județele industrializate, Brașov, Timiș, Hunedoara și Constanța.

Pe fondul unui spor natural ridicat și al unei fertilități tradiționale mari, densitatea populației în Podișul Moldovei a cunoscut în ultimele șapte decenii creșteri de 89 loc./km² (de la 35 loc./km² în 1912 la 124 loc./km² în 1992).

Cele mai mari densități rurale în anul 1912, cuprinse între 125 și 150 loc./km², erau întâlnite în partea de vest a Podișului Sucevei și pe valea Siretului. Ele erau asociate frecvent cu valori de 75–100 și 100–125 loc./km². În restul teritoriului, acestea din urmă, în mediul rural, apar cu totul izolat, revenind doar unor târguri ca Săveni și Darabani sau comunelor Rădăuți-Prut, Ștefănești ș.a. Densitatea de 50–75 loc./km² predomină în Podișul Central Moldovenesc, în partea vestică a Colinelor Tutovei, la contactul dintre culmea Siretului și Cimpia Moldovei. Cele mai mici densități (între 25 și 50 loc./km²) se înregistrau în Cimpia Moldovei, valea Birladului și Colinele Tutovei.

În prezent cea mai populată parte a Podișului Moldovei este cea de nord-vest, adică Podișul Sucevei și culoarele Moldovei și Siretului, unde apar valori de 100–200 loc./km², pe alocuri chiar peste acestea (fig. 148).




Fig. 148. Densitatea populației din Podișul Moldovei

Densitățile medii, de 75–100 loc./km², sînt caracteristice părții sudice a Cimpiei Moldovei și zonelor de contact ale acesteia. Valorile cuprinse între 50 și 75 loc./km² le




Fig. 149. Densitatea așezărilor rurale în Podișul Moldovei (la 100 km²)

întîlnim astăzi în părțile de nord ale Cimpiei Moldovei și Podișului Birladului. Cele sub 50 loc./km² apar în cîteva arii, reduse ca suprafață, în Colinele Tutovei, în Dealurile Fălciului și în ariile împădurite ale Podișului Central Moldovenesc.

6.1.9. Așezările

Așezările rurale. Satul reprezintă un element dominant în peisajul geografic al Podișului Moldovei, răspîdit neuniform, datorită condițiilor istorice, sociale și naturale în care s-a dezvoltat. Informațiile statistice, alături de izvoarele cartografice care se referă la așezările rurale, indică o creștere a numărului acestora de la 1 977 de sate, consemnate în statistica rusă din 1774, la peste 2 500 de sate la recensămîntul din 1912. Comasarea satelor în perioada contemporană a dus la reducerea numărului lor la circa 1 800, acestea fiind neuniform repartizate în teritoriu (fig. 149).

Gruparea așezărilor a îmbrăcat în decursul timpului forme diferite, satele preferînd

liniile de contact geografice, cu distanțe mici între ele, adeseori ținându-se ca un lanț continuu (de exemplu, între Cucuteni și Deleni, pe contactul Dealului Mare al Hirlăului cu Cîmpia Moldovei). În localizarea satelor populația a urmărit să dispună de condiții avantajoase de apărare, de adăpost față de vînt și posibilitatea valorificării complementare a diferitelor categorii de teren agricol, a resurselor de apă și de material lemnos.

Analizînd satele din Podișul Moldovei, după numărul de locuitori, se desprind arii în care predomină așezările sub 800 de locuitori (în Cîlinele Tutovei și sud-vestul Podișului Central Moldovenesc), apoi arii în care majoritatea așezărilor au între 800 și 1 500 de locuitori (acestea fiind cele mai întinse) și arii în care așezările rurale cele mai numeroase trec de 1 500 de locuitori (Depresiunea Rădăuți, Coasta Iașilor etc.).

Actuala configurație a rețelei de așezări din Podișul Moldovei este rezultatul unei îndelungate evoluții istorice, pe fondul unei continuități de locuire, al unei depline permanențe umane autohtone. Vetrele numeroaselor așezări feudale reprezintă în mod curent continuarea unor forme prefeudale de locuire. O mare extindere au avut în feudalism *așezările țăranilor liberi* („răzăși”), care au menținut trăsăturile străvechii organizări a obștilor țărești prefeudale, obști ulterior divizate prin împărțirea moșilor satelor (a „hotarelor”) în gospodării familiale autonome. Satele răzășești s-au menținut în număr mai mare în regiunea odinioară împădurită din zona marginală sudică a Podișului Moldovei (Cîlinele Tutovei, Cîlinele Covurluiului și Dealurile Fălciului). Pe lângă acestea sînt menționate documentar, în secolele XV—XVI, multe așezări aservite (boierești sau mănăstirești), care se grupau teritorial în special în Podișul Sucevei, în Podișul Central Moldovenesc, ca și în fișile marginale ale ariilor de sate libere. Nevoia de forță de muncă a marii gospodării feudale, ca urmare a fugii țăranilor de pe moși și a numeroaselor invazii din exterior, a dus la formarea în decursul feudalismului a unor sate, slobozii, organizate pe locul unor vechi vetre părăsite („siliști”) sau în apropierea unor așezări preexistente.

În unele arii din Podișul Moldovei (în special în silvostepa Cîmpiei Moldovei), satele au apărut în legătură cu creșterea pastorală

a animalelor și cu întreținerea culturilor mai îndepărtate de satele propriu-zise, începînd de la sfîrșitul secolului XVIII, și mai ales în prima parte a secolului XIX, numeroase odăi (nuclee de populare sezonieră) tiind întîlnite și în Cîmpia Fălciului, Cîlinele Tutovei etc. Majoritatea acestora s-au transformat ulterior în așezări permanente, așa cum se poate constata în cazul a cel puțin 38 de sate-odăi, înregistrate încă pe hărțile topografice de la sfîrșitul secolului XIX. Odată cu infiltrarea relațiilor de producție capitaliste au apărut tîrgușoarele, așezări cu funcții comerciale și meșteșugărești, avînd un statut de trecere între rural și urban și o fizionomie semiurbană. Marea majoritate a acestora sînt în prezent o componentă a habitatului rural, în unele cazuri păstrînd anumite funcții polarizante (Sulița, Bucecea, Bivolari, Podu Iloaiei, Murgeni ș.a.).

În urma legilor agrare din anii 1878—1879, 1881, 1889 și 1921 s-au format numeroase așezări de *împroprietărire*, cu vetre organizate geometric, cu o frecvență mai ridicată în Cîmpia Moldovei și în dealurile Fălciului și Covurluiului. O categorie aparte o formează așezările apărute și dezvoltate odată cu construirea și modernizarea unor căi de comunicație (în special pe lângă stațiile de cale ferată), răspîndite mai ales pe valea Bîrladului: Crasna, Berheci-Gară, Gara Roșiești, Halta Dodești ș.a.

În Podișul Moldovei se pot distinge, în funcție de localizarea în teritoriu, următoarele tipuri de așezări rurale:

- așezări de *obîrșie*, situate în bazinele de recepție ale unor afluenți secundari, avînd condiții de apărare naturală în perioada feudală. Multe sînt situate în bazinele de recepție ale unor torenți care atacă liniile de cuestă — „hîrtoape”. Ele prezintă greutate în dotarea cu căi de comunicație moderne, dar dispun de adăpost față de vînturi, de izvoare și materiale de construcție;

- așezări de *terasă* cu condiții geografice relativ favorabile, avînd posibilitatea utilizării podului teraselor, stratelor acvifere de calitate, căilor principale de comunicație, orientate în lungul văilor;

- așezări de *con de dejecție și glacis*, localizate mai frecvent la gura afluenților secundari în văile principale dar uneori preferînd glacisurile coluvio-proluviale de la contactul versanților cu albiile majore;

- așezări de *grînd și scruntar*, situate în partea mediană a luncilor inundabile, mai

frecvent pe grindurile înălțate deasupra nivelului albiilor majore cu 2—3 m, determinând constituirea unui aliniament de așezări, dezvoltat uneori cel puțin din perioada feudală;

— așezări de *versant* și de *platou*, aflate în număr redus.

În diferitele subunități ale Podișului Moldovei se înregistrează o distribuție specifică a acestor categorii de așezări. În Podișul Sucevei predomină așezările de terasă, cele de obirșie și cele de platou interfluvial. În Podișul Central Moldovenesc satele de obirșie se grupează în „cuiburi” polinucleare, de dimensiuni variabile, în raport direct cu evoluția procesului de despădurire. Pe valea Birladului apar numeroase așezări de terasă, iar pe contactul cu culoarul Siretului — așezări de con de dejecție și glacis. În Colinele Tutovei aproape 60% din sate se află în bazinele de recepție ale afluenților secundari, pe versanții văilor principale și în lungul cuestelor (relieful fragmentat și procesul treptat de defrișare impunând formarea unor vetre mici și numeroase); izolat apar și așezări de terasă (pe valea Birladului) și așezări de con de dejecție și glacis (pe văile Berheciului, Zeletinului etc.). În Dealurile Fălciului și Colinele Covurluiului sînt numeroase așezările de obirșie. În Cîmpia Moldovei și Cîmpia Fălciului satele s-au dezvoltat în special pe terasele inferioare și terasele de luncă ale Prutului, Jijiei, Bahluiului, Bahluietului etc., apoi pe grinduri (de exemplu, în lunca comună a Prutului și Jijiei, între Trifești și Scoposeni), mai rar pe versanții conformi, slab înclinați sau pe interfluvii.

După morfostructură în Podișul Moldovei există două tipuri principale de așezări: așezări *răsfirate*, specifice în ansamblu zonelor de dealuri din țara noastră, și așezări *adunate*, întîlnite mai frecvent în Cîmpia Moldovei și Cîmpia Fălciului, dar și în unele zone din Podișul Sucevei.

Utilizîndu-se criterii complexe de definire (structura producției agricole și a populației ocupate, locul de muncă și rezidența al angajaților), în Podișul Moldovei se disting următoarele tipuri funcționale de așezări rurale:

— așezări cu funcții *agricole*, tipul dominant, cu majoritatea populației ocupate (peste 85%) antrenată în activități agricole; prezintă mai multe subtipuri determinate de specializarea producției, în funcție, mai ales, de condițiile pedoclimatice;

— așezări cu funcții *agroindustriale*, dispersate în masa de așezări agricole, funcția industrială fiind secundară, reprezentată mai ales printr-o industrie mică și artizanală, dar și cu cîteva unități industriale de interes republican, ca întreprinderile din Bucecea, Vlădeni, Podu Iloaiei, Murgeni, Podu Turcului, Verești, Dolhasca, Cotnari, Sascut, Lunca Cetățuiei ș.a.;

— așezări cu funcții *agricole și de servicii*, în număr restrîns, în general foste tirgușoare cu o funcție de polarizare, revitalizată prin construcția unor dotări social-culturale, comerciale și de prestări de servicii de interes zonal (Răducăneni, Murgeni ș.a.), alături noduri de cale ferată ce reprezintă puncte de atracție în teritoriu (Crasna, Buhăiești ș.a.) sau stațiuni balneoclimatice, deși puține, în funcție de resursele modeste de ape minerale (Strunga, Drinceni);

— așezări cu funcții *agricole și de cazare a forței de muncă*, situate în lungul principalelor căi de comunicație modernizate, în cadrul izocronelor de 60—90' față de centrul polarizator, avînd funcția de cazare a forței de muncă care participă zilnic la migrațiile pendulare, cu o frecvență mai ridicată în jurul unor centre de atracție ca reședințele de județ, municipiile Roman, Birlad și orașele Rădăuți, Pașcani și Dorohoi.

Așezările rurale din Podișul Moldovei vor cunoaște în continuare o evoluție ascendentă strîns legată de valorificarea resurselor naturale și potențialul demografic, de dezvoltarea economică, de gradul de dotare social-edilitară, de poziția față de căile de comunicație, care să le asigure legături lesnicioase cu marile centre urbane etc. Se urmărește dezvoltarea, în primul rînd, a actualelor așezări agroindustriale, pentru ca acestea să devină într-un viitor apropiat centre de coordonare și polarizare a localităților din teritoriile înconjurătoare, cu posibilități de organizare a vieții la nivel urban. Așa sînt, de exemplu, Vlădeni, Ștefănești (în apropierea sistemului hidro-tehnic Stîncă—Costești), Podu Iloaiei (nod de cale ferată), Răducăneni, Țibănești, Murgeni, Podu Turcului sau altele care au deja dezvoltată o bază economică proprie (activități industriale, unități zootehnice cu caracter intensiv etc.): Bucecea (cu o întreprindere de industrializare a sfelei de zahăr), Verești (cu topitorie de în, întreprindere de nutrețuri concentrate ș.a.), Dolhasca (centru al industriei materialelor de construcție),

Fălciu (cu un complex de tip industrial de creștere a porcinelor), Săscut (cu o întreprindere de prelucrare a sfelei de zahăr și o fabrică de cherestea), Codăiești ș. a. Se preconizează ca în localitățile Flămânzi și Belcești, unde au avut loc răscoale țărănești în anul 1907, să se sprijine dezvoltarea unor puternice centre civice de nivel urban și construirea unor unități industriale, care să valorifice resursele locale și să ocupe forța de muncă din alte localități din împrejurimi.

Multe din aceste așezări au o anumită tradiție polarizatoare în teritoriu, fie ca foste târgușoare comerciale (Bucecea, Podu Iloaiei, Răducăneni, Codăiești, Murgeni, Podu Turcului), fie ca foste centre administrative (Vlădeni).

În continuare și alte așezări au condiții pentru a se dezvolta ca centre economice și sociale cu caracter urban. Printre ele se pot cita: Trusești, Hlipiceni, Sulița în județul Botoșani, Puiesti, Ivănești în județul Vaslui, Bivolari, Cotnari în județul Iași etc.

Localitățile cu disponibilități balneoclimatice (Strunga, Răducăneni, Drinceni ș.a.) sau cu potențial turistic (Ruginoasa, Cotnari, Mircești, Dragomirna, Dobrovăț, Poieni, Ipotești) se vor dezvolta în continuare în aceste direcții, prin dotarea lor cu unități de profil și vor deveni astfel centre de atracție a unui număr mai mare de oameni nu numai din orizontul local, ci și din alte regiuni ale țării. În Podișul Moldovei, ca și în întreaga țară, se urmărește să se creeze acele tipuri funcționale de așezări care se vor putea dezvolta îndeosebi prin valorificarea potențialului economic și uman local.

Așezările urbane. Rețeaua de așezări urbane din Podișul Moldovei (cuprinzând 46 % din populație) se compune din 22 de orașe, revenind în medie un oraș la 1 150 km². Această densitate a rețelei este apropiată de cea medie a României, însă cu diferența că ariile polarizate de fiecare oraș sînt, în general, mult mai populate decît pe ansamblul țării. Din cele 22 de orașe, în 1992, numai patru depășesc 100 000 locuitori, Iași (342 994 de locuitori), Bacău (204 495 de locuitori), Botoșani (126 204 de locuitori) și Suceava (114 355 de locuitori), trei dintre ele au între 50 000 și 100 000 locuitori: Roman, Birlad, Vaslui, iar dintre celelalte 15 numai




Fig. 150. Rețeaua de orașe din Podișul Moldovei, mărime și funcții. 1, Funcție complexă; 2, dominant industrială; 3, de servicii; 4, agroindustriale.

6 depășesc 20 000 locuitori (Pașcani, Dorohoi, Huși, Rădăuți, Fălticeni, Adjud (fig. 150).

Urbanizarea mai redusă se datorește stagnerii fenomenului urban în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și în prima parte a secolului XX (gradul de urbanizare al Podișului Moldovei era de numai 17,8% în 1948). Un dinamism deosebit se înregistrează după anul 1950, cînd orașe ca Suceava, Bacău, Vaslui, Adjud, Iași, Botoșani și Pașcani cunosc creșteri de 3–8 ori după 1948, iar altele, cum sînt Birlad, Roman, Fălticeni, Hirlău, Rădăuți, Dorohoi, Tîrgu Frumos și Huși au un spor al numărului de locuitori de la 1,5 la 3 ori, în această perioadă. Mai există însă și așezări urbane cu un bilanț migratoriu negativ, datorită capacității reduse de polarizare, iar la unele, ca Săveni, deficitul migratoriu ajunge chiar să anuleze sporul natural.

Tipul de oraș caracteristic este cel apărut la începutul feudalismului (secolele XIII–XVI),

avându-și originea în străvechi așezări rurale. Aceste orașe formează până astăzi armătura urbană a Podișului Moldovei. Ele s-au dezvoltat în locurile urbigene optime, în lungul contactelor geografice (Huși, Hîrlău ș.a.), la întâlnirea marilor căi de comunicație (Suceava, Vaslui, Roman, Bîrlad) sau acolo unde avantajele poziției de contact se îmbină cu cele ale poziției de intersecție — Iași, Bacău, Botoșani, Dorohoi. Toate aceste orașe au manifestat în decursul timpului tendința spre o dezvoltare complexă, îndeplinind funcții productive, administrative (sedii ale unor curți domnești și chiar capitale de principat, reședințe de ținuturi și ocoale etc.) și de relații (comerț, transporturi).

Condițiile social-economice apărute în perioadele modernă și contemporană au dus la dezvoltarea diferențiată a orașelor care s-a reflectat atât în dinamism, cât și în gradul mai mult sau mai puțin avansat de modernizare al lor, unele fiind puternic transformate (Bacău, Suceava, Vaslui etc.), altele păstrînd încă anumite trăsături tradiționale (Huși). Specifică în dezvoltarea acestui tip de orașe este valorificarea optimă a cadrului geografic local, fie că este vorba de terase ferite de inundații (Iași, Bacău, Roman, Vaslui, Hîrlău), de interfluvii înalte (Suceava) sau de mici depresiuni bine adăpostite (Siret, Huși). Adaptarea la morfologia locală a dat naștere, însă, unei trame stradale complicate, dezvoltate de regulă pe scheletul radiar al principalelor axe de penetrație.

Alt tip de orașe este cel apărut ca urmare a dezvoltării economiei de piață, începînd cu ultimele decenii ale secolului XVIII. Este generația așa-numitelor „tîrgușoare” (Al. Obreja, 1936, V. Tufescu, 1943), așezări comercial-meșteșugărești, cîndva foarte numeroase (au fost, în total, 63), dar din care numai unele au ajuns la un nivel urban propriu-zis (Fălticeni, Pașcani, Adjud, Tîrgu Bujor, Darabani, Săveni, Negrești și Berești). Dezvoltate mai tîrziu, acestea au ocupat puncte urbigene secundare, în intersecții de interes mai redus (Negrești) sau în locurile mai puțin polarizate urban anterior (Săveni, Tîrgu Bujor). Unele dintre ele au cunoscut o dezvoltare mai intensă după construirea rețelei feroviare (Pașcani și Adjud), iar altele s-au ridicat după obținerea unei funcții administrative (Fălticeni). Fizionomic se deosebesc de orașele vechi, prin predominarea

unei trame stradale regulate, frecvent sudată cu cea a satelor apropiate preexistente (Săveni, Negrești, Darabani). Adesea aceste așezări cunosc o dezvoltare polinucleară, ca un conglomerat de nuclee urbane și rurale, cu spații largi între ele (cazul Fălticeniilor). În nord-vestul Podișului Moldovei se distinge un tip de orașe dezvoltate prin urbanizarea treptată a unor așezări rurale mai vechi, situate lateral față de marile căi de comunicație (Rădăuți și Solca). Acestea se recunosc ușor, neavînd trăsăturile unui urbanism dirijat. Trama lor stradală, de origine rurală, este lipsită de diferențe importante de densitate internă.

Ținînd seama de dimensiunile zonelor de influență ale orașelor, de raportul dintre populația orașului și cea a acestor zone, de coeficientul de autonomie al teritoriilor respective (Al. Ungureanu, 1980), și de existența unor relații specifice între talie și rang, în Podișul Moldovei se disting funcțional următoarele categorii de orașe:

— *orașe cu dezvoltare complexă și cu o zonă de influență la nivel regional*, din care face parte numai municipiul Iași. Zona de influență apropiată a lașilor depășește 3 500 km², iar zona de influență îndepărtată se extinde asupra întregii Moldove;

— *centre de echilibru județean* — Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui, Roman, Bîrlad; orașe cu funcții complexe, cu un rol coordonator important mai mult în teritoriul administrativ al județului. Datorită dezvoltării lor în ultimele decenii, aceste orașe au atras forța de muncă de pe teritorii care au depășit cu mult zona lor de influență apropiată;

— *centre de polarizare zonală* — Dorohoi, Rădăuți, Pașcani, Fălticeni, Huși și Adjud —, coordonatoare ale unor activități din zona lor imediat apropiată;

— *centre urbane locale* (în număr de 9), din care unele au o funcționalitate urbană în curs de conturare: Darabani, Săveni, Hîrlău, Tîrgu Frumos, Solea ș.a.

Ca o consecință a generalizării procesului de industrializare, în structura funcțională a orașelor s-au produs importante transformări social-economice. Din datele recensămîntului din 1930 reiese că în orașele Podișului Moldovei industria era slab dezvoltată. În prezent, în cele mai multe (12), industria a devenit ramura de bază a economiei, proporția celor antrenați în industrie

și construcții depășind chiar 50% (Birlad, Bacău, Roman, Iași, Fălticeni, Botoșani, Suceava și Dorohoi). Considerând și numărul mare al populației care locuiește în mediul rural și este antrenată în activități urbane (circa 110 000 de persoane) reiese și mai mult rolul funcției industriale în dezvoltarea centrelor urbane. Proportia cea mai ridicată a forței de muncă domiciliată în mediul rural (din totalul personalului muncitor care lucrează în orașe) se înregistrează la Suceava (38,0%) și alte orașe, ca Pașcani, Hîrlău, Roman, Adjud, Tîrgu Frumos și Rădăuți (Al. Ungureanu, 1978). Mai există, însă, și câteva orașe, cum sînt Darabani, Solca și Berești, unde lipsa unei activități industriale corespunzătoare imprimă un comportament de tip rural deplasărilor populației ocupate, aici prevalînd deplasările spre orașele apropiate, Dorohoi, Suceava ș.a.

Procesul de industrializare a contribuit la dezvoltarea funcțiilor de servicii în unele orașe, remarcîndu-se în acest sens o anumită specializare. Astfel, transporturile joacă un rol mare în viața unor noduri feroviare, ca Pașcani, Adjud și Suceava. În învățămînt, cultură și artă lucrează un număr însemnat de locuitori din populația ocupată (de exemplu, în centrul universitar Iași 10,9%) și în unele orașe cu numeroase licee speciale (Roman și Tîrgu Frumos).

Privite sub aspectul dezvoltării social-economice, orașele din Podișul Moldovei se grupează în: *orașe cu funcții complexe*, cu cea mai echilibrată dezvoltare funcțională — Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui; *orașe cu funcții industriale* — Roman, Birlad etc.; *orașe specializate în servicii* — Adjud, Tîrgu Frumos și Siret; *orașe cu dominantă agricolă* — Darabani, Săveni, Solca, Berești.

O direcție principală de dezvoltare este aceea a clarificării zonelor funcționale interne și a creării de noi zone. În general, unitățile industriale au fost grupate în platforme periferice, ținîndu-se seama de direcția vînturilor dominante, de apropierea transportului feroviar, de terenul cu valoare minimă pentru agricultură și de posibilitatea unei legături lesnicioase cu cartierele de locuințe (zona industrială de sud-est, la Iași sau zona Rădăuți, la Vaslui). Cartierele de locuințe s-au construit de preferință în spațiile libere marginale. Construcțiile de locuințe au făcut ca în prezent, în majoritatea

orașelor, peste 50% din populație să beneficieze de apartamente cu o vechime sub 35 de ani. În multe orașe s-au organizat centre civice noi, cu edificii administrative și culturale construite după o arhitectură modernă, ca de exemplu la Vaslui, Roman și Botoșani. Rețeaua stradală a cunoscut remanieri importante, asigurîndu-se rocade de ocolire pentru traficul greu (la Suceava, Bacău, Vaslui) și magistrale de penetrație pentru trafic intens. A crescut suprafața spațiilor verzi organizate prin amenajarea unor noi parcuri și grădini publice multifuncționale (Grădina Botanică din Iași sau Parcul Tineretului din Suceava etc.).

6.1.10. Agricultură

Dezvoltarea agriculturii în ultimii zece ani s-a axat pe regionarea culturilor în funcție de condițiile pedoclimatice, stabilirea de asolamente, crearea de îndigui, desecări, extinderea irigațiilor în special în valea Prutului mijlociu, în culoarul Siretului, în bazinul Jijia — Bahlui.

Podișul Moldovei deține o pondere importantă în contextul agriculturii țării atît la culturile de cîmp, cît și în domeniul zootehnic. Acestuia îi revin 13,1% din suprafața agricolă a țării, 15% din arabil, 20,5% din plantațiile de vii. Podișul se înscrie cu valori mari la cultura și producția de cereale, precum și la unele culturi tehnice, ca floarea-soarelui 13,1%, in pentru fuior 15,7%, sfeclă de zahăr 17,6%, cartofi 21,2% ș.a.

Principalul sector de activitate, cultura plantelor, realizează 76% din valoarea producției globale agricole. Cerealele ocupă 61,4% din suprafața arabilă a podișului, iar dintre acestea grîul și secara dețin 23,1%, orzul 6,5%, iar porumbul peste 32%.

Cultura grîului precumpănește în părțile centrală și nordică ale Cîmpiei Moldovei, unde deține între 25 și 30% din terenul arabil. În culoarul Siretului mijlociu și inferior, în unele părți ale Podișului Bîrladului, cerealele panificabile reprezintă peste 30% din suprafața arabilă.

Porumbul ocupă circa 15% din suprafața cultivată la nivelul țării. El apare dominant în Podișul Central Moldovenesc, unde poate ajunge la 40—45% sau chiar mai mult din suprafața arabilă. Cu procente ridicate se înscriu și unele comune din Cîmpia Moldovei, din valea Siretului și podișul piemontan.

Producția la hectar prezintă diferențieri apreciable de la o regiune la alta, cele mai bune recolte obținându-se în Culoarul Siretului și valea Prutului.

Orzul deține 11,5% din suprafața cultivată cu această cereală la nivelul țării. Cea mai mare frecvență apare în Podișul Sucevei, unde deține între 20—30% din suprafața arabilă. În Podișul Central Moldovenesc, Cîmpia Moldovei și Podișul Căminului ocupă sub 10% din suprafața arabilă.

Plantele industriale (floarea-soarelui, soia, sfecla de zahăr, inul și cânepa) sînt cultivate pe mai mult de 160 000 ha. Suprafața cea mai mare este ocupată de floarea-soarelui (67 000 ha), care are cele mai prielnice condiții de dezvoltare în Cîmpia Moldovei (unde deține între 2 și 11% din suprafața arabilă), ca și în anumite părți din Podișul Bîrladului și din valea Siretului. În ultimii ani s-au extins culturile de soia care ocupă aproximativ 35 000 ha. Cele mai extinse suprafețe sînt concentrate în Podișul Central Moldovenesc, în Colinele Bîrladului, în părțile centrală și sudică ale Cîmpiei Moldovei. Sfecla de zahăr, plantă tehnică tradițională în Podișul Moldovei, se cultivă pe 46 000 ha, sau 17,6% din suprafața cultivată pe țară. Condiții pedoclimatice optime pentru dezvoltarea acestei plante întrunesc, în primul rînd, Culoarul Siretului și valea Moldovei, unde deține între 5,5 și 10,7% din suprafața arabilă. Urmează aria din cursul inferior al Moldovei și de la confluența acesteia cu Siretul, părțile centrală și nordică ale Cîmpiei Jijia — Bahlui, regiuni care se impun prin cele mai bune rezultate în producția la hectar (în jur de 450 q).

Dintre plantele textile importanță mai mare are inul, cultivat pe circa 10 500 ha, sau 15,7% din suprafața cultivată pe țară. Podișul Sucevei concentrează 70% din suprafața cultivată cu in în Podișul Moldovei. Cele mai importante suprafețe se află în comunele din bazinul Șomuzului Mare, bazinul mijlociu și inferior al Moldovei, bazinul Sucevei și de la confluența acesteia cu Siretul. Cânepa ocupă 4 100 ha, adică 12,3% din suprafața cultivată pe țară. Cele mai întinse suprafețe se găsesc în Podișul Sucevei, în Podișul Bîrladului, unde se detașează, prin suprafață și producție, comunele din bazinul Vasluietului.

Tutunul, cultură tradițională în sudul podișului, ocupă suprafețe întinse în partea

estică a bazinului Vasluietului, căruia îi revine 90% din suprafață (2 000 ha).

În structura culturilor de cîmp un loc important îl are cartoful, care este cultivat în toate unitățile agricole din Podișul Moldovei. Cele mai prielnice condiții de dezvoltare le oferă Podișul Sucevei. Arie compacte de cultură sînt pe interfluviul Suceava—Siret, unde ponderea cartofului în suprafața arabilă oscilează între 20 și 26,5%. Cu aceeași proporție se înscriu comunele de pe dreapta Sucevei din cursul său inferior. Suprafețe mai restrînse, între 8 și 15% din suprafața arabilă, au unele gospodării de la confluența Moldovei cu Siretul, arie cu vechi tradiții în cultura cartofului. În Cîmpia Moldovei și Podișul Bîrladului se cultivă mai mult cartoful timpuriu.

Legumicultura, ramură importantă a economiei agricole, deține, 1,7% din suprafața arabilă a Podișului Moldovei.

Bazine legumicole importante se întîlnesc în aria de influență a municipiului Iași, în special în lunca Prutului în comunele Bivolari, Moșna, Cozmești, unde legumicultura constituie unul din principalele sectoare ale agriculturii acestora. Cultura legumelor, ramură cu vechi tradiții, este bine dezvoltată în Depresiunea Huși, în lunca Prutului, între localitățile Costești, Deleni și Vetrișoia, unde suprafața cultivată variază între 5 și 10% din suprafața arabilă. Legumicultura s-a extins de asemenea și în vecinătatea municipiilor Suceava și Bacău.

În nordul, nord-vestul și vestul podișului, în structura culturilor de legume predomină varza, castraveții și rădăcinoasele, în timp ce în est și mai ales în sud, suprafețele cele mai mari sînt ocupate cu legume termofile: roșii, ardei și vinete.

Podișul Moldovei deține o pondere importantă în suprafața și producția de leguminoase pentru boabe, fasole și mazăre, plante ce se cultivă atît în ogor propriu, cît și ca plante intercalate între alte culturi. Cele mai bune rezultate se obțin în partea centrală a Cîmpiei Moldovei și în Podișul Sucevei.

Viticultura este bine dezvoltată în Podișul Moldovei, suprafața ocupată de vii fiind de circa 64 000 ha. Aici se află una dintre cele mai vechi și renumite podgorii — Cotnari. Deși situată la limita nordică a ariei culturii vitei de vie, condițiile geografice locale favorizează o producție de calitate superioară din soiuri indigene perfect adaptate

condițiilor locale. Cele mai întinse plantații, cultivate cu soiuri pentru vinificație, se localizează în Podișul Birladului, iar în ariile periurbane (în primul rând a Iașului) soiurile de masă dețin o proporție mai mare. Podgorii importante sînt în estul și nord-estul Podișului Birladului, în perimetrul Răducăneni—Huși—Vetrișoia, în tot bazinul Elanului, în Dealurile Fălciului. Aici se detașează podgorii mari în raza localităților Huși (peste 1 550 ha), Duda, Epureni (cu peste 760 ha), Bunești, Averești (500 ha) etc. Colinele Birladului, cu pante înșorite, expuse spre sud, sud-est și sud-vest, dețin peste 19% din suprafața ocupată cu vii a podișului. Podgorii mari sînt la Podu Turcului (737 ha), Priponești (478 ha), Buciumeni (454 ha), Glăvănești (470 ha) ș.a.

În sudul podișului se remarcă unele comune din Podișul Covurluiului, iar în nord cele din aria Dealu Mare—Hîrlău și în special cele din apropierea municipiului Iași (Moșna, Cozmești, Costuleni), unde plantațiile viticole dețin pînă la 53% din suprafața agricolă. În ultimii ani s-au extins plantațiile de vii în partea central—nordică a Cîmpiei Jijia—Bahlui.

Pomicultura este larg răspîdită, suprafața ocupată fiind apreciată la peste 32 000 ha, adică 8,5% din livezile țării. Cele mai importante livezi în masiv sînt în Podișul Sucevei. Sînt renumite livezile din bazinul Șomuzului Mare (care însumează peste 2 600 ha), cu regiunea pomicolă Fălticeni—Rădășeni, arealul Preutești—Valea Glodului. Suprafețe mari cultivate cu pomi fructiferi se află și la Vulturești și Dolhești. În plantații predomină mărul, cu 88% din totalul livezilor, cu soiuri rezistente la geruri și dăunători. Cu procente mai reduse se înseriu prunul (6%) și părul (4%).

În Podișul Sucevei, suprafețe relativ mari ocupate cu livezi se află și în aria periurbană a municipiului Suceava, în comunele Horodniceni, Răucești, Poienari, unde livezile ocupă între 100 și 240 ha. Condiții deosebit de prielnice pentru dezvoltarea pomiculturii sînt în masivul Dealu Mare—Hîrlău, unde cultura pomilor fructiferi a căpătat importanță deosebită în comunele Cotnari (900 ha), Deleni (500 ha), Strunga (652 ha) etc. Pomicultura ocupă un loc important în economia agricolă din Podișul Birladului, în aria nord-estică a Podișului Central Moldoveneșc, bazinele Miroslava—Tomești—Moșna

—Cozmești. Cele mai întinse plantații sînt în comunele Costuleni (527 ha), Comarna (421), Miroslava (415 ha) ș.a. Bazine pomicole importante s-au format în partea nordică și sud-estică a Colinelor Birladului. Sînt renumite livezile de meri de la Voinești, Laza—Poienesti, Perieni, Ivești, Iana—Pogana și Tutova. Alte bazine pomicole mai pot fi amintite în Dealurile Fălciului, Podișul Covurluiului etc.

Creșterea animalelor este favorizată de o bază furajeră bogată și variată: pășuni naturale, finețe, plante furajere cultivate, furaje concentrate. Pășunile și finețele naturale dețin, în medie, 13,2% și, respectiv, 2,6% din suprafața totală a podișului. Pășunile au o arie mai largă de răspîndire în partea sudică a Cîmpiei Moldovei și în Podișul Birladului. În nord-vestul Podișului Moldovei suprafața ocupată este egală sau chiar mai mare decît cea acoperită cu finețe naturale. Finețele naturale înseriu procente ridicate în comunele din lunca Prutului. Trifoiul se cultivă în vestul și nord-vestul podișului, acolo unde climatul este umed și răcoros. Această parte concentrează 97% din întreaga suprafață cultivată cu trifoi din Podișul Moldovei. Lucerna este cultura caracteristică Cîmpiei Moldovei și părții de sud a Podișului Birladului. Baza furajeră este completată de culturile de rădăcinoase, plante anuale pentru fîn, plante pentru însilozare și subproduse ale industriei alimentare.

În structura șeptelului predomină bovinele cu 40,2% din total, după care urmează porcinele cu 39,1%, ovinele cu 15,3% și păsările cu 5,4%.

Densitatea medie a bovinelor în podiș este de 38 capete la 100 ha teren agricol (mai scăzută decît la nivelul țării—44 capete). În Podișul Sucevei densitatea medie ajunge la peste 90 capete, cu valori chiar mai ridicate în Depresiunea Rădăuți și zonele periurbane ale Sucevei și Fălticeniilor. Creșterea bovinelor este bine dezvoltată în comunele din sudul Cîmpiei Moldovei, în Dealurile Ibăneștilor și în zonele periurbane ale Iașului, Romanului, Bacăului. Densitățile cele mai mici apar în Podișul Birladului, cu excepția fișiei de contact cu Cîmpia Moldovei și zonelor periurbane ale orașelor Vaslui și Birlad. Creșterea porcinelor ocupă locul al doilea în cadrul șeptelului. Densitatea medie pe întreg podișul este de 82 decapete/100 ha teren arabil, mai modestă decît cea la nivelul țării, deși sînt cîteva unități profilate pe

creșterea industrială în ferme specializate (Tomești—Iași, Fălciu—Vaslui, Verești—Suceava ș.a.). În Podișul Moldovei se crește și peste 15% din numărul total de ovine pe țară. Densitatea medie este de 128 capete la 100 ha teren agricol. Densități mari apar în Podișul Central Moldovenesc și Cîmpia Moldovei, unde media este de 170—200 capete la 100 ha.

În funcție de condițiile naturale și cele social-economice, în cuprinsul Podișului Moldovei se pot delimita mai multe zone și subzone de producție agricolă.

Podișul Sucevei se remarcă printr-o agricultură intensivă, unde valoarea producției animaliere (preponderent bovine) este egală sau mai mare decât cea provenită din cultura plantelor. O pondere ridicată în valoarea producției agricole are sectorul zootehnic în Depresiunea Rădăuți, Podișul Fălticeniilor, Valea Siretului. Alături de cultura cerealelor, importanță mare prezintă cartoful care deține 17% din suprafața arabilă, față de numai 4% cât este la nivelul Podișului Moldovei. Aceasta este și principala arie de producție a inului.

Cîmpia Moldovei are un profil complex, dar predomină culturile de cîmp cu precumpănirea porumbului și grîului, după care urmează sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Sectorul zootehnic deține între 35 și 40% din valoarea producției agricole.

Podișul Bîrladului se înserie cu o agricultură de tip complex, dar cu indicatori mai modști privind randamentul atât în creșterea animalelor, cât și la cultura plantelor.

Baza economiei agricole o formează cultura cerealelor, pomicultura și viticultura, ponderea sectorului zootehnic la valoarea producției globale fiind de 20 pînă la 30%. În cadrul acestei regiuni se detașează cîteva arii cu o vădită specializare: rama nord-estică a Podișului Central Moldovenesc, Dealurile Fălciului, Depresiunea Huși cu profil vitipomicol și zonele periurbane specializate în producția de carne, lapte, fructe și struguri.

6.1.11. Industria

Podișul Moldovei este o unitate geografică în care premisele naturale și cele istorice au fost mai puțin favorabile unei industrializări timpurii, în comparație cu alte regiuni ale țării. În perioada contemporană s-au creat noi structuri social-economice, care au făcut posibile obținerea unei producții industriale

și utilizarea unor resurse naturale, chiar mai modeste. Într-adevăr, sînt insuficiente în special resursele de purtători de energie și de materii prime pentru industria grea, implicînd cu atât mai mult integrarea Podișului Moldovei ca element component al sistemului economic național, cu specializări și excedente în anumite sectoare ale industriei, care echilibrează aportul din alte regiuni și al importului la aprovizionarea cu combustibili, minereuri, laminate, lemn, materiale de construcție etc. Cele mai strînse relații economice și tehnologice cu unitățile geografice apropiate sînt cele ale centrelor industriale din vestul Podișului Moldovei (Bacău, Suceava ș.a.), care beneficiază de apropierea Carpaților și Subcarpaților, orientîndu-se în mare măsură spre transformarea materiilor prime provenite din aceste regiuni (lemn, gaze naturale etc.). Pe ansamblul Podișului Moldovei ramurile industriale cele mai strînse legate de materia primă locală sînt industria alimentară, industria materialelor de construcție, industria sticlei și a ceramicii fine, industria pielăriei și încălțămintei, precum și, parțial, industria textilă.

În sudul și vestul Podișului Moldovei, s-au pus în evidență unele rezerve de hidrocarburi. Se exploatează mai mult gazele naturale din depozitele sarmatiene ale Depresiunii Precarpatice (în sectorul Roman — Secuieni — Onișcani) și din Depresiunea Bîrladului (la Găiceana, Glăvănești etc.). Petrolul se extrage în special din Depresiunea Bîrladului; în sectorul Țepu—Buciumeni (D. Paraschiv, 1979). În afară de acestea, se exploatează micile rezerve de turbă de la Dersca și se propune reluarea exploatărilor de lignit din zona orașului Fălticeni.

Majoritatea riurilor au potențialul hidroenergetic redus. Din potențialul hidroenergetic amenajabil, evaluat la 530 MW, circa o treime revine Prutului, urmat de Siret, Moldova și Bistrița (după ieșirea din Subcarpați, în zona de confluență). Amenajările hidroenergetice au valorificat, însă, sectoarele cu potențialul amenajabil specific cel mai înalt, așa cum este cursul inferior al Bistriței (cu hidrocentralele Racova, Gîrleni, Bacău I și Bacău II, totalizînd 101,8 MW), sectorul de vale epigenetică a Prutului (15 MW la Stîncea — Costești) și cursul Siretului avale de Bacău, unde s-au construit hidrocentralele de la Galbeni, Răcăciuni și Berești, toate aceste trei totalizînd

119,4 MW. S-au utilizat pentru microhidrocentrale chiar și conductele de alimentare cu apă ale unor orașe, ca Fălticeni (0,37 MW) și Iași. Necesarul de energie electrică este asigurat, în primul rând, de termocentrale, care funcționează cu gaze naturale locale sau aduse din Subcarpați și din Depresiunea Transilvaniei, amplasate la Iași, Suceava, Bacău, Botoșani, Roman, Bucecea ș.a. Pentru a reduce dependența de energie electrică din alte regiuni ale țării (livrată în special de termocentrala Borzești), o nouă generație de termocentrale, pe baza cărbunelui, se ridică acum la Holboca, Bacău și Suceava.

Se dă atenție folosirii energiilor neconvenționale, prin amenajarea unor captatori solari pentru apă caldă (de exemplu, la Bacău, Iași etc.), construirea microcentralei eoliene de la Bucecea, valorificarea biogazului (la Iași) ș.a.

Dintre resursele minerale ale subsolului, menționăm sarea de la Cacica, pe linia de contact a flișului cu miocenul salifer precarpat (C. Stoica, I. Gherasie, 1981), și sulful, descoperit în sectorul Darabani—Ivâncăuți. Din rîndul rocilor utile pentru industria materialelor de construcție, sticlei și ceramicii fine se evidențiază nisipurile cuarțoase de la Miorcani—Hudești. Mari cantități de balast sînt disponibile în albiile Moldovei, Siretului, Bistriței și Sucevei. În valea Prutului, la Ripiceni, aflorează calcare recifale, folosite în trecut pentru var. Calcare și gresii oolitice sarmatiene apar la zi pe fișii întinse din Podișul Sucevei și Podișul Central Moldovenesc, fiind folosite pentru construcții. În sfîrșit, aproape întregului Podiș al Moldovei îi sînt specifice cantități incalculabile de argile și luturi loessoide, utile pentru industria ceramicii.

Resursele de material lemnos (mai ales foioase tari — fag, stejar, carpen etc.) se evaluează la circa 50 mil. m³, cu o creștere anuală de aproximativ 1,5 mil. m³; ceea ce permite, ținîndu-se seama de necesitatea refacerii patrimoniului forestier, extragerea într-un an a 0,65 mil. m³ de lemn. Cea mai mare parte din acesta provine din exploatarea din Podișul Central Moldovenesc, urmat de cele din Dealul Mare al Hirlăului, Podișul Dragomirnei și Podișul Fălticeniilor.

Resursele de apă de suprafață (7 km³ anual) revin într-o proporție de 83% bazinului Siretului, datorită numeroșilor săi

afluenți carpațici. Pentru rezolvarea problemei alimentării cu apă a centrelor industriale din estul Podișului Moldovei a fost necesară amenajarea unor lacuri de retenție cu caracter plurifuncțional (la Pușcași pe Racova, la Solești pe Vasluiet etc.) și construirea unor aducții de mare capacitate, cum este cea din Prut, pentru orașul Iași, sau derivarea apelor din bazinul Prutului în cel al Vasluietului, în sectorul Costuleni—Schitul Duca.

Resursele de materii prime pentru industria alimentară și ușoară cuprind o gamă largă de produse ale zootehniei și culturii plantelor — carne, lapte, sfeclă de zahăr, cereale-boabe, fructe, struguri, cartofi, legume, soia, lînă, fibre de in și cîneapă, tutun etc.

În trecut industria din Podișul Moldovei avea o repartitie limitată și o structură incompletă. În 1938, acest teritoriu, unde trăia 12% din populația țării, asigura numai 7% din valoarea producției industriale. Ramura cea mai importantă era industria alimentară, cu unități mai mari la Roman, Ripiceni, Iași, Ițcani și Bacău, urmată de industria textilă — la Iași și Bacău — și industria lemnului, hîrtiei și celulozei, dezvoltată în special la Bacău. Industria chimică și metalurgia feroasă lipseau (Liliana Georgescu, 1941).

În prezent sînt dezvoltate ramuri ale industriei grele în centrele Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani, Suceava și Roman. De asemenea industria bunurilor de consum s-a dezvoltat cu precădere în unele centre urbane mici și mijlocii (Huși, Tîrgu Frumos). În ultimii ani s-a acordat atenție și industriei mici, larg distribuită în teritoriu, care contribuie la o mai mare stabilitate a forței de muncă în mediul rural și la valorificarea resurselor locale. Noi unități mici din domeniul industriei textile, a tricotelor și confecțiilor, a lemnului, prefabricatelor de beton, industrializării laptelui, legumelor, fructelor etc. au fost construite mai ales în centrele din ariile rurale cu un puternic deficit migratoriu — Vlădeni, Tîbănești, Podu Turcului, Flămînzii, Murgeni, Codăești ș.a.

În funcție de gradul de specializare la nivelul industriei naționale, ramurile industriale ale Podișului Moldovei pot fi grupate în următoarele trei categorii:

— *ramuri industriale noi*, cu o participare ridicată în cadrul economiei naționale: metalurgia feroasă (10,8% din producția națională) și industria confecțiilor (13,3%);

— ramuri industriale cu caracter tradițional, mult extinse teritorial: industria lemnului (9,4% din producția națională a ramurii), industria celulozei și a hîrtiei (20,6%), industria textilă (15,8%), industria pielăriei și încălțămintei (9,4%) și industria alimentară (12,3%);

— ramuri industriale care, la nivel național, contribuie cu o pondere mai scăzută: industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor (5,6% din valoarea producției României), industria chimică (7,2%), industria materialelor de construcții (7,8%), industria sticlei, porțelanului și faianței (6,4%).

Pe plan regional, însă, industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor se află pe primul loc, cu 19,9% din valoarea producției industriale globale a Podișului Moldovei. Ea este urmată de industria alimentară (17,9%), industria textilă (11,5%), metalurgia feroasă (8,6%), industria chimică (8,9%), industria confecțiilor (5,7%), exploatarea și prelucrarea lemnului (4,9%), industria materialelor de construcții (3,4%), industria celulozei și a hîrtiei (3,2%), industria pielăriei și încălțămintei (2,3%) și alte ramuri de importanță secundară.

Metalurgia feroasă este o ramură industrială concentrată în mari întreprinderi specializate în cea mai mare parte în laminate tubulare din oțel — întreprinderile metalurgică din Iași și de țevi fără sudură din Roman. Laminorul din Roman, în funcțiune din 1957, asigură 35% din producția de țevi de oțel a întregii țări, iar întreprinderea de profil din Iași este specializată în țevi sudate de cele mai diverse dimensiuni (40% din producția națională) și în profile de oțel. Aprovizionarea cu semifabricate a celor două laminare se face cu precădere de la cea mai apropiată unitate siderurgică integrată, cea din Galați și, secundar, de la Hunedoara și Reșița.

Fonta și oțelul se produc în cantități relativ mici, în secții subsidiare ale unităților constructoare de mașini, în special la Iași, apoi la Roman, Suceava, Bacău ș.a.

În cadrul industriei construcțiilor de mașini, integral nouă, este industria utilajului industrial. Ea cuprinde întreprinderi și secții de mașini-unelte la Bacău (pentru mașini de alezat și de frezat), Roman (strunguri-carusel), Iași (linii automate pentru producția de pistoane, mașini de găurit și de filetat), Birlad (strunguri, mașini de recti-

ficat), Dorohoi (mașini-unelte grele pentru deformarea plastică) și Suceava (mașini de ascuțit ș.a.). Din anul 1953 produce prima întreprindere românească de rulmenți — cea din Birlad; o nouă uzină de rulmenți, mult mai mare, s-a construit la Suceava. Industria utilajului pentru extracția petrolului și a gazelor naturale este concentrată în Bacău. Orașele Iași și Negrești produc utilaje pentru construcții civile și de drumuri; la Iași se fabrică, printre altele, utilaj pentru industria cimentului și pentru laminare, la Suceava — utilaj pentru industria celulozei și a hîrtiei, la Botoșani — utilaj pentru industria textilă și a confecțiilor, iar la Roman și Fălțiceni — utilaj pentru exploatarea și industrializarea lemnului. Ventilatoare, cuplaje, servomecanisme ș.a. se produc la Vaslui, scule și accesorii — la Pașcani și Rădăuți.

A doua subramură a industriei construcțiilor de mașini este industria electrotehnică și electronică, centrele principale fiind orașele Iași (aparate de radio, casetofone și pickupuri), Botoșani (aparataj electric și electronic), Pașcani (traductoare electronice) și Roman (reparații de motoare electrice). Apropiată ca orientare este subramura mecanicii fine, producătoare de elemente pneumatice pentru automatizări (la Birlad), aparate de măsură și control (la Vaslui și Suceava) ș.a.

În domeniul mijloacelor de transport, la Pașcani funcționează cea mai veche unitate din această ramură din Podișul Moldovei, care a trecut treptat de la reparații de material rulant la producția de boghiuri și vagoane de mare capacitate. Piese de schimb pentru autovehicule se produc la Iași, iar avioane clasice, de școală și antrenament, se construiesc la Bacău. „Fortus” S.A. din Iași produce, printre altele, motoare navale de mare capacitate.

Industria utilajului agricol are un caracter secundar dar în schimb prezintă o distribuție teritorială destul de largă, prin unitățile de reparații de mașini agricole și tractoare, pe lângă care se produc și unele mașini agricole simple, de serie mică, și piese de schimb — la Botoșani, Iași, Suceava, Roman, Țirgu Bujor, Dorohoi, Țirgu Frumos, Negrești ș.a. Numeroase alte produse metalice diverse se produc la Bacău (armături industriale), Rădăuți (mobiliier metalic), Iași (articole de camping), Suceava (radiatoare

și căzi de baie), Botoșani (elemente de asamblare).

Industria chimică s-a specializat în produse cu valoare mare, și în general, cu volum redus. Cea mai dezvoltată subramură este petrochimia, producătoare în special de fire și fibre sintetice, sector în care funcționează Combinatul de fibre sintetice din Iași (23 000 t fire și fibre de tip poliesteric în 1990), întreprinderea de fire și fibre poliamidice din Roman și întreprinderea de fire sintetice din Vaslui. Producția de mase plastice (polimetacrilat de metil) are loc în tinăra întreprindere chimică din Fălticeni, care mai produce și detergenți. Toate aceste unități lucrează cu produse semifinite livrate de uzinele petrochimice din Pitești, Brazi, Săvinești ș.a. De la aceleași unități, dar în primul rînd de la Borzești, se aduc și masele plastice necesare întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Iași și recentei secții a acesteia din Hîrlău. Industria cauciucului produce articole tehnice de cauciuc la Botoșani.

Industria îngrășămintelor chimice este concentrată la Bacău și este profilată pe produse azotice — amoniac, uree, fosfat de amoniu și alte produse — acid fosforic, fosfogips, acid sulfuric, clorură de aluminiu, criolit sintetic ș.a. În industria medicamentelor orașul Iași dă 84% din producția națională de antibiotice, medicamente cortizoidice, biostimulatori și substanțe medicamentoase din plante. Produse abrazive se fabrică la Birlad.

În cadrul industriei lemnului se poate distinge, mai întii, subramura produselor semifinite — cherestea, plăci aglomerate (17% din producția țării), plăci fibrolemnoase simple sau innobilate prin melaminare, furnir, placaj, parchete etc., obținute în mari unități integrate, în vestul Podișului Moldovei, aprovizionate în cea mai mare parte cu materie primă din Carpații Orientali și Subcarpați — la Suceava, Fălticeni și Bacău. La acestea se adaugă o serie de fabrici de cherestea din rășinoase (la Vicovu de Jos, Căcița, Rîșca ș. a.). În estul Podișului Moldovei unitățile producătoare de cherestea și parchete, exclusiv din lemn de foioase, sînt mult mai rare — la Ciurea și Hîrlău.

În schimb, la est de Siret, unitățile industriale s-au specializat în mobilă de înaltă calitate — la Iași, Vaslui, Botoșani, Bîrlad, Hîrlău, Tîrgu Bujor, Podu Turcului, Murgeni, Sagna. Unități mari producătoare de mobilă s-au înființat și în vestul regiunii, la Rădăuți, Bacău, Suceava, Fălticeni și Roman, iar mai mici — la Pașcani, Vicovu de Sus, Boroaia ș.a. Se mai poate aminti producția de butoaie și ambalaje (la Huși, Rădăuți, Fălticeni, Hudești, Baia etc.), cea de traverse impregnate (la Suceava), de căsuțe prefabricate (la Bacău), de bînale (la Suceava, Bacău ș.a.).

Industria celulozei și a hîrtiei este, de asemenea, amplasată exclusiv în vest. Dintre cele trei fabrici de celuloză și hîrtie de pe axa feroviară Siret — Suceava, cea mai veche este „Letea” din Bacău (înființată în 1885), specializată astăzi în sortimente de hîrtie fină, iar celelalte, de capacitate mai mare, din Suceava (20% din producția națională de hîrtie) și Adjud, datează din perioada contemporană.

Industria materialelor de construcție este larg repartizată, dar nu dispune de o gamă completă de subramuri și are puține unități de importanță națională. Cele mai numeroase sînt unitățile producătoare de ceramică brută (cărămidă, teracotă, țiglă, granulit etc.), situate la Roman, Iași, Dorohoi, Ciurea, Vaslui și Bacău. Întreprinderi pentru prefabricate de beton s-au construit în special în lungul rîurilor din vestul podișului — la Roman, Suceava, Rădăuți, Pașcani, fără a lipsi, totuși, în partea de est — la Iași și Vaslui. Industria materialelor izolatoare este concentrată în orașul Vaslui, iar industria lianților se limitează la producția de var de la Roman, Bucecea ș.a.

Industria sticlei este reprezentată numai de unități noi, deoarece fabricile de la Hîrlău și Lespezi au dispărut în timpul celui de al doilea război mondial. Utilizînd nisipul cuarțos de la Miorcani, din 1973 funcționează o întreprindere de corpuri de iluminat la Dorohoi. În afară de aceasta, la o capacitate mai mică, produc întreprinderea de sticlă pentru ambalaje din Suceava, întreprinderea de izolatori electrici din Botoșani, fabrica de sticlă pentru menaj din Fălticeni și secția de sticlărie din Muntenii de Jos. Mai recentă este industria

ceramicii fine, care cuprinde o întreprindere de porțelan pentru menaj la Dorohoi și o secție de obiecte sanitare din porțelan și semiporțelan la Roman.

Industria textilă a ieșit din cadrul îngust al orașelor Iași și Bacău, căpătând o repartiție geografică mult mai largă. Subramura principală continuă să fie industria bumbacului, cu întreprinderi la Botoșani și Iași, filaturi la Vaslui, Huși, Negrești, Flăminzi, Darabani și Murgeni, o recentă țesătorie la Țibănești, o fabrică de ață la Suceava și una de vată la Birlad. Specifică Podișului Moldovei este industria inului și cinepei, cu topitorii la Dornești, Băișești, Verești, Suceava, Sagna și Vaslui și întreprinderi de filatură și țesătorie la Fălticeni, Botoșani, Pașcani, Adjud și Iași. La Iași s-a dezvoltat industria mătăsii artificiale, cu cea mai mare întreprindere din țară (33% din producția națională). Industria linii naturale și a melanei are un caracter secundar, cu două întreprinderi integrate la Bacău și Suceava, și filaturi la Botoșani și Codăești. Acestei subramuri i se asociază fabricile și secțiile de covoare din Siret, Bacău, Darabani, Săveni, Berești, Tirgu Bujor, Drăgușeni ș.a. Pentru valorificarea deșeurilor s-au construit întreprinderi de vignonie la Birlad și Vlădeni. A ajuns la un nivel înalt de dezvoltare industria tricotajelor, cu unități de mare capacitate la Suceava (17% din producția națională), Iași, Huși, Pașcani și Rădăuți, precum și numeroase altele mai mici, la Siret, Hirlău, Roman, Podu Turcului, Hălăucești și Tirgu Frumos, cu noua fabrică de stofe tricotate.

Industria confecțiilor, dezvoltată paralel cu industria textilă, este frecvent amplasată în aceleași centre industriale — Bacău, Botoșani, Vaslui, Iași, Fălticeni, Huși, Rădăuți și Siret sau în apropierea acestora — Dorohoi, Săveni ș. a.

Pentru industria pielăriei și a încălțăminte, pe lângă singura întreprindere mai veche, din Bacău, s-au înființat trei unități noi, la Suceava, Tirgu Frumos și Huși dar în majoritatea centrelor urbane a rămas la nivelul cooperăției meșteșugărești.

Dintre numeroasele subramuri ale industriei alimentare o producție mai mare o au industria cârnii, conservelor și preparatelor de carne (cu centre principale la Suceava, Botoșani, Iași, Tomești, Bacău, Roman, Verești, Dolhasca, Tirgu Frumos, Tirgu Bujor,

Birlad, Murgeni etc.), industria morăritului, panificației și pastelor făinoase (la Iași, Botoșani, Bacău, Suceava, Birlad, Huși, Dornești etc.), industria produselor lactate (la Suceava, Iași, Botoșani, Dorohoi, Vaslui, Fălticeni, Săveni, Murgeni, Hirlău, Flăminzi etc.), industria zahărului și a produselor zaharoase (în lungul axei Siretului — la Bucecea, Pașcani, Roman, Sascul, precum și la Trușești pe Jijia) și industria vinificației (la Cotnari, Huși, Nicorești, Iași — Bucium, Tirgu Bujor, Oancea, Răducăneni etc.). Fabrici de alcool sint la Rădăuți, Bacău — Mărgineni, Hîntești, Iași, de amidon, glucoză și dextrină la Fălticeni, de bere la Bacău, Iași, Suceava și Solca, de conserve și semiconserve de legume și fructe la Suceava, Fălticeni, Huși, Hirlău, Răducăneni, Verești etc.

Dintre ramurile industriale mai puțin semnificative se pot menționa industria tutunului (la Birlad și Iași), industria săpunului (secții mici la Dorohoi, Iași, Suceava ș.a.) și industria poligrafică (la Iași, Bacău, Suceava, Botoșani ș.a.).

6.1.12. Căile de comunicație și transporturile

Eforturile de dezvoltare a căilor de comunicație au fost mult întârziate atât de situația grea moștenită după al doilea război mondial, cât și de constituția geologică și fragmentarea mare a reliefului.

Căile ferate și transporturile feroviare. În raport cu alte regiuni ale țării, construcția de căi ferate în Moldova a început abia spre sfârșitul deceniului al șaptelea al secolului trecut. Pînă la primul război mondial s-au construit liniile ferate: Vicșani—Ițcani (1866), Ițcani—Roman (1869), Roman—Galați (1870—1872), Pașcani—Iași (1870—1872), Verești—Botoșani (1871), Iași—Ungheni (1874), Tecuci—Birlad (1868—1872), Dornești—Rădăuți (1881), Bacău—Piatra Neamț (1885), Birlad—Vaslui (1886), Vaslui—Iași (1892), Crasna—Huși (1888—1890 — linie îngustă și 1936 linie normală), Birlad—Galați (1898), Leorda—Dorohoi (1888), Dorohoi—Lețcani (1896 — cînd s-a construit și prima linie dublă din țară între Lețcani și Iași), Dolhasca—Fălticeni (1887), Dărmănești—Păltinoasa (1888), Rădăuți—Gura Putnei (1898) și Podu Iloaiei—Hirlău (1910). În perioada 1915—1917 au intrat în exploatare liniile Roman—Buhăiești și

Zorleni—Fălcuș, iar după 1960 linia Suceava—Păltinoasa. După 1950 s-a dat o atenție mai mare lucrărilor de dublare și electrificare. Totodată, s-a renunțat la unele proiecte anterioare (Dîngeni—Rădăuți-Prut și Botoșani—Hîrlău) și la tronsoanele: Huși—Albița, Foltești—Vadu lui Isac, Petricani—Siret și Dîngeni—Ripiceni, din lipsă de trafic. În 1986 s-a dat în folosință linia ferată Pașcani—Tîrgu Neamț (fig. 151). Orientarea arterelor feroviare în lungul principalelor riuri a fost condiționată, în primul




Fig. 151. Rețeaua feroviară din Podișul Moldovei. 1, Cale ferată dublă electrificată; 2, simplă electrificată; 3, dublă; 4, simplă; 5, în curs de dublare.

rind, de formele de relief mai joase și mai accesibile. Orientarea principalelor drumuri comerciale vechi și cea a rețelei feroviare a influențat atît dezvoltarea unor orașe (Bacău, Roman, Pașcani ș.a.), cit și stagnarea altora (Botoșani, Siret, Tîrgu Frumos, Hîrlău), care din puternice noduri rutiere-comerciale au devenit centre izolate, ocolite de căile ferate, ori capete de linie.

Podișul Moldovei este traversat de două magistrale feroviare: Vîșani—Suceava—Ba-

cău—Adjud și Dorohoi—Iași—Birlad, ambele cu legătură spre Galați, unite prin patru linii de legătură: Verești—Dorohoi, Pașcani—Cucuteni, Roman—Buhăiești și Birlad—Tecuci. Din magistrala de pe valea Siretului se orientează spre vest două linii (prin Salva și Ciceu) ce fac legătura cu Podișul Transilvaniei, iar alte patru linii se termină la Nisipitu, Fălticeni, Bieaz și Tîrgu Neamț. Din magistrala de est se orientează spre valea Prutului patru linii ferate din care trei se racordează și cu rețeaua feroviară din Republica Moldova, prin punctele de frontieră de la Reni și Fălcuș (pentru trenuri de marfă) și Ungheni (marfă și călători). Lungimea totală a rețelei feroviare din Podișul Moldovei va fi (după terminarea dublării liniei Birlad—Iași) de 1 550 km (adică 14% din sistemul feroviar al țării), înseriind o densitate de peste 46 km/1 000 km².

Indicele de conexitate (racordare) al rețelei feroviare are o valoare mijlocie de 0,60 (indicele putînd oscila între „0” și „1”), relativ normală dacă se are în vedere poziția geografică în cadrul țării. În traficul de mărfuri se detașează liniile Adjud—Bacău—Roman—Pașcani—Suceava, Tecuci—Birlad—Iași, Suceava—Păltinoasa și Iași—Pașcani care concentrează peste 2/3 din volumul traficului.

Structura transportului de mărfuri este în concordanță cu profilul economic al zonelor agricole și cel industrial al orașelor, cu structura deficitului, dar și excedentului de produse din Podișul Moldovei și cu specificul traficului de tranzit. Ca produse principale se transportă: lemn (Dornești—Nisipitu); lemn, piatră și balast (Păltinoasa—Suceava); cereale, plante tehnice și materiale de construcție (Dorohoi—Iași); produse agricole, materiale de construcție, cărbuni și produse petroliere, metalurgice și lemnoase (Adjud—Suceava, Birlad—Iași și Pașcani—Iași); ciment, lemn, cărămidă și produse chimice (Piatra Neamț—Bacău), fier și cărbuni (Reni—Galați), cereale și materiale de construcție (Roman—Buhăiești).

Traficul de călători s-a multiplicat, condiționat de creșterea indicelui de mobilitate a populației. Sectoarele cele mai încărcate (10 000—20 000 călători/24 ore) sînt: Adjud—Bacău—Suceava, Tecuci—Iași, Lețcani—Iași și Păltinoasa—Suceava.

Căile rutiere și transporturile rutiere. Circulația se făcea în trecut pe marile drumuri comerciale ce străbăteau Moldova, orientîndu-

du-se atît spre gurile Dunării, Marea Neagră și vadurile Prutului, cît și spre vestul și nordul țării. Răserucca drumurilor a constituit în epoca feudală unul dintre factorii generatori și constanți de apariție și dezvoltare a funcțiilor neagricole, a prosperității economice și sociale a unor orașe, ca Iași, Botoșani, Dorohoi.

În Moldova construcția de șosele a început abia în prima parte a secolului XIX, cu Șoseaua Mihăileană (Galați—Mihăileni). Îmbunătățirea ulterioară a stării drumurilor s-a desfășurat lent și necorespunzător pînă în a doua jumătate a secolului XX, cînd s-a trecut la modernizarea căilor rutiere. Astfel, lungimea șoselelor modernizate sau cu îmbrăcămînți asfaltice ușcare a crescut de la 193 km în 1960 la peste 4 000 km în 1980, reprezentînd circa 40% din întreaga rețea rutieră a Podișului Moldovei. Modernizarea drumurilor naționale poate fi considerată deja încheiată deoarece, cei 97 km cît au mai rămas (din sectoarele : Manoleasa—Rădăuți-Prut, Oancea—Cavadinești, Murgeni—Gănești și Podu Turcului) reprezintă o lungime neînsemnată. Drumurile județene, în cea mai mare parte, sînt pietruite, iar o parte asfaltate. Drumurile cu piatră dețin ponderi mai însemnate în județele din vestul Moldovei (Suceava, Neamț, Bacău), unde și posibilitățile de aprovizionare cu materiale de construcție (piatră și balast) sînt mai mari.

Densitatea rețelei rutiere este de circa 39 km/100 km², depășind media țării. Prin orientarea și densitatea mai mare căile rutiere completează suficient de bine lipsa căilor ferate din unele areale, reducînd gradul de izolare al unor localități din Colinele Tutovei și Cîmpia Moldovei.

Conexitatea rețelei rutiere este mai mare decît în cazul căilor ferate, iar nodurile rutiere sînt mai numeroase și mai puternice, concentrînd de 2—3 ori mai multe direcții decît căile ferate. Și transportul rutier de mărfuri și călători a înregistrat transformări. Transportul auto de călători se caracterizează printr-o frecvență mare a curselor (cu precădere în ariile lipsite de căi ferate și în cele periurbane) și printr-un indice sporit de confort. Transportul de mărfuri se desfășoară în proporție de circa 60% pe drumurile naționale.

Transporturile aeriene asigură legături zilnice, de poștă și pasageri, între Iași, Bacău, Suceava și București.

Transporturile speciale (de energie electrică, apă și gaze naturale) s-au dezvoltat ca urmare a creșterii cerințelor de apă și energie, pe măsura dezvoltării economiei în general, a dezvoltării industriei și orașelor, precum și a electrificării așezărilor rurale.

Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național, sistem în care sînt conectate prin linii de înaltă tensiune (110 și 220 kV) și centralele electrice din Iași (150 MW putere instalată), Stîncea—Costești, Bacău, Suceava, Piatra Neamț, Birlad, Roman, Botoșani, Bucecea, precum și cele de la Borzești și Bicaz (din afara Podișului Moldovei) ce dețin o pondere însemnată în cadrul acestei alimentări. Orașul Iași a fost racordat la sistemul energetic național în 1957 prin linia de 110 kV (Roman—Iași) și în 1974 prin linia de 220 kV (Borzești—Iași—Suceava).

Alimentarea cu apă industrială și potabilă a ridicat și ridică probleme serioase datorită deficitului de apă din Podișul Moldovei. Dacă pentru alimentarea cu apă industrială soluțiile s-au găsit mai ușor, în cazul apei potabile s-a recurs la conducte de aducțiune, uneori de la mari distanțe, ca în cazul conductei Timișești—Iași. Prin conducte se alimentează orașele : Bacău și Buhuși (din albia majoră a Bistriței), Suceava (din albia majoră a Moldovei și Sucevei), Botoșani și Dorohoi (din Siret), Iași (din albia majoră a Moldovei și a Prutului), Hirău (din Siret) etc.

Alimentarea cu gaz metan se face prin magistrala gazeiferă de nord-est, din Transilvania, pentru localitățile : Bacău, Sascut, Piatra Neamț, Săvinești, Roman, Suceava, Fălticeni, Botoșani, Dorohoi, Bucecea, Iași și Pașcani.

6.1.13. Calitatea mediului. Măsuri de protecție

Sub raportul conceptului actual de calitate a mediului, ansamblul de condiții naturale, potențial uman și activitate economică în Podișul Moldovei întrunește trăsături care conferă acestei unități un caracter echilibrat.

Utilizarea antropică a cadrului fizic (actuală, recentă sau mai veche, dar cu repercusiuni încă sensibile) creează anumite premise de diminuare a calității mediului. Se pot enu-

mera, printre acestea, unele modificări neraționale ale utilizării terenului, implantarea insuficient documentată a unor obiective social-economice, mărirea unor capacități de producție fără asigurarea creșterii eficienței instalațiilor de protecție, exploatarea nerațională a solului (prin chimizare improprie, lucrări agricole sau amenajări neraționale), defrișări insuficient suplinite prin replantări etc. De asemenea, forme diverse de impurificare a aerului, a apelor de suprafață și subterane, precum și a solurilor înscru poluarea (industrială, agrozootehnică și urbană) printre cei mai activi factori de deteriorare actuală a calității mediului.

Toate formele de utilizare nerațională a potențialului natural și uman precum și a unor obiective economice sînt cu atît mai nocive, cu cît se desfășoară frecvent într-un cadru natural favorabil instabilității și degradării. Astfel, defrișările excesive din trecut au dezvelit versanți care deschid alternanțe de depozite permeabile și impermeabile și care primesc și rețin, prin expoziția lor, o mare cantitate de precipitații, ceea ce a antrenat procese de deplasare în masă pe suprafețe întinse; modificarea utilizării terenului cu introducerea unor culturi de prășitoare pe suprafețe favorabile șiroirii și cu frecvențe și viteze mari ale vîntului, au dus la distrugerea solului. Unele acumulări de apă afectează baza versanților cu instabilitate naturală accentuată. Utilizatori cu consum ridicat și deversări extrem de poluante (în emisari cu debite de diluție reduse) au fost amplasați amunte de prizele pentru alimentări urbane sau de acumulări cu profil piscicol; dirijarea nerațională a investițiilor a rezolvat cu totul insuficient unele canalizări urbane, în arii cu nivelul freatic aproape de suprafață etc.

Ținînd seama de starea actuală a calității mediului, de dezvoltarea industriei și zootehniei, de întreaga activitate umană și de condițiile naturale favorabile degradării mediului se desfășoară o activitate susținută pentru protecția mediului. În vederea cunoașterii și păstrării calității aerului, funcționează o rețea de 10 stații permanente și peste 120 de puncte de recoltare a probelor, situate în incinta întreprinderilor producătoare de noxe, sau la diferite distanțe-standard, ori în sectoare cu condiții favorabile acumulării și stagnării noxelor. Prin intermediul lor este supravegheat cuantumul de pulberi sedimentabile, funingine, CO, CO₂, NH₃, H₂O, SO₂, Pb, hidrocarburi aro-

matice policiclice ș.a. Rețeaua cuprinde, astfel, zonele industriale, arterele stradale și intersecțiile cu trafic intens și permanent (mai ales cele insuficient modernizate), sectoarele cu șantiere în lucru, ariile marilor complexe zootehnice. Circa 900 de instalații de purificare a aerului, cu o capacitate de aproximativ 8 mil. m³/h contribuie la reținerea, neutralizarea sau atenuarea emisiilor specifice, realizîndu-se uneori și recuperări ale produselor reziduale. S-a acordat atenție adoptării unor tehnologii nepoluante și înlocuirii treptate a unor mașini și agregate generatoare de zgomot (Iași, Botoșani ș.a.). De asemenea, au fost întocmite documentații pentru poluanții specifici localităților dotate cu platforme industriale și s-au realizat cartări ale nivelelor de poluare a aerului cu gaze, pulberi sau microelemente, ca și ale nivelelor de poluare fonică (la Suceava, Botoșani, Dorohoi, Tîrgu Frumos, Iași, Bacău, Huși, Vaslui).

Protecția apelor vizează concomitent conservarea, utilizarea rațională și calitatea volumului disponibil. În vederea asigurării necesarului de apă, activitatea de gospodărire rațională s-a orientat, în primul rînd, către construirea și refacerea unor lacuri de acumulare (iazuri) — circa 450, care pot suplini deficitul sezonier de alimentare ale apelor de suprafață și subterane. În același scop, unele unități industriale au urmărit promovarea tehnologiilor cu consum redus de apă, uneori realizîndu-se și recircularea cu caracter permanent (în special la termocentrale). În agricultură a crescut ponderea lucrărilor și sistemelor de irigații, precum și a unităților zootehnice cu eficiență mai ridicată de utilizare a apei (aspersiune, canale impermeabilizate, sisteme automatizate de adăpare și salubritate etc.). Păstrarea calității apelor, care trebuie să asigure consumul agrozootehnic și industrial și alimentarea cu apă potabilă a așezărilor se realizează, în primul rînd, prin intermediul a 380 de instalații de epurare a apelor uzate, cu o capacitate totală de peste 120 000 m³/h, decantoare, instalații de preepurare etc. În general sînt respectate normativile de securitate a captărilor, agențiile pentru supravegherea și protecția mediului organizînd controale periodice ale deversărilor, pentru evitarea depășirii concentrațiilor maxime admise pentru Fe, Mn, pesticide, detergenți, amoniu, fenoli, nitriți, substanțe organice ș.a. Conform datelor rezultate, cursurile de apă sînt omologate în categorii-standard de cali-

2500 x
58
2500

tate. De asemenea, agențiile menționate avizează documentația de specialitate a noilor obiective economice sau extinderea celor existente, ținând seama de structura și capacitatea echipamentelor de protecție proiectate.

Conservarea, ameliorarea și protecția solurilor sînt acțiuni care se întemeiază, în primul rînd, pe gestiunea corectă a tuturor tipurilor genetice de sol, cunoașterea lor (începînd cu caracteristicile agro-productive și repartitia teritorială), vizînd atît exploatarea cea mai adecvată cit și satisfacerea cerințelor pedoameliorative. În aceste scopuri au fost întocmite hărți de ansamblu și detaliate pentru o bună parte a teritoriului, laboratoarele județene de pedologie și agrochimie elaborînd memorii agrochimice pînă la nivel de comună (în Cîmpia Moldovei, Podișul Birladului ș.a.). S-au realizat lucrări complexe de combatere a eroziunii solurilor pe o suprafață de 450 000 ha, s-au amenajat pentru irigații 118 000 ha, iar prin lucrări de desecare și îndiguire terenul arabil a sporit cu circa 150 000 ha (în Colinele Covurluiului, sud-estul Colinelor Tutovei, zona de contact între Cîmpia Moldovei și Podișul Sucevei). O atenție deosebită s-a acordat problemelor legate de manipulare și administrarea îngrășămintelor chimice și pesticidelor, precum și de evacuarea și împrăștierea corectă a deșeurilor din zootehnie. De asemenea, s-au întocmit documentații tehnice pentru aproape întreaga suprafață ocupată de soluri alcaline și acide, în vederea folosirii corecte și integrale a cantităților de fosfogips și amendamente calceice livrate agriculturii.

Gospodărirea rațională a fondului forestier, în suprafață totală de 350 000 ha, se realizează, în primul rînd, printr-o riguroasă zonare funcțională. Pădurile din grupa I (cu rol de regularizare a debitelor, diminuare a scurgerii de suprafață și atenuare a extremelor climatice, purificare a aerului și înfrumusețare a peisajului), dețin 80 000 ha și pentru a asigura protecția mediului sînt protejate printr-un regim de întreținere și exploatare, mai ales de codru grădinarit. Ameliorarea structurii pe specii a ridicat ponderea celor cu valoare economică ridicată sau cu creștere rapidă (rășinoase, plop euro-american). Tăierile anuale s-au menținut în general la o cotă mai mică decît cea de creștere, iar împădurirea golurilor din fondul forestier, a terenurilor degradate și neproductive din fondul agricol este o preocupare

de bază în raza tuturor inspectoratelor silvice județene. Frecvent această acțiune a depășit suprafețele planificate. O consecință pozitivă a întreținerii raționale este valoarea creșterii medii anuale a pădurii, care atinge 5,5 m³/ha/an, superioară valorii medii pe țară (creșterea medie anuală a pădurii în regim de codru grădinarit ajungînd și la valori de 7,9 m³/ha/an). Sînt, de asemenea, ocrotite exemplare și asociații forestiere sau ierboase, în cadrul unor rezervații naturale bine cunoscute, însumînd circa 145 unități, cu o suprafață de aproape 3 000 ha. Protejarea și valorificarea rațională a faunei legate de fondul forestier, după cum atestă situațiile statistice, s-a soldat cu atingerea și frecvent depășirea efectivelor optime la unele specii: căprior, mistreț, cerb lopătar.

Păstrarea calității mediului este intens urmărită și în cadrul așezărilor umane, acțiunile de protecție orientîndu-se prioritar către extinderea spațiilor verzi, modernizarea rețelelor stradale, salubritate etc.

6.2. Unitățile regionale

6.2.1. Podișul Sucevei

6.2.1.1. Caracterele fizico-geografice

Podișul Sucevei este numit astfel după riul principal care îl drenează prin partea centrală și după cel mai însemnat centru urban din regiune — municipiul Suceava, vechea capitală a Moldovei din secolul XV, reședință a județului cu același nume.

Limita estică urmărește denivelarea dintre Dealurile Ibăneștilor și parțial Cîmpia Moldovei de nord (sau colinele Băseului), pe un aliniament ce trece prin apropierea localităților Baranca (pe Prut) — Suharău — Cristinești — Ibănești — Pomirla. În continuare, limita este foarte bine pusă în evidență de prezența depresiunii de contact (V. Mihailescu, 1936; V. Tufescu, 1937) dintre Dealul Mare și Cîmpia Moldovei, între care diferența de altitudine depășește 200 m. Contactul este, de asemenea, marcat de un aliniament de așezări: Hilișeu Horia — Sendriceni — Brăești — Ipotești — Copălău — Flămînzii — Scobinți — Cotnari — Cucuteni — Dădești — Strunga — Buda. Limita spre

Podișul Central Moldovenesc trece în apropierea localităților Hindrești—Stănița—Sagna.

În lungul limitelor de est, sud și vest, prin eroziune diferențială s-au format depresiuni de contact, chiar sub formă de culoare, care au favorizat instalarea unor importante căi de legătură (șoseaua Dorohoi—Botoșani—Hirlău—Tirgu Frumos—Strunga—Roman, sau Vicov—Marginea—Solca—Capu Codrului—valea Moldovei—Roman).

Între aceste limite, Podișul Sucevei ocupă o suprafață de circa 9 000 km² (aproape 1/3 din Podișul Moldovei), desfășurându-se pe o lungime de 150 km de la nord-vest la sud-est și de circa 65 km de la est la vest.

Reprezentînd partea cea mai înaltă a Podișului Moldovei, are o climă mai răcoasă și mai umedă și cu aspecte biopedologice cu afinități mai apropiate de specificul Europei centrale decît al celei estice.

Podișul Sucevei este alcătuit din formațiuni sarmatiene, necutate, cu înclinare generală concordantă cu cea a întregului Podiș al Moldovei (5—80°/∞). Depozitele sînt reprezentate printr-un complex de argile și marne cu alternanțe de nisipuri, la care se adaugă în diverse sectoare și unele orizonturi subțiri de gresii, calcare, conglomerate.

Relieful are un caracter tipic de podiș ce poartă amprenta structurii monoclinale și a litologiei variate. Structura orografică este dată de un ansamblu de culmi și platouri structurale înalte (Dealul Mare, Podișul Dragomirnei), dealuri piemontane la contactul cu unitatea carpatică, depresiuni și înșeuări sculpturale (Liteni, Bălăcăuți, Bucecea, Strunga), culoare largi cu sesuri și terase fluviale (culoarele Moldovei și Siretului), cîmpii piemontane terasate (Baia, Rădăuți) (fig. 152).

Comparativ cu celelalte părți ale Podișului Moldovei, prezența orizonturilor de roci dure protectoare a determinat apariția celor mai mari înălțimi din întreg Podișul Moldovei (689 m în Poiana Ciungilor, 587 m în Dealul Mare—Tudora, 583 m în dealul Boiștea, 528 m în dealul Teișoara, 525 m în dealul Poiana Trei Meri—Dragomirna).

Caracteristica principală a reliefului este dată de larga dezvoltare și repetare a formelor structurale generate de poziția monoclină a stratelor și de alternanța orizonturilor cu grad diferit de rezistență la eroziune. Platourile structurale au cea mai mare extindere în părțile centrale și de est, unde faciesul sarmatic este alcătuit pe

întinderi mari din gresii și calcare. Platourile au suprafața aproape orizontală (cu înclinare ce nu depășește 3°) și se află la înălțimi ce variază între 500 și 300 m, în funcție de poziția stratului rezistent care este scos la zi.

Între platourile structurale, cu aspect de adevărate cîmpuri înalte sînt de remarcă pla-




Fig. 152. Diviziunile geografice ale Podișului Sucevei. 1, Podișul piemontan Ciungi; 2, Depresiunea Rădăuți; 3, Culoarul Moldovei; 4, Podișul Dragomirnei; 5, Podișul Fălcișenilor; 6, Depresiunea Litenilor; 7, Culmea Siretului; 8, Culoarul Siretului. a — Podișul înalt; b — Săua Bălăcăuți. 5, Podișul Fălcișenilor; 6, Depresiunea Litenilor; 7, Culmea Siretului: a — dealurile Bour—Ibănești; b — Săua Lozna; c — Dealul Hăpăi (Musca); d — colinele Bucecea—Vorona; e — Dealul Mare—Hirlău; f — colinele Ruginoasa—Strunga. 8, Culoarul Siretului.

tourile Calafindeștilor, Călineștilor și Mitoc—Adincata—Burdujeni. Aceleași caracteristici întîlnim și în Podișul Fălcișenilor unde se individualizează Platoul Bosanci, platourile din Dealul Liniei, Dealul Ciritei, iar în sud apar suprafețe structurale discontinue în sectorul Tătăruși, Homița, Moțca, Brătești. Cea mai mare extindere a acestor forme se întîlnește, însă, în Dealul Mare, unde se dezvoltă cel mai întins platou structural din Podișul Moldovei.

Platforma structurală principală se desfășoară între localitățile Vascani, Hărmanuș, și

Todirești, Stroești cu înălțimi de 370—400 m, numită „platforma structurală Brosăria—Laiu”, „un platou de o netezime ideală” ... „Ciudat cîmpei de cîmpie înaltă” (V. Tufescu, 1937, p. 98). La vest și sud-vest de Hîrlău se desfășoară „platforma structurală Singeap”, pe care tot V. Tufescu (1937) o caracterizează că „o largă cîmpie de o perfectă netezime, pe care semănăturile și șoseaua dreaptă, cu arbori pe margine, înșală că te afli pe o cîmpie joasă și nu bănuiești că ești la 400 m” (*op. cit.*, p. 100). Orizonturile de calcare și gresii sînt exploatate doar pentru interese strict locale. În nord-est de pădurea Zagavia sînt încă vizibile vechile cariere pentru piatră de moară. În majoritatea cazurilor marginile acestor platforme sînt foarte abrupte, constituind cornișe dure la baza cărora, datorită prezenței unor strate acvifere bogate, apar alunecări de amploare. Prin secționarea acestor suprafețe structurale de către rețeaua hidrografică au rezultat văi cu caracter resecvent, subsecvent și obsecventi.

Marile văi ale Sucevei și Siretului, adîncite cu peste 150 m în podiș, cursul superior al Șomuzului Mare și Șomuzului Mic sînt orientate, în cea mai mare parte, pe direcția nord-vest—sud-est, conform cu structura monoclinală și prezintă profile transversale cu versanții relativ simetrici și afectați de aceleași procese geomorfologice. Evoluția lor avansată tinde să le transforme în depresiuni-culoar pe direcția de inclinare a stratelor. Acest aspect este propriu pentru cele două Șomuzuri și apare numai accidental în cazul Sucevei și Siretului. Astfel, valea Sucevei, între Dornești și confluența cu valea Suceveței, este orientată nord-est—sud-vest și nord—sud și prezintă o asimetrie evidentă, versantul stîng dintre Dornești și Țibeni reprezentînd o cuestă de dimensiuni mari. La fel, văile Șomuzului Mare (între Fălticeni și Dolhasca) și Șomuzului Mic (între Unești și Corni), cu orientare vest—est, au versanții sudicii formați de cueste impresionante. Situația se repetă și pe anumite porțiuni din văile Solcăi, Ilișeștilor, Scheiei, Drăgoiasei, Rădăsenilor.

Suprafețele netede întinse și continui au fost în bună parte interpretate ca platforme de eroziune provenind din trei mari cicluri de eroziune. Studiile recente infirmă existența mai multor cicluri de eroziune, ajungînd la concluzia că ele reprezintă „nivele parțiale”, înscrise la înălțimea diverselor

faciesuri petrografice (C. Martiniuc, 1955, 1960; I. Sîrcu, 1956, 1965; V. Mihailescu, 1966; V. Băcănușu și colab., 1980).

Versanții (mai ales cuestele) cu pante de peste 5° sînt afectați de alunecări, eroziune torențială și spălări areolare intense. Din vechia cîmpie de acumulare miocenă care a reprezentat suprafața inițială a Podișului nu se mai păstrează nimic, formele de acumulare majore fiind generate recent de riurile principale. Ariile de confluență și luncile riurilor mari (Siret, Moldova, Suceava) au aspectul și caracteristicile unor adevărate cîmpii de acumulare.

Asimetria versanților Siretului și existența șeilor din est, acoperite de prundișuri carpatice au dus pe primii cercetători la formularea ipotezei orientării inițiale a rețelei hidrografice pe direcția vest—est și formării Siretului (ca și a Prutului) printr-un lanț de captări succesive. În acest caz înșeurile respective (denumite și trecători ori porți) ar reprezenta vechi șei de captare (Dersea pentru Siret, Bucecea pentru Suceava, Ruginoasa pentru Moldova). Studiile ulterioare (I. Sîrcu, 1955, 1966; C. Martiniuc, 1955, 1960; V. Băcănușu, 1968, 1973; I. Hârjoabă, 1968; V. Sficlea, 1960, 1980) infirmă această ipoteză, arătînd că seria teraselor păstrează un paralelism evident la cursul actual, iar terasele superioare se găsesc la altitudini mai mari decît șele. Apariția șeilor este condiționată de eroziunea diferențială favorizată de prezența în perimetrele respective a unor formațiuni mai puțin rezistente. În cîteva puncte din Dealul Mare, din Dealurile Bour—Ibănești și în porțiunile de înșeuare se întîlnesc prundișuri de vîrstă sarmatică provenite din dezagregarea conglomeratelor din substrat, ele nereprezentînd opera unor paleoriuri cu direcția vest—est.

Este posibil ca în viitor rețeaua hidrografică să se transforme, parțial, într-o rețea transversală pentru că riurile din bazinul Prutului au nivelul de bază mai coborît, cu circa 160—200 m, decît axul văii Siretului. Cumpăna apelor s-a deplasat mereu spre vest, iar unii afluenți ai Prutului au pătruns pînă în albia Siretului. În sectorul Buhai—Valea Morii din șaua de la Dersea, Jijia a reușit să capteze bazinul superior al Bahnei, afluent al Siretului. La fel, situația se repetă la nivelul șei de la Bucecea, unde Sitna, afluent al Jijiei, a captat bazinul superior al văii Curnăturii, iar valea Fundoaiei a pătruns pînă la nivelul terasei de 20 m a Siretului.

Cercetările din diferite sectoare au pus în evidență existența pînă la 8 terase la care se adaugă încă 2—3 trepte de luncă. Terasele înalte ajung pînă la altitudinea relativă de 200—210 m în valea Siretului, 180—190 în valea Sucevei și 160—170 m în valea Moldovei. Terasele cu înălțimea pînă la 60—70 m sînt mai bine conservate și sînt acoperite de depozite groase de luturi loessoid. În sectoarele de confluență majoră (Suceava—Siret, Moldova—Siret) sînt caracteristice „gruiurile aluvionare” formate prin mutarea avale a confluențelor pe distanțe de zeci de kilometri. Luncile prezintă o micromorfologie foarte variată, cu 2—3 terase de luncă și o mulțime de meandre, grinduri longitudinale, brațe părăsite, „Sirețele”, popine.

Relieful, factorul cu rol polarizator și de suport pentru celelalte componente ale peisajului, a influențat puternic modul de distribuire a rețelei de așezări și a legăturilor dintre acestea.

6.2.1.2. Așezările și populația

Așezările din Podișul Sucevei s-au format în apropierea rețelei hidrografice, a pădurii, în locurile mai adăpostite și cu poziție dominantă sub directă condiționare a particularităților reliefului. Ca o caracteristică a Podișului Sucevei este de semnalat predominarea așezărilor mici. Așezările cu mai puțin de 600 locuitori (între care predomină cele cu 200—400 locuitori) prezintă o frecvență mai mare în Podișul Fălticenilor și Podișul Dragomirnei. Astfel 103 de asemenea așezări grupează aproximativ 9% din populația rurală. Așezările cu populație între 600 și 1 200 de locuitori grupează circa 21% din populația rurală și formează areale mai compacte în Podișul Fălticenilor și Podișul Dragomirnei. Așezările care au între 1 200 și 1 800 de locuitori cuprind aproape 17% din populație. Ele sînt caracteristice Culmii Siretului și Podișului Fălticenilor. Satele cu 1 800—2 400 de locuitori sînt în număr redus (33) și grupează 17% din populația rurală a Podișului Sucevei. Frecvența lor este mai mare la contactul dintre podișul piemontan din vest și depresiunile Rădăuților și Litenilor, precum și în Valea Siretului. Cele aproape 45 de așezări cu populație între 2 400 și 6 000 de locuitori dețin 34% din populația rurală a Podișul Sucevei. Aceste așezări sînt caracteristice pentru podișul piemontan și Depre-

siunea Rădăuților. Cea mai mare parte a așezărilor rurale au funcții economice dominant agricole, dar există diferențieri regionale în privința specializării lor. Așezările din vest fac parte din aria de creștere a animalelor și de cultură a plantelor, au o economie agricolă complexă, în care creșterea animalelor (bovine și porcine) ocupă un loc important. Baza furajeră pentru creșterea animalelor este formată din : pășuni și fînețe, culturi furajere și cultura cartofului. Cele mai numeroase sînt însă așezările din aria de cultură a plantelor și de creștere a animalelor care predomină în Podișul Dragomirnei, Culmea Siretului și Podișul Fălticenilor. Un subtip aparte îl formează așezările pomicole din Podișul Fălticenilor. De semnalat prezența unui număr mai mare de așezări, comparativ cu alte unități din Podișul Moldovei, cu funcție agricolă și industrială (Cornu Luncii, Bucecea, Verești, Hănțești, Dornești, Baia, Marginea, Dolhasca), unele apropiindu-se prin funcționalitate de așezările urbane. Pentru alte sate este sesizabilă tendința de evoluție ca așezări de cazare a forței de muncă și cu o agricultură specializată pentru piețele urbane. Deși nu au unități industriale, ponderea populației active în ramuri neagricole este, totuși, mare. Este cazul așezărilor rurale din jurul Sucevei (Ipotești, Lisaura, Mitocu Dragomirnei, Mitocași, Salcea, Mereni, Plopeni, Prelipca, Scheia, Florinta, Mihoveni, Sfintu Ilie), din împrejurimile Fălticenilor (Șoldănești, Tarna Mare), din jurul Pașcanilor (Valea Seacă, Topile, Blăgești, Boșteni, Gîștești, Lunca, Sodomeni).

Apare evidentă necesitatea multiplicării punctelor nodale de convergență în Depresiunea Litenilor, în jumătatea nordică a Podișului Dragomirnei și în Valea Siretului. Urbanizarea centrelor rurale cu funcție și industrială, la care se pot adăuga noi centre în cele trei arii, ar rezolva problemele dezvoltării economice și sociale uniforme în profil teritorial, ar întrerupe depopularea rurală.

Rețeaua de așezări urbane — mai puțin dezvoltată în Podișul Sucevei — este formată din șase orașe de dimensiuni mici și mijlocii. Cele 300 de așezări rurale și 6 orașe totalizează o populație de 660 000 de locuitori, din care 77% reprezintă populația rurală și numai 23% populația urbană. În anul 1912 erau înregistrați 407 830 de locuitori, iar în 1930 numărul lor ajunsese

la 440 265. În acest interval se constată sporuri mai însemnate în jumătatea sa sudică, mai ales în Podișul Fălticenilor.

În intervalul 1930—1956, apare un contrast mai evident în evoluția numerică a populației din jumătatea nordică și din cea sudică. Declinul demografic a fost caracteristic așezărilor urbane Rădăuți (5,0%), Fălticeni (4,3%), Siret (42,8%) și la 60 de așezări rurale situate îndeosebi în podișul piemontan din vest, în Depresiunea Rădăuților și în partea nordică a Podișului Dragomirnei (Brașca 28,2%, Dornești 27,8%), Corlata, Horodnicu de Sus, Măneuți 35,7%, Mihăileni 30,2%, Baineț 50,6%, Țibeni 64,4%, Lespezi 50,2% ș.a.).

După 1956, centrele urbane, și în primul rând orașul Suceava, au înregistrat creșteri foarte mari iar o parte din așezările rurale au pierdut din populație.

În perioada 1956—1966 în două areale s-a constatat un declin demografic evident. Primul corespunde cu partea nordică a Podișului Dragomirnei (Șana Bălcăuți) și cu Dealul Bour, iar al doilea cu partea sudică a podișului piemontan dintre Suceava și Moldova. Scăderi au înregistrat și unele așezări din Podișul Fălticenilor și din Dealul Hirlău. În total, în acest interval, 85 de așezări rurale au înregistrat pierderi de populație, cu valori pînă la 30%. În intervalul 1966—1977 se generalizează mai mult fenomenul de descreștere a populației în spațiul rural. În total, 165 de așezări rurale au cunoscut un regres al numărului locuitorilor. Circa 47% din cele 352 de așezări au înregistrat pierderi de populație. Fenomenul se dovedește caracteristic în cazul așezărilor mici și izolate. S-a amplificat, în schimb, puterea de absorbție a așezărilor urbane (Suceava, în mod deosebit) și au marcat creșteri însemnate așezările rurale din centura suburbană a acestora, ca și unele așezări rurale din partea de vest.

Populația din acest spațiu geografic a avut în timp o vitalitate demografică deosebită. Natalitatea în proporție de peste 20‰ se situează net deasupra mediei pe țară. Valorile cele mai mici ale indicelui de natalitate se întîlnesc în partea de nord a Podișului Dragomirnei și în partea sud-vestică a Podișului Fălticenilor. Valorile cele mai ridicate (peste 25‰) sînt specifice zonei de contact a podișului cu Obcinele Bucovinei și părții sudice a Podișului Fălticenilor. Între cele două medii, rural și urban, s-a ajuns în ultimii ani la o inversare

de situații, în sensul că, dacă pînă în anul 1978 mediul rural prezenta valori superioare ale natalității față de cel urban, în prezent, acesta din urmă, înregistrează indici de natalitate superiori, consecință, desigur, a transferului de populație tînără spre centrele urbane.

În intervalul 1975—1983, indicatorul migrației arată o accentuare a plecărilor din mediul rural, dar și o creștere a capacității de primire a așezărilor urbane din acest teritoriu. Orașul cu cea mai mare putere de absorbție este Suceava (cu un sold migratoriu pozitiv de 38,0‰ în acest interval), urmat de Rădăuți (17,9‰), Pașcani (15,5‰) și Fălticeni (12,8‰). Mediul rural a înregistrat în acest interval valori negative, dar apar diferențieri cu conturarea unor arii mai puțin afectate de migrații, cum este fișia de la contactul cu Obcinele Bucovinei ca și aria largă din imediata apropiere a orașului Suceava. La polul opus se situează Podișul Dragomirnei, Culmea Siretului, unele areale din partea sudică a Podișului Fălticenilor, unde migrațiile definitive au o intensitate mare (19—24‰). Cu toate că valorile negative ale soldului migratoriu sînt generale în mediul rural, pe ansamblul Podișului Sucevei nu se constată o scădere a populației.

Diversificarea activităților economice în ultimul timp a produs schimbări importante în structura profesională a populației. Astfel, dacă în anul 1966 peste 77% din populația activă a Podișului Sucevei își desfășura activitatea în agricultură, în 1977 ponderea ei a scăzut la 51,3%. Proporții încă însemnate de activi în agricultură s-au păstrat în partea nordică a Podișului Sucevei și în Culmea Siretului (peste 65%). În bună măsură scăderea populației agricole este consecința transferurilor în industrie și construcții, ramuri în care în același an, populația activă a ajuns la 29,5%.

Dezvoltarea asistenței medicale, a comerțului, învățămîntului ș.a. a permis, pe ansamblu, o creștere însemnată a populației active în sectorul terțiar (de la 1,4% în 1966 la 19,2% în 1977). Cu toate transferurile care au avut loc, Podișul Sucevei rămîne o regiune cu populație rurală dominantă și un rezervor de forță de muncă.

Densitatea generală a populației din Podișul Sucevei era în anul 1977 de 138 loc./km², valoare prin care se încadrează între regiunile naturale cu densități mari. În 1912 densitatea era de 84 loc./km², în 1930 a ajuns

la 103 loc./km², iar în 1966 la 122 loc./km²; regional, densitatea a avut o evoluție diferențiată, remarcându-se, pe de o parte, unele areale mici din partea de nord, în care densitățile sînt mai scăzute în prezent față de începutul secolului (marcînd scăderi pînă la 40 loc./km²), iar pe de altă parte, alte areale mult mai largi, în care densitatea a crescut cu 50—100 loc./km². În prezent, densitatea cea mai mare (între 140 și 170 loc./km²) formează areale compacte și largi în jurul orașelor Suceava, Pașcani, Rădăuți și Fălticeni, iar cea mai mică se găsește în Culmea Siretului și în partea nordică a Podișului Dragomirnei. Exprîmînd densitatea prin raportul dintre numărul de locuitori la 100 ha teren arabil convențional, se constată că cea mai mare densitate rurală (200—300 loc./100 ha t.a.e.) există în partea vestică, la contactul cu Obeinele Bucovinei, sub forma unei fișii compacte.

6.2.1.3. Activitățile economice

Activitățile agricole au constituit ocupația de bază pentru cea mai mare parte din populație, astfel că suprafețele agricole s-au extins continuu în detrimentul pădurii, care a ajuns în prezent la 75 380 ha, ceea ce reprezintă 17,6% din suprafața totală. Suprafața agricolă deține peste 72% din suprafața Podișului Sucevei (o medie superioară mediei pe țară), dar, în condițiile unei densități mari de populație (la un locuitor revine doar 0,5 ha teren agricol), dezvoltarea agriculturii a necesitat și necesită în continuare o mai bună gospodărire a fondului funciar prin ameliorarea calității unor terenuri. Prin îndiguiri, suprafețe importante cu exces de umiditate din luncile Siretului, Moldovei, Sucevei ș.a. au fost ferite de inundații.

Acțiunea de drenare a terenurilor cu exces de umiditate are tradiții mai vechi în Depresiunea Rădăuți, unde în secolul trecut existau sisteme de drenaj. Îndeosebi în partea de vest a Podișului Sucevei și în luncile Siretului și Moldovei, au fost create sisteme de desecare (sistemul Rădăuți—Frătăuți, sistemul Cornu Luncii—Fîntîna Mare, sistemul Mitoc—Negostina, sistemul Hălăucești ș. a.). Pentru combaterea deficitului de umiditate, resimțit mai ales în partea sudică a podișului, s-au făcut amenajări pentru irigații pe 4,6% din suprafața agricolă, în sisteme locale pe suprafețe

mici, specifice Podișului Sucevei. Acestea se grupează pe luncile și terasele joase, în apropierea surselor de apă: în valea Siretului (peste 11 000 ha), valea Moldovei (peste 4 000 ha) și valea Sucevei (peste 1 000 ha).

Asigurarea debitului de apă necesar irigațiilor culturilor se realizează, în cazul rîurilor cu debit insuficient în perioada de vară, prin acumulări de mică capacitate, amenajate pe Șomuzul Mare, Șomuzul Mic, Strîmbu ș. a. Lucrări de combatere a eroziunii solului și de regularizare a scurgerii apelor pe versanți s-au făcut în bazinele Șomuzului Mare și Solonețului.

Cea mai mare parte din terenul agricol revine terenurilor arabile (78%), urmate de pășunile și fînețele naturale (20%) și livezi (2%). În proporție de aproape 50% terenul arabil este utilizat pentru cultura cerealelor iar în cadrul acestora suprafețele cele mai mari le dețin în ordine porumbul (22%), grîul (19%) și orzul (aproape 7%). Global, suprafața cultivată cu porumb reprezintă 1,6% din suprafața cultivată a țării. Porumbul, deși ocupă cele mai întinse suprafețe nu are, totuși, condițiile cele mai bune de cultivare. Producția medie la hectar este inferioară mediei pe țară. Cele mai mici producții se obțin în partea nordică și sînt determinate de regimul termic (perioada mai scurtă de vegetație) și de condițiile pedologice mai puțin favorabile. Suprafața cultivată cu grîu și secară reprezintă 2,1% din cea cultivată cu aceste cereale pe țară. Producția medie la hectar, inferioară mediei pe țară, reprezintă 1,7% din cea a României. Cultura orzului, cu o perioadă mai scurtă de vegetație, deține circa 2,5% din suprafața totală a țării cultivată cu orz, dar participă cu numai 1,6% la această producție.

Cultura cartofului a găsit aici condiții mult mai bune de dezvoltare și ocupă peste 15% din suprafața arabilă, ceea ce reprezintă aproape 13% din suprafața cultivată cu cartof a țării și contribuie cu peste 15% la producția pe țară. Producția medie la hectar se situează cu mult peste media pe țară. Podișul Sucevei se dovedește una din regiunile importante de cultură a cartofului și în cuprinsul său s-au dezvoltat unități de mare capacitate de industrializare a cartofului. Există și o anumită specializare în cultura cartofului în sensul că soiurile pentru industrializare se produc în unități agricole din Depresiunea Rădăuți, în apropierea fabricii de spirt, în valea

Siretului, în aria imediată a fabricii de amidon de la Hănțești.

Între plantele industriale, suprafețele cele mai însemnate sînt deținute în ordine de sfecla de zahăr, de inul pentru fuior și de cînepă. Suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr se concentrează în apropierea celor două mari unități de prelucrare de la Bucecea și Pașcani. Arealul de cultură s-a extins mult în valea Siretului, unde au fost dezvoltate și irigațiile. Se cultivă pe aproape 10 000 ha și cu producții medii la hectar de peste 25 000 kg. Inul pentru fuior și cînepa, culturi tradiționale, ocupă suprafețe mai însemnate în jumătatea nordică, mai umedă și răcoroasă, unde mai ales inul are condiții favorabile de dezvoltare. Suprafețele cultivate cu in s-au extins mult în ultimul timp și datorită necesităților de prelucrare a unităților de industrializare din regiune.

Cultura plantelor furajere ocupă peste 10% din terenul arabil. Cele mai întinse suprafețe sînt cultivate cu trifoi, plante pentru însilozat, rădăcinoase și lucernă. Legumele se cultivă cu puțin peste 2% din suprafața arabilă și ele se concentrează în lungul Siretului, Sucevei și Moldovei. Dintre culturile legumicole, condiții bune pentru cultură au în partea de nord varza de vară și de toamnă, rădăcinoasele, castraveții de toamnă, iar în partea sudică, tomatele, ardeii, vinetele. Un bazin specializat în cultura castraveților pentru conserve este Depresiunea Rădăuților, iar un alt bazin legumicol este conturat în regiunea Vereștilor.

Pășunile și fînețele naturale sînt caracteristice pentru podișul piemontan și Dealul Mare—Hîrlău. Dintre acestea, pășunile au o extensiune mai mare și ocupă circa 14% din terenul agricol.

Pe ansamblu, suprafața ocupată cu livezi deține numai 2,2% din suprafața agricolă, dar aici s-a individualizat un important bazin de cultură a mărului în regiunea Fălticeni—Rădășeni—Preuțești—Vulturești—Horodniceni. În prezent, în acest bazin pomicol se acordă o atenție tot mai mare cîreșului și vișinului.

Creșterea animalelor reprezintă o activitate de bază a economiei rurale din Podișul Sucevei. Creșterea bovinelor a constituit una din ocupațiile tradiționale în special în jumătatea nordică și spre contactul cu Obșinele Bucovinei. Întinsele suprafețe de pășuni și fînețe naturale din regiunea de

munte ca și din cea piemontană au oferit cele mai bune condiții pentru creșterea vacilor (rasa Simmental în regiunea Rădăuți). Cu o densitate medie de 83 bovine la 100 hectare teren agricol, Podișul Sucevei se situează între primele regiuni din țară. Ariile cu densități mai mari sînt determinate de amplasarea complexelor de îngrășare a taurinelor sau a fermelor mari specializate (Rădăuți, Dornești, Gălănești, Verești, Bucecea, Fălticeni, Pașcani, Hănțești ș. a.). În partea de vest, unde apare o concentrare mai evidentă a efectivului de animale, predomină rasa Pinzgau, rasă de mare productivitate pentru lapte. În rest predomină Bălțata românească. Deși nu este o regiune de cultură a cerealelor, creșterea porcinelor este, totuși, bine dezvoltată. Densitatea de peste 130 capete la 100 hectare teren arabil este superioară mediei pe țară. Creșterea porcinelor a fost stimulată prin trecerea la sistemul de creștere de tip industrial, în complexe de mare capacitate (Verești, Bucecea, Dornești, Scheia ș. a.), amplasate, în general, în apropierea unităților de industrializare a cărnii. Densitatea medie a oilor la 100 hectare teren agricol este de 110 capete, o intensitate mai mare de creștere fiind caracteristică pentru Culmea Siretului, Podișul Fălticeniilor și podișul piemontan. Exprimînd intensitatea de creștere a animalelor prin indicatorul unități vită mare la 100 hectare teren agricol se constată că acesta arată o densitate medie de 168 de unități vită mare pe ansamblul Podișului Sucevei. Complexele de tip industrial de creștere a păsărilor s-au dezvoltat în apropierea orașelor Suceava și Pașcani.

Documentele istorice din secolele XV și XVI menționează existența a numeroase mori de apă pe majoritatea arterelor hidrografice. Aceste instalații s-au menținut pînă la începutul secolului XX, cînd au început să-și facă apariția morile cu abur. O răspîndire mare au avut și teascurile pentru extragerea uleiului din in și mai ales din cînepă, povernele și velnițele, instalații vechi pentru fabricarea spirtului și rachiului din fructe, cereale și cartofi, slădnițele, instalații pentru producerea berii. Industria casnică de prelucrare a lînii, țesutul pînzei de in și cînepă au constituit, de asemenea, ocupații vechi, tradiționale. Documentele din secolul XV menționează numeroase mori, torcătoare de lînă și pive pentru bătutul sumanelor. Au existat, de asemenea preo-

cupări de prelucrare a lemnului (ferăstraiele de apă fiind mai ales în partea vestică a podișului), a rocilor de construcție, de fasonare a pietrelor de moară, pentru olărit etc. Multe din aceste instalații de mică capacitate au continuat să fie prezente alături de unitățile industriale de mai mare capacitate până mai târziu. Secolul XIX marchează apariția unităților industriale de mai mare capacitate. Cele mai numeroase au fost din ramura industriei alimentare, ce foloseau ca materie primă cartoful, cerealele, fructele, unitățile industriale pentru prelucrarea cărnii (Burdujeni), pentru fabricarea uleiului vegetal și a zahărului (Ițcani), de conservare a fructelor (Timpești), fabricile de bere (Solca, Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Siret). Îndeosebi în partea de vest și-au făcut apariția fabricile de cherestea, de hirtie și de mobilă (Rădăuți, Marginea, Cornu Luncii, Fălticeni). Primele unități de tip industrial, din ramura construcțiilor de mașini, au fost cele de la Pașcani (atelierul de reparații de vagoane) și Rădăuți (unități pentru unelte agricole, acumulatori, pile electrice). Multe din unitățile industriale care au apărut la începutul secolului XX au avut un timp scurt de existență. Dezvoltarea mai intensă a activităților industriale, în cuprinsul Podișului Sucevei, a început după anul 1950, când s-a trecut la construcția unor mari obiective industriale.

Industria lemnului, ramură reprezentativă a Podișului Sucevei, a înregistrat schimbări substanțiale prin valorificarea superioară a masei lemnoase provenite mai ales din Obceinele Bucovinei. Construirea în anul 1959 a combinatului de prelucrare a lemnului din Suceava (cu secții de mobilă, plăci fibro lemnoase, placaje, furnire estetice și de uși și ferestre) a dus la valorificarea într-un grad superior a cherestelei și a deșeurilor provenite de la fabricile de cherestea din regiunea de exploatare. Pentru valorificarea lemnului de rășinoase și a deșeurilor de lemn în 1962 a intrat în producție întreprinderea de celuloză și hirtie din Suceava, unitatea cu cea mai mare pondere în producția industrială a orașului. O altă unitate reprezentativă din această ramură este fabrica de mobilă din Rădăuți (intrată în funcțiune în anul 1962), cu o capacitate anuală de 15 000 garnituri de mobilă. O unitate specializată în producția de lăzi de ambalaj s-a dezvoltat la Rădăuți, după anul 1976, iar în orașul Fălticeni, în

anul 1971, a intrat în producție o nouă unitate de prelucrare a lemnului cu secții de înobilare a lemnului, de mobilă, PAL, de mobilă din plăci înobilate. Industria lemnului este prezentă și în alte localități: Cacica (fabrică de cherestea), Vicovu de Jos, Marginea ș. a. Sînt unități de mai mică capacitate, dar concentrarea lor în partea vestică arată legăturile strînse cu regiunea de munte.

Dezvoltarea industriei textile s-a bazat pe materia primă oferită de cultura plantelor textile, care găsesc aici condiții favorabile. Unitățile de prelucrare primară a inului și a cînepii de la Ițcani—Suceava, Verești, Dornești și Cornu Luncii furnizează firele și fibrele necesare pentru două unități reprezentative din acest teritoriu: filatura de in și cînepă din Fălticeni, intrată în funcțiune în 1957 (care se aprovizionează și de la alte topitorii din țară, Ulmeni, Cîrța, Joseni, Palota, Sagna, Sinnicolau Mare), întreprinderea de la Pașcani, înființată în anul 1978, care produce fire și țesături subțiri.

Industria confecțiilor și tricotajelor este dezvoltată în principalele centre urbane. În orașul Suceava a fost înființată întreprinderea de tricotaje „Zimbrul” (fire de bumbac și sintetic), cu secții la Fălticeni (specializată în producerea lenjeriei de corp) și în orașul Siret (unde se prelucurează tricotel de la unitatea din Suceava) ca și întreprinderea de tricotaje Bucovina pentru produse de lină. În anul 1982 în orașul Siret s-a înființat întreprinderea de covoare plușate, iar la Pașcani întreprinderea de tricotaje și perdele care produce țesături de mătase artificială și tricotaje.

Industria alimentară prelucurează o gamă foarte largă de materii prime din agricultură prin întreprinderea de spirt, bere și amidon Hănțești, fabricile de zahăr de la Bucecea și Pașcani, fabricile de prelucrarea legumelor și fructelor de la Suceava, Fălticeni, Verești etc.

Industria morăritului și panificației este reprezentată prin unitățile mari de prelucrare de la Suceava, Fălticeni, Dornești, Dolhasca ș.a. Creșterea animalelor oferă posibilități de valorificare a unor importante materii prime. Una dintre unitățile mari din țară este cea de industrializare a cărnii din Burdujeni—Suceava. Abatorul din Burdujeni a intrat în funcțiune în anul 1913. Distrus în timpul războiului, a fost refăcut și modernizat în 1971. În prezent el are o

fabrică de conserve și semiconserve, un antrepozit frigorific.

Industria construcțiilor de mașini este o ramură relativ nouă, cu un rol deosebit de important în diversificarea activităților economice și în completarea profilului economic al centrelor urbane. Centrul cel mai important al industriei construcțiilor de mașini este orașul Pașcani care, prin întreprinderea mecanică de material rulant, produce vagoane basculante și vagoane platformă; în prezent și-a diversificat gama de produse prin intrarea în funcțiune, după anul 1980, a întreprinderii de tractoare și reglatoare directe și întreprinderii de scule și unelte așchietoare. Încă din anul 1963 în orașul Suceava a apărut o unitate de întreținere a combinatelor de prelucrare a lemnului și de celuloză și hirtie, care s-a dezvoltat și a diversificat produsele în domeniul construcțiilor metalice industriale, utilajului chimic și mașinilor unelte. Întreprinderea produce utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții și pentru industria celulozei și hirtiei. O secție a acestei întreprinderi a fost înființată în anul 1977 în orașul Fălticeni; ea preluând activitatea unor ateliere mici ale industriei locale. Un al treilea centru important este orașul Rădăuți unde, din anul 1977, funcționează fabrica de confecții metalice și prelucrări mecanice cu o secție de producție în orașul Siret.

Industria materialelor de construcții valorifică unele materii prime din cuprinsul Podișului Sucevei și din regiuni apropiate. De dată recentă sînt cele două unități producătoare de sticlă din centrele Suceava și Fălticeni, prin care se valorifică nisipul de Hudești. Necesitățile dezvoltării construcțiilor de locuințe și industriale au dus la apariția, în orașul Suceava, a unei unități de prefabricate din beton armat și altele la Dolhasea și Milișăuți.

Industria chimică, cea mai nouă ramură din cuprinsul Podișului Sucevei, este reprezentată prin combinatul chimic din Fălticeni specializat în producerea detergenților. Folosește materii prime prin conlucrarea cu mari combinate chimice din țară (Borzești, Valea Călugărească ș.a.).

Podișul Sucevei este o unitate naturală fără resurse de subsol, dar cu toate acestea dezvoltarea industrială a fost amplificată mult în ultimul timp. Industria sa este orientată în mare măsură spre valorificarea produselor agricole specifice acestei regiuni

(textilă, alimentară) și a resurselor oferite de Obeinele Bucovinei (industria lemnului), sau de Cîmpia Moldovei (industria sticlei).

Localizarea unităților industriale s-a făcut cu precădere în centrele urbane, în scopul impulsiei lor economice și pentru creșterea capacității lor de polarizare. Existența unor așezări rurale cu un profil industrial bine conturat (Verești, Cornu Luncii, Dornești, Bucecea, Salcea) răspunde necesității de apropiere a unităților de prelucrare de materiile prime agricole și conduce la conturarea centrelor de polarizare.

6.2.1.4. Podișul piemontan dintre râurile Suceava și Moldova

Între văile Moldovei și Sucevei, pe aliniamentul Păltinoasa—Cacica—Solca—Voivodeasa—Straja, în lungul liniei pericarpatice, vin în contact două unități total diferite: Obeinele Bucovinei și Podișul Sucevei iar la acest contact a luat naștere podișul piemontan (Piemontul colinar Marginea—Ciungi după N. Popp, 1935, Piemontul Obeinei Mari după C. Martiniuc, 1960) lat de 8—10 km, cu caracteristici biopedoclimatice proprii Podișului Sucevei, peste care se suprapun și elemente de natură carpatică. Acest podiș are cea mai mare dezvoltare între Moldova și Sucevița, iar în cuprinsul lui se individualizează dealul Poiana Ciungilor (689 m), cea mai impunătoare formă de relief din Podișul Sucevei, după altitudine.

Este alcătuit din depuneri fluvio-deltaice sarmatice cu extensie mai mare în dreptul râurilor ieșite din munte. Construcția piemontului a început în sarmațianul inferior, cînd întreaga arie din fața obeinelor era submersă și supusă unui proces de colmatare prin depuneri deltaice. Originea și vîrsta depozitelor au fost remarcate de C. Martiniuc (1946), L. Ionesi și colaboratorii (1971), care precizează că acumulările fluvio-deltaice reprezintă doar vollhinianul și sînt formate din cel puțin patru complexe de pietrișuri, fiecare complex fiind alcătuit din cîteva orizonturi de pietrișuri și argile nisipoase, separate de intercalații argil-nisipoase marine. Succesiunea complexelor indică atît faze de intensificare a eroziunii în uscatul din regiunea carpatică, cit și o pendulare a liniei de țarm. În urma îndelungatei evoluții pliocen-cuaternare, din cîmpia

piemontană sarmatică au rămas numai câteva dealuri și coline izolate (sculptate în acumulările fluvio-deltaice). La periferia lor s-a format o treaptă mai joasă de relief de acumulare (glacisuri proluvio-culuviale, terase inferioare, lunci), larg dezvoltată în Depresiunea Baia și în Culoarul Moldovei. Treapta deluroasă, situată cu 200–300 m sub marginea Obcinelor, are cea mai mare extensie între valea Moldovei și valea Suceviței, unde relieful actual reprezintă mulajul fosilizat al piemontului sarmato-pliocen (C. Martiniuc, 1971). Dintre trăsăturile caracteristice piemontului se remarcă înclinarea pe direcția vest—est, orientarea perpendiculară pe Obcine a rețelei hidrografice, despletirea ei și capacitatea mare de înmagazinare a apelor infiltrate.

În dreptul ieșirii Moldovei din munte se află Masivul Poiana Ciungilor (689 m), situat între valea Moldovei și pîrîul Ilișești și continuat spre nord, pînă la valea Solonețului, cu Dealul Socului (614 m), reprezentînd o deltă fosilă, cu axa mare de 15–16 km, orientată de la nord-vest spre sud-est. Masivul este alcătuit din pietrișuri heterogene groase de 70–80 m, cu intercalații lenticulare de nisipuri grosiere și argile vinete, dispuse pe un pat de argile vinete moi. Acestea, ca și complexul de pietrișuri, prezintă înclinări din partea centrală a masivului spre exterior, mai accentuată (de 6–7°) pe versantul sudic dinspre valea Moldovei. Această înclinare este consecința unor mișcări de ridicare posterioare depunerilor deltaice, materializate printr-o bombare tectonică (N. Barbu și colab., 1964). Tectonica de bombare asimetrică se reflectă în caracterul radiar al rețelei hidrografice, în altitudinea mare și asimetria masivului. Planul de înclinare al stratelor a permis și dezvoltarea unor mici suprafețe structurale, în special pe flancul sudic.

În nordul Masivului Ciungi (între văile Solonețului și Solcăi), complexul de pietrișuri apare în petice dispartate. Grosimea mare a complexului de pietrișuri din sectorul Pîrtești (30–40 m) ne indică și aici existența unei vechi delte formate de un paleo-Soloneț.

Suprafața cea mai întinsă derivată din fostul piemont sarmatic se desfășoară între văile Solcăi și Suceviței, complexul de pietrișuri fluvio-deltaice fiind rezultatul acțiunii unei paleo-Sucevițe. Grosimea depozitelor din partea mediană a fostei delte depășește 100 m (Dealul Cerdacu), iar pe

flancul nordic, care depășește valea Suceviței, în Dealul Fătu, acestea ajung la peste 60 m. Ultimul aliniament de dealuri înalte se desfășoară pe dreapta culoarului Sucevei, format din Dealul Crucii (520 m), Dealul Leahu (537 m), Dealul Brădet (482 m), Dealul Colnic (491 m), Dealul Osoi (482 m); pe acestea se găsesc depuneri de pietrișuri în grosime de 5–10 m. Pietrișurile nu au continuitate spre poala Obcinei Mari, astfel că originea lor este controversată: resturi din terasele Sucevei, ori trene de pietrișuri fluvio-deltaice volhiniene.

Între aceste dealuri și munte se desfășoară Depresiunea Horodnicului, parte vestică a Depresiunii Rădăuți. Acest ultim compartiment al podișului piemontan este fragmentat intens de o rețea deasă de văi bine adîncite prin care sînt transportate din munte cantități mari de aluviuni. Voitinul și Horodnicul și-au creat, în sectorul Bălănești și Marginea, conuri largi de dejecție care se contopesc cu conurile Sucevei și Suceviței.

În imediata apropiere a muntelui se schițează un uluc îngust, accentuat în mod izolat prin depresiuni de contact (Cacica, Soloneț, Solca), apărute prin exhumarea fișiei de miocen de sub stiva depozitelor piemontane.

Vecinătatea munților, înălțimile constante mari și caracteristicile structural-litologice produc o diferențiere evidentă a factorilor fizico-geografici față de celelalte unități ale Moldovei extracarpate. Astfel, radiația solară globală (111–115 kcal/cm²/an) și durata anuală de strălucire a Soarelui (1 800–2 000 ore) au valori mai reduse decît în celelalte părți ale podișului și se produc frecvente procese de foehnizare a maselor de aer ce coboară dinspre Obcine, fapt care creează condiții termice medii apropiate de restul podișului. Precipitațiile atmosferice înregistrează 700–750 mm, iar dinamica generală a atmosferei este completată de brize de munte — vale și vale — munte. Precipitațiile atmosferice bogate și constituția litologică permit acumularea unor mari rezerve de ape subterane. În sectorul Cacica—Solca apar ape subterane mineralizate prin dizolvarea sărurilor reziduale din formațiunile miocene.

Vegetația naturală puternic modificată este reprezentată în sectorul Dealul Poiana Ciungilor, Ilișești, Dealul Lupului prin masive de făgete, în care apar și insule de conifere cu *Abies alba* și *Picea excelsa*. Solurile podzolice indică și ele abundența precipitațiilor.

și acoperirea, în totalitate, a regiunii cu păduri de fag. Local, mai apar planosoluri și podzoluri pseudogleice.

La periferia estică a dealurilor și colinelor piemontane, prin adâncirea și deplasarea succesivă a rețelei hidrografice, se desfășoară o treaptă joasă, cu relief tinăr de acumulare, reprezentat prin șesuri și glaciuri proluviale, în care predomină pietrișurile cu bolovaniș și nisipurile grosiere acoperite uneori de argile eluviale și proluviale-culuviale, cu o morfologie foarte variată de terase joase, conuri de dejecție, grinduri, microdepresiuni, cursuri părăsite. De fapt această treaptă joasă cu mari rezerve de ape subterane, de bună calitate, care uneori ajung la suprafață și produc înmlăștinirea terenurilor, este constituită din Depresiunea Rădăuți și Culoarul Moldovei.

Depresiunea Rădăuți. Se dezvoltă în sectorul mijlociu al văii Sucevei, înaintind tentacular sub formă de golfuri pînă la contactul cu Obcina Mare (Straja pe Suceava, Voivodeasa pe Sucevița).

Dispusă de la nord-vest spre sud-est, conform orientării generale a riului Suceava, se desfășoară pe circa 35 km între Straja și Milișăuți, cu o lățime în jur de 20 km, între Marginea și Dornești și ocupă o suprafață de peste 600 km². Dominată cu 100–150 m de unitățile vecine, corespunde cu cele mai coborîte trepte ale piemontului pericarpatic (altitudine medie 360 m) și cu aria de desfășurare a conurilor-deltă ale Sucevei și Suceviței. Suceava curge acum pe flancul nordic al propriului con, formînd o buclă largă între Gălănești și Satu Mare, în timp ce Sucevița și-a adîncit valea în axul conului. În dreptul orașului Rădăuți, conurile aflate la marginea extensiunii lor estice se întrepătrund, fiind parazitare de conul pîriului Pozen. Depozitele de aluviuni au grosimea între 6 (în conul Sucevei) și 10 m (în conul Suceviței) și conțin ape subterane bogate, cu nivelul freatic foarte aproape de suprafață, ceea ce provoacă înmlăștiniri, datorate și complexului argilo-marnos (1–5 m) de la suprafața șesurilor. În sectorul Bădeuți apare și un strat de turbă de circa 80 cm grosime.

Aliniamentul median al dealurilor Leahu, Brădet, Colnic, Osoi, cu prundișuri la partea superioară, care pot fi interpretate și ca o terasă de 60–70 m, separă Bazinul Rădăuțiului (N. Lupu, 1937) în două depresiuni secundare: a Horodnicului și a Rădăuțiului.

Depresiunea Horodnicului. Mai legată de munte decît Depresiunea Rădăuți, are relief

frământat și secționat adînc de rețeaua hidrografică. Regimul apelor de suprafață este foarte variabil. Chiar riurile cu bazinul dezvoltat și în munții de alături și cu debite relativ mari, la intrarea în depresiune își micșorează debitul datorită infiltrării în cîmpia piemontană, ajungînd pînă la secarea completă în perioadele secetoase (Sucevița). Forma alungită a depresiunii favorizează canalizarea maselor de aer de la nord-vest la sud-est (40,3% frecvență). Temperatura medie anuală este de 7°C. Iarna temperaturile medii lunare coboară sub –5°C (excepțional chiar sub –13°C) iar vara depășesc 18°C. Extremele absolute au variat între –32,5 și 37,7°C. În interiorul depresiunii înconjurată de forme de relief înalte se înregistrează frecvent inversiuni de temperatură, fiind considerată polul de frig al podișului (Gh. Slavic, 1977). Precipitațiile medii anuale în jur de 650 mm sînt superioare față de cantitățile din celelalte părți ale Podișului Moldovei, în anumiți ani înregistrîndu-se cantități mult mai mari. În anul 1955, caracterizat printr-o intensă activitate a maselor de aer, s-au înregistrat 1 211 mm.

Solurile aluviale cu o vegetație spontană mezofilă și solurile hidromorfe gleice ocupă cea mai mare parte a depresiunii. Podișul piemontan și Depresiunea Rădăuți împreună au o populație rurală de peste 113 000 de locuitori. Mărimea medie a așezărilor rurale din întreaga subunitate (2 360 locuitori în Depresiunea Rădăuți și 2 080 locuitori în Podișul piemontan) este mult superioară față de celelalte subunități ale Podișului Sucevei. Așezările cu mai puțin de 600 locuitori se întîlnesc mai ales în jumătatea sudică, în dealul Poiana Ciungilor (Varvata, Lunca, Virfu Dealului, Bodnărei, Codru, Maidan, Runcu, Brașca, Corlata, Gura Soleii). Ele nu dețin decît 2,3% din populația rurală a unității. Frecvența cea mai mare o au așezările cu populație cuprinsă între 1 800 și 2 400 locuitori și cele cu 2 400–3 000 locuitori. Aceste categorii grupează circa 40% din populația sa rurală (fig 153).

Ceea ce dă nota caracteristică acestei regiuni este prezența așezărilor de talie mare și foarte mare. Apariția lor subliniază legătura strînsă dintre cele două unități naturale vecine care a oferit posibilități de practicare a unor activități economice complexe (creșterea animalelor, cultura plantelor, exploatarea și prelucrarea lemnului ș.a.). Populația a găsit aici cele mai bune condiții de așezare pe văile riurilor care vin




Fig. 153. Podișul piemontan și Depresiunea Rădăuți. Treptele de relief și așezările amenestii. 1; Podiș piemontan; 2, depresiuni; 3, Podișul Dragomirnei; 4, așezări agricole de creșterea animalelor și cultura plantelor; 5, agricole de cultura plantelor și creșterea animalelor; 6, agro-industriale.


din Obeințele Bucovinei (Sucevița, Horodnic, Volovăț, Iaslovăț, Solca, Botoșana, Racova, Soloneț, Suceava, Voitin, Pozen, Iliești, Stupca, Drăgoiasa) și pe afluenții acestora. Micile arii de depresiune au favorizat concentrarea populației și formarea așezărilor de talie mare, cu vetre extinse pe versanți. Așezările cu populație de peste 3 600 de locuitori grupează circa 38% din populația rurală. Cele mai mari dintre ele (Arbore, Cajvana, Vicovu de Jos, Marginea, Vicovu de Sus) au peste 5 000 de locuitori. Cel mai mare sat din tot Podișul Sucevei este Vicovu de Sus cu peste 9 000 de locuitori.

Un aspect care individualizează așezările rurale din piemont este cel al dispersiei

mari a gospodăriilor în vatră, fenomen care reflectă un tip de economie agricolă diferențiat față de celelalte subunități. Prezența terenului agricol în apropierea gospodăriilor a determinat dispersia și formarea unor vetre care ocupă, în anumite cazuri (așezările mari și foarte mari), suprafețe considerabile. Acest aspect ne îndreptățește să le considerăm ca tipuri de vetre de tranziție între cele din Obeințele Bucovinei și din restul Podișului Sucevei.

Există un număr de sate care formează un areal mai mare în partea centrală a piemontului, în lungul râului Solca — Poieni, Solca, Botoșana, Cajvana, Codru, Iaslovăț, Codru, Lunca — și un areal mai mic în

Fig. 154. Podișul piemontan și Depresiunea Rădăuți. Utilizarea terenurilor. 1, Păduri; 2, pășuni și fânețe; 3, livezi; 4, arabil; 5, cale ferată; 6, drum modernizat.



nordul Depresiunii Rădăuți—Hurjuieni, Coștișă—, a căror populație este în proporție de 80% ocupată în agricultură, dar cele mai multe așezări au populația agricolă în proporție de 60–80%. Între așezările rurale cu funcții complexe se remarcă Dornești, Satu Mare, Mărginea, Horodnicu de Sus, din apropierea orașului Rădăuți, Părhăuți, Soloneț, Comănești și Humurenii, aflate în aria de influență a orașului Suceava. Cel mai evoluat sat de aici este Dornești, din Depresiunea Rădăuți, așezare rurală cu o poziție favorabilă în culoarul Suceava—Siret. Situat la jumătatea distanței dintre Rădăuți și Siret, Dornești este nod feroviar și are deja o funcție industrială bine conturată

(topitorie de in și cîneapă, moară de mare capacitate).

În general, pentru toate așezările rurale funcția agricolă este dominantă, cu specializare în creșterea animalelor și cultura plantelor. Suprafețele agricole dețin sub 60% din suprafață, pădurea păstrîndu-se în masiv numai în porțiunile înalte. În utilizarea terenurilor domină folosințele: arabil-pășune și fînețe-livezi, cu excepția Masivului Poiana Ciungilor, unde predomină suprafețele de pășuni și de fînețe (fig. 154). Condițiile climatice cu precipitații abundente sînt favorabile dezvoltării pajistilor naturale și fac ca pe suprafețele arabile cultura cerealelor să apară ca secundară în favoarea culturii



Fig. 155. Podișul Sucevei în apropierea contactului cu munții, nu departe de Cacica (foto C. P. B.)

cartofului și a plantelor furajere. Depresiunea Rădăuți se distinge ca un bazin specializat în cultura cartofului industrial care este prelucrat la fabrica de spirt din Rădăuți. Întărirea bazei furajere a necesitat extinderea treptată în cultură a plantelor furajere care, alături de pajiștile naturale, asigură nutrețurile necesare creșterii animalelor.

Depresiunea Rădăuți, partea sudică a piemontului și valea Moldovei se remarcă prin cultura inului pentru fuioar, a cărei prelucrare se face în centrele Dornești și Cornu Luncii, iar Depresiunea Rădăuți reprezintă un bazin specializat în legumicultură, cu vechi tradiții în cultura castraveților pentru conservare.

Suprafețele întinse de pășuni și finețe, la care se adaugă cele din regiunea de munte alăturată, au oferit posibilități largi pentru creșterea bovinelor și ovinelor.

Densitatea bovinelor apare ca foarte mare în ariile de amplasare a marilor complexe de creștere industrială (Dornești, Rădăuți,

Gălănești), iar creșterea oilor este mai dezvoltată în jumătatea sudică și vestică, în Masivul Ciungi (Pîrteștii de Jos, Cajvana) și în extremitatea nordică (Gălănești, Bilca) (fig. 155). Rasa predominantă este țurcană, asupra căreia se fac încercări de ameliorare cu țurcana albă din regiunea Sibiului. Depresiunea Rădăuți are și vechi tradiții în creșterea cailor. La sfîrșitul secolului XVIII exista aici o vestită herghelie, iar în prezent herghelia de la Rădăuți este specializată în creșterea rasei Ghidran. Întreg ținutul de la poalele Obcinelor Bucovinei se detașază ca arie excedentară în producția de carne, lapte, cartofi și în pentru fuioar și prin potențialul său turistic.

Regiunea se caracterizează printr-un peisaj deosebit de pitoresc, născut dintr-o armonie perfectă între condițiile naturale și aspectul gospodăriilor. Între obiectivele de interes turistic sînt de menționat Muzeul tehnicilor populare din Rădăuți (cel mai vechi muzeu etnografic din Moldova), Com-

plexul muzeal Ciprian Porumbescu, Muzeul din Solca, Muzeul sătesc din Arbore și Muzeul arheologic din Botoșana.

De un interes istoric deosebit sînt biserica episcopală Sf. Nicolae (Bogdana) din Rădăuți, cea mai veche biserică din piatră din Moldova, biserica din Arbore, construită în secolul XVI, impresionantă prin pictura interioară și mai ales exterioară, biserica din Volovăț, ctitorie din piatră a lui Ștefan cel Mare, biserica din Horodnicu de Jos sau cea din Ilișești. La Volovăț se cunosc vestigii ale culturii geto-dacice și aici a fost ridicată la 1346 biserica de lemn a lui Dragoș, mutată în 1468 la Putna de către Ștefan cel Mare.

Podișul piemontan și Depresiunea Rădăuți fac parte dintr-o arie etnografică dintre cele mai interesante din țară. Unele așezări sînt bune păstrătoare ale portului național (Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca, Vicovu de Sus și Vicovu de Jos); altele se remarcă prin continuarea unor meșteșuguri vechi: Arbore în confecționarea covoarelor, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Horodnic și Rădăuți, în confecționarea sumanelor, Marginea, cel mai renumit centru din țară în producerea olăriei negre. Alături de toate acestea sînt de amintit izvoarele cu apă clorurată sodică, foarte concentrată, vechea salină cu lac subteran și biserica tăiată în sare de la Cacica. Orașul Rădăuți are o capacitate de cazare mică (puțin peste 100 locuri), completată de locurile de cazare din orașul Solca (60 de locuri) și în hanul turistic de la Ilișești.

Particularitățile geomorfologice au făcut ca cele mai multe artere rutiere să se dezvolte în lungul rețelei hidrografice, pe direcția vest—est. Cu toate dificultățile terenului, au apărut și rețele rutiere pe direcția nord—sud. De altfel, aici a fost construită una din primele șosele modernizate din cuprinsul Podișului Sucevei (la sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX), așa-numita „șosea de sub munte”, care lega localitățile din nord (prin Vicovu de Sus, Marginea, Solca, Cacica) cu Gura Humorului. Gradul de modernizare actual al rețelei rutiere din această subunitate este superior mediei Podișului Sucevei, deoarece obiectivele turistice de aici și din Obcinele Bucovinei au impus amenajări prioritare. Cele trei ramificații feroviare au fost construite în etape diferite: ramificația Dărmănești—spre Vatra Dornei prin sectorul de mare dificultate Strigoia—Cacica a fost

construită în anul 1869 iar cea nordică, Dornești—Rădăuți spre Brodina în 1887. Mult mai tîrziu, în anii 1961—1966, a fost construită cea de-a treia ramificație care străbate podișul piemontan prin sud pentru a se evita traseul greu din sectorul Cacica—Virfu Dealului, pe un traseu care unește localitățile Suceava—Stroiești—Lucăcești—Păltinoasa. În această regiune sînt două centre de convergență urbană—Rădăuți și Solca—, care, prin particularitățile lor, reflectă întru totul condițiile geografice ale unităților în care se află.

Solca, cu 2 522 de locuitori în 1977 și 4 772 în 1992, este cel mai mic oraș din cuprinsul podișului piemontan situat la contactul cu Obcinele. Evoluția sa urbană este recentă (după 1960) și s-a datorat construirii unei fabrici de bere și funcției balneoclimaterice, dar funcția sa dominantă este cea agricolă, fapt relevat și de proporția mare a populației din agricultură (48% în 1977), cu specializare în creșterea animalelor.

Funcția industrială este dată de mici unități de prelucrare a unor resurse locale: fabrica de bere (circa 64% din producția globală industrială) și unități de industrie textilă.

Rădăuți este așezat în centrul depresiunii căreia i-a dat numele. Încă de la mijlocul secolului XIV era cunoscut ca așezare cu funcție politico-administrativă. Cu toate acestea, procesul de evoluție urbană a fost lent, în evul mediu depășind starea de așezare rurală cu funcție de tîrg în care se făceau schimburile dintre munte și podiș. Evoluția sa lentă se mai explică prin poziția periferică față de marile drumuri comerciale. În perioada feudală nu a fost un vad comercial important de talia Sucevei și Siretului, ceea ce s-a reflectat defavorabil.

La sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, în condiții politice noi, marchează o evoluție economică și demografică deosebită. Dezvoltarea industriei și comerțului s-a datorat imigrării aici de populații străine. Autoritățile austriece de ocupație au început să dezvolte unități industriale de mică capacitate, în intenția de a valorifica materiile prime din regiune. Rădăuții au devenit un important centru de creștere și ameliorare a raselor de cai, odată cu mutarea (1812) aici a hergheliei, pentru ameliorarea calului lipișan din Obcinele Bucovinei.

În prezent, funcția industrială este bine conturată și dominantă. În ultimii ani se constată schimbări în specializarea funcției industriale. În anul 1965 exploatarea și prelucrarea lemnului deținea peste 46%, fiind urmată de industria alimentară, cu peste 38% și construcțiile de mașini. Noile investiții au permis schimbări între ramuri, participarea lor la producția globală devenind mai echilibrată: construcțiile de mașini (38,4%), industria textilă și a pielăriei (21,7%), industria de exploatare și prelucrare a lemnului (20,4%) și industria alimentară (14,7%). Dezvoltarea funcției industriale nu a dus, însă, la o creștere foarte rapidă a populației, orașul menținându-se într-o creștere lentă a populației: în 1912—16 535, în 1930—16 788, în 1956—15 949, în 1966—18 580, în 1977—21 869 și în 1992—30 948 de locuitori. Orașul păstrează și în prezent o funcție importantă administrativă, culturală, sanitară, comercială, prin care răspunde populației din Depresiunea Rădăuți și în bună măsură pentru cea din Obcinele Bucovinei. Este un centru spre care converg materiile prime agricole, masa lemnoasă, forța de muncă din aceste două unități.

6.2.1.5. Podișul Dragomirnei

Podișul Dragomirnei reprezintă interfluviul vast care domină cu 200—250 m văile Sucevei și Siretului. Limita de nord-vest este marcată de valea riului Târnauca, afluent al Sucevei. A fost considerat ca „cea mai tipică parte a Podișului Sucevei prin toate caracterele geomorfologice proprii Podișului Moldovenesc: un monoclin cu forme structurale (cueste și platforme)” (N. Popp și colab., 1973, p. 38). Culoarele largi ale Sucevei și Siretului îi conferă un aspect insular față de celelalte unități din podiș.

Este alcătuit dintr-o alternanță de argile, argile-nisipoase, nisipuri, depozite luto-argiloase provenite din alterarea argilelor. Uniformitatea litologică este întreruptă de apariția unor nivele de gresii-calcaroase care se impun în relief. Altitudinea diferitelor puncte unde apar orizonturile calcaro-grezoase arată că sedimentele au o poziție monoclinală cu o înclinare de 4—5 m/km spre sud și sud-est. Prezența și extensiunea acestor orizonturi au frinat ritmul eroziunii și justifică altitudinile relativ ridicate și marea dezvoltare a reliefului structural.

Rocile calcaroase și grezoase fisurate și mai ales intercalațiile nisipoase oferă condiții foarte bune pentru înmagazinarea de apă subterane bogate, mai ales că se află pe paturi argiloase impermeabile. Datorită lor pe versanți apar alinamente continui de izvoare (ca cele aflate la altitudinile de 340—355 și 480—490 m), care generează procese de versant cu caracter distructiv. Înălțimea medie a podișului este de circa 480 m, dar se pun în evidență două direcții principale de dispunere a înălțimilor: de la nord-vest spre sud-est, concordant cu platourile structurale centrale și terasele superioare de la confluența Siret—Suceava (506 m în Dealul Țăranca, 527 m în Poiana Trei Meri, 456 m în Dealul Căprăriei) și dinspre centru spre exteriorul podișului și zona teraselor (469 m în Dealul Pătrăuți, 305 m la nord-vest de Ițcani).

Relieful structural este bine reprezentat prin platouri structurale și cueste separate de văi subsecvente (cele tributare Siretului), obsecvente, reconsevente (afluenții Sucevei). La sud de linia localităților Grămești—Bălcăuți și de valea Horaițului se desfășoară podișul structural al Dragomirnei, bine împădurit la altitudinea de peste 500 m. Supus fragmentării dinspre Siret și dinspre Suceava, platoul inițial a fost secționat și redus ca suprafață (circa 22 km²), cele mai reprezentative suprafețe fiind cele de la Calafindești—Poiana Trei Meri—Dealul Vărrăia—Pădurea Dragomirna, Călinești, Adincata—Mitoc—Burdujeni (circa 11 km²). La nord de limita amintită se dezvoltă un relief cu aspect de cimpie înaltă, larg ondulată, cu versanți domoli și văi îmbătrânite, așa-numitul Podiș (sau Șaua) Bălcăuți, aflat la altitudinea de 380—400 m, aproximativ la nivelul teraselor de 30—40 m a Sucevei și de 100 m a Siretului (valea Siretului este situată cu 60 m mai jos decât cea a Sucevei—I. Sircu, 1965).

În sectorul nord-estic, piriul Mănăstioara, tributar Siretului, a creat o mică depresiune de eroziune, cu caracter subsecvent, în care s-a dezvoltat orașul Siret, unul dintre cele mai vechi orașe din Moldova. Flancurile dinspre Siret și Suceava sunt tivite de 7—8 nivele de terasă. Spre confluența celor două riuri se dezvoltă un grui aluvionar prelung, constituit din terase de confluență și acumulări coluviale (începând din Dealul Căprăriei întreg interfluviul este constituit din terase).

Aproximativ 20% din suprafața podișului este afectată de procese de versant cu intensitate mare. Studii experimentale efectuate în două mici bazine hidrografice — Zavalina și Valea Bradului (situate în Șaua Bălcăuți și respectiv în podișul structural al Dragomirnei) — indică valori ale eroziunii areolare de 9,75 t/ha.an și, respectiv, 27,43 t/ha.an, iar pentru eroziunea torențială, calculată la o ploaie maximă în 24 de ore cu asigurare de 10%, cantitatea de material îndepărtat reprezintă 0,45 t/ha, în bazinul Zavalina și 41 t/ha în bazinul Mereni. extins în terasele Sucevei. Alunecările, în general mixte, sînt foarte dezvoltate în sectorul Țibeni, Dărmănești, Pătrăuți, Zamostea, Mănăstioara.

Cele mai favorabile condiții de locuire le-au oferit ariile joase, respectiv terasele Siretului, ale Sucevei, văile afluenților Siretului și Sucevei, Șaua Bălcăuți în partea sa nordică. Cele 82 de așezări rurale (grupînd peste 90 000 de locuitori) au mărimi, fizionomii și funcții evident diferențiate. Ruralismul acestei subunități este accentuat, singurul oraș, Siret, fiind din categoria celor mici. În general este de remarcat numărul mare de așezări rurale cu populație sub 600 de locuitori (32 de sate), care cuprind numai circa 11% din populație. Dispersia populației în localități rurale de talie mică apare ca fenomen caracteristic în Șaua Bălcăuți (Baineț, Băncești, Mușenița, Vieșani, Gropeni, Iaz, Botoșănița Mare, Botoșănița Mică, Verbia, Badragi), pe versantul estic al podișului (Lunca, Ciomirtan, Stîncuța, Corpaci, Tăutești, Grigorești), pe flancul vestic, spre valea Sucevei (Gara, Slobozia Sucevei, Sirghiești) și în partea de sud către confluența Sucevei cu Siretul (Mereni, Luncușoara, Cotu Dobei, Slobozia, Vercicani). Așezările cu populație între 600 și 1 200 de locuitori au, de asemenea, o frecvență mare (22 de așezări rurale), întărind imaginea de dispersie mare a populației. Între așezările de talie mare, localizate mai ales în partea sudică a podișului, sînt de menționat Adîncata, Siminicea, Hănțești, Pătrăuți, Dumbrăveni, acest ultim sat este cel mai mare, avînd o populație de peste 6 000 de locuitori.

Dispersia mare pe sate a populației este însoțită și de o dispersie accentuată a gospodăriilor în vatră. Mai mult de o treime din sate au vetre mai puțin închegate. Răspîndirea gospodăriilor în teritoriu (impusă în cele mai multe cazuri de fragmentarea

accentuată a reliefului, de dezvoltarea vetrelor în zonele inundabile) apare ca fenomen tipic pentru satele situate la baza versanților care fac trecerea de la podișul înalt spre șesurile aluviale ale Siretului și Sucevei și cele de pe gruiul aluvionar constituit din terasele de confluență ale celor două riuri (Ciomirtan, Zamostea, Răuțeni, Tăutești, Cojocăreni, Nicani, Stîncă, Stîncuța, Poiana, Berești, Arțari, Călugăreni, Cotu Dobei, Slobozia, Vercicani, Roșcani s.a.).

O mare parte dintre așezările din partea centrală a Podișului Dragomirnei (Rudești, Bălinești, Verbia, Botoșănița Mică, Botoșănița Mare, Calafindești, Corpaci, Răuțeni, Tăutești, Stîncă, Stîncuța) sînt de talie mică și cu un grad de izolare ridicat. De aceea aceste sate au rămas ca așezări cu funcții puțin evolute (la care populația activă în agricultură ajunge la 60—80%). În partea sudică a unității, aflată în aria de influență a orașului Suceava, numeroase sate au înregistrat scăderi importante a populației active în agricultură (pînă la 40—60%), apărînd ca așezări cu funcții complexe (fig. 156).

O evoluție spre complexitate s-a constatat în cazul așezărilor rurale Slobozia Sucevei, Sirghiești, Dănila, Mărița Mică, Dărmănești, Mărița, Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei, Mitocași, Adîncata, Fetești, Salcea, Văratec, Hancea ș. a. În categoria așezărilor rurale cu funcții complexe se înscriu și unele așezări rurale din partea nordică (Negostina, Vieșani) și estică (Țibeni), aflate în ariile de influență imediată a orașelor Rădăuți și Siret. Sub influența orașului Suceava cîteva așezări aflate în aria imediată a acestuia au trecut în categoria celor cu funcții complexe evolute, a căror populație activă în agricultură a scăzut pînă la 20—40% —Mereni, Plopeni, Verești. Localitatea Verești beneficiază de o poziție geografică foarte favorabilă, fiind situată într-un punct de convergență a căilor de comunicație (nod de cale ferată) și care poate contura o arie de influență economică cu posibilități de extindere mai ales spre nord și sud. Poate deveni un centru de polarizare important pentru sudul Podișului Dragomirnei ca și pentru partea nord-estică a Podișului Fălticeniilor. Vereștii au deja o funcție industrială bine conturată (fabrică de nutrețuri concentrate, topitorie de în, fabrică de conserve) și dotări de tip urban. Alături de Verești, și alte așezări rurale din cuprinsul




Fig. 156. Podișul Dragomirnei. Așezările omenești și funcțiile economice. 1, Mărimea așezărilor; 2, așezări agricole; 3, agroindustriale; 4, agricole și de cazare; 5, căi ferate; 6, drumuri modernizate.

acestei subunități au perspectivă de dezvoltare ca centre agroindustriale (Dumbrăveni, Zamoștea).

Poziția insulară a Podișului Dragomirnei între culoarele largi ale Sucevei și Siretului contribuie la apariția unor nuanțe climatice deosebite față de celelalte subunități din Podișul Sucevei, cu consecințe evidente asupra peisajului și modului de utilizare a

terenurilor. Izoterma anuală de 8°C trece prin sudul podișului, dar pe platourile structurale înalte se înregistrează $7,2-7,5^{\circ}\text{C}$.

Iarna, în partea înaltă a podișului se înregistrează temperaturi mai moderate decât în ariile joase, unde au loc frecvente inversiuni termice. Media anuală a precipitațiilor ajunge în jur de 600 mm. De remarcant cantitățile mari de precipitații căzute în




Fig. 157. Podișul Dragomirnei. Utilizarea terenurilor. 1, Păduri; 2, pășuni și fînețe; 3, livezi; 4, arabil; 5, căi ferate; 6, drumuri modernizate.

decurs de 24 ore care depășese cu mult media lunii în care s-au produs (Hăntești, 142,7 mm la 12.07.1929; Dumbrăveni, 101,2 mm la 27.04.1950).

Umanizarea treptată a teritoriului a dus la lărgirea suprafețelor agricole în detrimentul pădurii. În prezent, terenurile agricole dețin suprafețe mari mai ales în partea nordică a podișului, în Șaua Bălcăuți și

în lungul flancurilor sudice, estice și vestice, pe terasele Siretului și Sucevei. Terenurile agricole se restrîng treptat pe măsură ce înaintează spre partea centrală mai înaltă, mai fragmentată și mai împădurită, iar în cadrul acestora în aceeași măsură scade proporția terenurilor arabile în favoarea pășunilor și fînețelor (fig. 157). Livezile sînt extinse îndeosebi în partea sudică a

podîşului. Cele mai întinse suprafețe arabile sînt destinate culturii cerealelor (deocamdată cu randamente scăzute datorită condițiilor pedoclimatice) apoi culturii cartofului și plantelor tehnice. Cultura cartofului este caracteristică acestei regiuni unde întîlnește condiții favorabile. În partea estică, între Hănțești și Zamostea, se individualizează un bazin specializat în cultura cartofului industrial (soiuri cu un bogat conținut în amidon) care aprovizionează fabrica de amidon de la Hănțești. Inul pentru fuior ocupă suprafețe mai însemnate în părțile vestice și sudice care se constituie în arii de aprovizionare a centrelor de industrializare de la Dornești și Verești. Sfecla de zahăr s-a extins mai ales în estul și sudul Podîşului Dragomirnei, constituind partea de vest și de sud-vest a bazinului de aprovizionare a fabricii de la Bucecea.

Creșterea animalelor — cu predominarea bovinelor — este dezvoltată în unele areale din sudul și nordul regiunii (Verești, Calafindești, Adîncata), acolo unde au apărut complexe de tip industrial.

Vegetația de pădure de foioase ocupă circa 25% din suprafață și acoperă în special platourile structurale și terasele înalte. În urma defrișărilor intense în părțile joase pădurea a rămas numai sub formă de pîlcuiri. În părțile înalte predomină *Fagus sylvatica* singur sau în asociere cu *Carpinus betulus*, *Acer platanoides*, *Quercus robur*, *Q. petraea*, *Tilia tomentosa* etc, iar mai jos (sub 400 m) apar gorunetele la care participă arborete formate din *Quercus petraea*, *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Tilia cordata* ș.a. În regiunea Bălcăuților apare o vegetație de stejărete și insular gorunete.

În Podîşul Dragomirnei există cîteva rezervații interesante: rezervația de fag din nordul așezării Dragomirna, rezervația forestieră de la Crujana, la nord de Pătrăuți (formată din arboret în care predomină stejarul), rezervația floristică de la Zamostea formată din stejar, frasin, tei, cireș sălbatic, carpen și cu unele elemente declarate monumente ale naturii (laleaua peștriță), rezervația de la Salcea din lunca Sucevei, cu nuferi albi și galbeni. În afara rezervațiilor naturale și a numeroaselor locuri cu peisaje atrăgătoare, activitatea turistică se desfășoară și pe seama altor obiective. Mănăstirea Dragomirna, cu construcție impozantă de cetate, datează din secolul XVII, ctitorie a mitropolitului cărturar Anastasie Crimca;

are amenajat un muzeu cu colecții de broderii, argintărie, manuscrise cu miniaturi și tipărituri vechi.

Biserica din Bălinești (în estul podîşului), construită în secolul XV, este considerată ca unul dintre cele mai interesante monumente ale arhitecturii moldovenesti, cu ziduri exterioare care prezintă decorațiuni tipice pentru perioada lui Ștefan cel Mare. Biserica din Pătrăuți, zidită de Ștefan cel Mare la 1487, cu picturi interioare, iar biserica din Adîncata este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Moldova.

Relieful și-a pus amprenta puternică asupra repartiției căilor de comunicație. În general, traseele rutiere s-au dezvoltat pe direcția nord—sud, în lungul rețelelor hidrografice. Astfel, Masivul Dragomirnei este traversat pe flancuri și prin părțile mai joase de cîteva șosele importante. Cea mai importantă este șoseaua internațională de pe flancul său vestic care prin orașul Siret trece spre nord în Ucraina. O altă șosea modernizată străbate partea sudică a podîşului și leagă orașul Suceava de orașul Dorohoi, iar extremitatea sudică este tăiată de altă șosea modernizată care face legătura între Suceava și Botoșani. Un alt traseu rutier modernizat pe direcția nord—sud este cel care permite relații mai directe între orașul Suceava și Siret. Se resimte absența unui traseu rutier modernizat pe flancul estic al podîşului ca și absența unor trasee rutiere modernizate pe direcția vest—est, care ar permite legături între așezările rurale de pe cele două flancuri. Partea vestică a Podîşului Dragomirnei este străbătută de calea ferată Suceava—Vieșani, care reprezintă și primul sector construit (1866) din magistrala care străbate Podîşul Sucevei.

Orașul Siret, avînd o poziție avantajoasă pe drumul vechi comercial de pe Siret, s-a individualizat timpuriu, între celelalte așezări rurale, prin funcția sa comercială și ca reședință domnească (în a doua jumătate a secolului XIV). Pierderea funcției politice, prin mutarea capitalei la Suceavă, și micșorarea activităților economice au dus și la decăderea tîrgului. A rămas o așezare cu funcții comerciale și meșteșugărești limitate, dar îndeplinește rolul de punct vamal important pe șoseaua care leagă țara noastră cu Ucraina și Polonia. În prezent funcția sa industrială este în evidentă creștere prin amplasarea unor noi


unități de industrie textilă (peste 74% din producția globală industrială), construcții de mașini, alimentară și de prelucrare a lemnului. Evoluția numerică a populației concordă cu nivelul dezvoltării sale: în 1912 avea 11 143 de locuitori, în 1920, 9 905 de locuitori, în 1956 scăzuse la 6 993, în 1966 a ajuns la 8 018, iar în 1977 la 8 264 de locuitori (inclusiv satele Mănăstioara și Pădureni). În 1992 avea 10 044 de locuitori. Evoluția sa funcțională este ilustrată de schimbările care au avut loc în structura populației active între ultimele recensăminte. În 1966 în servicii erau peste 49% din activi, în agricultură peste 38%, iar

orizonturi de gresii calcareoase și calcare oolitice aparținând volhinianului (la nord de aliniamentul Baia—Ciumulești—Tolești—Tătăruși) și basarabianului (la sud).

Structura și constituția petrografică sînt determinante pentru apariția unor fronturi de cueste și abrupturi, atacate intens de eroziune, ca și a unor suprafețe structurale întinse (fig. 158).

Formațiunile miocene sînt mascate, adesea, de luturi loessoide subțiri și discontinui și de depozite fluviatile de vîrstă cuaternară. În depozitele volhinieni din zona Șoldănești apar între 5 și 12 intercalații lenticulare de lignit dar foarte subțiri (pînă la 0,5 m).

Fig. 158. Profil transversal pe valea Moldovei și Podișul Fălticenilor. 1, Formațiuni miocene cutate; 2, formațiuni volhinieni monoclinale; 3, depozite de terasă; 4, falia pericarpatică (F. P.).



cei din construcții și industrie reprezentau circa 7%. În 1977 în servicii erau 51% din activi, ponderea celor din industrie și construcții a crescut la 30%.

6.2.1.6. Podișul Fălticenilor

Reprezintă vastul interfluviu dintre culmile Sucevei, Siretului și Moldovei, care, spre sud, se îngustează și se termină prin gruiul prelung format de terasele comune ale Moldovei și Siretului. Limita spre Depresiunea Litenilor și podișul piemontan urmărește valea Ilieștilor și aliniamentul localităților Vilcele, Trei Mivile, Moara, Bunești, Lămașeni, Cornu Luncii. Trăsăturile peisajului natural sînt asemănătoare cu cele din Podișul Dragomirnei. Dacă spre nord și est domină văile Sucevei și Siretului cu 200–250 m, față de valea Moldovei, puternic colmatată, se înalță numai cu 40–50 m.

În cea mai mare parte, este alcătuit din argile, argile nisipoase și nisipuri dispuse monoclinale nord-vest — sud-est, în care apar

Apariția complexului de cărbuni este interpretată ca un episod local în stiva depozitelor volhinieni, geneza lui datorindu-se unei oscilații de nivel a mării sarmatice, în urma căreia pe uscatul recent apărut au luat naștere mici suprafețe lacustre cu apă dulce ce au evoluat spre turbării.

Înălțimea maximă din Podișul Fălticenilor de 528 m se înregistrează în Dealul Teișoara de la vest de Suceava, iar cele mai coborîte cote, de 170–180 m, se întîlnesc în aria de vărsare a Moldovei în Siret.

Văile principale din Podișul Șomuzurilor (O. Martiniuc, 1956) au cursul superior orientat conform structurii monoclinale și profilul transversal relativ simetric. Evoluția avansată tinde să le transforme în depresiuni-culoare. În cursul mijlociu și cel inferior, văile Șomuzului Mare (între Fălticeni și Dolhasca) și Șomuzului Mic (între Hrețești și Rotunda) cu direcția vest—est prezintă un profil transversal asimetric, cu versantul sudic reprezentat de o cuestă pronunțată supusă unei modelări accentuate. Versantul nordic, conform cu structura, este relativ domol și afectat ușor de eroziune areolară și torențială. Platourile structurale sînt bine

reprezentate la est și nord-est de Fălticeni pînă spre Suceava (Dealul Liniei, Pleșa Dolheștilor, Dealul Bosanci, Dealul Ciritei). Spre sud, unde podișul se îngustează mult, platourile structurale se restrîng, apărînd izolat în aria localităților Tătărăuși, Homița, Moțca, Brătești. Sectorul în care a fost identificată cea mai veche confluență Moldova — Siret este în partea centrală a interfluvului la nord-est de satul Ciohorăni (395 m). Ca urmare a formării unor terase comune a avut loc o retragere treptată a punctului de confluență, astăzi ea găsindu-se la peste 30 km la sud de Roman (V. Băcăuanu, C. Martiniuc, 1970).

Fragmentarea mare a reliefului a făcut ca traseele rutiere să fie în majoritate în pantă, ceea ce creează dificultăți procesului de modernizare. Rețeaua de drumuri este mai deasă decît pe ansamblul Podișului Sucevei (42 km/100 km²) dar traseele modernizate sînt încă în proporție scăzută. Magistrala feroviară care străbate Podișul Sucevei prin partea sa centrală a fost construită, pe sectoare, la sfîrșitul secolului XIX. Ramificația care merge în lungul Șomuzului Mare a fost construită în anul 1886, iar sectorul nordic, Suceava—Stroiești—Lucăcești spre Păltinoasa, a fost construit în perioada 1961—1964. Ramificația desprinsă din magistrala Roman—Pașcani—Suceava, electrificată și în curs de dublare, are o lungime de 25 km.

Ansamblul condițiilor climatice sînt asemănătoare cu cele din Podișul Dragomirnei, dar se remarcă o creștere normală a temperaturilor medii anuale, precum și a cantităților de precipitații. Partea central-vestică are temperaturi medii anuale de 7,5—8°C (media plurianuală la Fălticeni este de 7,9°C), în timp ce în sud ele depășesc 8°C. Precipitațiile descresc din vest spre est. În valea Moldovei, la Horodniceni, se înregistrează anual 650 mm, la Fălticeni 635 mm, iar la Dolhasca numai 552 mm. În aria Rădășenilor (vest de Fălticeni), condițiile de relief locale creează un topoclimat de adăpost extrem de favorabil culturilor pomicele.

Cele mai răspîndite ape subterane sînt de stratificație și apar în partea centrală a podișului sub forma a două nivele etajate la 305 și 345 m. Deschiderile stratelor acvifere pe versanți a generat alunecări de teren pe mari suprafețe (est Dealul Cornești, vest Dealul Tarna Mare, nord-est

Dealul Spătărești). În orizontul de la altitudinea de 345 m se află izvoarele rîurilor principale ce drenează podișul, rîuri care, în lipsa unei alimentări superficiale îndelungate, au o scurgere intermitentă. Valea Șomuzului Mare a permis crearea unor lacuri antropice cu un volum de peste 1 200 000 m³.

În partea de nord-vest a Podișului Fălticenilor, pînă la marginea Podișului Piemontan, se dezvoltă o mică subunitate sculpturală suprapusă bazinului superior al Șomuzului Mare, *Depresiunea Litenilor*, separată spre sud-vest printr-un prag foarte jos de 10—15 m de Cîmpia piemontană de la Baia (C. Martiniuc, 1946). Relieful reprezentat prin dealuri și coline joase (sub 350 m) se înscrie pe depozite volhiniene moi. Văile au aspect îmbătrînit: sînt largi, cu adîncimi mici și adesea cu șesul mlăștinos și soluri freatic hidromorfe. Șomuzul Mare se găsește în medie cu 130 m mai jos decît albia Moldovei din sectorul depresionar Baia și amenință să capteze rîul Moldova. Valea Brădetului, afluent pe dreapta Șomuzului, a străpuns cumpăna de apă dintre cele două bazine, înaintînd regresiv pînă la nivelul terasei inferioare a Moldovei din sectorul Brăești.

Dacă în partea înaltă a podișului vegetația naturală, puternic modificată de om, ocupă numai suprafețe reduse, reprezentate prin păduri de fag (și în amestec) în sectorul Ilișești, Dolhești și Tătărăuși—Moțca, în Depresiunea Litenilor este de semnalat apariția insulară a vegetației de silvostepă cu specii xero-mezofite și xerofite.

În lungul marginii sudice a Podișului Fălticenilor, la contactul cu dealurile subcarpatice ale Neamțului, valea Moldovei se individualizează ca un culoar larg, plin de așezări, de o importanță cu totul aparte pentru legăturile dintre ținutul Carpaților Bucovinei și Maramureșului și culoarul de intensă circulație al Siretului. De fapt, în literatura geografică se vorbește mai mult de Culoarul Moldova—Siret decît de Culoarul Siretului.

Avale de Păltinoasa, valea Moldovei se prezintă ca o adevărată depresiune mult alungită și orientată nord-vest — sud-est, cu lățimi de pînă la 6 km la nivelul luncii și de 10—15 km în partea superioară a versanților. Șesul aluvial al Moldovei a ajuns la lățimea maximă în „cîmpia piemontană de la Baia” (C. Martiniuc, 1956).

Albia Moldovei are o pantă de scurgere redusă (de la 460 m la Păltinoasa, la 285 m la Timișești, 185 m la Roman) și prezintă un grad mare de despletire, căpătând un aspect fascicular-deltaic.

În timp ce versantul drept al văii este secționat de numeroși afluenți care separă forme deluroase semețe, flancul stâng se prezintă mai unitar. Afluenții de pe dreapta (Suha Mare, Suha Mică, Valea Seacă, Ozana etc.) și-au creat conuri de dejecție largi, cu textură grosieră, care au înălțat lunca riului. Conurile afluenților de pe stînga sînt de dimensiuni mai mici și cu o granulometrie chiar mai fină decît a luncii peste care se suprapun.

În lunca Moldovei au fost puse în evidență terase cu altitudini relative de 0–2 m, 2–3 m și 4–6 m. Terasa de 2–3 m apare sub formă de areale discontinue pe suprafața cărora se observă sectoare de albiu vechi. Este folosită preponderent pentru culturi agricole și pășuni, fiind inundată numai la viiturile cele mai mari. Mult mai întinsă apare terasa de 4–6 m care, local, este suprainălțată de grinduri longitudinale care obligă afluenții laterali să curgă paralel cu apa Moldovei pe distanțe mari (pe circa 20 km vechiul curs al riului Rîșca). Terasale de 5–10 și 10–20 m fac trecerea spre terasele de versant (30–35 m, 50–60 m, 80–90 m, 100–110 m, 120–130 m, 150–160 m, 180 m), a căror distribuție alternează cînd pe o parte, cînd pe cealaltă a văii.

Lunca dispune de strate acvifere subterane bogate, folosite în alimentarea a numeroase localități. În sectorul Timișești drenurile de captare ocupă circa 5 km lungime, preluînd peste 1 000 l/sec. Această sursă a fost folosită încă de la începutul secolului pentru alimentarea orașului Iași.

Vegetația spontană a luncii Moldovei este reprezentată prin pajiști mezofite sau mezoxerofite în sectoarele cu drenaj bun și petice de vegetație higrofilă în zonele cu exces de umiditate. În trecut suprafața luncii era ocupată și de pîlcuri de pădure (zăvoaie), cu rol pozitiv în moderarea proceselor fluviale (actual mici areale de pădure se mențin doar în apropierea localităților Cornu Luncii și Baia), dar în prezent a fost transformată în terenuri agricole cu productivitate ridicată.

Oferind condiții prielnice de locuire, de-a lungul culoarului Moldovei au apărut peste 60 de sate (ceea ce înseamnă o densitate

mai-mare decît în alte părți ale Podișului Sucevei) și nu dintre cele mici, pentru că aproape o treime sînt sate cu peste 1 000 de locuitori, unele dintre ele avînd peste 3 000 de locuitori (Mălini, Bogdănești, Baia, Răucești, Urecheni).

Privind în ansamblu Podișul Fălticenilor se observă că suprafețele arabile precum-pănesc în părțile joase, iar spre cele mai înalte își fac loc tot mai mult pășunile și fînețele naturale și livezile. Livezile ocupă suprafețe însemnate în partea centrală a unității unde, datorită particularităților condițiilor naturale, s-a dezvoltat un important bazin pomicol, specializat în cultura mărului (peste 3 000 ha). Bazinul pomicol din valea Șomuzului este în prezent în extindere spre sud și est, asigurînd în acest mod o utilizare superioară a versanților afectați de eroziune (fig. 159). Suprafețe însemnate din arabil sînt ocupate de cereale, cu predominarea porumbului și grîului. În văile Moldovei, Sucevei și Siretului suprafețe însemnate sînt ocupate de culturi tehnice — în pentru fuior, cîneapă și sfecă de zahăr — care sînt prelucrate în unitățile industriale din regiune (Cornu Luncii și Pașcani). Creșterea animalelor are o intensitate mai mică decît pe ansamblul Podișului Sucevei, cu excepția creșterii oilor.

Podișul Fălticenilor împreună cu Culoarul Moldovei reprezintă partea cea mai bine populată a Podișului Sucevei. În prezent, populația este grupată în trei centre urbane, Suceava, Fălticeni și Pașcani și în 165 de sate. Populația totală este de peste 300 000 de locuitori, din care 195 000 reprezintă populația rurală. Aproximativ 10% din populația rurală se găsește în așezări de sub 500 de locuitori. Așezările rurale de talie mică sînt în general cele provenite prin roire din ariile joase spre locurile înalte, definind areale distincte în Depresiunea Liteni (Frumoasa, Vornicenii Mici, Vornicenii Mari, Podeni, Șes, Trei Movile), pe interfluviul dintre Suceava și Șomuzul Mic (Reusenii, Mănăstioara, Merești, Racova, Vulturești, Osoi) și pe interfluviul dintre Șomuzul Mare și Moldova (Cămîrzani, Ciumulești, Roșiori, Ioneasa, Ruși, Moldovenii, Nigotești, Uidești). Numai cîteva (Brusturi, Ortoși, Țibucani) se află în Culoarul Moldovei. Așezările cu 500–1 000 de locuitori grupează 22%, iar cele cu 1 000–1 500 de locuitori dețin 18% din populația rurală. Aceste trei categorii de mărime grupează aproape 80% din numă-





Fig. 159. Podișul Fălticeniilor și Culoarul Moldovei. Utilizarea terenurilor. 1, Arabil; 2, livezi; 3, pășuni și fânețe; 4, păduri; 5, vetre de așezări; 6, căi ferate; 7, drumuri modernizate.

rul așezărilor și peste 50% din populația rurală. Așezările cu 1 500—2 000 locuitori sînt în număr de 12 și grupează 16% din populația rurală, iar cele cu 2 000—2 500 locuitori, în număr de 8, concentrează 13% din populația rurală. Așezările rurale mari se datoresc vechimii populării, condițiilor naturale mai favorabile și funcțiilor economice și sociale determinate de poziția în rețea. Așezările cu populația cuprinsă între 2 500 și 3 500 de locuitori (Moțca, Dolhasca, în partea sudică, Ipotesti și Sf. Ilie în partea nordică, în apropierea centrului urban Suceava) dețin aproximativ 8% din populația rurală. La acestea se adaugă patru așezări cu peste 3 500 locuitori: Cristești în partea de sud a podișului, Baia, Liteni și Bosanci, aceasta din urmă fiind cea mai mare așezare rurală cu aproape 6 000 de locuitori (fig. 160).

La sfîrșitul secolului XVIII vetrele așezărilor se caracterizau prin dimensiuni mici cu gospodării dispersate. Treptat punctele locuite s-au înmulțit și s-au mărit, iar condițiile naturale proprii podișului, cu văi largi, favorabile extinderii teritoriale, au făcut ca forma predominantă actuală de așezare să fie cea alungită, sau cu tentacule. Forma rotundă a așezărilor rurale este mai puțin întîlnită, dar ea este prezentă la unele așezări, ca: Ipotesti, Bosanci, Rădășeni, Horodniceni, la vest de orașul Fălticeni, Forăști, Broșteni, Giștești, Heci în sudul podișului.

În strînsă legătură cu condițiile locale, dar și cu împrejurările istorice, economice și sociale, vetrele multor așezări au ajuns să se unească formînd, în anumite sectoare, benzi continue de gospodării. Fenomenul apare mai evident în cazul teraselor joase

Fig. 160. Podișul Fălticenilor și Culoarul Moldovei. Mărimea și funcțiile așezărilor omenești. 1, Dealuri; 2, arii depresionare; 3, așezări agricole pentru cultura plantelor și creșterea animalelor; 4, pomicole; 5, agroindustriale.



ale Moldovei și Șomuzului Mare. În unele situații, prin evoluție teritorială, s-a ajuns, de asemenea, la fenomenul de înglobare într-o vatră a mai multor așezări, rezultând vetre polinucleare, așa cum este cazul așezărilor Dolhasca (prin includerea unor cătune, ca Săndeni, Vămeni, Ciurchinari), Liteni (Bucsa, Humăria, Boereasca) etc. Nota dominantă este dată de dispersia mare a gospodăriilor (cu valori între sub 1 gospodărie/ha până la peste 6 gospodării/ha) și a densității populației cu valori mici în așezări (cu valori de sub 6 loc./ha la peste 18 loc./ha).

Cele mai puțin evolute economic (după structura populației active) sînt așezările mici și izolate, grupate în trei areale distincte. Un prim areal este cel din partea nord-vestică a orașului Fălticeni, care cuprinde o parte din așezările rurale din Depresiunea Litenilor (Vornicenii Mici, Horodniceni, Botești,

Mihăiești, Groapa Vlădichii, Șes). Al doilea areal corespunde cu interfluviul dintre Suceava și Șomuzu Mic (Merești, Vulturești, Giurgești, Valea Glodului, Bahna, Arini, Rotunda), iar al treilea, mult mai extins, este cel din partea central-sudică a podișului (Boura, Manolea, Mesteceni, Țolești, Nigotești, Uidești, Ruși, Antoceni, Oniceni, Iorcani).

La marea majoritate a așezărilor populația ocupată în agricultură este în proporție de 60-80%. Așezările cu funcții complexe, avînd populația activă în agricultură sub 60%, se află în ariile de influență urbană și în lungul axelor de circulație majoră. Un prim areal este cel din jurul orașului Suceava (cu așezările rurale Mihoveni, Stroiești, Moara, Bosanci), care se extinde spre sud-est în lungul Sucevei și al axei riului Siret (Mănăstioara, Știrbăț, Liteni, Corni, Poiana, Dolhasca). În partea sudică se

conturează aria de influență imediată a orașului Pașcani (Heci, Bursuc-Deal, Bursuc-Vale, Valea Seacă, Topile, Moțca, Giștești, Brătești, Cotu Băii, Fintina Mare, Baia și Cornu Luncii). La toate aceste așezări rurale este de subliniat mobilitatea zilnică a populației, spre centrele urbane. Mai apare clar o categorie a așezărilor cu funcții evaluate, în care funcția agricolă apare ca secundară (populația activă în agricultură în proporție de 20—40%): Șcheia, Sf. Ilie, Ipotești, Lisaura, din apropierea Sucevei, Șoldănești și Țarna Mare din apropierea Fălticeniilor și Lunca din imediata apropiere a Pașcanilor.

Din resturile vegetației de silvostepă prezentă în Depresiunea Litenilor au fost declarate două rezervații floristice: una la Frumoasa (comuna Moara), în care se remarcă o interferență a florei nordice și sud-estice, la contactul dintre provinciile floristice central-europeană și ponto-sarmatică și alta la Ponoare, lângă satul Curmătura, unde se află Fiețele seculare de la Ponoare, interesantă prin numărul mare de plante pe care le cuprinde.

Cele mai importante obiective turistice le reunește orașul Suceava, obiective cu caracter istoric care reflectă importanța lui în istoria neamului, dar obiective turistice interesante grupează și orașul Fălticeni (Muzeul de artă și literatură, Galeria oamenilor de seamă, Galeria de artă plastică, colecția sculptorului Ion Irimescu și o secție de istorie—arheologie).

O localitate cu rezonanță istorică este Baia, unde există obiective turistice valoroase, ca: Biserica Albă, construită de Ștefan cel Mare, ruinele catedralei catolice, din vremea lui Alexandru cel Bun și biserica cu picturi interioare și exterioare, ctitorie a lui Petru Rareș, la care se adaugă mănăstirea Proboata, una dintre cele mai însemnate realizări ale arhitecturii feudale din Moldova, ctitorie a lui Petru Rareș.

Cele mai importante dotări turistice sînt grupate în orașul Suceava, care are o capacitate de cazare de aproape 800 de locuri, în 6 unități de profil. Orașul Suceava se remarcă prin ponderea relativ mare a turiștilor străini (circa 23%), atrași de monumentele arhitecturii medievale moldovenești din nordul Moldovei. La capacitățile de cazare de la Fălticeni și Pașcani se adaugă (favorabil amplasate) hanurile și popasurile turistice, de la Moțca, Drăgușeni, Rădășeni, Fălticeni.

Orașul Fălticeni a avut o evoluție urbană asemănătoare multor așezări din Podișul Moldovei care au devenit țiguri comerciale-mesteșugărești. Evoluția sa spre tirg a fost favorizată de poziția care a înlesnit schimburile de produse între regiuni naturale cu economie complementară (Podișul piemontan din vest, Podișul Fălticeniilor și valea Moldovei). Dar, alături de poziția favorabilă, un rol foarte important în evoluția sa l-au avut factorii politici. Prin ocuparea părții de nord a Moldovei de către austriecei, după 1775, a luat locul Sucevei ca centru administrativ pentru partea sudică și s-a dezvoltat ca centru comercial, renumit fiind iarmarocul de la 20 iulie (cu o durată de cîteva săptămîni), spre care se îndreptau negustori din multe ținuturi ale țării. Funcția comercială și administrativă i-a asigurat un rol important între numeroasele așezări rurale din Podișul Fălticeniilor. În prezent, orașul se impune prin funcția industrială reprezentată prin unități din industria prelucrării lemnului și textilă (care dețin peste 75% din producția globală industrială), la care se adaugă unitățile de industrie alimentară și chimică, concentrate în partea de sud-est a orașului. Orașul a avut o evoluție lentă. Dacă în 1912 avea 13 724 de locuitori, în 1930 14 196, în 1966 17 839, iar în 1977 20 659 de locuitori (inclusiv satele Șoldănești și Țarna Mare). În 1992 a ajuns la 32 733 de locuitori. Schimbările în structura populației active între ultimele trei decenii nu au fost prea evidente. În 1977, activii din industrie dețineau 55%, din construcții aproximativ 3%, din agricultură 5,0% și în servicii 40%.

Funcțiile comercială, sanitară, de învățămînt și turistică au o influență restrînsă, îndeosebi asupra așezărilor rurale din Podișul Fălticeniilor.

Orașul Pașcani are o poziție geografică deosebit de favorabilă pe cea mai importantă arteră de circulație din Podișul Moldovei. Pînă spre sfîrșitul secolului XIX se situa în rîndul așezărilor cu funcție de tirg. Dezvoltarea urbană a fost impulsionată de construirea căii ferate din lungul Siretului și mai ales de apariția nodului feroviar odată cu construirea ramificației spre Iași. În prezent dominantă este funcția industrială. Primele unități industriale au fost cele legate de funcția sa de nod feroviar important (întreprinderea mecanică de material rulant), pentru ca mult mai tîrziu orașul să-și diver-

sifice activitățile industriale prin amplasarea unor unități reprezentative din industria construcțiilor de mașini, textilă și alimentară. Astfel, în anul 1965, orașul Pașcani se încadra în categoria orașelor cu funcție industrială specializată în construcțiile de mașini, această ramură deținând aproape 90% din producția globală industrială. În prezent, prin dezvoltarea a numeroase unități industriale s-a schimbat raportul între ramurile industriale, în sensul că industria textilă deține peste 44% din producția globală industrială, fiind urmată de ramura construcțiilor de mașini (peste 40%).

Dezvoltarea industrială a atras o creștere importantă a populației active în industrie: în 1977 activii în industrie și construcții reprezentau peste 56% din activi, fiind urmați de cei din servicii (peste 40%). Dar dinamica industrială nu a produs o evoluție rapidă a populației. În 1912 avea 11 695 de locuitori, în 1956 a crescut la 15 008, în 1977 a ajuns la 24 459 de locuitori (inclusiv satele Blăgești, Boșteni, Giștești, Lunca, Sodomeni), în 1980 la 28 598 și în 1992 la 44 652 de locuitori. Funcția de transport este reflectată de numărul mare al angajaților în transportul feroviar. Prin particularitățile dezvoltării sale, orașul s-a impus în valea Siretului prin formarea unei arii de influență întinsă pînă la contactul cu aria de influență a orașului Iași, în est și cu cea a orașului Roman, în sud.

Deși se încadrează în categoria orașelor mici, datorită poziției și posibilităților logistice de transport, spre el converg curenți de forță de muncă din aria rurală imediată.

Municipiul Suceava este reprezentativ nu numai prin poziția centrală în această unitate geografică, dar mai ales prin aceea că a devenit un centru cu o dezvoltare economică complexă și cu influență puternică în teritoriu. Este unul dintre orașele vechi, iar începuturile sale urbane le putem considera la mijlocul secolului XIV. Un rol important în dezvoltarea sa l-a avut funcția de reședință domnească căpătată la sfîrșitul secolului XIV, care a contribuit la dezvoltarea sa urbanistică (cetate de scaun, fortificații) și la diversificarea activităților economice (meșteșugărești, comerciale și administrative) (fig. 161). În secolele XV și XVI a fost cea mai importantă așezare din Moldova, dar după mutarea capitalei la Iași orașul stagnează, iar din a doua jumătate a secolului XVII se poate sesiza o

ușoară înviorare economică, rămînînd însă un centru urban cu funcție administrativă și comercială. În 1912 avea 18 500 de locuitori, iar în 1930 scăzuse la 17 335 de locuitori (fig. 162).

Dezvoltarea economică din ultimele trei decenii a determinat o creștere rapidă a populației: de la 37 700 în 1966, la 62 700 în 1977 și la 114 355 de locuitori în 1992. În primul rînd a fost dezvoltată mult funcția industrială prin amplasarea de numeroase obiective industriale în nord-estul și în vestul orașului. Pînă în anul 1965, funcția sa industrială era dată de industria alimentară (36,0% din producția globală industrială în 1965), industria celulozei și hîrtiei (33,5%) și cea de prelucrare a lemnului (16,5%). După anul 1965 unitățile industriale existente și-au dezvoltat mult capacitățile, iar pe de altă parte, au fost construite noi unități industriale din domeniul construcțiilor de mașini, materialelor de construcții, alimentar și textil. Profilul industrial este în prezent mult mai complex, dar au rămas predominante industria celulozei și hîrtiei și de prelucrare a lemnului, industriile alimentară, textilă, construcțiilor de mașini. Dinamica producției globale a atras după sine schimbări și conturarea zonelor funcționale: zona industrială principală dezvoltată în nord-estul orașului, pe terasa de luncă a Sucevei, grupînd cele mai importante unități industriale și a doua zonă cu profil alimentar, zona Șcheia. În afara acestora, în intravilan mai sînt diseminate alte unități industriale nepoluante.

Odată cu dezvoltarea industriei s-au produs schimbări în structura populației active. Dacă la recensămîntul din 1966, 32,5% din populația activă lucra în industrie, 13,5% în construcții, 49% în servicii (comerț, învățămînt, sănătate ș.a.) s-a ajuns ca în 1977, 46% din populație să activeze în industrie, 6% în construcții, 44% în servicii și 4% în agricultură.

Orașul Suceava este un important nod de comunicații feroviare și rutiere. Orașul dispune de trei zone feroviare (Suceava nord, Suceava-Burdujeni și Suceava vest), o autogară și un aeroport care este situat în partea de nord-est a orașului, la Salcea. Căile feroviare și rutiere permit o legătură strînsă cu aria imediată și chiar mai îndepărtată, ceea ce favorizează aflusul de forță de muncă spre industrii.




Fig. 161. Suceava, cetatea de scaun a Moldovei (foto. C. P. B.).




Fig. 162. Municipiul Suceava. A, Evoluția teritorială: 1, nuclee urbane din sec. XIV–XV; 2, extinderi din sec. XVI–XVII; 3, din sec. XVIII; 4, din sec. XIX; 5, din perioada 1900–1950; 6, din perioada contemporană. B, Zonele funcționale: 1, industriale; 2, de transport și depozite; 3, agroindustriale; 4, administrativ-comercial-culturală; 5, rezidențiale; 6, spații verzi.

Funcțiile administrativă, comercială, sanitară ș.a. se grupează în orașul propriu-zis și ele răspund funcției de centru reședință de județ. Funcția turistică a orașului este, de asemenea, evidentă prin fondul de interes turistic cultural din interior (Ruinele cetății de scaun, fosta mitropolie Sf. Ioan cel Nou, biserica Sf. Dimitrie, mănăstirea Zamca ș.a.), dar și prin aceea că prin spații de cazare și alte dotări turistice răspunde turismului de tranzit spre mănăstirile din nordul Moldovei (fig. 162).

Funcția de învățământ se materializează prin Universitatea „Ștefan cel Mare” și prin gama largă de unități ale învățământului mediu, a căror specializare vine să răspundă activităților economice din interior și la nivel regional.

Prin funcțiile sale complexe, orașul Suceava se individualizează net față de celelalte așezări urbane din cuprinsul Podișului Sucevei, el generând influențe de o mai mare intensitate în zona imediată, de unde își procură forța de muncă suplimentară și materiile prime agricole pe care le prelucrează, dar cu o influență mai largă în teritoriu, în special ca centru urban de sprijin pentru întreg teritoriul administrativ al județului Suceava.

6.2.1.7. Culmea Siretului

Culmea dintre valea largă a Siretului și Cimpia Moldovei, cunoscută și sub numele de Culmea Bour — Dealul Mare, se prezintă ca o succesiune de masive înalte și șei largi.

Prezența a numeroase masive deluroase cu înălțimi de peste 500 m (587 m, Dealul Mare — Tudora care reprezintă și cota maximă pentru întregul Podiș al Sucevei; 555 m, Dealul Bereslogi; 532 m, Dealul Slobozia; 530 m, Dealul Șanțurilor) și situarea între unități joase asigură o bună individualizare a unității. Numele de Culmea Siretului este justificată pe deplin de formă și dimensiuni: se desfășoară pe o lungime de 130 km (de la granița de nord până în dreptul orașului Roman) cu lățime maximă ce abia atinge 20 km în dreptul Hirlăului. În ansamblu reprezintă o alternanță de masive de peste 400 m bine împădurite, cu șei largi populate. Formele de relief mai semețe, masivele deluroase sînt alcătuite dintr-un substrat mai rezistent la eroziune format din formațiuni sarmațiene reprezentate prin gre-

sii, calcare și microconglomerate silicioase. În sectoarele cu substrat geologic alcătuit din roci argiloase friabile, eroziunea selectivă a dus la formarea de șei cu altitudini care abia depășesc 300 m (350 m în Șaua Bucecea).

Apariția unor orizonturi de prundișuri în dealuri și existența șeilor în care de asemenea se întîlnesc prundișuri au fost interpretate ca dovezi ale existenței unei rețele hidrografice inițial transversală (vest—est), din care, prin captări succesive, s-au format cursurile principale actuale din Podișul Moldovei (V. Tufescu, 1932; M. David, 1933). Inițial s-a presupus că Șaua Ruginoasa a fost formată de riul Moldova, iar Șaua Bucecea de Suceava, dar studiile ulterioare (C. Martiniuc, 1955, 1960; I. Sîrcu, 1955; V. Băcăuanu, 1968, 1973) au infirmat posibilitatea existenței unei rețele hidrografice inițiale pe direcția vest—est. Cercetările au constatat că pietrișurile existente pe masivele înalte sînt de vîrstă sarmațiană și provin din dezagregarea unor conglomerate, neavînd nimic comun cu terasele unor presupuse riuri transversale.

Raporturile dintre Șaua Ruginoasa—Strunga și valea Siretului demonstrează că nu a fost posibilă sculptarea șeii de către o veche Moldovă, deoarece între ele se interpun înălțimi mai mari. Întreaga serie de terase ale Siretului sînt paralele cu actualul curs iar terasele superioare se află la altitudini mai mari (peste 400 m) decît Șaua Ruginoasa—Strunga (I. Sîrcu, 1955). Aceeași situație este pusă în evidență și în cazul Șeii Bucecea. Dealul Căprăriei de la est de orașul Suceava reprezintă un rest dintr-o terasă de 180—190 m, fapt care dovedește că la acest nivel Suceava se vărsa, ca și acum, direct în Siret și deci nu este răspunzătoare de sculptarea Șeii Bucecea, a cărei altitudine absolută abia depășește 300 m.

Stratificația monoclinală și natura rocilor cu comportări diferite la atacul agenților modelatori au condiționat orientarea și înclinarea pe direcția nord-vest — sud-est a culmilor, apariția unor platouri structurale largi, a cuestelor și celorlalte abrupturi, însăși succesiunea de masive înalte separate de șei largi (V. Mihăilescu, 1930; V. Tufescu, 1937). La nord de Ruginoasa, în aria localităților Vascani, Hărmănești, Todirești, Stroești, între 370—400 m se desfășoară cea mai întinsă suprafață structurală din Podișul Moldovei numită Broscăria—Laiu. Un platou

de o netezime ideală, care ține astfel până la Poiana Tudora și coasta abruptă dinspre Cirjoaia. De pe ea ai impresia că te afli pe o cîmpie pe care valea Broscăria e abia estompată. Numai ajungînd la marginile ei abrupte fie spre nord, fie spre est, îți dai seama că această cîmpie este cu 300 m mai sus decît văile largi ale Cirjoaiei și Măgurei care curg numai la 1 km sub coastă. Numai așa apare adevărata valoare a acestui crîmpei de cîmpie înaltă (V. Tufescu, 1937, p. 98). De asemenea, la vest și sud-vest de Hîrlău se dezvoltă suprafața structurală Singeap, aflată la 400 m altitudine absolută.

Trecerea spre Cîmpia Moldovei pe aliniamentul Tirgu Frumos—Cotnari—Hîrlău—vest Botoșani se face prin abrupturi, unele cueste cu o energie ce depășește, de regulă, 200 m, puternic atacate de procese de versant (I. Sircu, 1956). La fel de uniformă este apariția cuestelor și abrupturilor spre valea Siretului (Buda, Bădilița, Hărmănești), încît a fost denumită și regiunea Coastelor Siretului (V. Tufescu, 1937).

La extremitatea nordică a Culmii Siretului se află *Masivul Bour* (472 m în Dealul Pietriș), prelungit spre nord-est în lungul graniței cu pîntenul deluros al Ibăneștilor (385 m în Măgura). Către sud coboară spre valea joasă și largă a Bahnei, în care afluenții Jijiei, Sitnei și Miletinului sint pe cale de a efectua captări asupra Siretului. Între Masivul Bour și pîntenul deluros al Ibăneștilor la vest de Dorohoi, relieful scade sub 300 m, aici apărînd *Șaua Loznei*, un șes mlăștinos fără o rețeah hidrografică organizată, în cuprinsul căreia se află și se exploatează turbă.

Din Șaua Loznei pînă la sud-est de Virful Cîmpului relieful este format dintr-un alt șir de masive înalte împădurite care culminează în *Dealul Hăpăi* (Masca), la 426 m. Spre sud șirul masivelor împădurite este întrerupt de *Șaua Colinele Bucecea—Verona*, plină de sate și acoperită de culturi agricole, pe care V. Mihăilescu (1930), denumind-o „Coridorul Bucecii”, a considerat-o ca reprezentînd o fază aproape finală a luptei care se dă între afluenții Jijiei și ai Siretului (fig. 163).

Mai la sud se înalță *Dealul Mare—Hîrlău*, masiv caracteristic pentru întreaga Culme a Siretului, despărțit de obirșile Bahluiului în doi lobi inegali. Ramura vestică este mai dezvoltată și culminează în *Dealul Mare—Tudora* la 587 m. Partea estică are o extindere mai mică pe stînga văii Bahluiului,

la nord de Hîrlău, și ajunge la 556 m în Dealul Holm. Partea superioară a Dealului Mare—Hîrlău este bine acoperită de păduri




Fig. 163. Culmea Siretului. a, Dealuri înalte; b, dealuri (coline) joase; c, șei; d, căi-ferate; e, drumuri modernizate.

de fag, sub care se găsesc soluri argiloiluviale (tipice și pseudogleizate) și rendzine (cele mai mari suprafețe din întreg Podișul Moldovei), formate pe seama calcarelor oolitice.

Șaua (sau Colinele) *Ruginoasa—Strunga* (Poarta Tirgului Frumos, după V. Tufescu, 1940) reprezintă ultimul sector al Culmii Siretului. Se desfășoară între Dealul Mare și Podișul Birladului, pînă pe aliniamentul localităților Hindrești—Stănița—Sagna. Relieful este format din dealuri joase, cu pante domoale, acoperite de terenuri agricole. În ansamblul Culmii Siretului, terenurile agricole ocupă suprafețe însemnate numai în părțile joase. Odată cu creșterea altitu-

dinii, în structura terenurilor agricole sporesc pășunile, finetele și livezile (mai ales în Dealul Mare). În Șaua Ruginoasa — Strunga suprafețele cultivate cu cereale dețin în medie peste 65% din suprafețele arabile. Un loc important îl are cultura sfecei de zahăr și a cartofului. Ca urmare a comasării efectivelor de animale în ferme de tip industrial, creșterea animalelor apare cu intensitate mai mare în ariile Bucecea și Virfu Cimpului.

Culmea Siretului apare ca cea mai puțin populată parte a Podișului Sucevei care deține 13% din populația podișului — adică circa 79 000 de locuitori (1977) — grupată în 59 de așezări rurale. Diferențierile teritoriale ale repartitiei sînt generate de alternanța părților înalte cu ariile joase. Partea nordică (Masivul Bour, Șaua Lozna, Dealul Masca) se remarcă printr-o slabă populare. În Șaua Bucecii, cele 19 așezări cuprind circa 35% din populația Culmii Siretului. Dealul Mare, deși este o subunitate înaltă, apare, totuși, bine populat, ca urmare a fixării așezărilor în special pe afluenții Siretului: 20 de sate ce grupează circa 32% din populația Culmii Siretului. Șaua Ruginoasa apare ca partea cea mai bine populată. Populația de aici este cuprinsă în 7 așezări și reprezintă în jur de 12% din populația totală a regiunii. Mărimea așezărilor se prezintă într-o mare diversitate: 15 sate au sub 600 de locuitori și cuprind 6% din populația totală. Între acestea sînt cîteva sate sub 300 de locuitori. Gorovei, Călinești, Vlădnicuț, Satu Nou. Cea mai mare parte a populației este cuprinsă în categoria așezărilor cu 1 200—1 800 locuitori (circa 37%). Alături de acestea sînt și așezări de talie mare, sate vechi cu poziție și condiții naturale favorabile, îndeplinind funcții comerciale (tîrguri) de-a lungul timpului: Todirești, Bucecea, Dersca, Corni, Tudora. Acesta din urmă este și cel mai mare sat din Culmea Siretului, avînd o

În general, aşezările din Culmea Siretului au un grad mai mare de izolare faţă de centrele urbane şi axele majore de circulaţie, exceptînd aşezările din şele Bucecea şi Ruginoasa. Din acest motiv, multe din ele se încadrează în categoria celor cu funcţii neevoluate, aşa cum sînt Rogojeşti, Viţcani, Lunca, Gorovei, în partea nordică, Bohoghina, Hrişcani, Mesteacăn, Icuşeşti, Sirefel în Dealul Mare. O categorie aparte o reprezintă aşezările cu funcţii complexe, la care se remarcă o scădere a populaţiei agricole la 40—60%. Fenomenul este tipic pentru satele aflate în aria de influenţă imediată a oraşului Paşcani. Din jumătatea nordică este de evidenţiat Bucecea, cu o poziţie avantajoasă pe legătura feroviară dintre Veresti şi oraşele Botoşani şi Dorohoi din Cîmpia Moldovei. Este importantă poziţia sa la încrucişarea a două căi rutiere principale : şoseaua dintre Suceava şi Botoşani—Dorohoi din Cîmpia Moldovei şi şoseaua pe direcţia nord-vest — sud-est din lungul Siretului. Avînd o funcţie industrială bine conturată, dar cu o specializare deocamdată strictă în industria alimentară (prin construirea în anul 1960 a unei importante întreprinderi de industrializare a sfecelei), Bucecea are largi posibilităţi de a-şi dezvoltă aria de influenţă economică.

Relieful a condiționat mult orientarea arterelor de circulație prin șele care au favorizat apariția unor axe pe direcția vest-est. Pentru partea înaltă sînt tipice traseele




Fig. 164. Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la Ruginoasa. (foto C. P. B.)

rutiere infundate. Căile feroviare s-au dezvoltat pe aceeași direcție.

6.2.2. Cîmpia Moldovei

6.2.2.1. Caracterile fizico-geografice

Alcătuirea geologică și relieful. O regiune deluroasă cu văi largi și interfluvii domoale, pe alocuri sub formă de poduri întinse aflate la un nivel general de 150–250 m altitudine absolută, cu aproximativ 200 m mai jos față de unitățile vecine de la vest și sud; o regiune cu recunoscute caractere silvostepice, utilizată astăzi intens în scopuri agricole, care ne impresionează, vara, prin lanurile nesfârșite de porumb, grâu, floarea soarelui și de alte culturi. Pîlcurile rare de pădure de șleau, care se mai păstrează doar pe câteva înălțimi ce depășesc 180–200 m sau pe versanții umbriți, numărul mare de

iazuri din lungul văilor secundare, prezența, încă stăruitoare, pe versanți a unor pajști naturale și a suprafețelor degradate prin alunecări, procese de eroziune a solului, organisme torențiale în diverse stadii de evoluție, satele, rare pe interfluvii și mai dese pe terasele și versanții văilor largi, constituie trăsăturile definitorii ale Cîmpiei Moldovei (fig. 165).

Este de la sine înțeles că aceste componente ale peisajului, vizibile de la distanță de pe orice punct dominant, sînt strîns legate de un întreg complex de factori, a căror prezență, activitate ori importanță pentru înfățișarea întregului ansamblu geografic trebuie mai mult căutate, adesea deduse și interpretate.

Cîmpia Moldovei se individualizează și se delimitează foarte clar față de subunitățile învecinate. Dacă spre nord-est și est limita o constituie Prutul, spre nord-vest, vest și sud este deosebit de tranșantă, expri-

mată în relief și în întregul peisaj, printr-o ramă înaltă, cu energie de 200–300 m, cu pante obișnuite de 15–20°, cunoscută și sub numele de Coasta Moldavă (I. Sîrcu, 1956).



Fig. 165. Diviziunile Cîmpiei Moldovei. a, Relief colinar; b, depresiuni de contact; c, lunca Prutului.

Poziția geografică, înfățișarea generală și, mai ales, altitudinea sa mai coborită față de nivelul general al reliefului din jur — de unde și numele de Depresiunea Jijiei — se asociază și cu alte discontinuități ale peisajului. Într-adevăr, cîmpia deluroasă cu aspect de silvostepă intens cultivată cu cereale, este încadrată, spre vest și sud, de podișuri structurale cu altitudini de peste 350 m, acoperite cu păduri întinse de foioase (stejar și fag). În plus, trebuie remarcată existența unor adevărate „ghirlande de așezări” vechi și prospere, situate la contactul Cîmpiei Moldovei cu regiunile vecine, care întregesc peisajul, subliniind și mai puternic limitele fizico-geografice.

Legăturile cu regiunile din jur au fost favorizate de prezența șeilor sau „porților”, ca cele de la Lozna, Bucecea, Ruginoasa — Strunga și Grajduri (Bordea), străbătute de importante căi de comunicație și în fața cărora au apărut și s-au dezvoltat orașele Dorohoi, Botoșani, Tirgu Frumos și Iași.

Contactul cu pîntenul deluros împădurit al Ibăneștilor se face prin planuri de racord mai prelungi, conforme cu structura geologică, care asigură tranziția mai largă și între-pătrunderea aspectelor geografice pe o linie ce ar trece prin partea de sud a localităților Pomirla, Ibănești, Cristinești, Suharău, Baranca—Hudești (pe Prut). Spre culmea înaltă Bour—Dealul Mare (Culmea Siretului) — parte din Podișul Sucevei — limita este marcată de un șir întreg de localități: Hilișeu —Horia (la nord-est de Dorohoi), Șendriceni, Brăești, Ipotești, Copălău, Flăminzi, Hîrlău, Cotnari, Cucuteni, Dădești, Strunga, Buda. Cu Podișul Central Moldovenesc intră în contact prin Coasta Iașilor, cel mai puternic aliniament de abrupturi structurale din Moldova, cu o lungime de aproape 100 km. Limita, ușor sinuoasă, se înscrie pe la baza acestei cueste care a oferit condiții prielnice multor așezări, ca: Sinești, Voinești, Mogoșești, Bîrnova, Tomești etc. Între aceste limite, Cîmpia Moldovei are o lungime de 160 km, lățimea de 40–60 km și o suprafață de aproape 8 000 km².

Cîmpia Moldovei ocupă partea nord-estică a Platformei Moldovenești formată dintr-un soclu cristalin precambrian penepienizat, ce se afundă către vest — sud-vest sub cuvertura monoclină de sedimente ordovician-siluriene, cretacice și neogene, cu grosimi de 600 m în sectorul corespunzător interfluvului Prut—Volovăț și 1 600 m la Tirgu Frumos. Cercetările geofizice (I. Gavăț și colab., 1963) precum și forajele de mare adîncime care au interceptat acest soclu (la 950 m la Todireni, în partea centrală a cîmpiei, la 1 008 m la Bătrînești—Botoșani și la 1 121 m la Iași) arată că fundamentul este format din trei sectoare bine sudate: arhaic-karelian, la est de o linie ce ar trece pe la Darabani—Trușești—Ungheni; baikalian mai la vest și caledonian (sisturi verzi) spre marginea vestică (Dorohoi—Botoșani—Hîrlău—Tirgu Frumos). Cuvertura s-a format în trei cicluri de sedimentare, sub influența mișcărilor de basculare, însoțite de transgresiuni și regresii marine.

Formațiunile paleozoice, ca și cele mezozoice, au fost întâlnite numai în forajele adînci, iar cretacicul aflorează și în malul Prutului, între Rădăuți—Prut și Mitoc, unde este reprezentat prin calcare marnoase cenomaniene cu concrețiuni de silix (cele mai vechi depozite la zi din întregul Podiș al Moldovei).

Ultimul ciclu de sedimentare a acoperit suprafața denudată a depozitelor cretacee, iar cuvertura sedimentară este formată, la partea superioară, din depozite bugloviene, volhiniene și basarabiene. Caracteristica principală a acestora este structura monoclină diferită de a celor mai adânci și predominarea faciesurilor argilo-nisipoase cu intercalații de conglomerate, gresii, nisipuri și calcare care au condiționat, în bună măsură, morfologia și înfățișarea de ansamblu a acestei regiuni. Badenianul se poate urmări în lungul versantului drept al văii Prutului, de la nord de Pălteniș până la Liveni, format din trei orizonturi care reflectă condiții de sedimentare diferite: un orizont constituit din gresii, calcare, conglomerate cu silix și nisipuri cuarțoase, deschis la Miorcani, Crasnaleuca și Mitoc; un orizont de gipsuri și anhidrite, care îl continuă lateral pe cel anterior, vizibil la Cuzlău, Slobozia, Crasnaleuca și identificat, de asemenea, în numeroase foraje și un orizont de marno-argile cenușii-negricioase cu intercalații subțiri și discontinue de tufuri și bentonite, prezent la zi tot în valea Prutului.

Buglovianul, deschis tot în lungul Prutului de la nord de Pălteniș și până la Ștefănești, se caracterizează prin prezența unor calcare recifale (*toltry*), continuate lateral și acoperite de un litofacies detritic argilo-marnos cu intercalații de nisipuri și prundișuri, uneori chiar de tufuri andezitice (Hudești) și de bentonite (Miorcani—Crasnaleuca). Formațiunile calcaroase sectionate de Prut — care a creat în dreptul lor adevărate „porți” — au fost dezgolite printr-o evidentă eroziune selectivă, formându-se, astfel, mici culmi, numite local „stinci”, cum sînt cele de la Liveni, Ripiceni, Stîncea ș.a. De altfel, barajul și hidrocentralele de la Stîncea—Costești — date în exploatare în anul 1978 — au fost plasate tocmai într-o astfel de îngustare a văii.

Sedimentarea miocenă a continuat, în nord, până către sfîrșitul volhinianului, cînd începe ultima retragere a apelor și formarea reliefului actual. Treptat, aria uscatului s-a extins spre sud, încît în basarabian se mai afla sub apă doar teritoriul de la sud de o linie ce ar trece de la nord de Hîrlău pînă la nord de Bivolari, iar în kersonian întreaga suprafață a Cîmpiei Moldovei era exondată și supusă acțiunii factorilor externi.

Depozitele sarmatice în care s-a sculptat tot relieful au grosimi mai mici de 100 m

în nord-est și depășesc 500 m în sud-vest (522 m la Deleni—Hîrlău) și sînt destul de uniforme, dominate de prezența argilelor și marnelor cu intercalații subordonate de nisipuri și lentile de gresii și prundișuri. Peste ansamblul depozitelor marine amintite se așterne o pătură subțire și discontinuă de luturi loessoide, aluvio-colviale și eluviale. Prezența teraselor Prutului, ușor divergente din amunte spre avale (V. Băcănu, 1968), ca și mișcările neotectonice pozitive actuale, cu valori de 3—4 mm/an în nord și 2—3 mm/an în sud (R. Ciocîrdel și Al. Esca, 1966) arată că în cuaternar a fost afectată de mișcări neotectonice cu implicații în aspectele reliefului.

Multe dintre rocile de suprafață sînt folosite, pe plan local și regional, pentru industria materialelor de construcții (ceramică, sticlă) sau sînt întrebuințate de localnici pentru construcții. Nisipurile cuarțoase badeniene de la Miorcani sînt utilizate de întreprinderea de sticlă și porțelan din Dorohoi și de alte fabrici din țară. Ele se exploatează în galerii încă din anul 1950, au un conținut de 98% SiO_2 și sînt amestecate, mai ales în bază, cu concrețiuni de silix negru (flint). Concrețiunile cu formă neregulată sînt folosite în fabricarea emailurilor și a sticlei abrazive, iar cele rotunde înlocuiesc sferele de oțel ale morilor cu bile care mărunțesc feldspatul, caolinul etc. Rezerve mari de nisipuri silicioase se găsesc la Hudești, Suharău și Bajura, însă cu un conținut ceva mai ridicat de carbonați.

Gipsurile de la Cuzlău, Slobozia și Crasnaleuca se asociază cu zăcăminte de sulf de origine diagenetică, descoperite în zona Darabani—Pălteniș. Un interes cu totul local prezintă tufurile andezitice de la Hudești, argilele bentonitice de la Miorcani și Crasnaleuca, calcarele recifale de la Liveni, Ripiceni și Stîncea, gresiile de la Hudești și de la nord de Sulița. Argilele și luturile necesare pentru industria ceramicii sînt exploatare și folosite îndeosebi în jurul principalelor orașe: Iași (Vlădiceni, Ciurea), Dorohoi, Botoșani.

O altă categorie de resurse subterane o constituie apele din depozitele de cuvertură ale platformei (care completează rezervele modeste oferite de pînzele freatice) și, în special, apele minerale. Forajul de la Nicolina—Iași, care a atins adîncimea de 1 391 m, a interceptat mai multe strate de apă sub presiune. Cele mai adînci se găsesc în partea

superioară a fundamentului cristalin, între 1 107 și 1 309 m, au o mineralizare puternică variind între 57,7 și 63,6 g/l (din care 25–43 g/l NaCl, iar 16–30 g/l CaCl) și un caracter ascensional. În depozitele siluriene s-a întâlnit un complex acvifer situat la adâncimi între 602 și 1 107 m, cu caracter artezian (+ 7,5 m), având un debit liber de 77 m³/h. Apele au o culoare negricioasă, gust sărat și miros de H₂S, cu o mineralizare totală între 9,9 și 12,9 g/l. Ele conțin 213 mg/l H₂S; 5 mg/l iod; 40 mg/l brom, 80% din gradul de mineralizare datorindu-se clorurii de sodiu. Dispun de prețioase calități terapeutice și sunt utilizate în cura balneară la spitalul de recuperare construit recent în imediata apropiere. Celelalte formațiuni geologice, cretacice și miocene, îmagazinează orizonturi bogate de ape potabile sau ușor mineralizate (Rădăuți-Prut, Livești, Mihălășeni, Ripiceni, Stinca etc). Uneori apele pot fi însă foarte dure (Botoșani), bogate în clorură de sodiu și hidrogen sulfurat (Dingeni) sau cu o mineralizare complexă: sulfatate, bicarbonatate, alcaline, calceice, magneziene (Iași). Multe izvoare minerale apar în lungul ramei înalte ce încadrează Cimpia Moldovei: Strunga, Băicești, Pircovaci, Tomesti și în alte puncte. Relieful Cimpiei Moldovei s-a format în condițiile unui substrat geologic foarte ușor de modelat. Evoluția geomorfologică a acestui teritoriu a început încă din sarmatian dar vîrsta reliefului actual nu depășește pliocenul mediu. Explicația constă în aceea că suprafețele și formele inițiale, dezvoltate pe seama unor roci moi, au fost distruse și înlocuite cu altele, derivate, mai tinere. Toate încercările de reconstituire a evoluției acestei regiuni duc la concluzia că pe suprafața primară, proaspăt ieșită de sub apele mării sarmatice, s-au instalat riuri care au urmărit țărmurile în continuă deplasare spre sud. Cu siguranță că un astfel de riu, inițial consecvent, a fost și Prutul, poate și altele care însă nu s-au mai păstrat pînă astăzi. Acestea și-au dobîndit o seamă de afluenți care s-au adîncit și s-au ramificat și, ajutate de ceilalți factori ai denudației, au contribuit la sculptarea și coborîrea continuă a suprafeței generale a reliefului, conferindu-i, în cele din urmă, aspectul actual.

Relieful de dealuri și coline, precum și mare parte a văilor au o orientare conformă cu structura geologică, reflectînd, în același timp și constituția petrografică. Deosebit

de evidentă este predominarea formelor asimetrice, cu versanți mai abrupti spre nord și nord-vest și cu cline domoale spre sud și sud-est, cu procese de eroziune arcolară pe suprafețele cu pante moderate și alunecări pe cele cu înclinații mai accentuate. Înălțimile maxime doar în cîteva puncte izolate depășesc 250 m (atingînd 270 m în dealul Bodron, la vest de Mitoc), iar cele mai coborîte din lunca Prutului ajung sub 40 m (32 m la confluența Jijia–Bahlui). Altitudinile medii sînt de 150–200 m (175 m) în jumătatea nordică și de 100–150 m (125 m) în sud.

Formele structurale sînt mai slab reprezentate decît în subunitățile înalte învecinate, totuși cîteva cueste pe care culturile agricole alternează cu pășuni și fînețe, ori cu mici suprafețe împădurite și areale intens degradate, întovărășesc sectoarele subsecvente ale riurilor de aici: versantul drept al Jijiei superioare dintre Corlăteni și Mindrești, unele sectoare de pe dreapta Băseului (Săveni–Vlăsinești și Hănești-sud Mihălășeni), flancul sudic al văii Sitnei între Drașeni și Hlipiceni, coasta Miletinului și cea a văii Gîrla Morii (Jijioara), continuată spre est de coasta Jijiei inferioare (Larga, Jijia–Popricani–Victoria), Coasta Bahluiului și cea din lungul Bahluietului. La acestea s-ar putea adăuga multe alte cueste secundare care, prin întreaga lor înfățișare, contrastează cu versanții opuși, conformi, prelungi, utilizați aproape exclusiv pentru culturile cerealiere.

Culmile, podurile și toate interfluviile reflectă adesea o adaptare generală la structura monoclină și sînt acoperite de pături subțiri (1–4 m) și discontinue de luturi loessoide eluviiale (fig. 166). Natura rocilor parentale, condițiile climatice și ceilalți factori pedogenetici au favorizat formarea, aici, a unor soluri cernoziomice a căror fertilitate și productivitate sînt afectate uneori de procese de eroziune slabe și moderate. Lărgimea și forma lor ușor valurită, convexă, sau cu înclinare domoală se pretează atît pentru agricultură, cît și pentru alte utilizări economice. În multe sectoare din lungul Prutului, de la Săveni, Dorohoi–Botoșani, de la sud de Bahlui și Bahluiet etc. există chiar condiții pentru dezvoltarea irigațiilor. Suprafața totală pretabilă la irigare, în care se includ și terasele și luncile, este de peste 90 000 ha.

Cu excepția sectorului epigenetic al văii Prutului dintre Rădăuți-Prut și Stinca, sculptat în formațiuni cretacee și miocene, toți versanții sectionează numai depozite argilo-marnoase sarmatice, care conțin și unele intercalații subordonate de nisipuri. De aici decurge multitudinea și varietatea proceselor de versant care — cu toate măsurile de prevedere și combatere din ultimele decenii — au încă o răspîndire mare, în-

afectate de procese și forme de ravenare ajunse uneori pînă la stadiul de badlands, se întîlnesc pe suprafețe limitate la Iurești. Ringhilești, Unțeni, Vlăsinești, pe versanții Jijiei (Albești—Zlătunoaia, Epureni, Popricani etc.), în bazinul superior al Bășului, pe versantul drept, lipsit de terase, al văii Prutului (Berza, Santa Mare, Golăești—Mînzătești) și, îndeosebi, în lungul abrupturilor ce delimitează cîmpia.




Fig. 166. Profil pe direcția nord-vest — sud-est în partea de sud a Cîmpiei Moldovei. 1, Complexul argilo-marnos cu intercalații nisipoase și calcaroase (sarmatian mediu); 2, calcare sarmatice; 3, prundișuri și nisipuri de terasă; 4, luturi loessoide; 5, aluviuni argilo-nisipoase.

scriindu-se clar în peisaj. Defrișările și mai ales deștelenirile masive din ultimele două secole au avut drept consecință creșterea gradului de stepizare și modificarea esențială a peisajului geografic.

Pluviodenudarea și ablația, deși nu au consecințe morfogenetice spectaculoase și sesizabile imediate, se situează pe primul loc între degradările de teren. Urmările lor sînt vizibile pe toate culmile și versanții cu înclinări mai mari de 6—7°. Elocventă din acest punct de vedere este și turbiditatea medie anuală a apei râurilor, cuprinsă între 2 000 și 2 500 g/m³, cu o creștere de peste 170 ori în timpul ploilor torențiale excepționale. În iunie 1965, pe Jijia — la Todireni — la un debit lichid de 73 m³/s s-a înregistrat o turbiditate de 8 100 g/l, respectiv un debit solid de 590 kg/s (M. Pantazică, 1974). La 13.VI.1975 însă debitul maxim a fost de 731 m³/s, încît extrapolînd datele privitoare la debitul solid ajungem la valori de zece ori mai mari. Media scurgerii solide este de 0,75—1,2 t/ha.an, iar efluența este de 460 000 m³/an — corespunzătoare erodării de pe întreaga suprafață a unui strat de 0,05—0,11 mm.

Eroziunea torențială, asociată cu ablația prezintă pe majoritatea versanților cu înclinări mai mari de 5—10°, este mai intensă și cu forme mai evolute pe terenurile recent defrișate ori deștelenite, ca și pe unele imășuri utilizate abuziv. Perimetre

Cu implicații importante în peisaj sînt alunecările, aproape nelipsite pe versanții cu înclinări mai mari de 10° și mai ales pe cei ce reprezintă cueste. Studiile au ajuns la concluzia că alunecările, cu o gamă largă de tipuri și stadii de evoluție, sînt stabilizate sau în curs de stabilizare în proporție de 70% și numai 30% sînt active, chiar dacă există suprafețe întinse și perioade în care dezvoltarea lor atinge stadii de paroxism (V. Băcăuanu, 1968). În această privință se remarcă o oarecare corespondență între manifestarea intensă a alunecărilor și ciclitatea climatică. Ea a fost confirmată și în cursul anilor 1969—1974, cu excedent de precipitații, cînd în partea de est a județelor Botoșani și Iași s-au declanșat și reactivat alunecări pe cîteva mii de hectare. Clasificările și tipizările menționate în multe lucrări detaliate (C. Martiniuc și V. Băcăuanu, 1961; V. Tufescu, 1964, 1966; V. Băcăuanu, 1968 ș.a.) scot în evidență predominarea în proporție de peste 80% a deplasărilor umede, detrusive, insecvente, cu un microrelief combinat (monticuli, valuri, trepte etc.), cu profunzime pînă la 10 m, de vîrstă contemporană și cu tendințe de stabilizare naturală. În vederea prevenirii și combaterii acestor procese dăunătoare economiei s-au executat numeroase lucrări tehnice foarte costisitoare (cum au fost cele de la Iași și Botoșani și din alte localități), dar pe cele mai întinse suprafețe s-au luat măsuri

de utilizare adecvată a terenului în scopuri silvo-pomicole (în jurul Iaşului, la Strunga, Hirliu, Truşeşti, Vlăsineşti etc.).

Cu excepţia luncilor inundabile — intrate şi ele în plin proces hidroameliorativ —, formele reliefului de acumulare au poduri orizontale sau slab înclinate bine drenate, stabile, cu soluri cernoziomice bine conservate, deosebit de prielnice pentru agricultură, pentru fixarea aşezărilor şi a căilor de comunicaţie.

Deşi numărul, extinderea, modul de păstrare şi înălţimea teraselor diferă de la o vale la alta, acestea oferă cele mai bune terenuri agricole, cu mari disponibilităţi pentru dezvoltarea şi sistematizarea teritoriului şi a localităţilor.

Cele mai bine reprezentate sînt terasele din lungul Prutului, din sectorul inferior, subsevent, al Jijiei şi de pe stînga Bahluiului. De altfel raportul dintre ierarhizarea şi dezvoltarea reţelei hidrografice, pe de o parte, şi terasele fluviatile, pe de altă parte, este aici dintre cele mai tipice, evidenţiind, cît se poate de clar, importanţa, vechimea şi rolul primordial al Prutului. Acest lucru rezultă şi din comparaţia numărului şi altitudinilor teraselor celor mai înalte: 7 terase pe Prut în sectorul Trifeşti—Probota, cu altitudini maxime pînă la 140—150 m; 5 terase pe Jijia inferioară care ajung la 140 m; 4 terase pe Sitna inferioară şi pe Miletir şi cîte una-două pe văile afluate mai mici. O excepţie o constituie valea Bahluiului cu 8 terase bine păstrate, dispuse în evantai, cu o lărgime totală pînă la 6—7 km. Prezenţa teraselor cu altitudini superioare celor din valea Prutului demonstrează clar că au existat şi alte trepte mai înalte, care au fost distruse.

Arealele ocupate de terase sînt discontinue, iar pe alocuri întreaga serie de terase este dispusă alternativ de o parte sau de alta a riului, indicînd menţinerea direcţiei cursurilor de apă, cu abateri laterale constante. Aşa este cazul văilor consecutive şi resecvente şi îndeosebi a Prutului, cu discontinuităţi ale teraselor de pe flancul drept între Rînghileşti-nord Tabăra, Victoria—Tuţora şi în alte sectoare în care aceste trepte se dezvoltă pe versantul stîng. Depozitul de terasă are grosimi între 3 şi 20 m şi este format din nisipuri cu lentile de prundişuri carpatice în bază — mai frecvente şi mai groase în lungul Prutului — acoperite de luturi-loessoide. Vîrsta teraselor este pleistocenă superioară pentru terasele

cu altitudini pînă la 30—40 m, pleistocenă medie pentru cele de 50—70 m, pleistocenă inferioară pentru cele cu altitudini în jur de 100—140 m şi pliocenă pentru cele mai înalte.

În general, regiunea este deficitară în resurse hidrice, dar terasele dispun de unele rezerve de ape freatice superioare celorlalte unităţi geohidromorfologice. Stratele acvifere freatice sînt situate la adîncimi între 5 şi 30 m şi au oscilaţii reduse de nivel în timpul anului (0,5 m), înscriindu-se, din punct de vedere calitativ, spre limita superioară de potabilitate. Ape freatice bogate se întîlnesc şi în aluviul luncilor principale, însă acestea se plasează adesea la limita inferioară a potabilităţii.

Lunca Prutului începe de la Ştefăneşti şi se continuă, cu unele întreruperi pe teritoriul românesc, în tot lungul Cîmpiei Moldovei. Amunte de Ştefăneşti, cele cîteva crîmpeie de luncă din sectorul epigenetic au fost acoperite de apa lacului de acumulare Stîncă—Costeşti, iar în porţiunea subseventă din extremitatea nordică, Prutul curge în apropierea bazei versantului drept, lăsînd o luncă largă pe stînga sa, ca şi între Româneşti—Trifeşti, în partea central-estică a regiunii.

Acolo unde riul se deplasează mai mult spre stînga (Ştefăneşti—Româneşti, Trifeşti—Tuţora), lunca atinge lăţimi de 3—7 km. Grosimea totală a aluviunilor argilo-nisipoase, cu lentile de nisipuri şi prundişuri în bază, oscilează între 6 şi 15 m, iar pe suprafaţa sa, constituită, în mare parte, din trei trepte (1—2 m, 2—3 m şi 4—6 m) se întîlnesc numeroase cursuri vechi (Pruteţe) şi meandre părăsite, arii mlăştinoase, grinduri şi popine. Caracteristică este apoi prezenţa unor cursuri paralele, care se menţin pe distanţe de zeci de kilometri (Başeu—Prut, Jijia—Prut ş.a.).

Caracterele climei şi ale rîurilor principale. Poziţia geografică a Cîmpiei Moldovei, înfăţişarea generală a reliefului cu altitudini medii sub 200 m, cu largă deschidere spre est-nord-est şi cu o ramă înaltă ce o domină cu 200—300 m spre vest şi sud, contribuie la apariţia unor caracteristici climatice uşor deosebite de ale celorlalte subunităţi ale Moldovei extracarpătice.

Climatul temperat continental prezintă nuanţe de excesivitate, iar interferenţele influenţelor climatice ale Europei Centrale cu cele din estul continentului sînt marcate de predominarea vînturilor de nord-vest

(24%), de invaziile frecvente de aer continental dinspre est și nord-est — secetoase vara, reci și producătoare de viscole și înzăpeziri, iarna —, de caracteristicile regiunii termice, de natura precipitațiilor.

* Extinderea cimpiei de la nord la sud pe 160 km generează mici deosebiri ale valorilor componentelor climatei. Intensitatea radiației solare globale crește cu circa 3 kcal/cm²/an de la nord la sud (peste 117,5 kcal/cm² la sud de Iași), iar durata de strălucire a Soarelui — care este de peste două ori mai mică decât durata posibilă corespunzătoare latitudinii orașului Iași — crește, de asemenea, cu vreo 250 ore, ajungând la 2 150 ore/an. Aceasta este condiționată și de regimul nebulozității, cu o medie anuală de 5,5–6 zecimi, exprimat în numărul mediu anual de 40–60 de zile cu cer senin și 100–120 zile cu cer acoperit.

Temperatura aerului are valori medii de 8,3°C la Dorohoi, 8,6°C la Botoșani și 9,4°C la Iași. Mediile anuale cele mai ridicate au ajuns la 10,3°C (1930) la Botoșani și 10,9°C (1936) la Iași, iar cele mai coborâte 6,8°C și respectiv 7,1°C (1940). Diferențe asemănătoare se întâlnesc și între lunile cu cele mai ridicate ori cu cele mai scăzute temperaturi medii (iulie 19,7°C la Dorohoi, 20,1°C la Botoșani și 21,1°C la Iași; ianuarie — 4,4°C la Dorohoi, — 4,1°C la Botoșani și — 4°C la Iași). Amplitudinile medii de 24–25°C, ca și valorile absolute, atestă continentalismul termic al acestei regiuni. Temperatura maximă absolută a fost de 39,4°C (7.VIII.1952) la Botoșani și de 40°C (13.VIII.1946) la Iași, iar minima absolută de —30,3°C (1.II.1937) la Iași, amplitudinea termică absolută fiind de 75°C. La suprafața solului extremele termice au atins 66,6°C la Iași (iulie, 1969) și —34,6°C la Podu Iloaiei (ianuarie, 1963), realizându-se, astfel, o amplitudine de 101,2°C.

În mod obișnuit, primul îngheț se produce în jurul datei de 16.X. la Botoșani și 14.X. la Iași, iar ultimul la 15.VI. și respectiv, 20.IV. De multe ori datele medii amintite sînt devansate sau întrziate cu 10–30 de zile. Cel mai timpuriu îngheț s-a înregistrat la 17.IX. la Botoșani și la 10.XI. la Iași, iar cel mai târziu, primăvara, la 21.V. pentru întreg teritoriul Cimpiei Moldovei. Primele brune apar începînd de la 1.IX. în nord și 1.X. în sud, iar ultimele se produc în jurul datei de 11.IV.

Toate aceste elemente explică întîrzierea cu circa o săptămînă, de la sud la nord, a

unor date fenologice și a perioadelor optime pentru desfășurarea lucrărilor agricole. De exemplu, înflorirea mărului, care necesită o sumă de 425°C temperatură, se produce în medie între 3–6 mai; maturizarea griului de toamnă, care are nevoie de 1 490°C, se face între 3–5. VII în sud și 11–15. VII în nord; înflorirea florii-soarelui, cu un indice termic de 1 540°C, are loc între 11 și 17. VII în sud și între 18 și 24. VII în nord.

* Dacă în nord, vest și sud precipitațiile oscilează între 500 și 550 mm (569 mm la Botoșani, 526 mm la Frumusea, 518 mm la Iași), în partea nord-estică și central-estică a Cimpiei Moldovei descresc sub 500 mm (488 mm la Trușești, 452 mm la Avrămeni, 465 mm la Bivolari). În proporție de 70% ele cad sub formă de ploaie, cu excepția intervalului din ultima decadă a lunii noiembrie, pînă în ultima decadă a lunii martie, cînd se înregistrează 34–42 de zile cu ninsoare (din totalul de 118 zile posibile). Cînd cantitățile anuale de precipitații sînt distribuite normal, se asigură condiții bune de dezvoltare a vegetației și culturilor. Există, însă, multe abateri, începînd de la cantitățile medii anuale și pînă la cele diurne. După unele estimări (Elena Erhan, 1979), într-un interval de 60 de ani la Iași, doar 15% au avut precipitații de 500–550 mm, cei mai numeroși sînt anii deficitari (49%), iar cei ploioși dețin 36%.

Cele mai reduse cantități anuale de precipitații au fost 215 mm la Frumusea (1907), 240 mm la Podu Iloaiei (1924), 285,8 mm (1896) și 294 mm (1945) la Iași, 345 mm (1945) la Botoșani, ani consecutiv deficitari fiind 1894–1896, 1902–1904, 1937–1939, 1943–1946 ș.a. (fig. 167).

Ani deosebit de ploioși au fost 1901, 1912, 1932, 1940 ș.a. În 1912 au căzut 1 014 mm la Frumusea (față de media multianuală de 526 mm), 964 mm la Botoșani, iar la Iași 829 mm (1901), 805 mm (1933), 842 mm (1940), 796 mm (1970) ș.a.


Observațiile au constatat o creștere a cantităților din martie pînă în iunie și o descreștere, în continuare, pînă în februarie. Din totalul precipitațiilor, 35–40% cad vara, 23–30% primăvara, 17–23% toamna și 10–17% iarna. Lunile cele mai bogate în ploi sînt mai și iunie, uneori chiar iulie, cînd se realizează 65–75 mm lunar.

O expresie clară a nuanțelor continentale excesive ale climatului Cimpiei Moldovei o constituie ploile torențiale din sezonul

cald, care alternează adesea cu perioade de secetă. Cele mai mari cantități de apă căzute în 24 de ore sînt egale sau apropiate de cele lunare (de exemplu, 136,7 mm la Iași, la 25.VIII. 1970—adică 243,2% față de media lunară). În general, cînd precipitațiile depășesc 20 mm/24 de ore și solul este deja umed, ori cînd sînt mai mari de 40 mm/24 de ore și solul este deja umed, ori cînd sînt mai mari de 40 mm/24 de ore și

Stratul de zăpadă are o durată medie de 65—68 de zile, cu o grosime variabilă de 2—200 cm. Pentru 50% din ani, solul și culturile de toamnă sînt protejate împotriva gerurilor mari de un înveliș de zăpadă de cel puțin 5 cm. Bruma se manifestă în medie circa 40 zile/an, și dăunează culturilor atunci cînd se produce în septembrie sau în mai.

Fig. 167. Climogramă după investigațiile de la stația Iași-Aeroport. T — Temperatura medie anuală; P — precipitații medii anuale; TM — temperatura maximă anuală; Tm — temperatura minimă anuală; 1, temperatura medie lunară; 2, precipitațiile medii lunare la scara 1/2; 3, precipitațiile medii lunare la scara 1/3; 4, perioade umede; 5, perioade uscate; 6, perioade secetoase; 7, lunile cu temperaturi minime absolute < 0°C; 8, lunile cu temperaturi medii < 0°C.



cad pe un sol uscat, apar condiții de producere a inundațiilor, se pot deteriora unele culturi, sînt favorizate procesele de scurgere difuză, de eroziune a solului și de deplasare în masă.

În cursul unui an sînt, în medie, 190 de zile fără precipitații, care se pot grupa în 6—11 intervale secetoase, cu o durată medie de 14—18 zile. Cumularea acestora, mai ales în perioada vegetativă a culturilor, are influențe negative asupra recoltelor, iar statistica arată că o dată la doi ani secețele pot dura 28 de zile, iar o dată la 10 ani, 42 de zile.

Valorile evapotranspirației potențiale anuale oscilează între 600 și 700 mm, lunile mai—iulie înseriindu-se cu circa 350 mm. Deficitul anual de umiditate ajunge pînă la 150—180 mm, ceea ce necesită compensarea lui prin extinderea suprafețelor irigate.

Întreaga dinamică a atmosferei este dominată de masele de aer nord-vestice (cu o frecvență medie de 23—24%, ajungînd la 35—41% în iulie-august), urmate de cele sud-estice, cu o frecvență între 15 și 19%, și cele nordice (5—10%). Viteza medie corespunzătoare acestor trei direcții principale este de 4.1—5.7 m/s, 3.1—4.4 m/s și, respectiv, 1.7—4.5 m/s. Vînturile de nord, nord-est și est, deși au o frecvență mai redusă se manifestă, totuși, mai ales în timpul iernii, sub forma crivățului, asociat zilelor geroase și uscate sau unor viscole puternice ce dezgolesc solul expunînd culturile de toamnă la îngheț, troienesc căile de comunicație, împiedică transporturile feroviare și rutiere etc.

Numărul mediu al zilelor cu viscol este, la Iași, de 7.5. Cele mai multe zile cu viscol dintr-o lună se produc, de obicei, în ianuarie

(12 zile în 1966, 9 zile în 1967). În perioada caldă a anului, îndeosebi, în iunie—iulie, au loc fenomene orajoase ce totalizează o medie de 25 zile/an, ajungându-se uneori pînă la 58 zile/an, așa cum a fost în 1975, la Iași, cînd numai în iunie s-au produs 17 oraje.

Prutul, cu o lungime de peste 300 km pe lătura de est a Cîmpiei Moldovei, are o albie minoră sinuoasă. Uniformitatea relativă a condițiilor de mediu (și îndeosebi a celor climatice) amunte de Ungheni, care asigură o alimentare din ploi și zăpezi în proporție de circa 85%, sînt reflectate clar în regimul său hidrologic de tip carpatic și pericarpatic estic. Debitele medii anuale cresc destul de puțin către avale (67 m³/s la intrarea în țară, 72,5 m³/s la Ungheni), dar repartiția scurgerii în timpul anului are variații foarte mari (41,9% primăvara, 30% vara, 14,1% toamna și 14% iarna). Raportul între debitul maxim, la Ungheni (1 200 m³/s) și cel minim (5,56 m³/s) este de 1/220.

Construcția nodului hidrotehnic Stîncea—Costești (lac de acumulare lung de 70 km, în suprafață de 6 000 ha și un volum de 1,5 milioane m³) asigură regularizarea scurgerii — prin creșterea debitelor minime la 35 m³/s — și utilizarea mai eficientă a apei pentru irigații, alimentarea localităților, producerea de energie electrică (15 + 15 MW). Reținerea apelor mari de primăvară — vară, și digurile din avale, ridicate în ultimele decenii, au scos de sub inundații zeci de mii de hectare, iar lucrările hidroameliorative pe afluenții din sectorul Trifești—Ungheni au sporit substanțial potențialul economic al regiunii.

Jijia cu afluenții săi Sitna, Miletinul, Bahluiul, apoi Bașeul și alte cîteva riuri mici ale căror bazine hidrografice se suprapun Cîmpiei Moldovei au șesuri de dimensiuni mai modeste (200—3 000 m lățime și aluviuni predominant argiloase, cu grosimi ce rar depășesc 7—8 m), cu numeroase sectoare sărăturate ori cu excese de umiditate, cu multe parazitări laterale sub formă de conuri și glacisuri. Riurile acestea aparțin unei subunități și unui subtip aparte de regim hidrologic pericarpatic estic (subtipul Jijia), caracterizat printr-o alimentare pluvio-nivală și subterană moderată și o scurgere medie de 1—2 l/s.km². Primăvara riurile transportă, în medie, 40—50% din volumul anual de apă, iar toamna și în prima parte a iernii numai 14—15%. Afluenții cu bazine hidrografice mai mici de 300—400 km² seacă.

În timpul apelor mici nota dominantă este dată de clasa apelor sulfatate sodice, cu o mineralizare foarte ridicată (1 000—2 000 mg/l în nord și peste 2 000 mg/l în partea central-estică și de sud). Duritatea totală este ridicată (20—24° dHG) în nord și foarte ridicată în partea de sud a Cîmpiei Moldovei. Pe cursurile superioare ale Jijiei, Bașeului, Volovățului, în bazinul Bahluiului amunte de Belcești și în bazinele de la sud de Lețcani-Iași întîlnim ape bicarbonatate calcice cu mineralizare ridicată (500—1 000 mg/l). Bazinul Sitnei amunte de Sulița și bazinul Bahluietului dispun de ape bicarbonatate sodice cu mineralizare foarte ridicată, iar pe Bahlui avale de Podu Iloaiei și pe Jijia inferioară (avale de Larga-Jijia) predomină apele mixte — grupa sodiului, cu mineralizație foarte ridicată (Maria Panta-zică, 1974).

Aspectele deficitare ale resurselor hidrografice fac ca atenția specialiștilor să se îndrepte către valorificarea disponibilităților pe care le oferă Siretul pentru compensarea deficitului de umiditate din bazinele Jijiei și Bahluiului și către amenajarea complexă a rețelei hidrografice. De altfel, această problemă i-a preocupat pe localnici cu multe secole în urmă, determinîndu-i să amenajeze numeroase iazuri care constituie una dintre caracteristicile peisajului. Aici există circa 320 de iazuri cu o suprafață totală de 6 000 ha și un volum de aproximativ 185 mil. m³. Ele sînt prezente pe majoritatea văilor secundare — uneori sub formă de „salbă” — fiind utilizate pentru piscicultură, irigații, reținerea undelor de viitură. Dintre cele mai importante sînt de amintit: Dracșani (500 ha), Tansa—Belcești (352 ha), Hănești (200 ha), Negreni (172 ha), Ciurbești (154 ha), Podu Iloaiei (150 ha), Tătărășeni (122 ha), Cal Alb (118 ha), Cucuteni (108 ha), Stăuceni (100 ha), Cătămărăști (100 ha) (fig. 168).

Învelișul biopedogeografic. Deși biotopii naturali au fost înlocuiți cu întinse culturi agricole ori cu suprafețe utilizate în alte scopuri, îndeosebi vegetația constituie încă una dintre cele mai de seamă caracteristici ale peisajului, iar corelațiile morfotopedo-climatice sînt deosebit de evidente. Cîmpia Moldovei aparține, aproape în totalitate, zonei de silvostepă cu cernoziomuri levi-gate, continuată spre est-sud cu areale reduse de stepă cu cernoziomuri. În partea central-vestică, pe dealurile Copălău—Cozan-
cea—Guranda, se individualizează o prelun-

gire a domeniului forestier din Dealul Mare—Hurlău care apare ca un pînten cu soluri cenușii (argilo-iluviale), ce subîmparte Cîmpia Moldovei într-un sector nordic (silvostepa Săvenilor) și altul sudic (silvostepa Iașilor).

Condițiile naturale proprii silvostepii ocupă peste 70% din suprafața acestei cîmpii deluroase. Poziția în ansamblul Podișului Moldovei și încadrarea între stepa de pe luncele



Fig. 168. Răspîndirea iazurilor în Cîmpia Moldovei.

svîntate și terasele joase și pădurile din unitățile înalte din vest și sud, îi conferă mai mult calitatea de etaj decît cea de zonă fitopedoclimatică. Vestigiile pajiștilor întinse de odinioară se mai păstrează doar pe unii versanți, pe terenuri improprie pentru agricultură. De asemenea, arealele disjuncte cu păduri de stejar și șleauri s-au restrîns, ocupînd astăzi cîteva culmi și înălțimi de peste 180–200 m, ori unele creste mai abrupte cu expoziție nordică și nord-vestică.

Vegetația pajiștilor primare ale silvostepii, prezentă pe suprafețe discontinue subordonate culturilor agricole, se întîlnește îndeosebi pe versanții văilor Jijiei, Băseului, Sitnei, Miletinului, Bahluiului etc. și este dominată de asociațiile mezoxerofile de păiș (Festuca valesiaca, F. pseudovina, F. sulcata), cu colilie și negară (Stipa joanis, S. capillata) și alte ierburi xeromezofite și xerofite. Pe

terenurile întelenite, uneori degradate datorită proceselor de versant și pășunatului excesiv, se mai întîlnesc asociații secundare de firuță cu bulb (Poa bulbosa), firuță de finețe (Poa pratensis), bărboasă (Botriochloa ischaemum), pir gros (Cynodon dactylon), obsigă (Bromus tectorum), peliniță (Artemisia austriaca), laptele ciinelui (Euphorbia stepposa) ș.a. O sinteză a florei pajiștilor Cîmpiei Moldovei ne este oferită și de rezervația științifică „Finețele din Valea lui David”, situată la 6–7 km vest de Iași, unde, pe o suprafață de 100 ha cresc peste 400 de specii de plante cu flori. Nu sînt diferențieri notabile în componența floristică a pajiștilor din sectorul nordic, corespunzător bazinelor Jijiei superioare și Băseului, și cel sudic, suprapus bazinului Jijiei inferioare și Bahluiului.

Peisajul de silvostepă este întregit și de prezența clementelor faunistice obișnuite, la care se adaugă iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus), colonizat și specific numai împrejurimilor localității Cristești-Iași.

Solurile zonale corespunzătoare silvostepii din bazinul Jijiei sînt, în primul rînd, cernoziomurile levigate (cambice), formate pe depozite argiloase și lutoase. Ele ocupă culmile ușor ondulate cu altitudini sub 160 m, terasele și chiar unii versanți cu pante domoale. Areele cele mai întinse se suprapun interfluviilor Prut—Volovăț—Băseu, celor situate de o parte și de alta a Jijiei superioare (Dorohoi—Dîngeni), ca și interfluviilor Jijia—Prut, Jijia—Bahlui, Bahlui—Bahluiet, ori din extremitatea sudică a Cîmpiei Moldovei (la sud de Bahluiet—Bahlui). Reprezentativ este și cernoziomul levigat de la vest de Podu Iloaiei.

Variațiile reliefului și etajarea climatei și a vegetației sînt reflectate de stadiile diferite de evoluție ale acestor soluri. Concludentă din acest punct de vedere este situația de pe versantul stîng al văii Bahluiului inferior unde, pe lunca svîntată și pe celelalte forme joase — cu altitudine absolută sub 70–80 m — se întîlnesc cernoziomuri în diverse stadii de evoluție, pe terasele etajate între 80–160 m se dezvoltă cernoziomuri levigate, iar intensitatea levigării crește odată cu altitudinea. În continuare, se observă unele tranziții către solurile cenușii de pădure (argilo-iluviale), care devin dominante pe înălțimile ce depășesc 180–200 m (N. Barbu, 1974).

Prezența la suprafață, în Cîmpia Săvenilor, a marnelor argiloase volhinienne, cu textură

fină, a favorizat formarea unor soluri cernoziomice mai compacte, local chiar vertisoluri (Darabani), foarte bogate în humus însă cu o fertilitate moderată, care se lucrează greu, oferind producții corespunzătoare doar în anii ploioși.

Alături de cernoziomurile levigate, pe interfluvii pot fi întâlnite și areale reduse de cernoziomuri, cernoziomuri carbonatice, iar pe versanții înclinați cernoziomuri subțiri de pantă, soluri slab dezvoltate și erodate, soluri hidromorfe, litomorfe și, îndeosebi, salinizate.

Luncile svintate, terasele inferioare și glacisurile uscate din lungul Prutului, Băseului, Jijiei și Bahluiului, cu altitudini absolute până la 70–80 m, aparțin stepei. Poziția mult mai nordică față de limitele stepei zonale și distribuția în cadrul văilor au dus la concluzia că această unitate de vegetație trebuie considerată ca un etaj fitogeografic al Podișului Moldovei. Stepizarea datorită intervenției omului este evidentă pretutindeni. Asociațiile floristice primare au fost aproape total înlocuite prin culturi sau degradate datorită proceselor de eroziune a solului, pășunatului etc. În cuprinsul pajiștilor se întâlnesc, între altele, asociații de colilie (*Stipa lessingiana*, *S. joannis*), negară (*S. capillata*) și păiuș (*Festuca valesiaca*, *F. sulcata*), alături de care se întâlnesc tufărișuri de porumbar (*Prunus spinosa*) cu păducel (*Crataegus monogyna*) șitrandafir sălbatic (*Rosa canina*), defrișate intens în ultimele decenii. Acestei arii de stepă îi corespund solurile cernoziomice (carbonatice și semicarbonatice), cu o productivitate ridicată, care, ca și cele levigate, oferă condiții bune pentru culturile de cereale și floarea soarelui.

Dealurile mai înalte din silvostepă sint acoperite pe alocuri cu pîlcuri de pădure de stejar și gorun sau de sleauri (Rădăuți Prut, vest Vornicenii, Livenii, Zahoreni, Ciornehal, Rădenii, nord Hodora, Breazu-Iași, Aroneanu—Rădăuți Aldeii s.a.) sub care s-au format soluri cenușii (argilo-iluviale), cu fertilitate redusă.

În cuprinsul silvostepii și stepei, alături de alte formațiuni fitopedogeografice intrazonale, în lunca Prutului se dezvoltă și zăvoaie de salcie și plop, parțial regenerate prin plantații, la care se asociază și alți arbori și arbuști (de exemplu la Ștefănești—Românești, Lunca Prutului, Vladomira, Șendrenii, Medelenii, Bosia etc.).

În Cîmpia Moldovei se întâlnesc, însă, și păduri care aparțin zonei nemorale. Ele ocupă un areal important în partea central-vestică, prezentîndu-se ca o prelungire directă, spre est-nord-est, a codrilor din Dealul Mare — Hirlău.

Pădurile din dealurile Copălău—Cozancea, situate la altitudini maxime de peste 200 m, se continuă și dincolo de valea Jijiei, la Guranda și Dobirceni. Componenta lor este dominată de prezența stejarului (*Quercus robur*), care se asociază și cu alte foioase. Pe înălțimile cele mai mari și în partea de vest a acestui pînten forestier, se mai adaugă gorunul (*Quercus petraea*) și chiar fagul (*Fagus sylvatica*). Prin defrișările făcute de-a lungul timpului, în cuprinsul său și, îndeosebi, la nord și sud de suprafețele împădurite s-au extins terenurile agricole și pajiștile stepizate.

Învelișul pedogeografic de sub arboretele compacte ale pîntenului deluros Copălău—Cozancea—Guranda și din sectoarele adiacente este format din soluri cenușii și brune podzolite, care capătă o extindere apreciabilă în cuprinsul Coastei Moldave și a ramei înalte a podișurilor din vest (N. Bucur și N. Barbu, 1961). Aceste soluri cubazice, cu un conținut moderat de substanțe chimice, au o troficitate mijlocie, pretîndu-se la diferite culturi agricole.

6.2.2.2. Populația și așezările

După *Condica Liuzilor* (1803), în Cîmpia Moldovei trăiau circa 123 000 de locuitori. Pînă la această dată, la creșterea populației au contribuit atît sporul natural ridicat, cît și cel migratoriu, cauzat de curenții de împopulare cu ungureni, munteni, cordunenii sau ceangăii, secui, rutenii, evreii și bulgarii. Aceste migrații au contribuit la înmulțirea odăilor și apoi a satelor, la o mai bună repartitie a populației în raport cu suprafața agricolă. Dacă la 1859 sint înregistrați 337 717 de locuitori, înscrind o densitate medie de 49 loc./km², în 1912 populația ajunge la 426 615, iar densitatea la 56 loc./km². Începînd cu partea a doua a secolului XIX, suprafețele agricole se extind, migrația sezonieră pentru lucru se accentuează și se iau o serie de măsuri administrativ-funciare, care contribuie la creșterea populației, astfel că în 1930 populația totalizează 544 769 de locuitori, iar densitatea 72 loc./km². Pierderile din timpul celui de-al doilea război mondial se refac abia pînă în 1956.

În 1977 erau înregistrați 921 328 de locuitori (120 loc./km²), iar în 1980 948 367 124 loc./km²). Pe ansamblul mediului rural densitatea medie este doar de 70 loc./km², oscilând, însă, între 45 (Dîngeni) și 154 loc./km² la Podu Iloaiei. Aproape jumătate din numărul comunelor au densități cuprinse între 60 și 80 de locuitori. Densitățile mai mici se întîlnesc în partea nordică, iar cele mai mari în partea sudică.

Între 1932 și 1942, natalitatea a fost de 36,4‰ (peste media țării, de 29,8‰), iar după scăderea din perioada 1960—1966, a crescut din nou, fiind acum printre cele mai ridicate din țară. Mortalitatea, ridicată în trecut, a scăzut continuu pe măsura îmbunătățirii nivelului de viață și a asistenței sanitare: de la 21‰ între 1932 și 1942 la 9‰ în prezent. Sporul natural, deși a avut oscilații, a scăzut continuu, ajungînd, în 1980, la 12‰ în sectorul nordic al Cîmpiei și la 15,5‰ în cel sudic. În acest context, unitatea se menține încă la un nivel superior mediei țării, exprimînd o vitalitate mare și constituind un rezervor de forță de muncă. Soldul migratoriu a avut o evoluție care a avantajat mediul urban, dezavantajînd mediul rural, prin cunoscutele procese de feminizare, îmbătrînire și deprofesionalizare a populației. Pînă la al doilea război mondial (și chiar pînă în 1955—1960) volumul migrației era neînsemnat. Dar industrializarea rapidă asociată cu urbanizarea s-au răsfrînt puternic și în mobilitatea profesională și teritorială a populației, rupînd echilibrul demografic și generînd curenți de plecare definitivă spre ariile endodinamice ale țării sau spre orașele proprii (Iași, Dorohoi și Botoșani). Orașele mici (Hîrlău, Tîrgu Frumos, Darabani și Săveni) au avut mult timp un comportament rural. La nivelul anilor 1979 și 1980 orașele din nord par a înregistra un fenomen de saturație, începînd să înregistreze deficite migratorii. Intensitatea plecărilor este mai mare în partea nordică în raport cu partea sudică, unde, pe comune, o frecvență mai mare o au soldurile negative de la -15‰ la -25‰. Soldul total redă foarte clar aspectele creșterii sau descreșterii populației pe comune și arii, raportată la cîteva momente caracteristice. În anul 1955, cînd industria mare abia se înfiripa, numai în două comune scăzuse populația. În perioada 1960—1966, datorită dezvoltării forțate a industriei, migrația definitivă s-a amplificat, iar numărul

comunelor în care populația scade ajunge la 13. În anii 1967—1968, are loc o redresare a natalității, soldul total devenind pozitiv pentru toate localitățile. În 1973, datorită reducerii natalității și amplificării plecărilor, populația a scăzut în 40% din comune, cele mai multe aparținînd părții nordice. În anul 1980, deficitul a crescut deoarece 80% din numărul comunelor au înregistrat scăderi ale populației. În afară de orașe, creșteri au avut doar localitățile din jurul Iașului (Belcești, Vlădeni, Flămînzii) și alte cîteva comune, în majoritate, din sectorul sudic.

Populația activă era angajată în proporție de 47,8% în agricultură, de 29,4% în industrie și construcții, de 22,8% în servicii. În cadrul localităților deosebiri sînt însă mari, în sensul că există comune în care activitățile industriale și de construcții concentrează sub 5% din populația activă (Plugari, Mîtoc ș.a.) sau depășește 25%, ca în cazul comunelor Curtești, Răchiți, Holboca, Reditu și Tomești. La orașe proporțiile sînt superioare: 59% la Botoșani, 52% la Dorohoi și 57% la Iași. În ansamblu, această structură redă schimbarea profilului economic al Cîmpiei Moldovei de la predominant agricol la un profil agricol-industrial în continuă evoluție.

Așezările se găsesc pe cele mai diverse forme de relief: platouri, coaste, terase, hîrtoape, șesuri și grinduri. Evoluția numărului și dispersia au fost condiționate și de schimbările de vetre, lăcările de sate, schimbul de sate între proprietari, crearea odăilor și slobozilor, de împrumutările de la 1864, 1887 și 1921 care au contribuit la fixarea populației și la formarea de sate noi. Construcția de căi ferate a favorizat și fenomenul de „roire” a populației din satele izolate spre calea ferată. Documentele din secolele XIV și XV atestă cele mai multe așezări existente și în prezent, care formează cîteva grupări, mai mari, de sate: — gruparea din Coasta Iașului și bazinul inferior al Bahluiului, unde peste jumătate din satele existente sînt atestate încă din secolul XV (Crivești, Buznea, Dădești, Lunгани, Sinești, Goiești, Păușești, Prigoreni, Gănești, Vorovești, Scoposeni, Proselnici, Bogdănești, Hărpășești, Bucium, Vlădiceni, Tomești, ș.a.); gruparea din vecinătatea ariei împădurite Copalău—Cozancea—Guranda (Dobîrceni, Cișmănești, Brăteni, Mihălășeni, Brăești — atestat la 1400—, Vișorenii, Stroești, Gîrbești, Băbicieni, Jumătățeni,

continuată spre Prut cu Băbicieni și Bădiuți); gruparea sau aliniamentul de pe contactul cu Podișul Sucevei (Băbicieni, Coțnari, Hirlău, Deleni, Rădeni, Vlădeni-Deal, Șendriceni, Mănăstirea Doamnei, Cătămarăști, Cervicești, Brăești, Văculești, Șendreni, Corjeuți, Cristinești, Hudești, Ivăncăuți ș.a.); gruparea din fosta plasă a Turiei (Ciulinesti, Cîrniceni, Moimești); gruparea de pe Prut (Berești, Chiperești, Țuțora, Ungheni ș.a.); gruparea din bazinul Miletinului (Șipot ș.a.); gruparea din bazinul Bașcului (Balinți, Drăgășeni, Podriga, Știubieni, Petricani, Boroica, Vlăsinești, Bozieni, Nichiteni ș.a.); gruparea din bazinul superior al Jijiei (Miclăușeni, Mateeni, Verbia, Călugărenii Vechi ș.a.). Numărul satelor a crescut continuu, așa încît pe harta lui Bawr (1774) apar 270 de localități, în *Condiția Liuzilor* (1803) sînt înregistrate 345 de sate și odăi, iar în 1859 numărul satelor ajunge la 500. După această dată, în Cîmpia Moldovei s-au mai întemeiat 130 de sate, dispersate printre cele vechi. După 1968, rămîn 554 de sate, multe dintre acestea și-au pierdut identitatea prin dezvoltarea vetrelor și comasarea cu altele mai mari. Densitatea de 7 sate/100 km² este superioară mediei pe țară. Cele mai numeroase sînt satele mici: 34% sub 500 de locuitori, iar 29% între 500 și 1 000 de locuitori. Satele cu 1 000—2 000 de locuitori dețin 26%, iar cele cu peste 2 000 de locuitori numai 11%. După structură predomină două tipuri principale: satele adunate (unele chiar cu forme geometrice) și satele răsfrînte (pe coaste și văi), dintre care unele au tendință spre risipire, iar altele spre tipul adunat. Structura risipită apare în arealele de podgorie (Tomești, Bucium, Coțnari etc.). Modificări importante s-au produs în structura profesională a populației active, pe măsura dezvoltării în mediul rural a activităților neagricole, sau printr-o migrație diurnă din sate spre orașe. Majoritatea satelor au o funcție predominant agricolă (peste 75% populația activă în agricultură) (fig. 169).

Unele sate evoluează spre orașe (Flăminzi, Ștefănești, Vlădeni și Podu Iloaiei), iar altele spre centre de polarizare regională: Ripiceni, Trușești, Hlipiceni, N. Bălcescu, Mitoc; marea majoritate, însă, are un profil agricol cerealier — zootehnic sau cerealier — pomiviticol (Coțnari).

În cuprinsul Cîmpiei Moldovei populația urbană este concentrată în 7 orașe, care


însușează mai mult de 540 000 locuitori dintre care peste 63% se află numai în Iași. Celelalte orașe se înscriu în categoria celor mici și mijlocii.

6.2.2.3. Activitățile economice

Agricultura și peisajul geografic. Reforma agrară din 1864 a impulsionat extinderea culturilor, astfel că numai în partea de nord, în fostele județe Dorohoi și Botoșani, între 1864 și 1905 suprafețele însămînțate cu grâu au crescut de 1,8 ori, cu porumb de 2,2 ori, cu orz de 3,6 ori și cu ovăz de 4,1 ori. Terenurile cultivate reprezentau în 1905 circa 52% în județul Botoșani și 63% în județul Dorohoi. Începînd cu secolul XX se vor cultiva pe suprafețe tot mai mari: rapița, fasolea, mazărea, bobul, linteaa, cartoful, sfecla de zahăr, legumele și zarzavaturile. Ierarhia culturilor (după suprafață) din partea sudică, în anii începutului de secol, era relativ asemănătoare cu cea din partea nordică. Ordinea la primele culturi era aceeași: porumb, grâu, orz și ovăz; după acestea urmau floarea-soarelui, rapița (peste 1/2 din cea a țării), cartoful și sfecla de zahăr, în sud și cartoful, secara, sfecla de zahăr și rapița, în nord. Se remarcă profilul predominant cerealier, în care cerealele secundare jucau un rol important: orzul se cultiva pe circa jumătate din suprafața destinată grîului, iar împreună cu secara, totaliza aproximativ 100 000 ha (de 10 ori mai mult decît în prezent). Agricultura avea un caracter extensiv, inventarul agricol fiind redus și rudimentar. Răscoala țărănească din 1907, începută aici, la Flăminzi, este expresia fidelă a înecității ce domnea în agricultură, a exploatării moșierești, a productivității agricole scăzute. În ultima perioadă agricultura se găsește într-un continuu proces de schimbare, de profilare și specializare, de găsire a celor mai bune metode și forme de creștere a rentabilității și productivității. În prezent suprafața amenajată pentru irigație (din luncile Prutului, Bahluiului, Bahluietului, Jijiei și Bașcului) este de peste 20 000 ha.

Au fost create stațiuni de cercetări pentru ameliorarea soiurilor de plante și a raselor

Fig. 169. Mărimea și funcțiile așezărilor din Cimpia Moldovei. 1, Așezăr agricole; 2, agroindustriale; 3, agricole și de servicii; 4, alte funcții; A, populația pe grupe de vîrstă și sexe.



de animale la Iași, Podu Iloaiei, Tîrgu Frumos, Botoșani, Albești și Dorohoi.

Din suprafața totală a Cimpiei Moldovei terenurile agricole reprezintă 80,9%, pădurile 11%, iar celelalte categorii de utilizare 8,1%. În structura agricolă se detașează suprafața ocupată cu culturi (58,4%), după care urmează cele ocupate cu pășuni și finete naturale (19,6%), vii (1,8%) și livezi (1,1%) (fig. 170).

Cele mai întinse suprafețe agricole se găsesc în ariile centrale ale celor două părți ale Cimpiei Moldovei — de nord și de sud. Tot aici se întâlnesc și cele mai întinse terenuri destinate culturilor de cîmp. La contactul cu podișurile din vest și sud, pădurile, pășunile, și finetele naturale, vița de vie și pomii fructiferi au o extensiune mai mare și reduc terenul arabil din unele comu-

ne la sub 30% (Tomești, Bîrnova, Sinești). Cultura cerealelor reprezintă subramura de bază, deși ponderea suprafeței cultivate a scăzut de la 79% în 1935 la 64% în 1980. Porumbul se cultivă anual pe circa 175 000 ha (36%) și apare în toate comunele. Grîul se cultivă pe 100 000 ha (24% din suprafață), în toate comunele. Creșterea continuă a producției medii la ha a fost condiționată și de introducerea în cultură a unor soiuri noi mai productive și mai rezistente la variațiile climatice, la boli și dăunători, iar unele mai bine adaptate la terenurile înclinate. Celelalte cereale dețin suprafețe relativ mici: orzul 8 000—10 000 ha (2,0%), ovăzul 2 000 ha (0,5%). Floarea-soarelui, relativ pretențioasă la condițiile pedoclimatice, se cultivă pe circa 31 000 ha (7,0%), iar producția este dirijată spre fabrica de ulei




Fig. 170. Utilizarea terenurilor în Cîmpia Moldovei. 1, Terenuri arabile; 2, vii; 3, livezi; 4, pășuni și fînețe; 5, păduri; A, proporția terenului arabil.

din Iași. Sfecla de zahăr, plantă ce preferă terenurile netede sau ușor înclinate, temperaturi medii de vară de 19°C , precipitații de 350 — 650 mm în perioada de vegetație, soluri cernoziomice și aluvionare, se cultivă pe aproximativ 18 000 ha (4,2%). Prelucrarea se face la Bucecea. Repartiția culturii este în funcție atât de condițiile naturale, cât și de prezența forței de muncă

și a transportului mai rentabil pe calea ferată decît pe cea rutieră.

Pe suprafețe mici se cultivă cartoful (2,6%) cu soiuri timpurii și semitimpurii, semitîrzii și tîrzii, legumele și zarzavaturile (1,8%), leguminoasele pentru boabe (2%), inul pentru ulei, plantele medicinale și aromatice și culturile furajere (14%).

Pășunile și fînețele naturale acoperă circa 150 000 ha, contribuția lor la dezvoltarea

zootehnicii este relativ limitată deoarece sînt incluse în această categorie, pe lîngă pășunile din lunci (relativ bune) și o serie de terenuri în pantă, degradate și frîmțitate de alunecări și ogașe. Culturile de viță de vie (14 000 ha) valorifică deosebit de rentabil o serie de versanți cu expunere estică, sudică și sud-estică din sudul și sud-vestul Cîmpiei Moldovei, unde condițiile pedoclimatice sînt cele mai favorabile. Viile de la Hîrlău și Cotnari sînt atestate încă de la 1448, iar cele de la Buciun de la 1538. În jumătatea de nord a cîmpiei suprafețele cu vii sînt relativ reduse, mai mari sînt în partea sudică, unde se conturează două podgorii: Iași și Cotnari. Podgoria Iașului (Iași 1 120 ha, Aroneanu 300 ha, Birnova 440 ha, Rediu 175 ha, Tomești 400 ha, Miroslova 265 ha și Holboca 115 ha) este specializată pentru vinuri albe, cultivîndu-se soiurile Fetească albă, Aligoté, Busuioacă, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling italian, Fetească regală ș. a. și însumează 2850 ha (23%).

În podgoria Cotnari (fig. 171) (Cotnari 1 800 ha și 1 700 ha în comunele vecine) se cultivă Grasa de Cotnari, Feteasca albă, Frîncușa și Busuioaca. Podgoriile Iași și Cotnari dețin 40% din viile Cîmpiei Moldovei. Prelucrarea strugurilor se face în combinatele de la Iași și Cotnari, precum și în unități mai mici la Tomești, Voinesti, Podu Iloaiei, Vlădeni, Movileni, Proboata, Tirgu Frumos, Belcești, Hlipiceni, Trușești, Botoșani, Frumușica și Ungureni (fig. 172).

Pomicultura, o preocupare străveche, era practică în trecut, cu precădere, în gospodăriile populației. În ultimele decenii mai ales pe terenurile improprii pentru cereale și plante tehnice s-au creat plantații pomicole în masiv, sistematizate și specializate. Suprafața pomicolă este de 8 650 ha, din care cea mai mare parte revine părții sudice, unde se detașează ariile Iași (Iași, Birnova, Tomești, Miroslova, Popricani) cu 1 530 ha, și Cotnari cu 1 665 ha (Cotnari 665 ha, Deleni 525 ha, Hîrlău, Ceplenița și Scobinți) ce dețin 40% din livezile Cîmpiei Moldovei. Suprafețe întinse sînt și la Strunga (635 ha), Curtești (350 ha) și Șendriceni (170 ha). În partea nordică livezile sistematizate sînt mai rare și producția mai redusă decît în cea sudică. În structura culturilor predomină mărul (39%) și prunul (37%). O parte a producției de fructe este prelucrată în fabricile de la Iași, Hîrlău, Botoșani, Dorohoi.

Creșterea animalelor ocupă locul secund după cultura plantelor. Bovinele au o densitate medie de 50 capete la 100 ha teren agricol. Aproape jumătate din efectiv sînt vaci cu lapte care se crește în fermele IAS și în complexele intercooperatiste. Porcinele se înscriu cu o densitate medie de 73 capete la 100 ha teren arabil, mai mare în apropierea fermelor de la Leorda și Tomești, mai redusă în părțile nordice și sudice ale cîmpiei. Ovinele și caprinele (785 000 capete) au repartiție ceva mai uniformă, dar strîns legată de repartiția pășunilor și finetelor naturale. Densitatea medie este de 138 capete la 100 ha teren agricol, dar variază de la 50 capete în comunele din jurul Iașului, pînă la 250—300 capete la 100 ha teren agricol la Brăești-Iași, Hlipiceni, Deleni, Movileni, Bălțați. În cadrul IAS funcționează 21 de ferme de ovine, specializate în producția de carne, lînă fină și semifină și pielele. Consumul de carne din Iași și Botoșani a condiționat construirea de ferme de mare capacitate pentru creșterea păsărilor la Uricani—Miroslova, Cătămărăști—Mihai Eminescu.

Cîmpia Moldovei dispune de o bază meliferă foarte variată și bogată. Valoarea nutritivă a mierei a dus la revitalizarea acestei ramuri (decăzută după descoperirea fabricării zahărului). Există circa 40 000 familii de albine, iar producția medie pe stup este de 25—30 kg. Prin apariția unor acumulări de apă (Drașani, Negreni, Hănești, Hudești, Mileanca. Tătărășeni, Stăuceni, Podu Iloaiei, Ciurbești, Cătămărăști ș.a.) și a unor pepiniere piscicole la Hănești, Stăuceni și Podu Iloaiei pescuitul s-a dezvoltat mult în ultimele decenii.

După gradul de favorabilitate a terenurilor și intensitatea activităților agricole, inclusiv structura producției, s-au delimitat opt subzone de producție agricolă:

— *nordică*, de cultură a cerealelor și plantelor tehnice (porumb, grîu, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui) și de creștere a bovinelor, corespunzătoare ariei deluroase dintre Darabani și Dorohoi;

— *nord-vestică*, de cultură a cerealelor, plantelor tehnice, legumelor și de creștere a animalelor cu caracter mixt, suprapusă peste aria de contact dintre Dorohoi și Curtești-Botoșani; în jurul orașelor s-au format zone preorășenești cu ferme specializate în producția de legume, fructe, lapte, carne și ouă;




Fig. 171. Podgoria Cotnari. 1, VII; 2, livezi; 3, pășuni și fânețe; 4, păduri; 5, alte solosiște; 6, gospodării; 7, drumuri; 8, cale ferată.




Fig. 172. Podgoria Cotnari — Plantații viticole în Dealul Plăiesului (foto C. P. B.).

— *central-vestică*, de cultură a cerealelor și plantelor tehnice și de creștere a ovinelor, situată la contactul dintre Curtești și Deleni și bazinul superior al Miletinului;

— *sud-vestică*, cerealier-pomi-viticolă, situată între Deleni și Strunga; viile și livezile (peste 6 000 ha) reprezintă circa 1/4 din întreaga suprafață cu vii și livezi a câmpiei;

— *sudică*, de cultură a cerealelor, florii soarelui, plantelor furajere și de creștere a oilor, aflată în aria dintre Strunga și Ciurea; potențialul natural este mai scăzut și lipsesc fermele specializate;

— *sud-estică*, sau zona preorășenească a Iașului, bine dezvoltată, cu o agricultură intensivă, cu numeroase ferme specializate în culturi de câmp, vitipomicole și de legume, cu ferme de creșterea vacilor, porcilor, oilor și păsărilor; are patru sectoare profilate pe cereale, legume, lapte și carne în nord; pe cereale, cartofi, legume, struguri, fructe, lapte, păsări în vest; pe cereale, lapte, carne, lână, în est și pe struguri, fructe, carne în sud;

— *central-sudică*, de cultură a cerealelor, florii-soarelui și de creștere a bovinelor și ovinelor, din bazinul inferior al Jijiei;

— *central-nordică*, de cultură a cerealelor, plantelor tehnice (sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, plante medicinale, in) și de creștere a bovinelor, porcinelor și oilor; ocupă suprafața cea mai mare, corespunzând părții centrale a Cîmpiei Jijiei superioare și a Băseului.

Activitatea industrială. Deși o serie de ateliere de manufactură apăruseră încă de la sfîrșitul secolului XVIII, dezvoltarea industriei a fost, totuși, frînată de persistența îndelungată a relațiilor feudale și a monopolului turcesc, de lipsa căilor ferate și a capitalului autohton, de pătrunderea celui străin, la care se adaugă concurența străină, crizele economice și distrugerile provocate de război. Chiar dacă pînă la obținerea independenței țării au fost evenimente care au acționat favorabil (înlăturarea monopolului turcesc; reforma agrară, promulgarea unor legi de încurajare și protejare a industriei naționale), rolul lor a fost limitat și revoluția industrială se va face simțită abia spre sfîrșitul secolului XIX. Primele unități mai mari au fost de industrie alimentară și textilă: fabrica de bere, Iași (1786), moara de la Iași (1841), fabrica de frîghii de la Iași (1886), fabrica de zahăr de la Ripiceni (1900), „Țesătura” din Iași (1910). La acestea, treptat, s-au adăugat

unități și de alt profil industrial: centrala de energie electrică din Iași (1899), atelierle de reparat material rulant „Nicolina” (1896 — 1905), fabrica de tricotaje „Moldova” din Iași (1907) etc. Aceste „fabrici” (de fapt niște ateliere) erau localizate cu precădere în Iași și antrenau un număr mic de lucrători. Spre exemplu, în 1885, la Iași funcționau 36 de fabrici la care lucrau doar 532 de persoane. În perioada 1925—1935, în toată Cîmpia Moldovei au funcționat circa 100 de fabrici, din care 65 erau în Iași și 20 în Botoșani. Industriile textile și alimentară dețineau 2/3 din numărul lor și 83% din numărul lucrătorilor din industrie.

După 1947 se construiesc noi unități industriale.

Primele unități apărute după naționalizare au fost: întreprinderea poligrafică din Iași (1948), fabrica de confecții din Botoșani (1949) și uzinele textile „Moldova” din Botoșani (1951). Ulterior au început să fie construite întreprinderi cu o capacitate mai mare de producție din diferite ramuri economice.

Comparativ cu perioada antebelică, industria actuală a înregistrat și un proces de modernizare și de amplasare mai rațională în cadrul orașelor Iași, Botoșani și Dorohoi, unde s-au creat adevărate platforme industriale.

În dezvoltarea industrială a județelor Botoșani și Iași s-a avut în vedere o repartiție mai echilibrată a forțelor de producție, în teritoriu, existența bazei de materii prime, cit și potențialul de forță de muncă din Moldova de nord; unele ramuri industriale s-au putut aproviziona numai cu materii prime locale. Agricultură pune la dispoziție cereale, plante tehnice, fructe și struguri, legume și zarzavaturi, miere, lapte, carne și ouă, pentru industria alimentară. Din numeroase cariere se extrag nisipuri, gresii, argile și calcare necesare industriei sticlei, materialelor de construcții și modernizării drumurilor. Producția de in și cîneapă, lână și piei de animale servește, parțial, industria ușoară. Exceptînd legăturile de producție și de cooperare între întreprinderi, se constată, totuși, că industria grea și chiar cea ușoară apelează la cantități mari de materii prime din alte regiuni: fontă, oțel și laminate pentru producția de utilaje grele, țevi, mașini unelte, piese de schimb, șuruburi ș.a.; diferite extracte pentru antibiotice, produse chimice pentru fabricarea firelor și fibrelor sintetice; buin-

bac și lină, celofibră și coloranți pentru industria textilă; energie electrică, gaze naturale, produse petroliere și cărbuni ș.a.

Aprovizionarea cu apă industrială se face din văile Moldovei, Prutului (pentru Iași) și Siretului (pentru Botoșani, Dorohoi și Hirlău). Tot de la mare distanță se aduc și cheresteaua de rășinoase, masele plastice. Potențialul de forță de muncă calificată este ridicat și a fost recrutat atât din orașe, cât mai ales din mediul rural. Navetismul în industrie este relativ redus.

Pe ansamblu, între 1960 și 1985, valoarea producției industriale a crescut de mai multe ori, cele mai mari creșteri înregistrându-se în metalurgie, construcții de mașini, chimie, industria alimentară. Cele mai mari creșteri le-au avut orașele Iași, Botoșani, Dorohoi, Tirgu Frumos și Darabani. Creșteri mai mici au avut orașele Hirlău și Săveni. În industrie ponderea cea mai mare revine industriei grele (61,5%), mare consumatoare de metal, apă și energie electrică, fapt ce duce la unele perturbări ale activității economice și sociale.

În funcție de ponderea ramurilor, profilele centrelor industriale apar diferit. Astfel, orașul Iași are un profil axat pe industria chimică, metalurgie, construcții de mașini, industria textilă și alimentară. Orașul Botoșani este profilat pe construcții de mașini, industrie textilă, confecții și industrie alimentară. La Dorohoi predomină materialele de construcții, confecțiile și ramura alimentară, acestea reprezentând 88%. La orașele mai mici profilul industrial este mai simplu: Tirgu Frumos — industria confecțiilor și încălțăminte, industria alimentară; Hirlău: industria textilă, alimentară; Săveni: industria alimentară și confecții; Darabani: industria alimentară, industria textilă, confecții și prelucrarea lemnului.

Industria energiei electrice este reprezentată prin centrala electrică de termoficare Iași (150 MW) și hidrocentrala de la Stîncea-Costești (15 MW partea română).

Industria metalurgică s-a dezvoltat la Iași, începând cu anul 1963. Aici se fabrică țevi sudate și profile ușoare îndoite la rece. Tot aici a intrat în producție și o oțelărie electrică. Industria constructoare de mașini și a prelucrării metalelor deține primul loc cu 1/4 din industria regiunii, deși a apărut destul de târziu (sfârșitul secolului XIX). În 1939 în industria Iașului, de exemplu, deținea o pondere doar de 0,50%. În prezent are o repartiție largă și se remarcă

printr-o gamă foarte mare de produse, destinate atât pieței interne, cât și celei externe (fig. 173).

Industria chimică, reprezentată în trecut doar prin câteva ateliere de luminări, săpun, lacuri și vopsele, a ajuns pe locul al doilea (18,5%). În structura producției menționăm: fibre și fire sintetice — poliesterice și poli-propilenice, antibiotice și biostimulatori, produse din mase plastice la Iași și articole tehnice din cauciuc — la Botoșani; industria de exploatare și prelucrare a lemnului reprezentată prin întreprinderea forestieră de exploatare și transport — Iași, fabrica de cherestea de la Ciurea, fabricile de mobilă de la Iași și Cătmăraști — Botoșani, acestea oferind o gamă largă de produse (cherestea, butoaie și traverse, mobilă curbată și mobilă stil). Industria materialelor de construcții, care produce materiale necesare construcției obiectivelor economice și sociale, a locuințelor și a căilor de comunicație, și-a mărit producția, față de 1960, de câteva zeci de ori (1986). Ramura este specializată în corpuri de iluminat, cristal, sticlă colorată și porțelan — menaj din Dorohoi, cărămizi, țigle, prefabricate din beton și blocuri ușoare de zidărie (Iași). Industria textilă și a confecțiilor a fost și a rămas o ramură de bază a industriei care și-a diversificat și mărit producția oferind țesături de bumbac, de mătase și tip mătase (Iași), de bumbac în amestec cu celofibră și poliester (Botoșani), fire și țesături subțiri de in (Botoșani). În ultimii ani au intrat în producție și filaturile de vigonie (Vlădeni), de bumbac (Darabani) și melană (Botoșani). Producția de confecții se realizează la Iași, Botoșani și Dorohoi, iar tricotajele la Iași și Tirgu Frumos. Industria pielăriei, blănăriei și încălțăminte s-a sprijinit pînă acum pe cooperativele meșteșugărești, dar recent a început să producă o fabrică modernă la Tirgu Frumos. Industria alimentară, care are tradiții îndelungate, se remarcă printr-o repartiție largă și o gamă variată de produse care se obțin atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Mari unități de morărit și panificație funcționează la Iași, Botoșani, Dorohoi și Săveni; prelucrarea cărnii se face în abatoarele din Iași, Răchiți — Botoșani, Dorohoi și Hirlău; tot la Botoșani se prelucrează și peștele. Producția de lapte se concentrează spre unitățile de industrializare din Iași, Botoșani, Dorohoi și Săveni. Prelucrarea legumelor și fructelor se face în unitățile




Fig. 173. Industria în Cîmpia Moldovei. 1, Exploatări de gresie; 2, calcar; 3, nisip și balast; 4, argile și luturi; 5, cărămidărie; 6, morărit; 7, panificație; 8, morărit și panificație; 9, vinificație; 10, nutrețuri combinate; 11, filatură de bumbac; 12, filatură de vigoine; 13, centrală electrică; 14, energie electrică; 15, metalurgie; 16, construcții de mașini; 17, chimie; 18, prelucrarea lemnului; 19, materiale de construcții; 20, textilă; 21, confecții; 22, pielărie și încălțăminte; 23, alimentară; 24, alte ramuri; 25, cale ferată; 26, drum modernizat.

de la Iași, Hirău, Botoșani, Dorohoi și Săveni. Industria băuturilor se sprijină pe combinatele de la Iași și Coțnari și pe unitățile mai mici din Botoșani, Hlipiceni, Trușești, Frumușica, Ungureni și Vlădeni. Tot la Iași se mai fabrică bere, spirt și țigarete.

Nutrețurile combinate se obțin la Iași, Botoșani și Leorda.

În afară de unitățile industriei republicane (care deține aproximativ 95% din valoarea globală a producției) și industriei locale (2,5%), în Cîmpia Moldovei funcțio-

nează cooperative meșteșugărești ce folosese forța de muncă și materiile prime locale și participă cu o parte din producție chiar la export (eu încălțăminte, confecții, textile, timplărie și mobilă, confecții metalice, covoare persane, marochinărie, olărie neagră, împletituri).

O parte a producției industriale este destinată exportului. Aria de export cuprindea cu câțiva ani în urmă : 24 state europene, 16 state asiatice, 12 state africane, 6 state americane, Australia și Noua Zeelandă. Orașul Iași exportă produse metalurgice și antibiotice, țesături și tricotaje, fibre și fire sintetice și țevi sudate. Industria orașelor Botoșani și Dorohoi valorifică la export utilaje electrice de joasă tensiune, războaie de țesut, articole tehnice de cauciuc, melanj, mobilier, țesături de in, produse din sticlă și porțelan, confecții și produse alimentare.

Orientarea și conexitatea rețelei căilor de comunicație au fost influențate puternic atât de condițiile naturale, cât și de cele economice și istorice.

Căile ferate s-au construit începând din ultimele decenii ale secolului trecut și au ajuns la o lungime de 309 km cu o densitate de 4,2 km la 1 000 km².

Amenajarea căilor rutiere este o preocupare de dată recentă, rețeaua creată, ajunsă la 2 700 km, a fost supusă, și în ultimele decenii, unor importante lucrări de organizare, sistematizare și modernizare. Densitatea medie este de numai 35 km/100 km².

Din lungimea totală a rețelei, 30% este asfaltată, 38% este pietruită iar 32% încă neamenajată. Transportul de călători cu autobuzele a crescut pe măsura modernizării drumurilor și creșterii puterii de atracție a orașelor. Lungimea totală a rețelei rutiere pentru autobuze este de 1 520 km, dar traseele de autobuze servesc direct doar 46% din numărul vetrelor de sat.

Cu toate că, sub aspectul peisajului geografic, Cîmpia Moldovei apare ca cea mai omogenă subunitate a Podișului Moldovei, diferențierile fizico- și economico-geografice permit delimitarea, în primul rând, a două subunități: Cîmpia Jijiei superioare și a Bazei și Cîmpia Jijiei inferioare și a Bahluiului. În cuprinsul fiecăreia se pot delimita și alte subdiviziuni de ordin inferior (mai evidente sub raport fizico-geografic). Limita dintre cele două subunități corespunde în cea mai mare parte cu o limită fizico-geografică, dar și cu una administrativă (dintre județele Iași și Botoșani).

6.2.2.4. Cîmpia Jijiei superioare și a Bazei

Ocupă partea nordică a Cîmpiei Moldovei, dincolo de linia sinuoasă ce trece prin localitățile Nicolae Bălcescu—Chițoveni—Prisăcani—Hlipiceni—Rînghilești—Bogdănești. În literatura de specialitate pentru acest spațiu se folosesc, uneori, și numirile de „dealurile”, „cîmpia” ori „silvostepa” Săvenilor. Aici relieful este mai înalt și mai slab fragmentat decît în sud, predomină colinele cu poduri largi dezvoltate pe un substrat argilo-nisipos volhinian. Predomină înălțimile între 200 și 250 m, iar pe alocuri ajung la 270 m (Dealul Bodron). Cuestele sînt mai puțin tranșante, datorită substratului geologic omogen și rețelei hidrografice puțin evoluată, în cea mai mare parte adaptată la structura monoclinală. Terasa ocupă areale discontinue foarte restrinse. Pe fondul peisajului de silvostepă se inseriu și cîteva enclave de pădure, mai mult decît în partea sudică. Climatului are o nuanță ușor mai răcoroasă decît în sud, cu temperatura medie anuală de 8,4°C (ianuarie —5,1°C, iulie 20,1°C) la Dorohoi. Aici s-au înregistrat numai 17 zile „tropicale” și 72 de zile de „vară”, dar 132 de zile cu îngheț. Anual cad, în medie, 548 mm de precipitații din care 377 mm în perioada de vegetație. Vînturile de vest au frecvența cea mai mare (25%). În general, desprîmăvărarea, ca și unele aspecte fenologice indică aici întîzieri de circa o săptămînă. Nota dominantă pe care o imprimă unele sau altele dintre componentele peisajului în diferite sectoare ale Cîmpiei permite diferențierea unor subdiviziuni, dar care au limite difuze. Cîmpia deluroasă a Săvenilor cuprinde partea central-nordică, cu excepția văii Prutului din amunte de Ștefănești și a unei fișii cu lățime pînă la 10—15 km din apropierea ramei înalte din vest. Culmile calcareoase Rîpiceni—Stîncea, corespunzînd sectorului epigenetic al văii Prutului, sînt reprezentate prin cîteva „stînci” izolate, care domină terasele și albiile săpate în calcare recifale buglovienice ale unor afluenți. Depresiunile Dorohoiului și Botoșanilor sînt constituite dintr-o succesiune de cîmpuri, cu altitudini absolute sub 200 m, mai joase și mai slab fragmentate ca suprafețele dinspre est, dispuse în apropierea contactului cu rama înaltă, începînd de la nord de Dorohoi pînă la sud de Botoșani. Dealurilor Copalău—Cozancea—Guranda le corespund trei masive forestiere (stejar

în amestec cu alte foioase și chiar fag), separate de văile Sitnei și Jijicii care, ca și sectorul larg dinspre Prut, asigură continuitatea silvostepii din nordul și sudul Cîmpiei Moldovei. Cunoscut și sub numele de „Pintenu Copalău—Cozancea”, acest sector ocupă partea centrală a Cîmpiei Moldovei, începînd din dreptul localităților Coșula—Nicolae Bălcescu pînă la est de valea Jijicii, dincolo de Dobirceni și Durnești. Domeniului de pădure dezvoltat la altitudini de peste 200 m îi corespunde un topoclimat specific și soluri cenușii (argilo-iluviale), cenușii podzolite și brune.

Condițiile climatice și pedologice sînt favorabile practicării unei game largi de culturi agricole. Suprafețe întinse sînt ocupate de terenuri arabile; mai reduse sînt cele cu pășuni, fînețe, vii și livezi. În structura culturilor predomină porumbul și grîul, urmate de floarea-soarelui și sfecla de zahăr (5—10% din suprafața arabilă). Floarea-soarelui este dirijată spre fabrica de ulei din Iași, iar producția de sfeclă de zahăr spre fabrica din Bucecea. Clima răcoroasă permite cultivarea pe suprafețe mari a cartofului, inului pentru fuior, plantelor medicinale și soiului. Structura raselor de animale s-a schimbat datorită introducerii raselor ameliorate (la bovine Hollstein, Bălțata românească și Pinzgau de Transilvania). Numărul de porcine este mai redus decît în sud, dar densitățile pe comune sînt ceva mai mari. Creșterea oilor deține un loc important și predomină rasa Karakul (69%).

Industria este specializată în producția de țesături de în și de bumbac, sticlă, cristal, cărămizi, conserve de legume, unt și brînzeturi, confecții, șuruburi, articole din cauciuc, izolatori și componente electrice, războaie de țesut și mobilă, piese de schimb și mașini unelte.

Activitățile urbane sînt concentrate în patru orașe: unul de dimensiuni mijlocii (Botoșani), celelalte făcînd parte din categoria orașelor mici: Dorohoi, Darabani, Săveni.

Municipiul Botoșani, reședința județului Botoșani, a fost atestat documentar, ca tîrg, în 1439, apărut la o puternică răscruce de drumuri, punct de schimb și iarmaroc, la contactul dintre Podișul Sucevei și Cîmpia Moldovei, pe interfluviul relativ neted, dintre Dresleuca și Sitna. Răscrucea de drumuri comerciale (orientate fie de la vest la est, dinspre Bistrița și Suceava spre Hirleu și Iași, prin șaua de la Bucecea, fie de la

nord spre sud, dinspre Marea Baltică spre Marea Neagră și porturile dunărene) și schimbul de produse au generat potențialul urban al orașului.

Descoperirile arheologice din imediata apropiere a orașului (cetatea dacică de la Stîncești, secolele VI—III î.e.n., făcînd parte din sistemul de apărare al Daciei împotriva sciților și necropola din cartierul Căramidăriei etc.) atestă o continuitate de locuire încă din antichitate. În perioada feudală, la Botoșani, se ținea cel mai vechi și cel mai mare iarmaroc din Moldova. Prosperitatea lui a atras comerțanții din țară și de peste hotare dar și pe tătari și polonezi care, în secolele XV—XVII, l-au prădat de mai multe ori. În secolele XV—XVI orașul a fost în atenția domnilor Moldovei. Astfel, după ce la Popăuți, lângă curtea domnească, Ștefan cel Mare a construit o biserică fortificată (Sf. Nicolae), în veacul următor, Elena Rareș a ridicat alte două biserici de piatră păstrate pînă astăzi: Sf. Gheorghe, în 1541 și Uspenia, în 1552.

Mesteșugurile, organizate în bresle, sînt menționate la 1610, dar dezvoltarea lor atinge apogeul în secolul XVIII. Aria comerțului cu grîu, făină, ceară, miere, blănuri și cai ajungea pînă în Rusia, Germania, Italia, Franța și Anglia. Industria apare la începutul secolului XIX, iar la 1832 orașul avea deja 49 de „fabrici” (de ulei, luminări, săpun, pînzeturi, vopsele etc.) și 3 mori, la care, se adaugă, în 1847, prima moară cu valțuri din țară, renumită pentru calitatea făinii. La sfîrșitul secolului XIX (1869), orientarea căii ferate, pe valea Siretului, lasă orașul relativ izolat și-i dezorganizează vechile arii de influență statornicite de veacuri prin legături rutiere; apoi, crizele economice și politica economică de neglijență față de Moldova au dus la o stagnare economică, prelungită pînă în ultimele decenii. Drept urmare, și populația a scăzut de la 40 000 în 1880, la 35 017 (1912), 32 355 (1930), la 29 145 (1948).

În a doua jumătate a secolului XX orașul revine la o viață dinamică, iar populația a crescut continuu ca număr: 35 185 (1956), 63 207 (1977) și 126 204 de locuitori în 1992, atît pe seama sporului natural pozitiv, cît și a celui migratoriu, relativ ridicat, cu precădere în perioada 1965—1985, cînd orașul a intrat într-un proces intens de industrializare, și cînd, din 1968, a redevenit reședință de județ. În structura pe grupe de vîrstă, în 1977, adulții dețineau

o pondere de 62,6%, iar tinerii de 27,7%. Mutații importante s-au înregistrat în structura populației active. Astfel, în perioada 1930–1977, ponderea populației active din industrie a crescut de la 20,3% la 59,1%, iar cea din agricultură a scăzut de la 21,1%

4135 ha, din care a intravilanului la 950 ha (fig. 174).

În decursul istoriei, funcțiile orașului au evoluat: oraș comercial în perioada care a urmat atestării documentare și cu funcții administrative ca reședință de ținut (1741),




Fig. 174. Evoluția teritorială și ariile funcționale ale municipiului Botoșani. 1, Arie industrială; 2, de transport; 3, comercial-meșteșugărească; 4, administrativ-cultural-sanitară; 5, rezidențială; 6, spații verzi; 7, rețea stradală; 8, cale ferată; A, evoluția teritorială.

la 5,1%, orașul intrând în categoria celor cu profil industrial și de servicii.

Vatra inițială a orașului a fost „Tîrgul Vechi”, care se întindea din zona pieței și halelor actuale pînă la bisericile Sf. Gheorghe și Uspenia. În a doua parte a secolului XVIII, orașul s-a extins spre nord-est în „Tîrgul Nou” (azi cartierul Parcul Tinerețului), alături de care era cartierul lipovenilor. De asemenea, s-a extins și spre vest (pe moșia Tătărăștilor dintre „Tîrgul Vechi” și satul Popăuți). Spre sud, în secolele XVIII–XIX se formează mahalele Treisfetite, Sf. Neculai cel Sărac (str. Pușkin) și Morărești (pe șoseaua Iașilor), iar spre vest, satul Popăuți devine cartier orașenesc. În secolul XX, datorită dezvoltării industriei, orașul s-a extins spre satul Cătămăraști, iar suprafața administrativă a ajuns la

de județ, de regiune și raion. În prezent reședință de județ din 1968, orașul este un puternic centru industrial și de servicii.

Funcția industrială apare după anul 1950 datorită construirii celor 22 de întreprinderi (din care 17 de importanță națională); în anul 1948 dintre „fabricile” anterioare nu mai rămăseseră decît o moară (1875), o presă de ulei și un atelier mecanic.

În nord-vestul orașului s-a construit o platformă industrială cu un profil complex, cuprinzînd în majoritate întreprinderi noi de mașini agricole și industrie alimentară, de țesături de bumbac, rețele electrice (1960), unt și brînzeturi (1965), utilaje și piese de schimb (1972), nutrețuri concentrate (1975), aparatură electrică de joasă tensiune (1975), șuruburi (1976), mobilă (1977), articole tehnice din cauciuc (1977),

izolatori electrici din sticlă (1977), fire de melană (1978), fire și țesături de in (1980). Celelalte unități industriale sînt localizate fie în interiorul orașului (de confecții, vinificație, prelucrarea legumelor și fructelor, poligrafie și cooperative meșteșugărești), fie în extremitatea estică (pentru prelucrarea cărnii și peștelui).

Funcția comercială, cea mai importantă în trecut, se exercita cu precădere în centrul orașului („Tirgul Vechi”) prin numeroase prăvălii și ateliere meșteșugărești și în „Tirgul Nou” (în zona actualului cartier Parcul Tineretului), unde se ținea și tirgul de vite. În perioada actuală, deși unitățile comerciale sînt dispersate pe cartiere, totuși *zona centrală se menține cu un profil comercial-meșteșugăresc*, în care se găsesc și cele mai importante dotări: piața, hala centrală și noul magazin „Botoșani”. La sud de zona comercial-meșteșugărească și de centrul civic (care se conturează la contactul dintre aceste două zone), apare o zonă cu funcții complexe administrative, culturală și sanitară în care se găsesc: Palatul administrativ județean, Primăria orașului, Teatrul „Mihai Eminescu”, Casa de cultură, Muzeul de istorie, Spitalul județean, Policlinica de adulți, Maternitatea, Filarmonica de Stat, direcțiile județene de statistică și agricolă, școli etc. În anul 1985 în oraș funcționau spitale, policlinici și dispensare cu 2 500 de paturi.

Învățămîntul și cultura dispun de școli generale, licee, două teatre, trei cinematografe, o casă de cultură, muzee, case memoriale, grădinițe, etc. În oraș s-au născut Mihai Eminescu (care a copilărit la Ipotești), Nicolae Iorga, Grigore Antipa, Octav Băncilă, C. Gane ș.a.

În sectorul gării, lângă care s-a construit o autogară nouă, se conturează o zonă mai restrînsă pentru transporturi.

Orașul **Dorohoi** apare menționat documentar din anul 1408, ca punct de vamă pentru comerțul cu cai spre Camenița. Ca tirg domnesc, cu moșie și ocol, a îndeplinit funcții administrative: reședință a vornicului Țării de Sus (1568—1778), de ținut, de județ și de raion. Localitatea a apărut la contactul Podișului Sucevei cu Cîmpia Moldovei și la o importantă intersecție de drumuri. În secolele XV—XVI, nucleul inițial al tirgului coincidea cu intersecția actualelor străzi Grigore Ghica, Trandafirilor, Ștefan cel Mare și Republicii, de unde vatra se prelungea în trei direcții: spre est pînă la biserica Sf. Nicolae,

etitorie a lui Ștefan cel Mare la 1459; spre vest pînă la biserica de lemn Adormirea (1779); spre sud, pînă la podul de peste pîrîul Morii (podul Botoșanilor). În secolele următoare, evoluția localității a fost influențată de trecerea tirgului în stăpînirea mai multor mănăstiri și boieri și jefuirea lui de către tătari, turci și poloni. În secolele XIX și XX orașul se extinde tentacular, cu precădere în lungul căilor de comunicație: spre nord-vest, favorizată de construcția gării și a căilor ferate spre Leorda (1880) și Iași (1896) și a unor unități industriale; spre nord și nord-vest prin includerea în 1925 a satului Trestiana și înmulțirea locuințelor în lungul drumului spre Darabani sau Satu Nou; spre sud (pe Dealul Criva), unde construcția unor stabilimente militare a atras apoi și pe cele civile și, spre est, prin construcția platformei industriale din șesul Jijiei.

Are o suprafață administrativă de 6 050 ha. Populația a evoluat astfel: 885 de locuitori în 1774, 1 707 în 1831, 6 049 în 1859, 12 690 în 1899, 14 068 în 1912, 15 866 în 1930, 14 771 în 1956, 15 597 în 1966, 21 650 în 1977 și 33 730 de locuitori în 1990. Sporul natural a scăzut continuu pînă în 1966 (3,5‰), după care s-a redresat (10—20‰).

Reprofilarea economică a orașului apare vizibilă în structura populației ocupate, în care industria și construcțiile dețin 51,7%, iar serviciile 42,4%. În 1948 în oraș funcționau numai o moară și o presă de ulei, iar în prezent funcția industrială este prioritară și se pot distinge: o *zonă de est* (40 ha), cu ramuri ale industriei grele (de înobilare a nisipurilor, de fabricare a sticlei și articolelor de iluminat, a porțelanului și mașinilor grele pentru deformare plastică; o *zonă de nord-vest* (36 ha), cu unități ale industriei locale (de morărit, de conservare a legumelor și fructelor și de fabricare a cărămizilor și săpunurilor); o *zonă de sud-est*, cu unități de morărit și panificație și de prelucrare a laptelui. În comerț lucrează 7,5% din populația ocupată. Acesta dispune de 145 de unități comerciale. *Zona comercială-meșteșugărească* se află în partea centrală, ca și în trecut, dar extinsă și modernizată. Transporturile care folosesc 10% din populația ocupată formează o *zonă de transporturi* în perimetrul gării și autogării din vestul orașului. *Zona administrativ-culturală* se întinde la vest de cea comercială și cuprinde cea mai mare parte a dotărilor administrative și culturale ale orașului. Ca unități

sanitare orașul dispune de două dispensare, două policlinici și un spital cu 665 de paturi. Cele mai importante unități (spitalul, policlinica) sînt amplasate în cartierul Criva, unde se conturează o zonă complexă : *sanitară-scolară-industrială*. *Zonele rezidențiale* ocupă 65% din intravilan. Prin construcții de tip urban se detașează doar zona centrală și cartierul Criva.

Darabani este atestat documentar la 1569 prin vechea denumire de Cobiceni. Numele de Darabani derivă de la ostașii („darabani”) ce păzeau drumul mare al Hotinului și trecerea peste Prut. Între 1835 și 1837 a devenit ținț și făcea un comerț înfloritor cu cereale și vite. Statut de oraș a avut în perioada 1926—1950 și din 1968 pînă în prezent. În 1992 populația era de 11 767 de locuitori. În ultimii cinci ani sporul natural s-a menținut ridicat ($15-21\text{‰}$), iar cel migratoriu continuu negativ ($8-12\text{‰}$). Fiind un centru mic al industriei locale și cooperatiste meșteșugărești (de tip agricol-servicii, după populația activă), influența regională este neînsemnată.

Săveni, atestat documentar la 1546, are la origine un sat de clăcași și este așezat pe valea Băseului. A devenit ținț în 1818, iar oraș după primul război mondial. Între 1950 și 1968, trecînd în categoria așezărilor rurale, ca și Darabani, a stagnat. Populația a crescut lent, de la 4 953 de locuitori în 1930, la 8 452 de locuitori în 1990. Între anii 1966 și 1977 și-a menținut funcțiile agricolă și de servicii, care, împreună, concentrează 78% din populația activă. În ultimele decenii s-a înviorat sub raport economic prin construirea fabricilor de pine, de produse lactate, de confecții. În 1991 a fost racordat la rețeaua feroviară. În jur, se schițează o mică zonă pieorășenească, dar influența sa în cadrul regional este redusă.

6.2.2.5. Cîmpia Jijiei inferioare și a Bahluiului

Relieful, dezvoltat pe argile și mai nebasarabiene, are altitudini medii între 100 și 150 m, punctele cu înălțimi de peste 200 m rînd cu totul sporadice. Aspectele reliefului sînt dominate de prezența văilor subsecvente însoțite de cueste, de o intensitate sporită a proceselor de versant; luncile largi și terasele (cu înălțimi pînă la 160—170 m) sînt clar exprimate în morfologia regiunii.

Condițiile climatice sînt marcate de o ușoară creștere a valorii medii a temperaturii

aerului ($9,4^{\circ}\text{C}$ la Iași), de întîrzierea cu cîteva zile a brumelor și înghețului de toamnă. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 517 mm, din care 293 mm în perioada de vegetație.

Rîurile au debite ceva mai mari decît cele din Cîmpia Jijiei superioare, dar apele sînt mai dure și mai mineralizate. Peisajul de silvostepă acoperă aproape tot teritoriul, cu excepția luncilor svîntate și a teraselor inferioare din est. Arealele de pădure sînt foarte rare. Predomină solurile zonale cernoziomice, dar, pe lunci și versanți se întîlnesc și soluri halomorfe și hidromorfe. Deși peisajul, în ansamblul său, nu suferă schimbări importante, unele particularități geomorfologice se fac, totuși, simțite și permit separarea unor subunități: *Cîmpia Iașilor*, care se identifică cu cea mai mare parte a Cîmpiei Jijiei inferioare și a Bahluiului; *Valea Prutului*, cu întinse sectoare dominate de prezența unei lunci cu lărgimi de 3—7 km și a teraselor sub formă de amfiteatru, precum și cîteva *depresiuni de contact*. Cele mai clare, ocupate de depozite aluvio-coliuviale holocene, bogate în ape subterane, pe alocuri cu înmlăștiniri, fiind: Depresiunea Frumușica, Depresiunea Hîrlău—Hodora și Depresiunea Voiniești—Bîrnova.

În Cîmpia Jijiei inferioare trăiesc 59% din populația totală a Cîmpiei Moldovei și 69% din populația urbană. Sporul natural este mai ridicat (predomină, pe comune, valorile de $15-25\text{‰}$), iar cel migratoriu mai redus decît în nord. Densitatea populației active în agricultură este mai redusă în partea central-estică ($15-35$ loc./100 ha agricol) și mai mare în sud ($35-45$ loc./100 ha).

Suprafața culturilor agricole este mai redusă decît în nord. Datorită fragmentării mai accentuate a terenurilor, suprafețele pomi-viticole, de pășuni și fînețe naturale sînt mai întinse. În structura terenului arabil predomină aceleași culturi, dar cu ponderi mai mici. În schimb, pomicultura, viticultura și legumicultura ocupă suprafețe mari, ca urmare a condițiilor pedoclimatice mai favorabile și a solicitărilor mari pe piața Iașului. Densitatea bovinelor și ovinelor este redusă, excepție făcînd comunele din vecinătatea orașelor. La fel, la porcine, dar aici există complexul de la Tomești (170 000 de capete), mai mare decît cel din nord de la Leorda (75 000 capete).

Industria republicană este specializată în producția de oțel, țevi sudate și profile,

mașini-unelte speciale, utilaje pentru industria materialelor de construcții și drumuri, utilaj chimic și metalurgic, mătase, antibiotice, prelucrarea maselor plastice, fibre și fire sintetice, încălțăminte.

În ansamblu, potențialul demografic este mai mare decât în partea de nord, structura economică mai complexă, producția industrială de peste 3,7 ori mai mare, indicele de urbanizare mai ridicat și mișcarea năvălistă destul de accentuată. Un rol deosebit îl joacă orașul Iași, care concentrează circa 30% din populația totală a Cîmpiei Moldovei.

Municipiul Iași s-a dezvoltat pe vatra vechiului sat al Iașilor, care ocupa promontoriul terasei inferioare a Bahluiului (de 20 m), aproximativ în jurul actualului Palat al Culturii, într-o arie de locuire datînd încă din paleoliticul inferior și continuînd în epocile bronzului, fierului, getodacă și prefeudală (prin cultura Hlincea, aspectul local al civilizației Dridu).

Ca oraș, este menționat, mai întîi la 1388—1391 în lista de orașe „volohe” sub numele de Iaskii Torg și apoi la 1408, ca punct de vamă pe drumul comercial ce lega Lvovul cu porturile de la Dunăre. Dezvoltarea sa a beneficiat de o poziție favorabilă, la contactul dintre două unități geografice distincte (Cîmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc) și convergența unor importante drumuri comerciale medievale ce foloseau vadurile Prutului (Tuțora, Sculeni ș.a.) și șele de la Ruginoasa și Bordea (Birnova). Consolidarea statului feudal independent al Moldovei (sec. XIV), funcționarea unei curți domnești încă din timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1434) și fixarea capitalei Moldovei în perioada 1564—1862 la Iași au constituit alți factori favorabili ai creșterii rolului orașului.

Industria a apărut tirziu, cu întreprinderi modeste, pentru confecționat unelte agricole (1841), prelucrarea lemnului (1843), morărit (1841), panificație și arpacaș (1859) etc. După o perioadă de înviorare economică, odată cu pierderea funcției de capitală și izolarea orașului prin orientarea căilor ferate, industria a cunoscut o stagnare evidentă pînă la cel de-al doilea război mondial. Astfel, în 1939, Iașul se afla abia pe locul 8 în țară, deținînd circa 1,7% din forța de muncă și din valoarea producției industriale naționale. Comerțul s-a dezvoltat mai mult după dispariția monopolului turcesc și desființarea vămilor interne.

În arhitectură Iașul se remarcă prin construcția de monumente istorice și de artă, palate și așezăminte culturale: mănăstirile Galata (1579—1584), Cetățuia (1669—1672), Golia (1650—1660), Frumoasa (1726—1733) și Trei Ierarhi (1637—1642), ridicată de domnitorul Vasile Lupu, remarcabilă prin frumusețea sculpturii exterioare, în cadrul căreia au început să funcționeze o tipografie la 1640 și „Academia Vasiliană” la 1641, precum și o serie de palate-reședință ale unor boieri, în care funcționează astăzi: Filarmonica de Stat „Moldova”, Poșta Centrală, primăria, Conservatorul „George Enescu” etc.

La începutul secolului XX (1906—1925) s-a construit Palatul Culturii, în stil neogotic, pe locul ruinelor Curții domnești din secolul XV. Lîngă el, renovată de mai multe ori, se află și biserica „Sf. Nicolae-Domnesc” (1491—1492), ctitorie a lui Ștefan cel Mare, cel mai vechi monument din Iași.

Pe plan cultural, după epoca de prosperitate din timpul domniei lui Vasile Lupu, a urmat mult mai tirziu deschiderea la „Academia domnească” în 1813, de către Gheorghe Asachi, a cursurilor de ingineri în limba română, înființarea „Academiei Mihăilene” (1835), a Conservatorului (1836), a Școlii de arte frumoase și meserii, deschiderea cursurilor la Universitatea „Al. I. Cuza” (1860). Aici a avut loc primul spectacol de teatru în limba română (1816) și au apărut: „Albina românească”, prima gazetă în limba română din Moldova și revistele Convorbiri literare (1867), Contemporanul (1881), Viața Românească (1906) etc., care au polarizat viața literară și au promovat cu fermitate ideea Unirii Principatelor, prefigurată prin alegerea lui Alexandru I. Cuza ca domn al Moldovei și apoi al Țării Românești (1859). În Iași au trăit și creat remarcabile personalități ale științei și culturii românești¹. Dinamica populației și evoluția teritorială au fost în strînsă legătură cu cea funcțională, cu condițiile social-economice. În secolele XVI și XVII numărul de locuitori a fost puternic influențat

¹ Grigore Ureche, Miron Costin, Ioan Neculce, Nicolae Milescu, Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Alecu Russo, Mihail Sadoveanu, George Topirceanu, Garabet Ibrăileanu, Ionel Teodorescu, Titu Maiorescu, Mihail Codreanu, Matei Millo, Emil Racoviță, Ion Borcea, Grigore Cobălcescu, Ion Atanasiu, Petru Poni, Al. D. Xenopol, Vasile Conta, C. I. Parhon, P. Bujor, Nicolae Iorga, Gheorghe Ghibănescu ș.a.




Fig. 175. Evoluția teritorială a municipiului Iași. 1, Nucleul urban în sec. XIV—XV; 2, extinderea orașului în sec. XVI—XVII; 3, sec. XVIII; 4, sec. XIX; 5, în perioada 1900—1944; 6, în perioada 1944—1990; 7, drum principal; 8, cale ferată.

și de invaziile de jaf ale tătarilor, cazacilor, rușilor, polonezilor, turcilor și de epidemii. Conform Condicii Liuzilor (1803), Iașul avea 3 941 de familii cu aproximativ 22 000 de locuitori. În perioadele următoare populația a crescut de la 65 747 de locuitori în 1859, la 79 406 în 1912, 106 000 în 1930, 112 977 în 1956, 161 024 în 1966, 265 002 în 1977, la 342 994 de locuitori în 1992, astfel că Iașul a ajuns al cincilea oraș al țării, după București, Brașov, Constanța, Timișoara. Populația a crescut atât pe seama sporului natural ridicat (15,6‰ în perioada 1976—1980), cât și a celui migratoriu, continuu pozitiv și cu mărimi medii anuale de peste 15—20‰. Cele mai profunde mutații s-au înregistrat în structura profesională a populației active, determinate de marile transformări social-economice și politice din perioada postbelică. Astfel, în perioada 1930—1977, odată cu creșterea ponderii populației active în industrie și construcții, de la 25,8% la 58,1%, s-au redus ponderile serviciilor (de la 70,5% la 39,7%) și agriculturii (de la 3,7% la 2,2%). În consecință, profilul economic al orașului s-a schimbat, devenind

industrial și de servicii. Reprofilarea funcțională a determinat atât schimbarea structurii profesionale a populației active, cât și creșterea puterii de atracție a orașului. Astfel, curenții de populație orientați în lungul axelor de circulație, în cadrul izocroniei de 2 ore, concentrează zilnic spre Iași circa 20 000 de persoane, din care 98% bărbați.

Primul nucleu al orașului s-a conturat în zona pieței actualului Palat al Culturii, unde se întâlneau drumurile dinspre Carpați și Prut cu cele dinspre Marea Neagră, trecând vadul de peste Bahlui (actual Podu Roșu) din fața conului de dejecție al Nicolinei. În secolul XV orașul se întindea mai mult spre nord pe terasa de 20 m, până în zona Pieței Unirii și a cinematografului „Victoria”, pe circa 41 ha (fig. 175).

În secolele XVI—XVII, devenind capitală a Moldovei, orașul avea 158 ha și ocupa integral podul terasei inferioare. Vatra sa era limitată spre nord—nord-vest de actualul bulevard al Independenței (fostă Tirgul de Sus), de mănăstirea Golia (1584) și actuala Casă de cultură a tineretului, iar spre sud-vest

de fruntea terasei inferioare a Bahluiului. În sud, orașul nu trecea peste Bahlui, dar în imediată apropiere a vetrei s-a înființat tirgușorul Nicolina (1630) și s-au construit mănăstiri, întărite (Balica sau Frumoasa, Galata, Socola și Cetățuia). În est, independent, s-a dezvoltat satul Tătărași. În secolul XVIII, datorită înviorării vieții economice, orașul a înregistrat o extindere rapidă, tentaculară, pe trei direcții: spre sud, peste Bahlui, făcându-se joncțiunea cu tirgușorul Nicolina (1806); spre vest—nord-vest, în lungul drumului spre Roman și Hirleu și în est—nord-est, unde cartierele Tătărași și Rufeni s-au unit; spre Copou urca (în cartierul Muntenimii) până în zona actuală Universității; spre sud-est clădirile nu depășeau limita glaciului de contact dintre șesul inundabil al Bahluiului și terasa inferioară de 20 m. În 1800 suprafața era de 559 ha.

În secolul XIX orașul ocupa deja 1 329 ha și avea o dezvoltare tentaculară spre vest—nord-vest, prin construcția bulevardului Copou, a primei cazărmi (1852—1875) și a Școlii tehnice (azi Liceul industrial nr. 6), amenajarea Grădinii Copou (1834), construirea fabricii „Textila” (1886) și prin înglobarea tirgușorului Copou, orașul a ajuns până la actuala Alea Sadoveanu; spre sud-vest s-a extins până la piul Rădui Tătar, cuprinzând și tirgușorul Păcurari; spre sud-est, prin deschiderea drumului peste Dealul Repeș, au fost înglobate și satele Socola, Bucium și tirgușorul Socola; spre est orașul se întindea până la străzile Brîndușa și Moara de Vint, spitalul Pașcanu și cimitirul „Eternitatea” (1876), valea Cîrcului, Abator, tirgul de vite și cartierul Ciurchi. În lungul căii ferate (1870) s-au construit uzina electrică, fabrica de țigăre, tăbăcării și mori.

În secolul XX creșterea tentaculară este lentă. În schimb, s-au făcut parcelări în șesul Bahluiului, în zonele Țuțora, Șoseaua națională, Canta și Păcurari.

După 1944, prin dezvoltarea deosebită a funcțiilor urbane, în special a celei industriale, suprafața orașului a crescut continuu ajungînd de la 1 936 ha, în 1944, la 3 650 ha, în prezent, realizîndu-se o compactare a spațiului urban. S-a organizat zona industrială Țuțora, iar cartierele noi (D. Cantemir, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrîn, Dacia, Primăverii, Grădinari—Metalurgiei) valorifică spațiul liber dintre tentaculele vechi. De asemenea, orașul s-a extins și prin construcții pentru transporturi feroviare și auto, depozite și baze de aprovizionare,

unități de învățămînt, sanitare, balneare, agricole și a înglobării satelor Galata și Păcurăț. Actualele zone funcționale sînt rezultatul urbanismului dirijat, care a împins serios greutăți din cauza extinderii spontane anterioare (fig. 16).

Zona comercial-meșugărească. Nucleul vechi s-a aflat lângă actualul Palat al Culturii și s-a extins în secolul XVII pînă în Tirgul de Sus (azi Bulevardul Independenței). Ulterior, s-au dezvoltat și arterele Socola, Nicolina, Vasile Lupu, Ion Creangă, Smîrdan etc., iar în mijlocul cartierelor rezidențiale au apărut vadurile comerciale. Comerțul dispunea în 1985, de 970 de unități comerciale și utiliza 7,8% din populația ocupată. Suprafața comercială a crescut la 95 600 m², din care 40% revin zonei centrale.

Zonele administrative-culturale-sanitare. În perioada feudală primul nucleu a apărut lângă Curtea domnească. În secolele următoare funcțiile urbane au continuat să se dezvolte, iar aria centrală să se extindă spre nord-vest, prin construcția „Academiei Mihăilene” (1835), Spitalului „Sf. Spiridon”, Teatrului național „V. Alecsandri” (1894—1897), Universității „Al. I. Cuza” (1893—1897), Școlii normale de fete (azi corpul C al Universității), Liceului „C. Negruzzi”, Liceului fiilor de ofițeri (azi Spitalul militar) ș.a. În perioada actuală se remarcă un proces de specializare și de divizare a acestor zone. Astfel, în nucleul vechi al orașului s-a conturat *zona administrativ-culturală* între Palatul Culturii și Piața Unirii, cuprinzînd: Primăria, Tribunalul, Secția de literatură română veche (funcționează în Casa Dosoftei), Teatrul Național, Opera de Stat, Conservatorul „George Enescu”, Filarmonica de Stat „Moldova”, Muzeul Unirii ș.a. Dezvoltarea învățămîntului a făcut ca aria de influență a Iașului să se răsfîrîgă asupra întregii țări. În anul 1985 funcționau peste 160 de școli (generale, profesionale) și licee (teoretice, industriale, agricole, economice, pedagogice și sanitare), frecventate de 73 780 de elevi și 5 institute de învățămînt superior cu 26 550 de studenți.

În general școlile sînt dispersate în teritoriu, dar multe din școlile profesionale și liceele industriale, care sînt patronate de întreprinderi, sînt localizate în vestul zonei industriale. Unitățile de învățămînt superior sînt grupate pe șesul Bahluiului, între Podu Roșu și cartierul Grădinari (cu spațiile noi de învățămînt ale Institutului politehnic „Gh. Asachi”) și în cartierul

Copou, unde există numeroase instituții de învățământ și de cercetare (Universitatea „Al. I. Cuza”, institutele politehnice, agronomic, de igienă și sănătate publică, de chimie macromoleculară, de istorie și arheologie, de istorie literară, bibliotecile „Mihai Eminescu” și Academiei, Casa de cultură a tineretului și studenților etc. În 1985, învățământul, cultura și cercetarea științifică concentrău 8,9% din populația ocupată a orașului.

Unitățile sanitare formează trei areale distincte: în jurul Spitalului de ftiziologie, Spitalului de boli contagioase, Institutului de medicină legală și Policlinicii universitare; în cartierul Tătărași (spitalele de pediatrie și neurochirurgie și o secție a Spitalului de ftiziologie); pe șesul Bahluiului, unde s-a dezvoltat o arie balneară (policlinică balneară, spital de recuperare, grup școlar de recuperare motorie ș.a.), care utilizează apele sulfuroase și nămolurile curative.

În afara acestor concentrări în toate cartierele se găsesc unități culturale și sanitare (școli generale, licee, policlinici, dispensare ș.a.). În unitățile sanitare lucrează 5,3% din populația ocupată. În Iași funcționează 12 spitale, dintre care 8 sunt specializate, 40 de dispensare, 12 policlinici, un leagăn de copii orfani și 34 de creșe. Toate unitățile sanitare dețin 8 948 paturi de spitalizare (de 6 ori mai multe decât în 1938), cu 1 190 medici și 3 950 cadre medii sanitare. Aria de influență sanitară a orașului se răsfringe asupra întregii Moldove.

Transporturile, în care lucrează 7,5% din populația activă sunt reprezentate prin transporturi feroviare, rutiere, aeriene și speciale. Activitățile de transport feroviar, apărute după 1870, sunt grupate în sud-vestul orașului, unde în ultimii ani s-a construit o nouă gară (Iași-Nord) și în sud-est, cu gara Nicolina și triajul Socola, construite în ultimele decenii pentru relațiile comerciale internaționale.

Unitățile de transporturi auto sunt, în general, dispersate, dar o anumită grupare de garaje, autobaze și ateliere de reparații se conturează la barierele spre Ungheni, Vaslui și Tirgu Frumos.

Aeroportul, prin care se realizează legături zilnice cu orașele București și Bacău, este situat în extravilan, pe Dealul Ciric (fig. 176).

Transporturile în comun s-au introdus în secolul XX, începând cu tramvaiul electric, în 1900 (condiționat de construcția

uzinei electrice în 1899). Dezvoltarea tentaculară exagerată a intravilanului și fragmentarea reliefului au întârziat crearea unei rețele inelare care ar fi îmbunătățit substanțial transportul intern. În 1990 transportul în comun este servit de peste 174 vagoane de tramvai și 160 de autobuze pe 83 km linii simple de tramvai și 160 km de autobuze. Din anul 1985 s-au introdus și primele troleibuze.

Apa este adusă prin două conducte din sursa Timișești (Valea Moldovei), construite în anii 1910 și 1976 și trei conducte din Prut (1956—1982). Din anul 1957 orașul este racordat la sistemul energetic național, iar din 1963 este conectat la magistrala transilvăneană de gaze naturale.

Zonele industriale. În anul 1977 industria și construcțiile utilizau 58,1% din populația ocupată, iar în anul 1980 59,2% (din care numai industria deținea 47,4%) și ocupă 27% din suprafața intravilanului. Se poate aprecia că prima zonă industrială s-a conturat în cartierul Păcurari în prima parte a secolului XX, unde funcționau câteva unități de țigarete, ulei, cherestea, piese din fontă, țesături de bumbac, mobilier metalic și morărit, deși unități industriale au apărut și în alte sectoare, evitând zona centrală cu profil comercial-mestesugăresc. Astfel, unități industriale s-au dezvoltat pe străzile Uzinei și Sf. Andrei (țesătorii de bumbac, tricotaaje, fabrici de tapiterie, mobilă, oglinzi, produse din fontă și obiecte de lăcătușerie), pe străzile Sf. Lazăr și Smirdan (țesătorii de mătase, de lână, moară, fabrici de săpun și oglinzi etc.) și în extremitatea de răsărit, cu „fabrici” de lână, cărămidă, spirt, carne și preparate din carne, prelucrarea pieilor, ș.a. Rămân izolate în cartierele orașului câteva unități mai mari ca: „Textila” în Copou, „Țesătura B” în Tătărași și „Țesătura” în Socola. În a doua jumătate a secolului XX, în scopul valorificării mai eficiente și în comun a combustibililor și energiei electrice, a apei industriale, a forței de muncă, a mijloacelor de transport, de epurare a apei și de protejare a atmosferei împotriva poluării, în sud-estul orașului, în șesul Bahluiului, s-a organizat cea mai extinsă zonă industrială a orașului (pe o suprafață de 736 ha) cu 22 de întreprinderi de importanță națională care realizează 88% din valoarea producției industriale a orașului. Această zonă are un profil complex, cu întreprinderi noi (mai vechi fiind: „Țesătura” — 1910, dar modernizată și dez-




Fig. 176. Zonele funcționale ale municipiului Iași. A. 1, Zonă industrială; 2, de transport; 3, de comerț și meșteșuguri; 4, de învățămînt, sanitară și administrativă; 5, rezidențială; 6, rezidențial-agricolă; 7, balnear-recreativă; 8, spații verzi; B. Dinamica populației.

voltată ulterior și „Nicolina” — 1906, reproductă pe producția de utilaje pentru industria materialelor de construcții), în care se fabrică băuturi alcoolice (1951), mobilă (1960), ulei (1961), țevi sudate și profile (1963), produse din masă plastică (1963), confecții și tricotaje (1965), energie electrică (1966), materiale de construcții, produse de morărit și panificație (1968), țesături de mătase (1969), conserve de legume și fructe (1970), unt și brinzeturi (1970), nutrețuri concentrate (1971), radioreceptoare (1973), piese auto (1973), bere și spirt (1974), mașini unelte, agregate și mașini unelte speciale (1976) (fig. 177). În imediata apropiere s-a construit un mare combinat de utilaj

greu (1977). În interiorul orașului se mai conturează încă două mici zone industriale: una în apropierea gării principale (cu întreprinderile de rețele electrice și mașini agricole și industrie alimentară) și alta în cartierul Păcurari, unde s-au menținut încă vechile unități de fabricare a berii (1786, actuala „Zimbru”), de țigarete, de tricotaje, de morărit și panificație. Alte unități industriale rămân dispersate: întreprinderea de antibiotice, localizată în extremitatea de vest a orașului, „Textila” în Copou și „Țesătura B” în cartierul Tătărași. În perioada 1960–1985 valoarea producției globale a crescut de 25 ori, iar orașul se impune în producția națională de radioreceptoare, de

fire și fibre sintetice, de antibiotice, de țevi de construcții, de ulei etc. (fig. 177).

Zonele agricole nu sînt specifice orașului, dar au apărut pe seama legăturilor acestuia cu zona rurală din jur, cuprinzînd o serie de dotări (ferme, centre de selecție, unități veterinare, stațiuni de cercetare și sere) și se conturează atît în extremitatea de est, cît și în cartierele vechilor sate înglobate în oraș.

Țirgu Frumos, oraș tot de contact, a apărut la o răscruce de drumuri comerciale, în fața șei de la Ruginoasa. Deși apare menționat pentru prima dată la 1448, N. Iorga a considerat că Țirgul a apărut înaintea „descălecatului”. Populația a evoluat lent, de la 5 000 de locuitori în 1930, 9 636 în 1985, la 13 713 de locuitori în 1992. Sporul natural este ridicat, dar creșterea populației este limitată de soldul migratoriu, orașul intrînd în aria de influență a Iașului. Dinamica economică a fost stînjenită și de pierderea statutului de centru urban în perioada 1950—1968. Azi este un oraș de tip mixt după profesională.

Hîrlău, atestat documentar la 1384, ca reședință de curte domnească, s-a dezvoltat la contactul Cîmpiei Moldovei cu Podișul Sucevei, pe importantul drum comercial dintre Țirgu Frumos și Botoșani. În 1992

populația a ajuns la 11 606 de locuitori. În perioada 1930—1980 și-a menținut același profil funcțional: agricol-servicii. În ultimul timp și-a dezvoltat funcția industrială (che-restea, tricotaje, confecții și conserve) și cea rezidențială. Este capăt de linie ferată și are un mic rol în teritoriu, deoarece intră în aria de influență a orașului Iași.

6.2.3. Podișul Birladului

6.2.3.1. Caracterile fizico-geografice

Ocupînd jumătatea sudică a Podișului Moldovei și drenat aproape în totalitate de sistemul hidrografic al Birladului, de unde își trage și numele, Podișul Birladului se întinde pe o suprafață de 11 450 km². Dacă limita de sud, spre cîmpie, este estompată fiind vorba de o tranziție, limitele de vest (valea Siretului), de est (valea Prutului) și de nord, spre Cîmpia Moldovei, sînt clare și corespund unor linii morfologice principale. Spre nord, limita trece prin Șaua Ruginoasa—Strunga și pe aliniamentul localităților Sagna—Stănița—Hîndrești pînă în valea Prutului, mergînd în lungul abruptului de peste 200 m al Coastei Iașilor. Spre sud, relieful coboară pînă la altitudinile proprii




Fig. 177. Întreprinderea „Tehnoton” (foto C. P. B.).




Fig. 178. Profile cu direcția vest-est prin Podișul Birladului: A, în partea de nord; B, în partea de sud. 1, Basarabian; 2, kersonian; 3, sarmatian nedivizat; 4, meoșian; a, soluri și vegetație de luncă; b, soluri cenușii și brune podzolite cu pilcui de păduri de stejar și fag întrepătrunse de silvostepă și culturi agricole complexe; c, soluri cenușii, cernoziomuri levigate (cambice) și vegetație de păduri și silvostepă; d, cernoziomuri și vegetație de stepă, silvostepă și luncă întrepătrunse de culturi agricole.

cîmpiei și se consideră că Podișul Birladului se oprește la o linie sinoasă jalonată de localitățile Nicorești—Tepu—Ghidigeni—Valea Mărului pînă în valea Prutului pe la nord de Tulucești (V. Sficlea, 1980; V. Băcăuanu și colab., 1980).

Podișul Birladului este construit din formațiuni sedimentare monoclinale pe un fundament diferențiat care corespunde părții sudice a Platformei Moldovenești și depresiunii structurale a Birladului. Morfologia regiunii este influențată în mod direct de natura părții superioare a cuverturii sedimentare alcătuită din formațiuni sarmatiene și pliocene, care se succed de la nord la sud. Partea nordică este sculptată în depozite basarabiene și kersoniene alcătuite din argile, marne, nisipuri și orizonturi de gresii și calcare, în special calcare oolitice. La sud de linia Bacău—Costuleni, urmează formațiunile meoșiene, argiloase și nisipoase, în care sînt intercalate orizonturi de cinerite andezitice, acoperite, în extremitatea sudică, de depozite pontiene și daciene. În nord, unde predomină plăcile dure grezo-calcare, relieful se prezintă sub formă de dealuri și platouri întinse, larg bombate, cu un pronunțat caracter structural, acope-

rite, în mare parte, cu păduri de fag și stejar. La sud de latitudinea orașului Vaslui masivitatea reliefului se reduce și devin caracteristice colinele prelungi, separate de văi aproape paralele. Vegetația de pădure se întrepătrunde cu pășistele naturale și secundare, astăzi în cea mai mare parte cultivate (fig. 178).

Înălțimea culmilor din extremitatea nordică a Podișului Birladului depășește 400—450 m (în Dealul Cetatea, 467 m; Tansa, 465 m; Dealul Șanțurilor, 447 m; Cheia Domniței, 438 m) dar cele mai înalte cote se înșiră de-a lungul culmilor din partea central-vestică: dealurile Aninoasa (522 m) și Poiana Neamțului (530 m) de pe culmea care desparte bazinele Siretului și Birladului; Dealul Doroșanu (564 m) din nordul culmii ce separă bazinele Berheciului și Zeletinului. Partea cea mai coborîtă se află în lungul văii Birladului, care are 126 m la Negrești, 50 m la gura Berheciului și aproximativ 40 m la Ghidigeni. 30% din suprafața podișului se situează la altitudini cuprinse între 200 și 300 m; 14% între 300 și 500 m, iar cea mai mare parte la sub 200 m. Densitatea fragmentării este în medie 0,7—0,9, dar se

accentuează de la sud la nord, așa cum, de fapt, se accentuează și energia reliefului care ajunge de la sub 100 m la 300—400 m.

Platourile structurale și cuestele sînt forme de relief dominante cu precădere în partea nordică a acestui podiș, dar destul de frecvente și în celelalte părți. Ele sînt condiționate de orizonturile de gresii și calcare sarmatice cu dispunere monoclină ($5^{\circ}/_{00}$), de la nord-vest la sud-est. Cele mai întinse platouri structurale se află la nord de localitățile Suhuleț, Ipatele, Șcheia și Schitu Duca, la nord-est de Țibana (platoul Cheia Domniței), la sud de Iași (cunoscutul platou Repedea—Păun), la sud de Slobozia și Dobrovăț etc. Aceste platouri sînt flancate de cueste cu dimensiuni variabile, de la cîțiva kilometri, la zeci de kilometri: Coasta Iașilor, coastele din lungul Birladului superior, ale Racovei, Vasluiului, Lohanului etc. În jumătatea sudică a Podișului Birladului, prin prezența faciesului nisipos al pliocenului, caracterul structural al reliefului se estompează, structura monoclină fiind pusă în evidență doar de orientarea general-consecventă a văilor și culmilor cu aspect colinar (V. Băcăuanu și colab., 1980).

În partea nordică a podișului, unde predomină depozitele nisipoase sarmatice, sînt frecvente alunecările de teren, masive și profunde, într-o alternanță de sectoare active și relativ stabilizate. În partea sudică, pe depozitele în facies nisipos ale pliocenului, dominantă este eroziunea torențială și spălarea areolară, alunecările avînd o răspîndire subordonată (fig. 178).

Relieful de acumulare, care ocupă circa 20% din suprafața podișului, are răspîndirea cea mai mare în lungul văilor Prutului și Birladului. Albia majoră a Prutului, de pe dreapta, cu o lățime de 4—8 km, cu o constituție argilo-nisipoasă și nisipoasă și cu un microrelief de albiu părăsite (numite local „Prutețe”), microdepresiuni de tasare, grinduri etc., evoluează de cîțiva ani în regim amenajat. De aceea, în fizionomia actuală, alături de microforme naturale (în mare parte nivelate) apar elemente de origine antropică (diguri, canale), care au rolul de a-i spori utilitatea agricolă. Albia Birladului, cu lățime cuprinsă între 1,5 km și 3 km, cu aceeași constituție, dar mai umedă, supusă adesea inundațiilor dinspre versant și prin revărsarea Birladului, se găsește în prezent în plin proces de amenajare pentru a intra total în circuitul agricol. Celelalte văi (ale Racovei, Vasluiului, Crasnei,

Tutovei, Zeletinului, Berheciului, Elanului ș.a.) prezintă albiu majore înguste, a căror evoluție este influențată puternic de aportul coluvio-proluvial al versanților. Acest fenomen este foarte evident în sectorul colinar, sculptat în formațiuni nisipoase, pliocene, unde au loc intense procese de agradare a albiilor și de îmbătrînire prematură a rețelei hidrografice (M. Filipescu, 1950), de pe urma cărora are de suferit activitatea economică.

În lungul văii Prutului au fost identificate cinci nivele de terase etajate la 5—11, 18—32, 57—58, 95—105 și 134—140 m (I. Gugiuman, 1959), cele inferioare avînd o extindere foarte mare și un grad de utilizare agricolă avansat. Valea Birladului este însoțită și ea de terase, dar cu excepția treptelor de 20—25 și 30—40 m, sînt mult mai fragmentate decît terasele Prutului. Nivelele de 65—70, 100, 110—115 și 130—140 m au o răspîndire discontinuă și structură asemănătoare cu cea a acumulărilor coluvio-proluviale, ceea ce le face greu de identificat. În aceeași situație se află și terasele de pe văile Tutovei, Pereschivului, Zeletinului și Berheciului. În afara treptelor de luncă, în lungul acestor văi au fost stabilite două nivele: de 5—8 m și de 10—20 m (I. Hirjoabă, 1962).

Atît albiile majore, cît și podurile teraselor sînt parazitare, la contactul lor cu versanții, cu depozitele coluvio-proluviale care formează fișii de glacis sau conuri de dejecție izolate, larg utilizate pentru fixarea așezărilor, a căilor de comunicație și ca terenuri agricole.

Podișul Birladului are un climat temperat de dealuri, puternic influențat de masele de aer continentale din estul Europei. În aceste condiții se recepționează, în medie pe an, 116—120 kcal/cm² și se înregistrează între 1 950 și 2 100 ore de strălucire a Soarelui. Temperatura medie anuală oscilează, în funcție de altitudine, între 8° și 9,8°C. Cele mai coborîte valori termice din timpul iernii se realizează în lungul văilor Birladului și afluenților săi din jumătatea de nord a bazinului (Crasna, Vaslui, Racova ș.a.).


Temperatura medie diurnă coboară sub 0°C, pe întreaga suprafață a podișului din 5—10 decembrie pînă în 25 februarie, în sud și 5 martie, în nord. Înghețul este posibil, în medie, de la 15—20 octombrie pînă în a doua decadă a lunii aprilie. Aproape 290 de

zile din an au temperatura medie peste 0°C, iar între 15 aprilie și 15 octombrie depășește 10°C. Acest interval reprezintă timpul ecologic optim pentru dezvoltarea plantelor. Tot acum, 80—95 de zile au temperatura maximă de peste 25°C, iar 18—25 de zile depășesc 30°C.

Umezeala relativă a aerului oscilează între 74 și 76%, fiind mai ridicată în anotimpul rece (80—87% în ianuarie) și mai redusă vara (58—60% în iulie). Nebulozitatea medie oscilează între 5,8 și 5,4, ajungând pînă

Resursele de apă sînt relativ mici. Apele freatice și cele captive ascendente au debite reduse, dar satisfăcătoare din punct de vedere calitativ. Adîncimea lor ajunge pînă la 20 m, rar depășește această valoare și se diferențiază, în funcție de depozitele în care sînt cantonate: formațiuni sarmatiene, pliocene, aluviale (de albie majoră și terase), coluviale etc. Cele mai bogate surse de apă și de bună calitate se găsesc în terasele și lunca Prutului, în cuprinsul platourilor structurale din nord, protejate de orizonturile de gresii și calcare sarmatice și, în

Fig. 179. Climograme la stațiile Vaslui și Huși. T — temperatura medie multi-anuală; P — precipitații medii multi-
anuale; TM — temperatura maximă absolută; 1, temperatura aerului; 2, precipitațiile medii lunare la scara 1/2; 3, precipitațiile medii lunare la scara 1/3; 4, perioade umede; 5, perioade uscate; 6, perioade secetoase.



la 7,5—7,8 în ianuarie și coborînd la 4 în iulie. În decursul unui an 100—120 de zile cerul este senin, 125 de zile au cerul noros și 120—145 de zile acoperit.

Caracterul continental al climatului este bine pus în evidență și de cantitatea de precipitații care, în medie, variază între 450 și 600 mm anual, în funcție de altitudine (fig. 179).

Dinamica atmosferică este puternic influențată de orientarea reliefului. Astfel, în partea de nord, au frecvență mare vânturile de nord-vest, sud-est, sud și nord (Vaslui), iar în partea central-sudică (Birlad), cele de nord, sud, sud-vest și nord-est. Viteza medie a vânturilor oscilează între 2,5 și 3 m/s, iar pe direcțiile dominante ajung pînă la 6 m/s. Acestea pot constitui o sursă energetică neconvențională utilizabilă, pe plan local, cu randament.

cantități mai reduse, în luncile secundare și depozitele deluviale de pe versanți.

Apele de suprafață sînt reprezentate de riul Birlad cu afluenții săi: Sacovăț, Stavnic, Rebricea, Vaslui, Crasna — pe stînga și Buda, Racova, Simila, Tutova, Pereschiv, Berheci — pe dreapta. În Prut se varsă cîteva piraie mici, printre care: Bohotin, Moșna, Sărata, Elan, Horincea și Chineja, iar în Siret, Răcățau, Polocin ș.a. Aici fenomenul scurgerii este foarte redus (circa 30 mm), fapt ilustrat și de raportul dintre suprafața mare a bazinului Birladului (6 644 km²) și debitul său foarte mic (6 m³/s). În această unitate predomină tipul de alimentare pluvială moderată, care imprimă rețelei hidrografice un regim de scurgere de tip torențial (I. Ujvári, 1972). Scurgerea cea mai accentuată se înregistrează primăvara (peste 50%), iar vara se produce viituri frecvente

și inundații (pe aproximativ 430 km²) care alternează cu perioadele de secare. Pentru suplimentarea rezervelor de apă, pe riurile din Podișul Birladului, în ultimele decenii, s-au construit peste 30 de lacuri de acumulare mici (de exemplu, lacurile Ciocănești, Pușcaș, Solești etc.). Debitul solid este foarte ridicat (7,6 kg/s) și turbiditatea mare (1960 g/m³), gradul de mineralizare moderat (900—1000 mg/l), cu dominarea carbonaților și calciului, precum și durezza ridicată (18—30 gg), limitând posibilitățile de utilizare a apelor.

Din punct de vedere biopedogeografic, Podișul Birladului constituie un teritoriu în care se interferează zonele de pădure, de silvostepă și de stepă, succedate de la nord-vest spre sud-est, având fiecare vegetația, fauna și solurile corespunzătoare.

Zona forestieră este reprezentată de etajele fagului (pe culmile de peste 400 m) și stejarului (la altitudini sub 400 m) care, datorită trecerii la silvostepă și a defrișărilor, își pierde continuitatea spațială. Compoziția floristică a acestor etaje este mozaicată, ca urmare a poziției lor de tranziție între nordul și sudul Moldovei, cît și a diversității litologice și morfologice a podișului. În arealele de făgete sau cu fag dominant, solurile brune luvice se asociază cu luvicoluri albice, iar în etajul evercineelor predomină solurile brune argiloiluviale, care spre est și sud-est fac loc solurilor brun-cenușii și cenușii.

Silvostepa se dezvoltă pe cernoziomuri oambice, dar fără posibilități de delimitare clare a acestora datorate fragmentării colinare a reliefului care favorizează întepătrunderea cu pădurea. Silvostepa este evidentă în partea de sud-est a Colinelor Tutovei, în Depresiunea Huși și la periferia Dealurilor Fălciului.

Vegetația de stepă, păstrată pe areale mici de pajiști și finete pe cernoziomuri (carbonatice și semicarbonatice), se întâlnește în extremitatea sudică a Podișului Birladului.

Solurile zonale sînt însoțite de o gamă mare de soluri cu extindere redusă, determinate de particularitățile locale ale condițiilor pedogenetice. Pot fi menționate peticele de rendzine de pe platourile structurale cu calcare la zi din nordul podișului, solurile cu evoluție întârziată (cernoziomuri subțiri de pantă și regosoluri) prezente pe versanții cu pro-

cese geomorfologice active, solurile aluviale, hidromorfe (lăcoviști) și halomorfe (sărături), acoperite cu o vegetație adecvată, prezente în luncile Birladului și ale afluenților principali.

6.2.3.2. Populația și așezările

Podișul Birladului, cu relieful său accidentat, acoperit cu codri seculari a oferit omului condiții prielnice de existență din timpuri străvechi. Continuitatea de locuire este mai evidentă aici decît în teritoriile joase, deschise, favorabile trecerii migratorilor. Nu întîmplător, în această parte a Moldovei răzășia țăranilor liberi a fost foarte puternică. Urmele de locuire străvechi se găsesc din abundență, pînă în cele mai greu accesibile puncte din interiorul podișului.

Podișul Birladului prezintă o evidentă unitate etnică și culturală tradițională ce se încadrează în ansamblul etnocultural al Moldovei și al întregului teritoriu locuit de români, dar se remarcă și o nuanțare etnoculturală și economică pe subunitățile geografice naturale.

O incursiune sumară în trecutul populației și apariției așezărilor arată că cea mai veche mărturie de locuire din această parte a Moldovei a fost descoperită în preajma satului Banca, pe o terasă a Birladului și datează din aurignacian. Urme de locuire din paleoliticul superior final (gravetian oriental) au fost găsite în mai multe puncte mai ales în nordul podișului (Chircești, Arsura, Duda—Epurenii, Valea Ursului) și în sud (Podul Pietriș, Pereni, Ivești, Zorleni, Brăhășești, Mălușteni, Pleșa ș.a.). Epipaleoliticul este prezent în cîteva puncte din sud-estul teritoriului (la Brădești, Berești—Meria, Băneasa), dar din neolitic urmele de locuire sînt mai numeroase. Neoliticul vechi este reprezentat prin culturile Criș și liniară. A fost descoperit pentru prima dată în Moldova la Perieni și Ripa Roșcanilor, în 1949, și ulterior, la Dumești Noi, Vulturești, Trestiana, Negoaia, Grivița, Dănești, Perieni, Sălceni. Neoliticul dezvoltat și începutul eneoliticului au fost descoperite în mai multe puncte, dar mult mai numeroase sînt locurile în care este cunoscut eneoliticul dezvoltat și tîrziu, în special aparținînd culturii Cucuteni (Țigănești, Iana, Cetățuia etc.). Din perioada de tranziție

la epoca bronzului și de la începutul acestei epoci sînt de menționat culturile Horodiștea (la Lichitișeni), amforelor sferice și morimintelor cu ocră (la Gîrceni).

Urmele de locuire din epoca bronzului sînt mult mai bogate. Cultura Monteoru este prezentă mai ales în nord și în vest (Voinești, Gîrceni, Bărboasa, Răcătu, Poiana, Balintesti), iar cultura Noua în partea mediană a podișului (Dumești, Zăpodeni, Tanacu, Lichitișeni, Bîrlad, Gîrbovăț, Tîgănești etc.). Vestigii din epoca hallstattiană au fost descoperite la Pocreaca, Rîsești, Zăpodeni, Tanacu, Prăjești, Poiana etc. și rețin atenția pumnalele scitice de tip akinakes găsite în nord la Comarna și Bîcu. Urmele de locuire ale dacilor din perioada La Tène sînt foarte numeroase (Moșna, Brad, Poiana, Fedești, Poenești, Epureni, Brăhășești etc.) și se cunosc așezările fortificate de la Brad (Sargidava), Răcătau (Tamasidava), Brăhășești ș.a.

Perioada de maximă înflorire a culturii geto-dace în Moldova (secolul I î.Chr. — sec. I A.D.) este foarte bine pusă în evidență la Poiana de lingă Niccrești, centru important (presupus Piroboridava), iar din timpul Daciei romane se cunosc foarte multe așezări și necropole carpo-dacice (la Comarna, Dănești, Negrești, Dumești, Gologofta, Poenești, Bărboasa, Răcătau, Banca, Bîrlad, Căbești, Ghidigeni etc.).

Descoperirile din timpul migrațiilor reprezintă mărturii ale permanenței populației locale carpo-dace. Multe dintre așezările din această perioadă de trecere la feudalism (sec. IV — sec. X) s-au dezvoltat pe vechile vetre ale așezărilor carpo-dace anterioare. Din secolul IV este de amintit valul de apărare din sud (Troianul), aflat, în linii mari, la limita dintre silvostepă și stepă (sau dintre dealuri și cîmpie), pe linia Ploșcuțeni — Tîgănești — Stoicani.

Din secolele X—XIII se cunosc urme de locuire pe valea Bîrladului (Prodana — Bîrlad, nord de Zorleni) și în alte locuri (Oncești, Lichitișeni, Ivănești, Răducăneni), iar din secolele următoare au rămas numeroase hrisoave care atestă o populație intensă a teritoriului, în special a părților de codru, cu relief mai înalt. În secolele XIV—XV numărul așezărilor a crescut, ca urmare a intensificării roirilor prin defrișări. Meșteșugurile au progresat și a crescut volumul schimburilor, ceea ce a dus la dezvoltarea

tîrgurilor: Bîrlad, Vaslui, Huși (Bîrladul căpătînd funcția de vamă de margine și de reședință a Țării de Jos a Moldovei).

În secolele XVI—XVIII s-a dezvoltat o viață rurală intensă în teritoriile apărute natural, cu relief fragmentat și cu păduri. Treptat, decăzînd puterea politică a statului feudal, se manifestă tendința de depopulare rurală a teritoriilor joase din valea Bîrladului și Depresiunea Elanului, în care pătrunderea invadatorilor era mai ușoară. Catagrafiile și documentele cartografice de la sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX arată o înmulțire a așezărilor prin prisăci și poieni, începînd din văi spre relieful mai înalt, împădurit. În urma tratatelor de la Kuciuk-Kainargi (1774) și de la Adrianopol (1829), prin liberalizarea comerțului exterior s-a extins cultura cerealelor și s-a acordat atenție terenurilor joase, favorizînd roirile avale.

În teritoriile cu așezări siliștite, în secolele XVI—XVIII din valea Bîrladului și din Depresiunea Elanului au apărut așezări noi, mai ales de clăcași. Tot aici, mai tîrziu, au primit pămînt mulți țărani în urma împrîrietărilor, iar căile de comunicație au amplificat gradul de populație.

În decursul timpului s-a format o rețea de așezări care, privită prin condițiile geografice naturale și sociale, scoate în evidență o răspîndire a vetrelor așezărilor pe aliniamente și mici grupări. Acestea mulează liniile principale ale reliefului, pun în evidență contactele geografice, conturează unitățile și subunitățile geografice, depresiunile, văile, cusele, bazinele de recepție, masivele păduroase (P. Poghirc, D. Chiriac, 1974).

Prin tradiție, trupurile de moși au fost delimitate transversal din deal în deal, sau de pe deal pînă la rîu, fiind înjugate (adică de la o cumpănă de ape, la alta) sau însurărute (adică de la o vale la alta) (H. H. Stahl, 1965), urmărindu-se îmbinarea pe spații restrînse a unor condiții variate și echitabile de dezvoltare economică.

Între ultimele două recensăminte, populația din Podișul Bîrladului a crescut cu 7,3%, dar în timp ce în mediul urban s-a înregistrat o creștere cu peste 90% (în special prin dezvoltarea municipiului Vaslui), în cel rural, deși sporul natural este ridicat (peste 20‰), populația a scăzut prin deplasarea spre orașele din regiune și mai ales din alte regiuni cu deficit de forță de muncă.

Populația rurală a scăzut mai puțin în zonele preorășenești ale Vasluiului și Birladului și a sporit în centrele de polarizare mici (Negrești, Berești, Tîrgu Bujor) și mai ales în cele pe cale de a deveni orașe (Răducăneni, Codăești, Podu Turcului ș.a.). În unele arii din partea central-vestică a Podișului Central Moldovenesc și în sudul Dealurilor Fălciului natalitatea se menține în jur de 30‰ (în arii mai mici ajungînd la 35‰), iar în vestul Colinelor Tutovei și în estul Podișului Central Moldovenesc în jur de 20‰.

Podișul Birladului reprezintă o arie cu spor natural ridicat. Cea mai mare parte a acestui teritoriu are valori între 15 și 25‰. În ultimul deceniu se manifestă însă tendința de diminuare a valorilor, dar se menține mult peste media țării și chiar a întregii părți de est a țării.

Densitatea populației rurale este în jur de 85 loc./km², sub media țării și mai mică decît a întregului Podiș al Moldovei. Dacă în anul 1912 cea mai mare parte a Podișului Birladului avea densitatea cuprinsă între 25 și 75 loc./km², în prezent aceasta este de 50—100 loc./km² în ariile cu spor natural foarte ridicat (peste 25‰) și mai mică în restul unității. O densitate mare (75—125 loc./km²) se constată în lungul cuestelor Iașului, Racovei și Horincei (unde condițiile de dezvoltare economică sînt complexe), la sud-vest de Bîrlad (în sudul Colinelor Tutovei și în Valea Birladului, unde sînt podgorii și culturi irigate) și în lungul versantului stîng al văii Siretului, la contactul cu pădurea. În cea mai mare parte a Colinelor Tutovei, în Dealurile Fălciului, în mare parte a Podișului Cîvurluiului și în lungul văii Prutului, la sud de Huși, densitatea este de 50—75 loc./km², iar cea mai mică densitate se înregistrează în partea mijlocie a Depresiunii Elanului: 25—50 loc./km². Se constată o anumită neconcordanță între sporul natural mare și valorile densității ca urmare a plecărilor definitive. Se poate aprecia că Podișul Birladului constituie un rezervor de forță de muncă, în care grupa populației tinere este numeroasă. Balanța mobilității prezintă un sold migrator negativ dintre cele mai mari din țară. Plecările definitive cele mai intense (peste 30% din locuitorii cu loc de muncă în acest teritoriu) s-au produs mai ales din Colinele Tutovei, din sud-vestul Podișului Central Moldovenesc și din sudul Dealurilor Fălciului, iar cu valori

mai moderate din Depresiunea Elanului, din locurile cu agricultură mai dezvoltată din estul și sud-estul Podișului Central Moldovenesc (cu vii și livezi) și de pe văile cu culturi legumicole. De asemenea, sînt mai moderate pe valea Birladului, unde căile de comunicații ușurează deplasările zilnice la Bîrlad, Vaslui și spre localitățile în care se dezvoltă activități neagricole. Cea mai mare parte a celor plecați lucrează în industrie și construcții. Pendulările forței de muncă din interiorul teritoriului sînt mai ales spre Vaslui și Bîrlad și numai o parte redusă spre Iași. Rețeaua de așezări este puternic condiționată de caracterele reliefului, iar fizionomia așezărilor, tipurile de așezări și de gospodării reflectă procesul îndelungat de defrișare pentru terenuri necesare economiei agrare (P. Poghire, D. Chiriac, 1974). Marea majoritate a așezărilor sînt de vale. Astfel, în lungul văilor principale ale Prutului și Birladului sînt așezări de terasă. Tot în văi sînt așezările de șes aluvial, aflate la contactul cu versanții și pe grinduri, dezavantajate de inundații și excesul de umiditate. Altele se situează la obîrșile văilor secundare, unde dispun de apă și climat de adăpost. Foarte multe așezări sînt pe versanți lipsiți de terase, unde au dificultăți din cauza degradărilor de teren. Cele mai multe din această categorie se află în Colinele Tutovei. Așezările situate pe platouri sînt mai puține.

În Podișul Birladului predomină așezările mici (sub 800 locuitori). Ele sînt foarte numeroase în Colinele Tutovei, unde majoritatea satelor au sub 500 de locuitori. Prezența așezărilor mici este legată de modul de fragmentare a reliefului, de risipirea surselor de apă, de posibilitățile limitate de constituire a unor moșii satești mari, de roirea așezărilor prin defrișare, de răspîndirea intensă a răzășiei în trecut etc. În celelalte părți ale Podișului Birladului așezările mici alternează, diseminat, cu cele mijlocii (între 800 și 1 500 de locuitori) și mai puțin cu așezările mari (peste 1 500 de locuitori). Acestea din urmă se găsesc în nord-estul teritoriului, în anumite locuri din lungul văii Prutului și în Podișul Cîvurluiului.

Densitatea așezărilor este mai mare decît în restul Podișului Moldovei, predominînd valorile de peste 6 așezări la 100 km². În timp ce în unele locuri din Colinele Tutovei și din partea centrală a Podișului Central

Moldovenesc se înregistrează peste 15 aşezări la 100 km², în Depresiunea Elanului şi în Podişul Covurlui numărul acestora este sub 6. Majoritatea aşezărilor sînt de tip răsfirat. Vetrele dispun de teren pentru culturi de grădină în interiorul lor, de aceea sînt „inundate de verdeată”.

Răsfirarea este tipică în lungul cuestelor; în Depresiunea Elanului manifestă tendinţa de adunare, iar în Colinele Tutovei sînt grupări de vetre şi vetre polinucleare formate prin unirea unor vetre care iniţial erau separate.

Marea majoritate a aşezărilor au funcţii economice dominant agricole şi numai unele dintre ele sînt agricole-industriale (Podu Turcului, Nicoreşti, Ghidigeni, Murgeni, Răducăneni, Codăeşti ş.a.). În aşezările mai importante, tirguşoare sau centre de polarizare, sînt prezente şi alte funcţii: comerciale, meşteşugăreşti, industriale locale etc. (Puiesti, Parincea, Murgeni, Răducăneni, Podu Turcului, Codăeşti ş. a.).

Predominante sînt aşezările cu profil cerealier, dar la o parte a aşezărilor din sudul Podişului Central Moldovenesc, din jumătatea nordică a Colinelor Tutovei şi din Podişul Covurluiului, se adaugă culturile industriale şi creşterea animalelor. În anumite areale din văile Prutului, Birladului şi Siretului ca şi în zonele preorăşeneşti profilul este cerealier, legumicol şi de creşterea animalelor. Aşezările cerealiere, viticole şi de creştere a animalelor se găsesc în nord-est (între Răducăneni şi Huşi), în sudul Colinelor Tutovei, în vestul şi sudul Depresiunii Elanului şi în estul Podişului Covurluiului. Cîteva aşezări din nordul Colinelor Tutovei şi sud-vestul Podişului Central Moldovenesc au profil cerealier, pomicol şi de creştere a animalelor şi tot puţine sînt şi cele pomiviticele şi de creştere a animalelor (la nord de Răducăneni şi în nordul Colinelor Tutovei).

Caracteristice sînt acele tirguşoare cu funcţii comerciale şi meşteşugăreşti, formate la sfîrşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX pe proprietăţi feudale, în teritoriile care nu intrau în ariile de influenţă directă a oraşelor (Puiesti, Podu Turcului, Murgeni, Codăeşti, Răducăneni, Plopana, Băceşti, Pungeşti, Parincea, Coloneşti, Găiceana, Stănişesti ş. a.). O parte a acestora sînt în prezent centre locale de polarizare care evoluează spre urbanizare, iar altele

ca Negreşti, Bereşti şi Tîrgu Bujor au primit deja statutul de oraş dar dotările sînt modeste.

Proporţia populaţiei urbane este sub media ţării şi este mai mare (32,5%) în cadrul judeţului Vaslui, unde se află 4 din cele 6 oraşe (Vaslui, Birlad, Huşi şi Negreşti).

Cele două municipii, Birladul şi Vasluiul, sînt situate pe axa principală rutieră şi feroviară din valea Birladului care le avantajează. În nordul regiunii este numai Negreştiul, în est Huşul, iar în Colinele Tutovei oraşele lipsesc. În sud-est, Bereşti şi Tîrgu Bujor, foste tirguri, la fel ca Negreştiul, au o însemnătate redusă. Reţeaua urbană este formată, aşadar, de şase oraşe, între care centrul tradiţional mai important este Birladul, unde concentrarea urbană mai amplă este veche şi s-a accentuat după al doilea război mondial. După 1968, investiţiile au sprijinit mult Vasluiul, devenit reşedinţă de judeţ şi situat într-un loc cu condiţii geografice naturale mai favorabile decît Birladul. Într-un viitor nu prea îndepărtat, Vasluiul va depăşi Birladul, deşi acesta din urmă se află la jumătatea distanţei între cele două oraşe mari, Iaşi şi Galaţi, dar nu are o poziţie centrală în cadrul actualului judeţ.

6.2.3.3. Activităţile economice

Economia industrială. Industria din această parte a Moldovei s-a dezvoltat tîrziu, a evoluat lent şi posedă mai ales unităţi mici din ramurile alimentare şi textilă. La această situaţie a contribuit răspîndirea largă în trecut a unei economii rurale închise, în special răzăsească, în care marea majoritate a bunurilor necesare vieţii erau produse în cadrul hotarelor sateşti, în gospodăriile mici ţărăneşti care nu ofereau cantităţi însemnate de materii prime pe piaţă. Marii proprietari dispuneau de surplusuri de produse agricole, dar aceste surplusuri erau în cea mai mare parte exportate, nefiind prelucrate industrial. Materiile prime de care dispune acest teritoriu sînt în cea mai mare parte agricole, în oarecare măsură forestiere şi foarte puţine de subsol. Resursele energetice aproape lipsesc, apa industrială şi potabilă ridică probleme, reţeaua rutieră şi feroviară, mai ales pe direcţiile vest—est, era absentă pe spaţii mari, iar cea existentă a apărut tîrziu. Teritoriul a dispus de resurse

mari de forță de muncă umană, dar fără calificare.

Industria, care s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX, valorifică materiile prime specifice teritoriului, în principal agricole. Resursele naturale locale fiind limitate, s-a dezvoltat mai mult industria bazată pe tehnologia de vîrf a unor materii prime și semifabricate, provenind din alte locuri din țară și din import. Producția industrială a ajuns să reprezinte peste 33% din producția globală totală. Structura industriei a devenit mai complexă cu următoarele ramuri: construcția de mașini (34,8% din valoarea producției industriale), alimentară (17%), textilă (12,5%), confecții (11,7%), exploatarea și prelucrarea lemnului (3,8%), materiale de construcții (5,3%), pielărie-blănărie (2,9%), chimică (5,2%), abrazive (3%) și poligrafică (0,1%).

Cea mai mare unitate industrială în ramura constructoare de mașini este Întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, intrată în producție din anul 1953 și lărgită mult în 1974. Tot în Bîrlad este Întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură și control, care a intrat în producție din 1974 și fabrică echipament și instalații pentru industriile metalurgică, chimică și alimentară. În Vaslui există o întreprindere nouă de ventilatoare și o fabrică de aparate de măsură și control, specializată în termostate. La Huși sînt fabricate piese de schimb pentru întreprinderi mari și bunuri metalice de larg consum, la Negrești și în alte localități se repară utilaj agricol.

Industria alimentară este destul de diversificată și are o răspîndire teritorială largă, cu unități de morărit la Bîrlad, Vaslui, Huși, Murgeni, Țîngu Bujor, Podu Turcului, Negrești, Țibănești, Costești, Băcani etc., de panificație la Bîrlad, Vaslui, Huși, Murgeni, Răducăneni, Podu Turcului, Negrești etc., de industria uleiului la Bîrlad și Vaslui (aceasta din urmă prelucreză soia), de industrializarea cărnii la Vaslui, Huși, Negrești și a laptelui la Bîrlad, Vaslui (cu secție de lapte praf), Murgeni (brînzeturi), Huși, Negrești. Industria conservelor de legume și fructe s-a dezvoltat la Huși, Răducăneni, Bîrlad, iar vinificația se face în numeroase centre, ca Huși (vinuri renumite), Vaslui (înnobilare de vinuri și secție de coniac), Nicorești, Țîngu Bujor, Bunești—Averești, Negrești etc. La Ghidigeni există o fabrică de alcool, la Simila de oțet și la Găiceana de amidon și glucoză.

Industria textilă posedă unități la Vaslui (filaturi de bumbac, fabrică de fibre și fire polyesterice, țesătorie de bumbac și topitorie de cînepă), Bîrlad (vată, filatură și țesătorie de vigoie), Huși (ciorapi și filatură de bumbac), Podu Turcului (ciorapi); Țîngu Bujor, Berești (covoare), Murgeni și Codăești, artizanat textil la Gohor, Tutova, Cozimești, Oțeleni. Industria confecțiilor se găsește la Bîrlad, Vaslui, Huși, Negrești etc., iar industria pielăriei este reprezentată prin fabrica de încălțăminte și mănuși din Huși și unitățile de prelucrare a pieilor și blănărie de la Bîrlad și Negrești.

Prelucrarea lemnului dispune de materia primă oferită de pădurile din Podișul Central Moldovenesc, Dealurile Fălciului, nordul Colinelor Tutovei care mai ocupă 17% din suprafața întregului podiș al Bîrladului. Prelucrarea lemnului este reprezentată prin întreprinderile de la Vaslui (mobilă, mobilier comercial, ambalaje), Huși (butoaie, ambalaje, căruțe etc.), Bîrlad (mobilă), Negrești, Podu Turcului, Murgeni, Țîngu Bujor, Răchitoasa. Industria materialelor de construcții are ca materii prime calcarele grezoase oolitice din nordul Podișului Central Moldovenesc (Repedea, Șcheia, Moța etc.), argilele sarmatiene, depozitele loessoide și unele intercalații de prundișuri din terase, nisipuri, cîinerite (în nord-vestul Colinelor Tutovei). La Vaslui se fabrică materiale izolatoare (cărămidă, dialit, carton asfaltat, vată minerală), ceramică brută, prefabricate din beton, la Bîrlad ceramică brută, teracotă, prefabricate din beton, la Huși prefabricate din beton, la Țibănești și Dagîța ceramică, la Tansa, Vinderei etc. este prezent olăritul.

Industria combustibililor are însemnătate modestă. Numai în sud-vestul Colinelor Tutovei (la est de Adjud) se găsește gaz metan și foarte puțin petrol. Gazul metan extras este dirijat la stația de unificare a presiunii de la Adjudu Vechi.

Podișul Bîrladului are un potențial hidroenergetic foarte limitat și acumulările de apă de pe Vasluiet, Racova, Tutova sînt fără valoare energetică. Energia electrică necesară provine din sistemul energetic național.

Industria din Podișul Bîrladului este grupată în special în orașele Bîrlad, Vaslui și Huși, în care o mare parte a unităților depind de întreprinderi din alte orașe. Celelalte unități sînt în orașele mici (Negrești, Țîngu Bujor, Berești), în unele comune în curs de urbanizare și în unele foste țîngușoare (Codăești, Podu Turcului).

Economia agrară. Agricultură, ocupație foarte veche, s-a dezvoltat în decursul timpului pe un teritoriu care a fost acoperit, în cea mai mare parte, de codri. Procesul de defrișare pentru culturi agricole, finețe și pășuni a fost îndelungat și s-a desfășurat până târziu.

Această acțiune a fost favorizată de răzăsie, de faptul că cea mai mare parte a pădurilor erau stăpinite în devălmășie. Defrișările efectuate pe relieful fragmentat, în special pe versanți, au dus la extinderea degradărilor de teren, cu deosebire în nordul Colinelor Tutovei. Ele au contribuit esențial și la accentuarea inundațiilor, mai ales în văile principale, și au dus la dispariția unor sate, la mutări de vetre și la limitarea suprafețelor arabile. Cele mai bune terenuri pentru culturi sînt pe terasele riurilor, dar acestea nu ocupă suprafețe mari. Versanții degradați și șesurile aluviale impun lucrări de ameliorare pentru folosirea lor în condiții bune. O mare parte a teritoriului este format din versanți cu condiții mai puțin prielnice culturilor. În multe locuri au fost folosiți abuziv pentru pășunat. La creșterea suprafețelor degradate a contribuit mult și vechiul sistem de tip răzășesc de lotizare a teritoriului, transversal pe văi, de pe culmea dealului pînă la pîrîu. Nu întîmplător a fost înființată aici renumita stațiune de cercetări de la Perieni. Au fost efectuate lucrări de terasare a versanților și combatere a eroziunii în bazinele riurilor Racova, Zeletin, Berheci, Chineja etc. dar sînt încă mulți versanți în care degradările sînt foarte avansate (la Solești, Popeni, Plopana etc.) și necesită investiții mari pentru recuperarea lor. Au fost executate și lucrări hidroameliorative pentru înlăturarea excesului de umiditate din șesurile Bîrladului și Prutului, cum sînt desecările din sectorul Albița—Fălciu (20 000 ha), din sectorul de veche confluență Jijia—Prut, îndiguirile de pe Bîrlad sau sistemul de irigații Stăniilești—Fălciu. Construirea de bazine de retenție a apei (Solești, Pușcași, Pogana etc.) contribuie la reducerea inundațiilor.

Terenurile arabile dețin 56,2% din suprafața totală, dar calitatea arabilului este în parte mediocră, mai ales pe versanți. Pășunile ocupă 11% din teritoriu, finețele 1%, viile 3,4%, livezile 1,2%. Suprafața amenajată pentru irigații este de 4,9% din arabil. Pășunile și finețele sînt răspîndite

în șesurile văilor principale și pe unii versanți inapți pentru culturi. Ele au ocupat suprafețe mari în Depresiunea Elanului dar în decursul timpului au fost transformate în terenuri arabile. Viile și livezile sînt în extindere, la vechile podgorii adăugîndu-se noi suprafețe aflate pe versanți, unde pe locul unor pășuni și terenuri arabile sărăcăcioase au fost construite terase. S-a urmărit trecerea unor terenuri în categorii superioare de folosință, atît pe versanți, cît și în șesuri.

Terenul arabil este folosit, cu precădere, pentru cultivarea cerealelor, care găsesc condiții bune de cultură în Depresiunea Elanului, pe terasele și în șesurile neinundabile ale Prutului și Bîrladului și pe interfluvii cu pante mici. Porumbul se află, tradițional, pe primul loc între culturi și predomină în lungul văilor Prutului și Bîrladului mijlociu, în nordul Podișului Covurlui, în zonele preorășenești. În locul soiurilor tradiționale se cultivă porumbul hibrid, care dă producții mai mari la hectar.

Grîul se cultivă mai ales în depresiunile Elanului, Hușului, Vasluiului, în estul Podișului Central Moldovenesc, în interiorul Colinelor Tutovei, iar celelalte cereale (orzul în valea Bîrladului, ovăzul în văile Bîrladului și Prutului, secara în Podișul Central Moldovenesc și nordul Colinelor Tutovei) ocupă suprafețe mult mai mici.

Plantele tehnice completează profilul agricol al teritoriului și sprijină dezvoltarea industriei prelucrătoare. Un loc important îl ocupă plantele uleioase: floarea-soarelui în Depresiunea Elanului, în sudul Colinelor Tutovei și în valea Bîrladului inferior; soia, în regiunea Vasluiului; inul pentru ulei, în Dealurile Fălciului și bazinul superior al Bîrladului. Plantele textile sînt reprezentate prin cîneapă care se cultivă în bazinul superior al Bîrladului, legată de vechea topografie de la Vaslui. Sfecla de zahăr, răspîndită în funcție de posibilitățile de transport la fabricile de zahăr de la Roman și Sasaut se cultivă în vestul și sudul Colinelor Tutovei spre valea Siretului, în bazinul superior al Bîrladului și pe valea Bîrladului.

Cartofii ocupă suprafețe mici în zona preorășenească dinspre Roman și în vestul Podișului Central Moldovenesc. Tutunul are condiții foarte bune de cultură pe solurile nisipoase și este extins în jumătatea estică a Colinelor Tutovei și în aproape toate comunele dintre Bîrlad și Prut, cu excepția

nordului Podișului Central Moldovei și a Depresiunii Elanului. Plantele de nutreț se cultivă în Podișul Central Moldovenesc, în Dealurile Fălciului, Colinele Tutovei ș.a.

Legumicultura se practică în lungul văilor Prutului (Grozesti, Răducăneni, Costuleni și la est de Huși), Birladului, ale unora dintre afluenți și în zonele preorașenești.

Viticultura găsește condiții foarte bune pe o parte însemnată a teritoriului. La podgoriile vechi renumite (Nicorești, Huși, Răducăneni ș.a.) s-au adăugat altele noi (Dealurile Bujorului, Berești, Podu Turcului, Duda-Epureni etc.) și au fost extinse viile nobile în locul hibrizilor. Pomicultura are și ea condiții bune de dezvoltare cu predominarea prunului, mărului, cireșului și vișinului. Livezi importante se găsesc în regiunile Comarnă—Tomești (pentru cireș, vișin și măr) și Răducăneni—Moșna (cireș, vișin și gutui), în bazinul superior al Birladului (la Țibănești, Tansa, Dagîța), în Colinele Tutovei (la Voinești, Puiești, Perieni ș.a.) și la contactul dintre Depresiunea Elanului și Dealurile Fălciului (Vișoara, Roșiști, Șuletea și Epureni).

Creșterea animalelor se sprijină pe suprafețe mari cu pășuni și culturile furajere. Fiețele și pășunile sînt prezente cu precădere în lunci și pe versanții afectați de procese intense de degradare, dar calitatea pășunilor de pe versanți este redusă, sprijinind mai ales creșterea extensivă a oilor. Pentru creșterea animalelor în sistem industrial au fost înființate fabrici de nutrețuri concentrate (la Fălciu, Birlad ș. a.) și ferme specializate: pentru porcine la Fălciu, pentru îngrășarea berbecilor la Rîșești și Vetrișoia, pentru bovine la Huși și Costești etc. Pe ansamblul Podișului Birladului precumpănește creșterea oilor, dezvoltată mai ales în Depresiunea Elanului, în Dealurile Fălciului, în Colinele Tutovei, în estul și sud-estul Podișului Central Moldovenesc. Rasele răspindite sînt: țurcana, în nord, țigaia și merinos, în est și sud. Acest sector de activitate prezintă în cea mai mare parte un caracter tradițional extensiv. Abia în ultimii ani s-au organizat unități specializate în cadrul întreprinderilor agricole de stat.

Creșterea bovinelor este în dezvoltare, dar se menține cu un număr de animale la 100 de ha teren agricol sub media pe țară și a Podișului Moldovei. De asemenea,

porcinele, cu unele excepții, sînt în număr mic la 100 ha teren arabil. Creșterea păsărilor a cunoscut în ultimii 10 ani o curbă ascendentă, după ce a căpătat un caracter industrial. O altă ocupație, pescuitul, fără a fi o îndeletnicire caracteristică în Podișul Birladului, prezintă un interes local și este practicat, în special, în Prut și în bălțile din lungul lui: Lacul Grosu, Balta Mare, Lacul Hirșești, Lacul Cirja etc.

Pînă la sfîrșitul epocii feudale, peisajul Podișului Moldovei a fost supus — aproape exclusiv — acțiunilor din domeniul agropastoral. Apariția elementelor de industrializare, cu precădere în epoca capitalistă, au dat o tentă nouă peisajului. Totuși, din cauza tehnicii de exploatare a potențialului natural puțin avansată, a lipsei de căi și mijloace de comunicații lesnicioase, Podișul Birladului și-a păstrat gradul accentuat de ruralism pînă la mijlocul secolului XX, cînd a început să se schimbe vizibil peisajul regiunii.

Prin cumularea acțiunilor antropice, peisajul natural reprezintă aici între 8% și 20%, cea mai mare parte aparținînd peisajului derivat: echilibrat și culturalizat în mare măsură și, local, chiar degradat (I. Stănescu, 1974). Ariile degradate, cu optim ecologic-economic redus (determinate de eroziuni și alunecări accelerate de unele acțiuni antropice) sînt foarte frecvente pe versanții din bazinul superior al Birladului și din Colinele Tutovei și mai reduse în Podișul Covurluiului. Șesurile Birladului și ale unor afluenți (Racova, Vaslui, Lohan, Tutova, Berheci), precum și al Elanului încă mai suferă de pe urma inundațiilor și înmlăștinirilor determinate de panta redusă și de caracterul torențial al scurgerii. Se depun eforturi pentru stăvilirea proceselor de degradare a versanților, de scoatere de sub inundații a luncilor și de organizare a teritoriului în funcție de necesitățile economice actuale.

Particularitățile fizice care formează suportul celorlalte componente ale peisajului au dus la diferențierea în cuprinsul Podișului Birladului a unor subunități cu trăsături geografice proprii. Se disting astfel: Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei, Dealurile Fălciului și Depresiunea Elanului, Podișul Covurluiului și Culoarul Birladului (fig. 180).




Fig. 180. Subunitățile Podișului Birladului. a, Dealuri, coline; b, depresiuni; c, culoare depresionare.

6.2.3.4. Podișul Central Moldovenesc

Ocupînd partea de nord a Podișului Birladului, Podișul Central Moldovenesc — numit Podișul sarmatic de M. David (1922) sau Podișul Birladului superior de V. Mihăilescu (1932) —, este cuprins între Coasta Iașului, la nord și aliniamentul format de Valea Morii (afluent al Siretului), Coasta Racovei, valea Birladului (între confluența Racova-Birlad și localitatea Crasna), coasta Lohanului, continuată prin nordul Dealului Dobrina (370 m) și versantul nordic al văii subsecvente a Draslovățului, la sud. Între valea Siretului și localitatea Crasna intră în contact cu Colinele Tutovei, iar între Crasna și valea Prutului cu Dealurile Fălciului. Structural corespunde cu partea sudică a Platformei Moldovenesti, cu constituție

omogenă și mobilitate tectonică redusă, ceea ce a condiționat dispunerea monoclină a sedimentelor de cuvertură. Formațiunile în care este sculptat relieful aparțin, aproape în totalitate, sarmațianului cu extensiune mare a depozitelor basarabiene (argile, marne și nisipuri în care se intercalează orizonturi de calcare oolitice cu grosimi de 3–5 m), peste care urmează un pachet de 130–150 m de argile, argile nisipoase și nisipuri cu intercalații și concrețiuni gresoase care aparțin faciesului deltaic al sarmațianului superior. Meotianul apare insular numai pe cele mai înalte culmi (Dealul, Coropcenii).

Trăsăturile structurale ale reliefului sînt asemănătoare cu ale Podișului Sucevei prin punerea în evidență a orizonturilor mai dure grezo-calcaroase, ambele unități fiind reprezentate prin „podiișuri-structurale” (C. Martiniuc, 1960) (fig. 181).

Cauzele tectonice la formarea reliefului susținute în trecut (M. David, 1941) au fost infirmate de studiile mai recente (P. Jeanrenaud, 1971). Micile deranjamente surprinse în structura sa actuală sînt de natură sedimentologică primară sau morfodinamică secundară (microcute, microfalii), care n-au nici un rol în morfologia podișului.

Atacat puternic dinspre sud de o rețea hidrografică activă, relieful este alcătuit dintr-un ansamblu de platouri larg bombate, dispuse în semicerc spre periferia nordică, cu înălțimi ce depășesc 400 m (Dealul Cetatea 467 m; Dealul Tansa 466 m; Dealul Bourului 455 m) și care coboară spre valea Birladului pînă la 100 m. Energia maximă a reliefului depășește 350 m iar cea medie oscilează între 150 și 200 m.

(Relieful dominant este cel de platouri structurale (Bunești — Averești, Tansa, Ipatetele, Borosești, Slobozia, Budu Cantemir, Dobrovăț, Schitu Duca), mărginite de cueste. Diferențierea altitudinală a platourilor a sugerat ideea interpretării lor ca platforme de eroziune, rezultate ale unei evoluții policiclice (Natalia Șenchea, 1941). Studiile mai noi au pus în evidență continuitatea de sedimentare mio-pliocenă și evoluția geomorfologică normală, determinată de activitatea selectivă a factorilor denudaționali și de dezvoltarea bazinelor hidrografice (V. Băcăuanu și colab., 1980) (fig. 181). Cuestele și versanții culmilor secundare sînt dominate de procese geomorfologice active, reprezentate

de alunecări în diverse stadii de evoluție, de eroziune torențială și spălări areolare. În lungul Birladului superior și al afluenților principali au fost identificate un număr de 4—7 terase, care ajung până la 100—120 m altitudine relativă. Albiile majore ale Birladului, Racovei, Crasnei, Vasluiului, aflate în plin proces de agardare, sînt parazitare, la contactul cu versanții, de gla-

asigurări mai mari de 55%. În schimb, debitele maxime ating valori între 100 și 370 m³/s. Din aceste motive bazinul Birladului a fost supus amenajării hidrotehnice, realizîndu-se un control prin acumulări pe circa 30% din suprafața sa (Iacurile Solești 452 ha; Căzănești 180 ha; Trohan 21 ha; Pușcași 230 ha etc.).




Fig. 181. Relieful structural din Podișul Central Moldovenesc. 1, Suprafețe structurale pe calcare oolitice basarabiene; 2, suprafețe structurale pe gresii kersoniene; 3, suprafețe structurale pe gresii cineritice meotiene; 4, cueste principale; 5, cueste secundare; 6, văi-consecvente; 7, văi subsecvente; 8, văi obsecvente; 9, văi resecvente.

cisuri coluvio-proluviale sau conuri de dejecție izolate, adesea ocupate de așezări.

Condițiile climatice cu precipitații de 500—600 mm și aria redusă a formelor de acumulare, care constituie principalele rezervoare de ape subterane, fac ca riurile să aibă un regim de scurgere de tip torențial. Cu excepția Lohanului, toate celelalte riuri au debite medii lunare minime de vară nule pentru

Aspectul de mozaic biopedologic este o consecință a poziției sale de tranziție între nordul și sudul Moldovei și a diversității morfologice și litologice. Astfel, pe solurile brune luvice și luvisolurile albice, la înălțimi de peste 400 m domină fagul. La altitudini mai joase, pe soluri cenușii în asociere cu solurile brune luvice, se dezvoltă gorunul la care se mai adaugă (în regimurile de silvostepă din

depresiunile Hușilor și Vasluiului cu soluri cernoziomoide) specii termofile de stejar pufos și stejar brumăriu. Dintre solurile intrazonale se remarcă regosolurile, consecință directă a proceselor de versant de pe culesturile abrupte ale Birladului superior, Crasnei, Vasluietului, Moșnei sau de pe suprafețele arabile cu pante mai mari de 20° , rîndzinele de pe platourile structurale cu calcare la zi, precum și peticele reduse

Rateș, Rebricea). Funcția predominantă a așezărilor este cea agricolă. Printre localitățile de acest tip se găsesc diseminate așezări agricole și industriale (morărit — Tăcuta, exploatarea lemnului — Mironeasa, Dobrovăț, Răducăneni, Codăești) etc.), unele cu tendințe de urbanizare.

Avîndu-se în vedere particularitățile peisajului geografic, pe cuprinsul Podișului Central Moldovenesc se disting următoarele




Fig. 182. Repartiția și mărimea așezărilor din Podișul Central Moldovenesc.

de sărături și lăcoviști din luncile riurilor principale.

Densitatea populației variază între 50 și 70 loc./km². Deși natalitatea atinge valori mari (35‰ în comunele Mironeasa și Tiba-na), datorită bilanțului migratoriu negativ (−0,5‰ în sud-vest), creșterea populației este foarte lentă.

Cele mai numeroase localități s-au dezvoltat în lungul văilor principale, în jurul bazinelor de recepție mici și în apropierea pădurii. Platourile sînt foarte puțin populate. Satele sînt de dimensiuni mici și mijlocii (500—1 500 loc.) și de tip răsfrat sau adunat (fig. 182). Multe din așezările de aici sînt relativ noi, formate prin „roire” în ariile eliberate de păduri sau prin migrarea spre axele principale de circulație (Lunca

subunități : Platourile structurale înalte, Dealurile Racova—Sternic, Dealurile Icușeștilor, Dealurile Comarna—Răducăneni, Depresiunea Negrești și Depresiunea Huși.

Platourile structurale înalte sînt alcătuite din două ansambluri de înălțimi structurale : Tansa—Repedea și Dolhești—Bunești cu peisaj asemănător, dar despărțite de valea largă a Vasluiului. Primele se întind la vest de această vale, ocupînd latura nordică a Podișului Central Moldovenesc, iar următoarele sînt reprezentate de înălțimile cele mai mari din bazinul Crasnei. Ele corespund orizontului de calcare dolitice și gresii sarmatice, ori al celor de cinerite andezitice. Sînt mărginite de culesturi și versanți abrupti, cu procese geomorfologice active. Între acestea cea mai mare dezvoltare o are Coasta




Fig. 183. Utilizarea terenurilor din Podișul Central Moldovenesc. 1, Terenuri arabile; 2, vii; 3, livezi; 4, pășuni și fînețe; 5, păduri.

Iașilor (M. David, 1941), cu o energie față de Cîmpia Moldovei de peste 200 m.

Fiind un domeniu al pădurilor de foioase (stejar și fag), pajistilor și culturilor agricole pe soluri brune podzolite (luvice) și podzoli argiloiluviale (luvisoluri albice) — slab productive — și avînd un potențial hidric deficitar, așezările omenești (în totalitate rurale) sînt ceva mai rare (circa 7 așezări la 100 km²). Optimizarea condițiilor naturale menționate impun investiții importante (fig. 183).

Dealurile Racova—Stemnic alcătuiesc un complex deluros flancat de cuestele Birladului superior și ale Racovei. În nord-vest cu aspect de mici platouri structurale pe gresii kersoniene, cu altitudini ce depășesc 400 m, devin din ce în ce mai joase în sud-est, unde capătă aspect de coline. Din punct de vedere uman și economic, această subunitate se aseamănă cu prima.

Dealurile Icușeștilor, numite și „Fața Siretului”, sînt alcătuite din cîteva culmi asimetrice detașate din partea înaltă a podișului, cu orientare est—vest. Afluenții subsecvenți de pe stînga Siretului creează o succesiune

de cueste din dreptul Romanului pînă aproape de Bacău, numite cuestele Icușeștilor (C. Martiniuc, 1960). Intens despădurite și afectate de procese geomorfologice active, aceste dealuri sînt acoperite cu pajisti, culturi agricole și livezi. Așezările rurale, dezvoltate pe văi și la contactul cu șesul Siretului, se află în zona de influență a orașului Roman.

Dealurile Comarna—Răducăneni, numite și „Fața Prutului”, sînt o replică spre est a dealurilor Icușeștilor. Succesiunea culmilor ce coboară spre șesul Prutului este despărțită de văile subsecvente Goruni, Comarna, Covasna, Cozia, Bohotin și Moșna. Bazinele Bohotinului și Moșnei au aspect de mici depresiuni, cu un climat de adăpostire în care se dezvoltă foarte bine viața de vie și pomi fructiferi (gutuile de Moșna, busuioaca de Bohotin). Rețeaua de așezări de pe cuprinsul acestor dealuri polarizează spre un centru local — comuna Răducăneni — cu funcție agroindustrială în plină dezvoltare.

Depresiunea Negrești corespunde cu valea subsecventă a Birladului superior care se lărgește asimetric, între Oniceni și Buhăiești,

extinzându-se mult pe partea stângă a râului. Această lărgire este accentuată și de altitudinea joasă (sub 200 m) a interfluviiilor substructurale separate de văile largiale Sacovățului, Stemnicului, Rebricei ș.a., care coboară dinspre platourile structurale din nord spre a imprima acestui teritoriu un pronunțat caracter depresionar.

În limitele menționate, extinsă până la sud de Vaslui sau redusă numai la aria de confluență de la Vaslui, această depresiune este consemnată în literatura geografică sub diverse denumiri: Depresiunea Vasluiului (V. Mihăilescu, 1966); Depresiunea Vaslui — Racova (V. Tufescu, 1974) sau Depresiunea Birladului superior, care se identifică cu ceea ce Gr. Posea și L. Badea (1980) numesc Depresiunea Negrești.

Condițiile morfoclimatice și pedologice, favorabile unei agriculturi complexe, au determinat dezvoltarea unui număr însemnat de așezări rurale (15—19 așezări la 100 km²), avînd ca centru de polarizare orașul Negrești.

Orașul Negrești este singura așezare urbană mai legată de Podișul Central Moldovenesc și cea mai mică din Podișul Birladului. Localitatea, care se pare că există din prima parte a secolului XV (M. Costăchescu, 1931—1932), a fost legiferată ca tîrg în 1845, iar în 1968 a fost declarată oraș. Populația a crescut prin spor natural (19,8‰ anual), deoarece bilanțul migratoriu a rămas negativ (Al. Ungureanu, 1980). Pînă la mijlocul secolului XX abia a atins 2 188 de locuitori (1948). O creștere mai substanțială a avut loc în ultimii treizeci de ani, cînd au luat ființă cîteva unități industriale; de prelucrarea cărnii, a laptelui, de vinificație, morărit și panificație, reparații de utilaj agricol, textile și confecții, de prelucrarea lemnului, care au redus caracterul negativ al bilanțului migratoriu. Ca urmare, în 1992 orașul Negrești a ajuns la 9 723 de locuitori.

Depresiunea Huși, situată în sud-estul Podișului Central Moldovenesc, reprezintă o subunitate geografică bine delimitată a cărei origine sculpturală este datorată râurilor Draslovăț, Huși, Recea, Gura Văii. Această depresiune este mărginită la vest de culmea Lohanului, la nord de cuesta Pietrăriei, la sud de cuesta Draslovățului; la est se deschide larg spre lunca Prutului (I. Gugiuman, 1959). Alături de complexul de culmi sculpturale din interior, cu înălțimi de 180 — 250 m, apar și unele platouri structurale suprapuse orizonturilor de gresii cal-

caroase, de vîrstă basarabiană (Dealul Ghermănești 215 m), iar în lungul Prutului și al unor afluenți se disting terasele de 5 — 11 m, 18 — 32 m, 57 — 58 m, 100 — 105 m și 134 — 140 m (I. Gugiuman, 1959), echivalente de V. Băcăuanu (1980) cu terasele de 10—15 m, 20—30 m, 60 m, 90—100 m, 140 — 150 m, depistate în alte sectoare ale acestui rîu și care sînt bogate în ape freatice de bună calitate. Acumulări de ape subterane se găsesc și în depozitele sarmatieni care, datorită gradului ridicat de mineralizare (brom, iod ș. a.), au valoare terapeutică.

Climatul de silvostepă, calitatea bună a solurilor (cernoziomuri, soluri aluviale ș. a.) și apropierea surselor de apă au permis ca Depresiunea Huși să devină un bazin vitipomicol și legumicol însemnat, cu numeroase așezări (densitatea așezărilor este de 12/100 km²), care au ca centru de polarizare orașul Huși, singura localitate urbană de aici.

Orașul Huși este situat în estul Podișului Birladului, oarecum izolat, la poalele cuestei Dobrina — Voloșeni, înconjurat la sud și la vest de dealuri înalte. Cadrul geografic înconjurător este destul de pitoresc, cu păduri pe relieful înalt și podgorii pe cel depresionar adăpostit. Prima atestare documentară păstrată a Hușiului este din anul 1487. În secolele trecute a avut funcții administrative (curte domnească, reședință de ocol și de episcopie), comercial-meșteșugărească și agricolă, fiind centrul uneia din cele mai renumite podgorii ale Moldovei. Evoluția sa teritorială s-a realizat prin înglobare treptată a unor sate vecine (Broșteni, Plopeni, Cotroceni, Rîșești și Corni), astăzi cartiere ale orașului. Poziția relativ izolată, concurența unor tirgușoare noi, înființate în secolul XIX (Răducăneni, Drînceni, Hoceni și Urdești), precum și a celeilalte reședințe de ținut (Fălciu) au frînat dezvoltarea economico-urbană a Hușiului, păstrîndu-și funcția dominant agricolă pînă în zilele noastre.

Populația orașului Huși a avut o creștere relativ lentă, bazată mai mult pe sporul natural (4 975 de locuitori în 1832, 12 115 în 1845, 15 866 în 1899, 17 519 în 1930, 18 055 în 1956). Ritmul de creștere s-a accelerat în ultimii ani (22 895 de locuitori în 1977, 32 688 în 1992), ca urmare a procesului de industrializare. Odată cu aceasta s-a schimbat și structura profesională, popu-

lația care activează în industrie și construcții precumpănind.

Industria orașului Huși este reprezentată de unități ale industriei alimentare (mărit, vinificație, prelucrarea laptelui, legumelor și cărnii), industriei ușoare (încălțăminte și mănuși, tricotaje, filatură de bumbac), industriei de prelucrare a metalelor (piese de schimb, obiecte metalice de larg consum), industriei materialelor de construcții (prefabricate din beton) și ale industriei de prelucrare a lemnului (mobilă de bucătărie, ambalaje, căruțe, binala etc.).

Orașul Huși deține și o gamă largă de servicii care contribuie în mod substanțial la dezvoltarea economică, socială și culturală a localităților din Depresiunea Huși și chiar din Cîmpia Fălciului. La dezvoltarea economică a orașului a contribuit și modernizarea șoselei de tranzit internațional București — Chișinău — Kiev.

6.2.3.5. Colinele Tutovei

Numele de Colinele Tutovei este legat, pe de o parte, de vechea împărțire teritorial-administrativă a Moldovei feudale, cînd o mare parte a acestui teritoriu aparținea ținutului Tutova (numit astfel după pîrîul Tutova), iar pe de altă parte, de aspectul caracteristic al reliefului, cu interfluvii înguste, prelungi, paralele, monoclinale, foarte asemănătoare între ele și cu versanți abrupti, cărora li s-a spus de geografi coline, deși termenul de colină este folosit rar de localnici. Ei utilizează foarte frecvent pe cea de „zare” sau „pe zare”, prin care înțeleg partea superioară, înaltă, cu aspect de platou îngust, al unei coline (P. Poghire, 1972). Numele de Colinele Tutovei a fost folosit pentru prima oară de geograful Mihai David iar limitele lor au fost precizate mult mai târziu.

Colinele Tutovei se desfășoară între văile Siretului, în vest, Bîrladului, în est, Coasta Racovei și valea Morii în nord și Cîmpia Tecuciului, în sud (I. Hârjoabă, 1968); pe o suprafață de 3 751 km², în care sînt răspîndite 402 așezări rurale (cu aproximativ 250 000 de locuitori). Nu posedă orașe în interior, ci doar tirgușoare ca centre de polarizare, unele susceptibile de a deveni cu timpul orașe (de exemplu, Podu Turcului, Puiești ș.a.).

Este o unitate construită pe un fundament ce aparține flancului sudic al Platformei Moldovenesti și părții de nord-vest a Depre-

siunii Bîrladului, puternic compartimentat și faliat. Cuvertura sedimentară (sarmațiană și pliocenă) groasă și uniformă dă unitate teritoriului. Kersonianul este în facies marin, argilo-nisipos în nord-est și deltaic, dominant nisipos (cu intercalații de gresii și argile), în nord și nord-vest, iar meotianul (cu grosimi de peste 300 m) este format dintr-un complex de nisipuri, nisipuri argiloase, argile și marne — care începe la bază cu un orizont de cinerite andezitice (groase pînă la 20 m în est și 80 m spre Siret). În sudul colinelor, peste meotian, sînt depozite nisipoase pontiene și daciene, iar pe culmi sînt prundișuri roșietice villafranchiene acoperite de luturi loessoide. Resursele subsolului sînt foarte limitate.

Pot fi amintite rezervele modeste de gaze naturale și petrol din sud (Găiceana — Glăvănești), intercalațiile de pietrișuri și nisipuri de construcții, argilele și luturile loessoide pentru cărămizi și olărie. Ceramica țărănească se obține la Tarnița, Poiana lui Alexa (ceramică roșie) și Ezerel (ceramică neagră).

În nord, pe circa 60 km, se desfășoară pe direcția vest—est Culmea Racovei de peste 400 m, din care izvorăsc cîțiva din afluenții consecvenți ai Bîrladului ce separă colinele orientate, în linii mari, nord—sud. În vest, între afluenții Siretului și ai Berheciului este Culmea Arinoasei orientată tot nord—sud, lungă de circa 90 km. În nord-vest între acestea și interfluviul Răcătau — Siret este mica Depresiune Parincea. Culmile Racovii și Arinoasei (cunoscute cu numele de „obcîni ale obîrșiiilor”) despart obîrșiiile văilor și din ele se desprind, dominant spre sud, colinele. La est de valea Berheciului sînt coline orientate, în linii mari, nord—sud, din ce în ce mai scurte spre est, începînd cu cea dintre Berheci și Zeletin (care are aproximativ 70 km) și în nordul căreia este Dealul Doroșanu de 564 m (cea mai înaltă din coline). Colinele de la est de valea Tutovei au o asimetrie mai evidentă. În extremitatea sudică Colinele Tutovei se termină prin platoul Poiana Nicorești, coborît la sub 100 m altitudine absolută. Deși sînt diferențe mari între fragmentarea și energia reliefului din nord (comparabile cu cele din Subcarpați) și din sud (unde valorile se reduc la mai mult de jumătate), formele de relief își mențin, totuși, același aspect. În aceeași măsură procesele de versant își reduc frecvența și intensitatea. Chiar dacă nu se materia-

lizează o anume limită, se poate vorbi de colinele înalte din nord și nord-vest și de cele joase din sud și sud-est. Trecerea de la o subunitate la alta se face aproximativ în lungul unei linii care unește, pe direcția sud-vest — nord-est, înălțimile în jur de 350 m ale culmilor. Chiar trecerea de la Colinele Tutovei la unitățile vecine se face prin fișii de interferență, în care aspectele geografice fizice și umane sînt comune. Relieful de cuestă din coline (cum sînt cuestele Racovei de la limita nordică sau cuestele din nord-vest, vest și nord-est — cuestele Lipovățului) nu are răspîndirea cunoscută în cea mai mare parte din Podișul Moldovei. Spre obârșile Tutovei și Lipovei, prin orientarea culmilor, prin prezența unor forme structurale și a unor amfiteatre de alunecare mari, relieful se aseamănă cu cel din Podișul Central Moldovenesc (I. Hârjoabă, 1968). În sud, colinele au aspectul de podiș scund, slab fragmentat, cu relieful asemănător celui de cîmpie. Dinamica reliefului, în cuvertura sedimentară dominant nisipoasă, se manifestă accelerat, favorizată de înclinarea accentuată a versanților, de predominarea rocilor nisipoase, de defrișările unor suprafețe întinse. Deplasările în masă (alunecări, surpări, solifluxiuni), spălarea sau eroziunea areolară și eroziunea torențială afectează aproape 2/3 din suprafața versanților. Eroziunea torențială se manifestă cu deosebită putere, creînd ripe adînci. Stăvilirea acțiunii de degradare a reliefului constituie o problemă majoră și nu întîmplător, la Perieni, funcționează o Stațiune de cercetări pentru combaterea eroziunii solului, cunoscută pe plan național.

Văile din Colinele Tutovei sînt în mare parte împotmolite, ca urmare a variațiilor mari ale debitelor lichide și solide (la topirea zăpezilor și la ploi). Pentru diminuarea proceselor nefavorabile de pe versanți și din lungul văilor au fost efectuate lucrări de combatere în bazinul Drobotforului, pe Tutova, Valea Seacă, Pereschiv etc. Mulți versanți au fost terasați pentru plantații de vii și livezi și au fost construite baraje pentru reținerea apei. În lungul Tutovei și Zeletinului apar cîteva fragmente ale terasei de 5–8 m, pe Berheci, Zeletin, Tutova și Pereschiv ale terasei de 10–20 m altitudine relativă, iar spre confluența Berheciului sînt terase de confluență de 20–25 și 60 m altitudine relativă. Podurile teraselor sînt reduse, astfel că omul nu a beneficiat de suprafețe largi


nici pentru vetrele așezărilor, nici pentru culturi agricole.

Colinele Tutovei par să prezinte o uniformitate geografică de ansamblu, dar se constată, totuși, că există o anumită varietate și o succesiune a condițiilor biopedoclimatice pe fișii dispuse pe direcția nord-vest — sud-est. Ele indică limita dintre clima de dealuri și cea de cîmpie (limita dintre păduri și silvostepă). Precipitațiile totalizează peste 500 mm anual în nord și sub 400 mm în sud și au în mare parte caracter de averse. Amplitudinile termice sînt mari (de la +39,7°C la –30,3°C la Birlad) și se pot înregistra pînă la 80 de zile lipsite de precipitații. În schimb, la topirea zăpezilor și în timpul ploilor abundente se produc frecvent inundații. Constituția geologică cu lentile mici de roci impermeabile face ca stratul acvifer să fie discontinuu și neuniform. Apele subterane libere sînt anemice, izvoarele sînt risipite, au debite mici, iar culmile au apă puțină și la adîncime. Chiar în șesuri și pe terase pinzele de apă sînt sărace.

Fragmentarea mare a reliefului și răspîndirea surselor de apă explică în mare măsură răspîndirea așezărilor omenești pe vetre mici și cu locuitori puțini. În general, așezările au evitat locurile expuse vînturilor reci (de pe culmi) și cele în care procurarea apei este dificilă. Sărăcia pinzelor de apă a fost compensată într-o anumită măsură prin iazuri și rîmnice. Aceste acumulări au fost foarte numeroase anterior extinderii defrișărilor. Prin distrugerea pădurilor și extinderea terenurilor agricole s-au activat mult procesele de versant și din lunci, ceea ce s-a soldat cu colmatarea și dispariția multor acumulări de acest fel. La sfîrșitul secolului XIX existau 46 de iazuri și 47 de mori de apă. În prezent mai sînt doar cîteva dintre iazurile vechi. În acțiunea de amenajare a teritoriului se are în vedere refacerea unora dintre iazuri și construirea a 12 baraje pentru reținerea apei (dintre care au fost construite, pe Valea Seacă, pe Tutova, pe Pereschiv etc.), care vor contribui și la diminuarea inundațiilor.

Solurile silvestre sînt răspîndite pe 2/3 din suprafața Colinelor Tutovei. În primele decenii ale secolului trecut (după harta rusă), pădurile ocupau 47,4% din suprafață, în 1893 ajunseseră la sub 22%, iar în prezent sub 19%. Există o interferență între vegetația forestieră și de silvostepă, cu prelungiri ale pădurilor spre sud, în lungul culmilor și ale silvostepii spre nord, în lungul văilor.

Fig. 184. Repartiția și mărimea așezărilor din Colinele Tutovei.




Cele mai multe păduri aparțin subzonei gorunului. La peste 400 m înălțime apar și păduri restrinse de fag, iar spre sud și sud-est specii termofile de everceinee. Silvostepa pătrunde mai ales pe valea Birladului. În secolele trecute pădurile din Colinele Tutovei erau stăpînite în devălmășie absolută și numai foarte puține erau braniști boeresti și domnești. Ca urmare, defrișarea lor a fost liberă pentru obținerea de curături, care deveneau proprietăți răzășești. Extinderea răzășiei în dauna pădurii a constituit timp îndelungat o activitate esențială pentru creșterea suprafeței curăturilor și amplificarea libertății răzășești. Colinele Tutovei reprezintă teritoriul în care s-a manifestat cea mai puternică și mai răspîndită răzășie din Moldova și unde s-au format prin defrișări,

în prisăci și în poieni, cele mai numeroase așezări rurale mici (P. Poghir, 1972).

Densitatea populației în această parte a Podișului Birladului este de 65 loc./km², mai mică decît media țării, deoarece migrațiile definitive în afara teritoriului sînt intense. Condițiile geografice și istorice au favorizat formarea unor trupuri de moșii ale așezărilor de dimensiuni mici, cu hotarele înjugate (organizate pe un singur șir, din „zare” în „zare” sau de la pîriu pînă în „zare”) și înșurărite (corespunzînd cu cele din văile vecine) (H. H. Stahl, 1965). Alternanța deasă a văilor și „zărilor” a favorizat formarea unor hotare mici care să permită asigurarea unor condiții complexe de viață pentru obștile satești, fără să-și stînjenească vecinii („zările” cu păduri, versanții pentru

Fig. 185. Utilizarea terenurilor din Colinele Tutovei. 1, Terenuri arabile; 2, vii; 3, livezi; 4, pășuni și finețe; 5, păduri.



vii și livezi, colinele joase pentru țărini, șesurile pentru finețe, iazuri, mori de apă etc.). Această situație s-a reflectat în formarea unor așezări rurale mici și foarte mici, aici găsim-se cele mai multe așezări de acest fel din Moldova: 8% din numărul așezărilor actuale au sub 100 locuitori și aproape jumătate între 100 și 400 locuitori (fig. 184). Sînt foarte frecvente cătunele risipite sau răsirate. Majoritatea așezărilor formează aliniamente la contactul luncilor cu versanții (68% sînt sate de versant) și au o putere economică modestă (P. Poghire, 1972). Aceste localități pun probleme dificile sistemizării și chiar împărțirii administrative (sînt comune cu foarte multe sate, chiar pînă la 17).

Economia din Colinele Tutovei era rămasă în urmă și păstra aspecte tradiționale legate

de autarhismul răzăsesc. Solurile și celelalte condiții geografice fizice puțin favorabile permit mai ales extinderea pomiculturii și viticulturii. Au fost mărite podgoria Nicoreștilor (spre Podu Turcului) și livezile, în nord, la Voinești, Plopana etc. Spinările culmilor și versanților cu pante mici se cultivă predominant cu cereale, iar în preajma orașelor din culoarele Birladului și Siretului s-au extins culturile pentru aprovizionarea piețelor (fig. 185). În estul teritoriului se cultivă tutunul, varietatea molovata. Creșterea animalelor nu se pune în evidență în mod deosebit, exceptînd creșterea oilor.

Chiar în stadiul actual de dezvoltare ruralismul colinelor este încă accentuat. Țirgușoarele de aici nu au progresat prea mult iar lipsa căilor ferate și a căilor rutiere transversale întîrzie procesul dezvoltării. Colinele

Tutovei sînt îmbucătățite administrativ și economic, intrînd în ariile de influență ale orașelor aflate în afara lor. Ele au rămas însă o unitate geografică umană și economică mai mult tradițională, în care fenomenele prezintă o evidentă uniformitate pe întreaga suprafață.

6.2.3.6. Dealurile Fălciului și Depresiunea Elanului

Între valea Birladului mijlociu și cea a Prutului se disting două subdiviziuni geografice: Dealurile Fălciului și Depresiunea Elanului, aceasta din urmă fiind cunoscută în literatură și sub alte denumiri: Stepa Elanului, Cimpia sau Depresiunea Fălciului.

a. *Dealurile Fălciului*, situate între văile Birladului și Elanului, se întind de la cuestele Lohanului și Draslăvățului (în nord) și pînă la cuestele Jeravățului și Horincei. Relieful, sculptat în marne argiloase, nisipuri și nisipuri argiloase, argile, cinerite nisipoase mio-pliocene, acoperite de depozite cuaternare, este reprezentat de o culme principală (cu altitudine de peste 300 m), fragmentată lateral de o rețea hidrografică tributară Birladului, Siretului (spre sud) și Prutului. Aici se îmbină relieful de platouri și cueste specifice Podișului Central Moldovenesc cu relieful colinar specific Colinelor Tutovei. Asimetria generală a reliefului, prezența platourilor largi, presărate cu microdepreșiuni de culme, precum și a versanților (cueste) afectați de procese geomorfologice (mai frecvente și mai active spre văile Birladului, Lohanului) întregesc imaginea geomorfologică de ansamblu. În partea nordică, cele mai mari înălțimi se aliniază în lungul unei culmi cu direcția nord-est — sud-vest, pe care se însiră dealurile Dobrina (365 m), Crețești (359 m), Oltenești—Zgura (376 m), care însoțesc cuesta Lohanului pe o lungime de aproape 25 km. Colinele monoclinale ce se desprind din această culme coboară spre sud-est și sînt rezultatul înaintării regresive a afluenților Elanului superior. Între Albești și Vutcani și între Zorleni și Epureni dealurile se îngustează mult și domină succesiunea de platouri largi cu altitudini ce nu depășesc 300 m, prelungite lateral cu culmi scurte, separate de mici bazine torențiale. Extremitatea sudică are o înfățișare mai masivă și înălțime de peste 300 m. Structura monoclină și prezența unor fronturi mai dure de cinerite andezitice imprimă reliefului aspecte struc-

turale, exprimate prin platourile largi din nordul regiunii, cuestele mari ale Lohanului, Draslăvățului și Birladului și succesiunea de cueste secundare de pe clina vestică a culmii principale.

Cornișele active (cu înălțimi de 15—25 m) care însoțesc cuestele pe distanțe mari și în general intensitatea proceselor de versant în diverse stadii de evoluție constituie nota specifică a acestei unități deluroase. Măsurile de combatere a degradărilor de teren declanșate în ultimii ani au redat circuitului economic mari suprafețe în perimetrele agricole ale localităților Tîrzii, Grivița etc.

Relieful și condițiile climatice (precipitațiile 450—600 m) au permis dezvoltarea unei rețele hidrografice de mică importanță sub raportul resurselor de apă, dar regimul torențial al scurgerii provoacă multe neajunsuri. Nici apele subterane nu constituie o rezervă deosebită. Cu excepția unor pinze subterane mai bogate și de bună calitate în dealurile Dobrina—Oltenești (din care se alimentează o parte din orașul Huși), restul Dealurilor Fălciului posedă pinze sărace, cantonate în depozitele sarmațianului superior și meoția-nului și cu concentrații mari de săruri.

Ceea ce întregesc imaginea peisajului actual al acestor dealuri este îmbinarea pe culmi înalte a suprafețelor de pădure, alcătuită din fag, gorun, stejar, în nord și în amestec cu specii termofile (stejarul pufos, stejarul brumăriu, mojdreanul, arțarul tătarăsc ș. a.), în sud și pe latura estică, cu pajiștile dezvoltate pe soluri cenușii și soluri brune luvice. Spre periferia sudică a acestor dealuri este domeniul silvostepii, reprezentat de pîlcuri de arbori termofili și pajiști xerofile degradate, în care domină asociații de peliniță, tiruță cu bulbi, bărboasă, iar local pîiș și negară (D. Mititelu, 1973), dezvoltată — în cea mai mare parte — pe cernoziomuri cambice. În prezent vegetația naturală are o răspîndire redusă, cu precădere pe culmile și versanții abrupti.

Avînd în vedere varietatea peisajului, după unii autori Dealurile Fălciului au fost împărțite în patru sectoare fizico-geografice (C. Martiniuc și colab., 1967): *Dealurile Dobrina—Oltenești*, cu altitudine de 300—370 m, fragmentate de văi adînci, cu climat caracterizat prin temperatura medie anuală de 8—9° și precipitații de 550—600 mm, care favorizează dezvoltarea pădurii de foioase cu gorun, stejar și fag; *Dealurile Vinderei—Mălușteni* cu altitudini în jur de 300 m, climat ceva mai

uscă (precipitații în jur de 500 mm) și vegetație de pădure mezoxerofilă ce face tranziția spre silvostepă; Dealurile Albeștilor, cu altitudini de 200–300 m, pante reduse, climat secetos (temperatura medie de 10°, precipitațiile medii anuale de 430 mm), pe care s-a dezvoltat vegetația de silvostepă




Fig. 186. Repartiția și mărimea așezărilor din Dealurile Fălciumului. 1, Dealuri, coline; 2, depresiune colinară; 3, lunca Prutului.

și soluri cernoziomice și cenușii de pădure; Dealurile Banca—Grivița, situate în extremitatea sudică cu altitudini de 200–250 m, în care văile subsecvente secundare au creat un relief de custe abrupte, afectate de procese active de modelare. Climatului mai secetos a favorizat dezvoltarea vegetației de silvostepă pe cernoziomuri luvie.

Dealurile Fălciumului au oferit condiții mai prielnice de locuire pe margini (fig. 186). De aceea aici domină așezările de contact morfologic (Crețești, Oltenești, Albești, Vut-

cani, Grivița, Vinderei ș. a.), care gravitează mai ales spre centrele de polarizare din unitățile vecine: Vaslui și Birlad — pe valea Birladului, Huși și Murgeni — pe valea Prutului. Sensul divergent al intereselor economice ca și lipsa unor resurse de subsol a făcut ca această unitate să aibă un caracter exclusiv rural, iar densitatea așezărilor (4–8/100 km²) și cea a populației (sub 50 loc./km²) să se situeze sub media țării.

b. Depresiunea Elanului, cuprinsă între Dealurile Fălciumului și Prut, reprezintă în fapt un relief de dealuri joase (100–200 m), sculptate într-un complex de roci friabile (argile nisipoase, calcare gresoase, cinerite de vîrstă kersoniană, meotiană și pliocen mediu, acoperite de luturi loessoide, aluvio-coliuviale, luturi nisipoase și prundișuri fluviale), de o rețea hidrografică tributară Prutului: Elanul, Sărata, Horincea. Este ultima din șirul depresiunilor din lungul Prutului mijlociu și inferior (Depresiunea Prutului mijlociu, Depresiunea Moșna, Depresiunea Bohotin, Depresiunea Huși), care au aceeași geneză. Asemănările peisajului său cu cel din Depresiunea Huși, cu care comunică prin valea largă a Prutului, l-au determinat pe I. Gugiuman (1959) să le înglobeze într-o singură unitate numită Depresiunea Fălciumului.

Formele structurale sînt reprezentate de cîteva custe (ca cele de pe dreapta Elanului mijlociu, din lungul văilor subsecvente ale pîraielor Floreni, Studineț etc.) și cîteva platouri din partea centrală și nordică, formate pe orizonturile mai rezistente de andezite cineritice. În partea estică și joasă a depresiunii predomină formele de acumulare: glacisuri, terase, lunci, formate în special de Prut. Lunca Prutului are lățimea de 4–8 km. Controlul scurgerii prin acumularea de la Stîncea, precum și amenajările locale (îndiguiri, nivelări, desecări) oferă posibilități de utilizare agricolă integrală. Pe versantul drept, paralel cu albia majoră, au fost puse în evidență 5 nivele de terase cu extindere fragmentară.

În condițiile climatice de aici (temperatura medie anuală de 10°C, precipitațiile în jur de 400 mm), rețeaua hidrografică prezintă mari variații de nivel și debit. De exemplu, Elanul are o variație de debit cuprinsă între 0 și 290 m³/s. Acest fenomen produce mari pagube în valea proprie și anulează pe mari suprafețe măsurile ameliorative din șesul Prutului. În aceeași manieră se

produce seurgerea și pe râurile Sărata și Horincea.

Relieful și clima întrunesc un potențial ecologic favorabil asociațiilor vegetale de stepă și silvostepă, dezvoltate pe soluri cernoziomice (carbonatice și semicarbonatice), cernoziomuri cambice întrerupte adesea de areale de soluri salinizate (în lungul văilor Elan și Sărata), psamosoluri și nisipuri semimobile (în sectorul Mălușteni—Vutcăni). Pe solurile salinizate a fost semnalată existența celui mai mare număr de specii halofile, organizate în cele mai tipice asociații din toată Moldova (D. Mititelu, 1973). Cele trei sectoare morfologice ale depresiunii (bazinul Elanului, sectorul Sărata-Prut și bazinul Horincei) nu se impun în fizionomia de ansamblu a peisajului. Energia de relief mică (60–80 m), caracterul stepic și silvostepic integral al climei și vegetației, ca și utilizarea agricolă uniformă impun o notă unitară acestei depresiuni și justifică numirea ei ca „stepa Elanului” sau „Cîmpia Fălciului”.

În decursul istoriei, procesul de umanizare a depresiunii a cunoscut o dezvoltare fluctuantă: creștere progresivă pînă în secolul XV, o reducere a numărului de locuitori și de așezări în secolele XVI–XVIII, prin fenomenul de siliștire, după care, din secolul XIX și pînă în prezent, a urmat o perioadă de sporire a populației și a numărului de localități, fenomen legat de succesiunea legilor rurale din 1864, 1871, 1921, 1945 și al prefacerilor social-politice din perioada de după cel de-al doilea război mondial (Al. Ungureanu, 1980). Cu toate acestea, în prezent, densitatea populației și a așezărilor se înscrie sub valorile medii ale Podișului Moldovei (densitatea populației de 40–80 loc./km², densitatea așezărilor de 4–6 așezări/100 km²). Situația se datorește caracterului exclusiv agricol al economiei și a lipsei unor centre de polarizare puternice, ceea ce a determinat un bilanț migratoriu negativ. Localitățile Ungureni și Fălciu, vechi tirgușoare, dezvoltate în secolul XVIII, n-au atins un nivel de dezvoltare pentru a le face apte să absoarbă excedentul de forță de muncă.

Agricultura dispune de un fond funciar ce depășește 80% din suprafața depresiunii. Pentru sporirea producției și extinderea suprafeței agricole, aplicarea măsurilor hidroameliorative și de protecție a versanților împotriva degradării sint în plină desfășurare. Prin îndiguirea Prutului avale de

Albița și prin desecarea unor incinte din lunca sa, în circuitul agricol au intrat peste 20 000 ha, iar prin crearea unor sisteme de irigații (Fălciu) și a unor instalații locale au fost scutite de urmările deficitului de umiditate cîteva mii de hectare.

Structura fondului funciar de aici plasează depresiunea în zona de cultură a cerealelor (porumb, grâu) și de creștere a animalelor (ovine — rasele spancă și merinos, precum și bovine — rasa Sura de stepă). În aria cerealieră se mai cultivă floarea-soarelui, plante furajere, tutun. Legumicultura se practică în lunca Prutului și mai puțin în cea a Elanului, iar viticultura și pomicultura pe rama vestică și în bazinul superior al Elanului.

Accesul spre această depresiune se face prin cîteva drumuri de importanță locală (Zorleni—Murgeni și Banca—Hurduj), precum și pe șoseaua din lungul văii Prutului care prefigurează un viitor ax de circulație capabil să preia o parte din încărcătura mijloacelor de transport de pe axul văii Birladului.

6.2.3.7. Podișul Covurluiului

Partea sudică a Podișului Moldovei, despărțită de dealurile Fălciului și Depresiunea Elanului prin văile Jeravățului (afluent al Birladului) și Horincei (afluent al Prutului) poartă numele de Podișul Covurluiului. Particularitățile geografice relativ omogene au determinat pe mulți autori să-l considere extins pînă în valea Gerului, la est, și pînă în luncile Siretului și Dunării, la sud (G. Vălsan, 1916; M. David, 1933; C. Martiniuc, 1955; I. Sîrcu, 1971; P. Coteț, 1973; V. Sficlea, 1980; V. Băcăuanu, și colab., 1980). Dar Podișul Covurlui, delimitat după criterii genetico-evolutive, repetă la altă scară Colinele Tutovei. Acest fapt atestă integrarea sa în Podișul Moldovei, fapt observat cu peste 100 de ani în urmă de Grigore Cobălcescu. Cu toate acestea, în unele lucrări mai noi (Atlas. R. S. România, 1972–1979, ș. a.), acest podiș a fost limitat la sud de linia sinuoasă Nicorești — Țepu — Ghidigeni — Valea Mărului pe la nord de Tulucești, iar partea sa sudică (Cîmpia Covurlui) a fost atașată Cîmpiei Române cu care are vizibile afinități.

Geologic se suprapune părții sudice a depresiunii structurale a Birladului cu fundament hercinic-kimmeric de tip dobrogean, acoperit de o cuvertură sedimentară jura-

sică și miocen superioară-pliocen, separată de o mare lacună stratigrafică. Depozitele post-villafranchiene (depozite de terasă și de albie majoră, luturi loessoide, depozite proluviale-prundișuri de Bălăbănești) formează o cuvertură continuă și definitorie pentru caracterele geografice ale unității (V. Sficlea, 1960, 1972; C. Ghenea, 1968; I. Hârjoabă, 1968 etc.). Alcătuirea petrografică, dispoziția monoclinală a strator și manifestările mișcărilor neotectonice (radia-re negative din pliocen până în pleistocenul superior și rar negative în holocen) au avut un rol hotărâtor în modelarea reliefului. În ansamblu acest podiș se prezintă ca o succesiune de interfluvii paralele, culmi sau platouri largi, care coboară de la nord către sud, separate de văi consecvente cu versanți convecși. Altitudinea scade de la 300 m la sub 200 m, iar energia reliefului variază între 150 și 70 m. Tot relieful provine din sculptarea vechii cîmpii villafranchiene, care poate fi interpretată ca un glacis ce face legătura între Podișul Moldovei și Cîmpia Română. Uniformitatea morfologică este tulburată de frecvența relativ mare a „piscurilor” — mici proeminente care domină nivelul culmilor și de „arcaciuri” — bazine torențiale scurte cu versanți abrupti și canal de scurgere foarte strîmt. În aria de răspîndire a depozitelor loessoide s-au dezvoltat numeroase forme clastocarstice și sufozionale: croturi, abrupturi, microforme piramidale, coloane etc.

Spre Cîmpia Tecuciului, la vest, și valea Prutului, la est, Podișul Covurlui coboară în trepte care se identifică cu nivelele de terasă ale Siretului și Prutului (șase nivele). La formarea complexului de terase ale Siretului a contribuit și Bîrladul.

Vecinătatea Cîmpiei Române se reflectă și în caracterele climatice. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9° și 10°C; temperatura medie a lunii ianuarie este de -8°C, iar a lunii iulie de 22°C. Media anuală a precipitațiilor depășește 500 mm, dar în anii secetoși poate coborî sub 400 mm (1963) sau poate urca spre 700 mm în anii ploioși (1969). Vînturile au o dominare proporțională pe direcțiile principale. Este de semnalat frecvența redusă a stărilor de calm (10—15%) și dominarea în proporție de 60% a „vîntului industrial” (I. Stănescu, 1971) cu viteză de peste 2—3 m/s, care poate fi utilizat ca sursă energetică.

În condițiile unui substrat friabil și ale unui regim pluvial neregulat, rîurile (Suhur-

luiului cu Gerul, Lozova, Mălina și Cătușa — tributare Siretului, Chineja cu Covurluiul Sec și Covurluiul cu Apă, Rădiciul și Valea Părului — tributare Prutului) au debit redus și regim de scurgere de tip torențial. Aceste rîuri poartă, în schimb, o încărcătură solidă în suspensie de 13,4 kg/m³ ce dă un debit specific de 6,6 t/ha.an (I. Ujvári, 1959), ceea ce generează un proces intens de colmatare a luncilor, a albiilor minore și a lacurilor de baraj natural (prin conuri de dejecție).

Imaginea de ansamblu a peisajului este dată de alternanța terenurilor cultivate (care domină) cu pășunile și suprafețele împădurite. Vegetația naturală aparține zonei de interferență a pădurii de foioase cu silvostepa. În spectrul său floristic predomină speciile termofile de stejar pufos, stejar brumăriu, cer, gîrniță, mojdrean, cîrpiniță, scumpie. Suprafața împădurită care la sfîrșitul secolului XVIII reprezenta peste 50%, astăzi ocupă abia 5% din suprafața podișului (V. Sficlea, 1980).

Deși sporul natural al populației atinge valori de 20—25‰ densitatea actuală înregistrează valori între 50 și 60 loc./km² și chiar mai puțin în părțile înalte și împădurite. Rețeaua de așezări rurale este alcătuită din sate foarte vechi de tip adunat-răsfrînt (cu 900—1 500 de locuitori), dezvoltate în lungul afluenților secundari. Densitatea de 3 așezări/100 km² (situată mult sub media țării) ca și bilanțul migratoriu negativ explică valoarea redusă a densității populației (Al. Ungureanu, 1980).

Podișul Covurlui se caracterizează printr-o economie predominant agrară, dezvoltată pe seama întinderilor mari cu teren arabil pe soluri fertile (cernoziomuri cambice și soluri cenușii). Agricultură are un caracter complex. Preocuparea principală este cultura cerealelor (porumb și grîu) și creșterea animalelor, în special oi (densitate peste 120 capete/100 ha teren agricol). Pe arii mai mari se cultivă floarea-soarelui, vița de vie și pomii fructiferi (fig. 187).

Larga răspîndire a degradărilor de teren (pe versanți cu înclinare mare și neprotejați de pădure), reprezentate prin spălări areolare, uneori pînă la roca mamă, ravenări care au generat pe suprafețe mici badlandsuri, surpări și alunecări aflate în diferite stadii de evoluție stînjenească practicarea unei agriculturi de tip intensiv pe toată suprafața podișului care este favorabilă extinderii sectorului vitipomicol.




Fig. 187. Podișul Covurluiului. Utilizarea terenurilor. 1, Terenuri arabile; 2, vii; 3, livezi; 4, păduri; 5, vetre de așezări; 6, cale ferată; 7, drumi modernizați; 8, alte drumuri.

Latura industrială a economiei este limitată la o serie de unități de mică producție din sectorul alimentar (mori, panificație, prelucrarea laptelui, vinificație etc.), de prelucrare a lemnului (Sendreni), de covoare etc.

Cele mai importante centre, dar care nu depășesc ponderea economică a unor așezări rurale dezvoltate, sînt orașele Berești și Tîrziu Bujor. Ele provin din așa-zisele „tîrgușoare” cu funcții comerciale și meșteșugărești, formate la sfîrșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Face parte dintr-o

rețea mai largă de asemenea localități de pe cuprinsul Podișului Moldovei care constituiau adevărate centre de polarizare din ariile cu un grad accentuat de ruralism. În a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX au traversat o etapă de regres. În prezent, dezvoltarea lor este axată pe industria locală (mobilă, vinificație, covoare, morărit, prelucrarea laptelui), pe sporirea capacității de servire, pe dotarea din punct de vedere edilitar gospodăresc

Orașul Berești este așezat pe valea superioară a Chinejei, la limita de nord a Podișului Covurluiului. A primit statut de oraș după al doilea război mondial. Numărul locuitorilor este de numai 3 950 de locuitori în 1992.

Orașul Tirgu Bujor este situat la marginea de sud a podișului într-o zonă agricolă de mare randament. Populația orașului înregistrează — în ultimii ani — o ușoară creștere: 7 583 de locuitori în 1977 și 7 957 în 1992.

6.2.3.8. Culoarul Bîrladului

Valea Bîrladului, prin dimensiuni, caracter geografice și funcții trebuie considerată subunitate aparte a Podișului Bîrladului, axă de circulație și de convergență economică pe care se află orașele Bîrlad și Vaslui. Ea străbate Podișul Bîrladului prin mijloc, leagă între ele subunitățile lui geografice și-i dă unitate, iar pe văile aferente se poate pătrunde în interiorul acestor subunități. În lungul văii Bîrladului trecea drumul vechi feudal, „drumul cel mare” sau „drumul Țarigradului”, care lega Liovil prin Iași cu gurile Dunării. Rîul Bîrlad izvorăște din sud-vestul Podișului Central Moldovenesc (de lângă satul Valea Ursului) și pînă la Băcești, în cursul superior, poartă numele Bîrlădel. De aici valea lui se lărgeste considerabil, căpătînd aspectul unei adevărate depresiuni mult alungite, dar asimetrice, limitată și dominată spre sud de cuesta Racovei. Avale de Negrești, șesul aluvial se lărgeste treptat (mai pronunțat avale de Vaslui), pînă ce, la Bîrlad, ajunge la aproape 3 km lățime. La baza versanților s-a format o fișie de agestre și glacisuri ce se pierd treptat în lunca plină de mici depresiuni umede, de brațe părăsite, bălți, grinduri uscate și movile antropice. Deși valea este destul de largă, terasele sînt mai puțin dezvoltate, dar se individualizează pînă la 7 nivele la altitudini relative de 5—8 m, 20—25 m, 30—40 m, 65—70 m, 100 m, 110—115 m și 130—140 m (Al. Obreja, 1961; V. Băcăuanu și colab., 1980).

La sud de Vaslui se conturează o mică piață de adunare a apelor, spre care converg Vasluietul, Racova, iar mai la sud Crasna. Văile lor inferioare dau văii Bîrladului un oarecare caracter depresionar.

Primăvara, la topirea zăpezilor și la trecerea spre vară în sezonul ploilor, o parte a șesului Bîrladului este inundat, iar

viiturile mari pot distruge porțiuni din calea ferată. La gura piraiei afluențe se produc adesea împotmoliri care afectează șoseaua și culturile agricole (avale de Strînsura Mitoc, la pepiniera de la sud de Bîrlad etc.). Unele vetre ale așezărilor, aflate în albia majoră, au avut de suferit de pe urma inundațiilor (Ciortolomu, Sirbi, Crasna, Crivești, Grivița, părțile de jos ale Vasluiului și mai ales ale Bîrladului). Nivelul apelor poate să crească cu 4 m deasupra etiajului la Bîrlad (ca în anii 1932, 1969, 1970). La Bîrlad a fost construit (în 1934) un dig de protecție și a fost mutată albia minoră în afara orașului. Între Vaslui și Țigănești sînt inundate, la viituri maxime, peste 10 000 ha. Împotriva lor se duce lupta prin lucrări de amenajare (construirea de baraje pe afluenți, îndiguiri) la Negrești, Pușcași, Solești, Valea Seacă, Pogana, avale de Vaslui, Bîrlad.

În urma defrișărilor pe suprafețe întinse, colmatării iazurilor, utilizării necorespunzătoare a versanților, inundațiile s-au amplificat treptat, astfel că numeroase așezări, atestate în primele documente feudale din secolele XV și XVI, nu mai apar consemnate ulterior. Locuitorii lor s-au retras în locuri mai ferite și au evitat rămînerea în lungul șesului și al „drumului cel mare”, care în condițiile de atunci nu le puteau oferi suficientă siguranță.

În timpul domniei lui Vasile Lupu, un călător străin, trecînd pe valea Bîrladului, consemna că a călătorit vreo 22 de ceasuri de-a lungul unei văi bogate, pe lângă o apă plăcută, dealurile pe ambele părți fiind acoperite cu păduri numeroase, refugiu al locuitorilor de pe aceste meleaguri. Într-un memoriu asupra stării vechi și actuale a Moldovei, contele d'Hauterive (1902) scria: „Lipsa oamenilor în locurile care sînt în preajma marilor drumuri nu e decît o strămutare, satele depărtîndu-se în fundul regiunilor, iubind mai mult întunecimea văilor, decît așezările pe dealuri lesne de văzut”. Depopularea parțială a șesului Bîrladului a fost îndelungată și nici în prezent nu poate fi considerată ca o vale intens populată. Vetrele așezărilor aflate în șes sînt relativ puține (Sirbi, Zorleni, Tutova etc.) și mai ales noi. Așezările au preferat fixarea pe văile secundare, pentru a evita inundațiile și „drumul cel mare”. Densitatea populației din lungul văii Bîrladului abia ajunge la 64 loc./km². Între celelalte așezări au rezistat aici mai

bine Birladul și Vasluiul, dar cu vicisitudini (Birladul a fost, de exemplu, ars de neînmărate ori). Avale de Crasna a fost vechiul tirg, stație de poștă, Docolina, care pînă pe la 1900 a dispărut, o parte din funcțiile lui fiind preluate de micul nod feroviar Crasna.

În secolele XIX și XX s-a produs o repopulare a văii Birladului, în condiții noi de siguranță, la aceasta contribuind împrietăririle (care au dus la formarea de sate noi), dezvoltarea căilor de comunicație, extinderea culturilor pentru piață. Foarte recent, eliminarea excesului de umiditate, împădurirea versanților degradați și acțiunea de terasare au creat condiții pentru înlăturarea în bună parte a aspectelor negative ale cadrului geografic și de folosire în condiții mai bune a teritoriului.

În afară de balast (prundișuri de terasă și nisipuri) și argilă pentru ceramică grosieră (exploataată în Dealul Paiu de lingă Vaslui), valea Birladului nu poate oferi decît zăvoaie și bălți folosite local și în măsură modestă pentru vînat și pescuit. Grindurile și porțiunile de șes mai puțin umede sînt folosite pentru culturi de legume și zarzavaturi în zonele preorășenești (la Zorleni, Viișoara etc.) și, în general, pentru culturi agricole bazate pe irigații. Versanții au fost plantați cu vii și livezi (la sud de Crasna, la Sîrbi, la nord de Birlad etc.) și se execută în continuare lucrări pentru stingerea torenților și împădurirea versanților degradați (la nord de Crasna, la est de Birlad ș. a.). În lungul văii Birladului sînt două aliniamente principale de sate, pe sub versanți. În mare parte satele sînt de tip răsfirat, unele cu tendință de adunare, iar cele formate în urma împrietăririlor au o textură geometrică. Cele mai multe au tendință de a gravita spre unul din cele două orașe mari din acest culoar — Birlad și Vaslui — care dețin funcții și unități industriale importante, dar și spre orașul Negrești, aflat în partea nordică a culoarului Birladului, în mijlocul Depresiunii Negrești.

Centrul tradițional urban cel mai important este Birladul, unde concentrarea urbană mai amplă este veche și s-a accentuat în ultimele patru decenii.

Municipiul Birlad, situat în partea sudică a podișului, în mijlocul bazinului hidrografic al râului Birlad, dispune de condiții geografice nefavorabile ale vetrei, deoarece cea mai mare parte a acestuia este în șesul supraumed și inundabil al râului Birlad.

Partea veche centrală se află pe conul de dejecție al pîrului Valea Seacă. Teritoriul ocupat a impus lucrări de canalizare, îndiguire și mutarea cursului Birladului mai spre est, în afara centrului (în 1935 și ulterior). Pe versantul drept sînt numai cîteva fragmente de terase care nu au oferit spațiu suficient pentru construcții și orașul a fost atras de șesul aluvial, mai întîi spre vad și apoi în lungul vechiului drum feudal.

Rolul cel mai important în apariția și dezvoltarea tirgului de vale al Birladului l-a avut poziția geografică de ansamblu, între subunități mari naturale, ca oraș etapă, pe un vechi drum comercial, într-o intersecție cu alte drumuri (spre Fălciu, Galați și Bacău). Zona de influență a Birladului depășește, în sud, sud-vest și vest, limitele județului Vaslui, nefiind concurat de un oraș mai mare (P. Poghirc, 1983).

Descoperirea de cuptoare și ateliere de prelucrare a fierului din secolele XI și XII arată că teritoriul acesta a fost locuit din timpuri vechi. În privilegiul Liovului din 1408 se menționează că Birladul avea funcție de vamă. Importanța localității rezultă nu numai din faptul că a fost reședința ținutului Tutovei, ci și a vornicului Țării de Jos a Moldovei. Ștefan cel Mare a construit aici o cetate de pămînt, în sud-vestul intravilanului actual. Orașul a avut foarte mult de suferit în decursul timpului (incendii, jafuri, inundații, cutremure) dar s-a refăcut de fiecare dată pe același loc. Evoluția lui a fost însă lentă pentru că industria s-a dezvoltat tîrziu și modest. Dacă în prima parte a secolului XX a trecut printr-o fază de stagnare (cînd avea 25 000 de locuitori), după al doilea război, prin dezvoltarea industriei, a ajuns la 77 009 de locuitori (în 1992). În prezent cea mai mare parte a populației active (2/3) lucrează în industrie și construcții. Industria construcțiilor de mașini deține aproape 2/3 din valoarea producției industriale, urmată de industria alimentară (15%) și a confecțiilor (11%). Industria oferă rulmenți, elemente pneumatice și aparate de măsură și control, ulei vegetal, produse de morărit și panificație, produse lactate, preparate din carne, confecții, fibre și țesături de vignonie, tutun fermentat, mobilă, pietre de polizor, materiale de construcții etc.

Birladul este recunoscut și ca centru vechi cultural al acestei părți a Moldovei,

cu licee renumite (care au dat mulți oameni de seamă), teatru, casă de cultură etc.

Birladul este un oraș de tip vechi românesc, în trecut cu o evoluție pe orizontală, care posedă tipuri variate de textură strădală (în centru radiară). Ariile funcționale nu sînt precis conturate, dar industria nouă este amplasată în nord, iar cea veche, completată cu unități noi, în sud și sud-est. În nordul părții centrale sînt concentrate multe unități culturale, administrative și sanitare, iar în sudul acesteia, cele comerciale și meșteșugărești. În centrul civic, actual modernizat, este Biserica Domnească zidită de Vasile Lupu (1640), reușit pusă în valoare. În nordul orașului există o grădină publică, în care se află cel mai mare parc zoologic din Moldova. În sud a fost amenajat parcul Prodana, prin asanarea unui teren cu bălți.

Municipiul Vaslui este reședința județului Vaslui și ocupă o poziție centrală a Podișului Birladului, în linii mari, între Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei și Dealurile Fălciului, într-o mică depresiune de confluență spre care converg cîțiva afluenți principali ai Birladului (Vasluiul, Racova) ale căror văi au ușurat accesul și formarea unei intersecții de drumuri. Locul în care a apărut și s-a dezvoltat orașul este mult mai favorabil decît al Birladului, fiind un interfluviu cu o terasă largă la confluența Vasluietului cu Birladul, neîndubilă, bună pentru construcții.

Vasluiul este atestat documentar în anul 1434, cînd posedă o curte domnească. În feudalism așezarea de aici avea însemnătate în sistemul de apărare dinspre sud al Moldovei și nu întîmplător în preajma ei s-a dat bătălia de la Podu Înalt (1476). Funcțiile vechiului tîrg au fost comerțul, meșteșugurile, reședință de ținut și de ocol domnesc, îmbinate cu cele agricole (P. Poghire, 1983).

Pînă după al doilea război mondial industria s-a dezvoltat puțin. Teritoriul din aria sa de influență fiind sărac, nu a atras investiții de capital. Multe secole orașul a rămas mic, chiar cu perioade de decădere. În 1930 avea aproape 13 000 de locuitori, iar în 1966 doar 14 000. Un salt pozitiv puternic în evoluția lui s-a produs după 1968, cînd a devenit reședință de județ și s-a dezvoltat mult industria, astfel că a ajuns la 80 151 de locuitori în 1992.

Funcțiile principale actuale sînt industrială și administrativă, dar evoluția este

spre un profil funcțional complex. Industria este aproape toată nouă și posedă un număr mare de unități. Ea a atras o parte a forței de muncă umane, dar disponibilul județului este mult mai mare. Deși funcția rezidențială a înregistrat progrese remarcabile (blocurile de locuințe ocupînd cea mai mare parte a intravilanului), deplasările diurne ale personalului muncitor sînt încă însemnate.

S-au construit unități industriale reprezentînd ramuri diverse și complementare care asigură o valorificare echilibrată a resurselor de forță de muncă. În domeniul industriei textile și confecțiilor, pe lîngă vechea fabrică de prelucrare a cîmpei, s-au construit patru unități noi: filatura de bumbac cardat (capacitate de 5 400 t fire anual), filatura de fire tip bumbac (1 400 t), țesătoria de bumbac (25 mil. m²) și întreprinderea de confecții, iar cea mai nouă unitate textilă este Combinatul de fire și fibre sintetice. Industria alimentară este reprezentată de un centru de vinificație (cu o secție de coniac), o întreprindere de prelucrare a laptelui, o fabrică de ulei de soia, o fabrică de gheață, un antrepozit frigorific, un abator, unități de morărit și panificație etc., iar industria lemnului este reprezentată de o fabrică de mobilă care mai produce ambalaje, mobilier comercial etc. Cele mai importante unități din domeniul industriei constructoare de mașini sînt: fabrica de aparate de măsură și control și întreprinderea de ventilatoare. La acestea se mai pot adăuga întreprinderea de materiale izolatoare și fabrica de cărămidă.

Aria de influență a orașului este limitată de cea a Iașului în nord, a Birladului în sud, a Romanului în nord-vest și a Hușiului în est, primele două concurîndu-l mai intens.

Zonarea funcțională a teritoriului reflectă evoluția sa recentă, etapizată prin sistematizare. Industria este dispersată mai ales spre margini, partea centrală fiind rezervată pentru alte funcții. Centrul civic, aflat pe locul nucleului vechi, inițial, are funcții administrative, comerciale și meșteșugărești, îmbinate cu funcția rezidențială modernă (fig. 188). Aici se află piața centrală cu palatul administrativ și alte construcții noi. În partea central-nordică, cu clădiri vechi, sînt grupate unități școlare și administrative. În nord, spre margine, se află parcul Copou. Atrage atenția faptul că la Vaslui, în ultimii 20 ani, s-a construit foarte mult și intravilanul




Fig. 188. Vaslui — Centrul civic (foto C. P. B.)

este în cea mai mare parte nou. Vechiul târg cu dughene a fost schimbat în întregime. Din nucleul vechi mai există doar câteva clădiri, între care biserica lui Ștefan cel Mare, monument istoric.

6.2.4. Culoarul Siretului

- 2 Siretul, una dintre cele mai importante artere hidrografice de la est de Carpații Orientali, străbate România pe direcția generală nord—sud, pe o lungime de 596 km (din totalul de 706 km). Formează o vale, cu aspecte și caracteristici de culoar, încă de la intrarea pe teritoriul țării, în dreptul satului Văscăuți (com. Mușenița, jud. Suceava; numit, cîndva, Văscăuți pe Siret), la nord de orașul Siret.

Aflată între unități fizico-geografice distincte, valea se caracterizează prin lățime

variabilă și prin asimetrie, cu versanți de pe stînga întotdeauna abrupti și înalți, însoțiți de fragmente de terase; iar cei de pe dreapta mai domoli, cu o largă desfășurare a teraselor, pe alocuri ajungînd în număr de opt, impresionant dezvoltate în adevărate cîmpuri la confluențele cu Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș. De la granița țării și pînă la nord de confluența cu Moldova, Siretul străbate în întregime Podișul Sucevei, valea fiind străjuită de Podișul Dragomirnei și Podișul Fălticeniilor, spre vest, și de Culmea Bour — Dealu Mare (sau Culmea Siretului), spre est. De la nord de confluența cu Moldova pînă la aceea cu Trotușul, valea Siretului este flancată spre est de Podișul Birladului iar spre vest de Subcarpați, dar mai departe lunca ia proporții considerabile, ajungînd la peste 40 km, o lărgime pe care nu o atinge nicăieri lunca Dunării (G. Vălsan, 1916).

Din punct de vedere fizico-geografic, cele două părți ale văii-culoar sînt subordonate subunităților în lungul cărora s-au format (ceea ce imprimă și o anumită uniformitate pe distanțe mari), dar cu numeroase variații locale, de mare însemnătate, determinate în special de pătrunderea în valea Siretului a rîurilor carpatice, bogate în ape și aluviuni (fig. 189).

Cele două părți ale culoarului sînt puse în evidență și de lărgimile diferite, pînă la nord de Roman acestea variînd între 4 și 10 km (la nivelul primelor terase) și între 4 și 18 km la sud de Moldova, cea mai îngustă porțiune, din întregul culoar, fiind aceea din dreptul Piriului Răcăciuni (și localitate omonimă), de numai 2,5 km, loc numit de G. Vălsan (1916) defileu, iar de către alți geografi, Poarta de la Răcăciuni, îngustarea fiind cauzată de un orizont de cinerite andezitice, destul de dure, asupra cărui eroziunea diferențială se exercită mai lent. Pe teritoriul României, pînă la confluența cu Trotușul, cursul Siretului se caracterizează prin pante de 0,54 m/km și chiar 0,40 m/km, cu o mare dezvoltare a meandrelor duble sau compuse, pînă la nord de orașul Roman, reprezentînd un stadiu mai avansat de dezvoltare, cu aspect de cîmpie la confluențele cu Suceava și Moldova (I. Gugiuan, 1940). Din dreptul Trotușului, pînă la vărsare, panta este mai accentuată pînă la confluența cu Zăbrăuțul (0,90–1,25 m/km) și foarte redusă de aici pînă la Dunăre (0,25 m/km)¹.

În general însă, amunte de confluențele importante, panta scade și albia se prezintă meandrat, iar avale de acestea, panta crește, rîul avînd tendința de despletire. Această variație a morfologiei albiei este datorată marilor cantități de aluviuni aduse de afluenții carpatici, depășind posibilitățile rîului de a le evacua imediat și formînd, la intrarea în lunca acestuia, agestre de mari dimensiuni (V. Tufescu, 1946).

Albia minoră este sculptată în aluviuni, iar aspectul general al luncii este dominat de mulțimea meandrelor și belciugelor, de grinduri și cursuri paralele (brațe părăsite, numite de populația locală *sirețele*), bălți și sectoare mlăștinoase.

Lunca are lățimi apreciabile — de la minimum 2 km, la maximum 10 km, în dreptul marilor confluențe — și în cuprinsul ei apar trei trepte de terasă (0,5–1 m, 1–2 m și 3–4 m), primele două afectate de modificări




Fig. 189. Culoarul Siretului. 1, Lunca; 2, agestre; 3, terase; 4, dealuri; 5, curmături.

morfologice în timpul viiturilor. Terasetele, cu suprafețe mici și fragmentare pe partea stîngă, au extinderi mari pe versantul drept, ajungînd, în unele porțiuni, ca între Roman și Bacău, la opt, avînd ca altitudini în jur de 210–200 m, 170–160, 140–130, 60–50, 40–35, 20–10, 7–5 și 4–3 m, coborînd, deci, pînă la nivelul luncii (V. Băcăuanu și colab., 1980).

¹ George Vălsan (1916) împărțea cursul Siretului, pe teritoriul Moldovei, în trei sectoare aproape egale: superior (pînă la Roman), mijlociu (pînă la defileul de la Răcăciuni) și inferior (pînă la vărsare, cu înfățișare de „estuar”).

Versantul stîng — puternic înclinat, reprezentînd, în general, o coastă, cu denivelări de peste 200 m față de albia minoră — este afectat, aproape peste tot, de intense procese de modelare actuală cu predominarea alunecărilor și eroziunii torențiale, ca în sectoarele Mihăileni—Vlădeni, Lespezi—Icușești și Răcăciuni — sud Adjud, a eroziunii prin spălare, șiroire și torenți în celelalte sectoare. Versantul drept, deși mai domol, este afectat, totuși, de procese moderate de eroziune prin spălare, șiroire și torenți, în sectorul podișurilor Dragomirnei și Fălticeniilor și la sud de confluența cu Bistrița.

Diferențele de altitudine între luncă și versanți nu au constituit impedimente pentru circulație și legături economice între Culoarul Siretului și subunitățile vecine înalte ale Podișului Sucevei, Podișului Bîrladului și Subcarpaților Moldovei. Configurația de amănunt arată prezența a numeroase curmături, străbătute, din cele mai vechi timpuri, de importante drumuri. Astfel, se evidențiază, pe flancul stîng, șele Lozna, Bucecea, Ruginoasa—Strunga, Valea Ursului, înlesnind legăturile cu Cîmpia Moldovei, Podișul Central Moldovenesc și Colinele Tutovei, iar pe cel drept șele Bălcăuți, Bozieni—Girov, dar, mai ales, largile văi ale Sucevei, Moldovei, Bistriței și Trotușului, cu deosebite posibilități de legătură spre Subcarpații Moldovei, Carpații Orientali și depresiunile Transilvaniei și Maramureșului, fapt care explică, parțial, interesul manifestat pentru acest culoar, bine populat, încă din antichitate.

Încadrat, în ansamblul său, în etajul climatic al dealurilor joase (200—500 m altitudine), Culoarul Siretului se individualizează ca o subunitate cu topoclimat complex, în care predomină topoclimate elementare de luncă și terase, de pădure, de versanți cu expoziții vestice sau estice, în funcție de condițiile locale. Influența orografiei este hotărîtoare pentru predominarea circulației atmosferice pe direcția nord—sud, pe axul vîi, mai ales în sectorul nordic — spre deosebire de aceea de pe largile văi ale Sucevei, Moldovei, Bistriței și Trotușului, unde predomină circulația de nord-vest — sud-est. În sectorul sudic, de la confluența cu Moldova, se resimt, pregnant, și influențele circulației sudice, ceea ce introduce unele deosebiri față de subunitățile de la est și de la vest.

Temperaturile medii anuale variază între 8 și 9°C pînă la Roman și între 9 și 10°C între Roman și Adjud. Iarna, temperaturile sînt mai coborîte decît în podișul alăturat (—4 ... —5°C media lunii ianuarie, pe toată valea, față de —3 ... —4°C în podiș, cu excepția cursului superior și mijlociu al Bîrladului și inferior al Jijiei, cu —4 ... —5°C). În perioada rece a anului, din cauza stratificării aerului mai rece, se înregistrează creșteri accentuate ale umidității relative care produc cături și inversiuni de temperatură de intensitate moderată (mai ales în partea nordică). În timpul verilor, pătrunderile de aer continental din sud și est fac ca temperaturile medii ale lunii iulie să fie cuprinse între 18 și 20°C pînă la Roman și între 20 și 22°C la sud de acest oraș, dar, în general, mai moderate ca în podiș. De altfel, clima Culoarului Siretului se caracterizează, din punct de vedere termic, prin ierni mai reci și veri mai răcoroase, în comparație cu podișul alăturat, în care verile sînt mai fierbinți și iernile mai blinde, așa cum arată temperaturile maxime absolute, 38.2°C la Roman, 38.8°C la Bacău (40°C la Iași, 39.7°C la Bîrlad), minime absolute, —33.2°C la Roman, —32.5°C la Bacău (—30.6°C la Iași, —30.5°C la Bîrlad) și amplitudinile absolute, 71.4°C la Roman, 71.3°C la Bacău, 70.2°C la Bîrlad). Caracteristic este și faptul că temperaturile extreme absolute se produc iarna în luna februarie, iar vara în luna august.

Precipitațiile medii anuale sînt influențate, la rîndul lor, de circulația maselor de aer dinspre nord și nord-vest și dinspre sud, fiind cuprinse între 550 și 600 mm pînă la Roman și între 500 și 550 mm de la Roman la Adjud. Cele mai mari cantități cad în sezonul cald (350—400 mm pînă la Roman și 300—350 mm de la Roman la Adjud), iar în semestrul rece, în medie, 175 mm pe tot culoarul.

Analiza celorlalte componente ale condițiilor naturale arată, de asemenea, unele deosebiri locale de-a lungul culoarului, introducînd, la rîndul lor, unele diferențe între partea nordică și cea sudică. Scurgerea lichidă a Siretului prezintă un regim variabil, fapt ce a impus începerea, din anul 1979, a construcției unor mari bazine de acumulare — Galbeni, Răcăciuni, Berești, Adjud etc. —, avînd drept scop atenuarea undelor de viitură, utilizarea în irigații și producerea de energie electrică. Regimul hidric se caracterizează prin ape mari de primăvară, dato-

rită afluenților din Carpații Orientali, și prin viituri de vară, ca urmare a debitului autohton.

În ceea ce privește scurgerea sezonieră, cele mai mari cantități de apă sînt transportate primăvara (45—50%) și vara (20—25%). Importante pentru populație și economie sînt și stratele acvifere freatice din luncă, aflate pînă la adîncimi maxime de 4—5 m, ca și cele de la baza teraselor, formînd linii de izvoare, cu debite bogate, multe dintre acestea corespunzînd aliniamentelor de așezări.

Solurile și vegetația au alcătuit premise pentru practicarea agriculturii și creșterii animalelor. Lunca este acoperită cu soluri aluviale și protosoluri aluviale, pe terase apărînd cernoziomuri cambice, soluri cernoziomoide și soluri cenușii, care, cu toate că nu sînt prea bogate în substanțe nutritive, au totuși randamente destul de bune, ca urmare a mecanizării, chimizării și irigațiilor. Pe mici suprafețe apar și lăcoviștile, în special pe partea dreaptă a Siretului, la confluența cu Suceava și între Moldova și Bistrița.

Lunca este astăzi domeniul terenurilor agricole (legume, plante tehnice, cereale), pajiștilor de iarbă moale (*Agrostis stolonifera*), coada vulpii (*Alopecurus pratensis*), și pir (*Cynodon dactylon*) (suprafețe reduse) și al zăvoaielor de salcie și plop. Pe terase și versanți se întind pajiști secundare și terenuri agricole destinate mai ales culturilor de cereale, plante tehnice și cartof.

Marile suprafețe acoperite cu soluri aluviale și cernoziomuri au favorizat cultura cartofului și a sfecei de zahăr, culoarul aflîndu-se în întregime în ariile de aprovizionare ale fabricilor de zahăr de la Roman, Pașcani și Sascut și parțial a aceleia de la Bucecea, precum și în ariile de aprovizionare cu cartofi ale fabricilor de amidon de la Filipești și Hănțești, dar contribuind, în același timp, cu importante cantități pentru consumul populației din alte regiuni ale țării. Suprafețe apreciabile din culoar sînt destinate culturilor de legume, dintre acestea distingîndu-se cele din jurul orașelor Bacău și Roman, și mai puțin Adjud, care fac parte din zonele cu agricultură preorășenească.

Jumătatea sudică a culoarului, cu importante suprafețe de versanți cu expoziție sudică și estică, se impune și prin prezența viței de vie, în localitățile Răcăciuni, Parava, Orbeni, Valea Seacă, Sascut, Urechești, care au și centre de vinificație.

Existența unei puternice baze furajere (importantă contribuție avînd fabricile de zahăr) a condiționat dezvoltarea creșterii animalelor și păsărilor, Culoarul Siretului remarcîndu-se prin mari densități la toate speciile, iar în ultima vreme și prin trecerea la creșterea intensivă, în mari complexe, ca acelea de la Pașcani (jud. Iași), Itești, Radomirești și Sascut (jud. Bacău) pentru bovine, de la Traian (jud. Bacău) pentru ovine, Verești (jud. Suceava), Siretu, Șerbești și Nicolae Bălcescu (jud. Bacău) pentru porcine, Bacău și Roman pentru păsări, iar la Lespezi (jud. Iași) și Săucești (jud. Bacău) ferme sericicole.

Suma factorilor de favorabilitate a cadrului natural a condiționat atragerea, fixarea și îndesirea elementului uman, cu atît mai mult, cu cît el se află într-o poziție geografică deosebită, la contactul cu unități mai înalte, bine împădurite și astăzi, aparținînd Podișului și Subcarpaților Moldovei și constituind axa principală a întregii circulații din spațiul circumcarpatic răsăritean.

Popularea culoarului este străveche, descoperirile arheologice și mențiunile în izvoare scrise antice și medievale constituind dovezi incontestabile despre autohtonă și continuitatea dacilor, daco-romanilor și românilor, ca și despre viața materială, spirituală și gradul de civilizație.

Siretul, ca rețea hidrografică, este pomenit încă din antichitate, de către Herodot, secolul V în. Chr., sub forma *Tiarantos*, de Ptolemeu, în secolul II A.D., *Hierasos*, de Ammianus Marcelinus, în secolul IV A.D., *Gerasus* și de către Constantin Porfirogenetul, în secolul X A.D., deci la începuturile feudalismului, în forma *Seretos*. Pe o vale al cărui nume s-a păstrat din antichitate — așa cum a demonstrat, între alții, V. Pârvan (1923), avînd înțelesul de „rîu iute” (repede) — nu se putea să nu fie consemnate și așezările, locurile întărite, meșteșugurile etc.

Cele mai vechi vestigii ale locuirii datează din paleolitic și epipaleolitic (Mihalache Brudiu, 1974), urmate, în cronologie stratigrafică, de cele din neolitic, din perioada de trecere la epoca bronzului și din epoca bronzului, din prima epocă a fierului tîrzie, cînd se evidențiază daco-geții, ca și din a doua epocă a fierului și din timpul regatului dac, cînd se constată începuturile înfloririi și apogeul artei dacice arhaice. Din aceste ultime două perioade datează știrile despre davele dacilor, construite pe înălțimile versantului stîng, înalt, al culoarului, ca *Dinogelia*

Fig. 190. Culoarul Siretului. A, Vestigii arheologice: 1, paleolitice și epipaleolitice; 2, neolitice; 3, din epoca bronzului; 4, așezări dacice și dave; 5, castre romane și castellum; 6, vestigii ale dacilor liberi; 7, monede și tezaure romane; 8, vestigii ale reducerii minereului de fier (sec. II—XI); 9, drum roman; 10, cetăți medievale. B, Drumuri din evul mediu; 1, drumul cel mare moldovenesc; 2, drumul tătarăsc; 3, alte drumuri importante.

Vetus (Bărboși, municipiul Galați), *Piroboridava* (Poiana, com. Nicorești, jud. Galați), *Tamasidava* (Răcătău de Jos, com. Horgești, jud. Bacău), *Zargidava* (Brad, com. Negri, jud. Bacău), despre așezările dacilor liberi de la est de Carpați, ca și acelea care atestă locuirea (necropole), arta orfevrăriei și schimburile comerciale (tezaure și monede); reducerea minereurilor de fier, iar din perioada imediat următoare, legăturile cu lumea romană (Radu Florescu și colab., 1980; Șt. Olteanu, 1983) (fig. 190). Nu mai puțin însemnătate au avut, încă din antichitate, dar cu rol amplificat de-a lungul întregii perioade a evului mediu, și cu atât mai mult în perioadele modernă și contemporană, drumurile care au străbătut acest culoar. Din antichitate este cunoscut drumul roman, care, urmînd, probabil, traseul unui mai vechi drum dacic, lega Moesia Inferior (Dobrogea de astăzi) de Transilvania, trecînd pe malul stîng, înalt, al riului Siret, de la *Dinogetia Nova* (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) la *Dinogetia Vetus*. Piroboridava, apoi pe valea Trotușului și a Oituzului, pe la *Utida* spre *Angustia* (Brăteu, jud. Covasna) din Dacia Inferior (Malvensis).

În evul mediu au funcționat *Drumul cel mare moldovenesc* și *Drumul tătarăsc*, primul fiind transcontinental, plecînd de la Dunărea maritimă, străbătînd toată valea Siretului, apoi spre Liov și Marea Baltică, iar al doilea Podișul Moldovei, cu numeroase legături între ele și spre regiunile limitrofe de la est și de la vest (fig. 190).

Mai tîrziu, vechile drumuri, și, în primul rînd, acela al Siretului, aveau să fie echipate corespunzător, din punct de vedere tehnic, și introduse în rețelele naționale de transport feroviar și rutier. Culoarul Siretului continuînd să exercite rolul de axă a vieții complexe a regiunilor circumcarpatice estice.

Rețeaua feroviară din culoar a apărut în a doua jumătate a secolului XIX. Primul tronson, construit la 1869, a legat orașele Roman și Ițeni, iar cel de al doilea, între anii 1870 și 1872, Roman și Galați, cu legătură prin Brăila spre București. Tot între anii 1870 și 1872, se definitivează primele legături cu Cîmpia Moldovei — Verești — Botoșani și Pașcani — Iași, ca și cu Podișul Birladului și, mai tîrziu, pînă la primul

război mondial, prelungită de la Birlad pînă la Iași. La scurt timp după acestea (1888), culoarul avea să fie pus în legătură cu subunități ale Podișului Sucevei, cu Subcarpații Moldovei și Carpații Orientali, prin căile ferate de pe văile Șomuzul Mare (Dolhasca — Fălticeni), Bistrița (Bacău — Piatra Neamț), Trotuș (Adjud — Tîrgu Ocna — Ghimeș, cu legătură spre Transilvania) și definitivată magistrala Siretului, între Mărășești și Buzău, realizîndu-se a doua legătură cu București.

După primul război mondial, se definitivează legătura culoarului cu Podișul Central Moldovenesc (1922—1923, Roman — Băcești — Buhăiești), iar recent s-a făcut o nouă legătură cu Subcarpații (1987, Pașcani — Tîrgu Neamț) și, ceea ce este de o mare însemnătate, dublarea și electrificarea întregii magistrale a Siretului. În ultimele decenii, au fost modernizate și căile rutiere, culoarul fiind străbătut de șoseaua internațională E20 în porțiunea nord Roman — Adjud, iar în rest de șosele naționale sau județene, de asemenea, modernizate.

Potențialul natural ridicat și largile posibilități de legătură în sens longitudinal și transversal au favorizat concentrarea așezărilor rurale — mai numeroase și mai mari decît pe interfluviile alăturate — și a activităților industriale și de transport în așezări urbane, apărute și dezvoltate mai ales la mari vaduri și confluente. Încă de la începutul secolului XX, densitatea medie a populației atinsese sau depășise puțin valoarea de 100 loc./km², valoarea acesteia urcînd, în ultimele decenii la 150 loc./km², în partea nordică și în zonele preorășenești înregistrîndu-se chiar densități pînă la 250 loc./km², ca urmare a sporului natural ridicat și a forței polarizatoare a centrelor urbane (Bacău și Roman, în special).

Populația este concentrată mai mult pe dreapta Siretului, pe terasele inferioare și medii, în așezări rurale care formează două iar uneori chiar trei alinamente. Între acestea predomină așezările mijlocii și mari; din punct de vedere funcțional există diferențieri între cele situate în zonele preorășenești ale Bacăului și Romanului, care au funcție agricolă și de cazare a forței de muncă, înregistrînd o mare intensitate a deplasărilor

mai ales diurne și cele cu funcție agricolă, avînd diverse specializări — cultura cerealelor, a plantelor tehnice (mai ales sfeclă de zahăr și apoi cînepă), a cartofului și legumelor și în creșterea animalelor și păsărilor. Există, însă, în culoar, și cîteva așezări rurale care îmbină agricultura cu activități




Fig. 191. Evoluția numărului de locuitori ai orașelor Bacău, Roman și Adjud.

industriale importante, ca Hănțești, Sagna, Filipești, Faraoani, Răcăciuni, Sascut etc.

Orașele din culoar au apărut și s-au dezvoltat, așa cum s-a spus, la confluențele Siretului cu riurile carpatice și la importante vaduri, existența lor fiind anterioară întemeierii statului feudal al Moldovei (C.O. Giurescu și colab., 1974) și avînd roluri de mare însemnătate în viața economică, politică, socială, unele dintre ele avînd și importanță strategică.

Evoluția în timp a orașelor este datorată, în bună măsură, poziției geografice, care a favorizat dezvoltarea meșteșugurilor, a schimbului de produse între regiuni de contact, a transporturilor și activităților industriale. În partea de nord a culoarului, orașele Siret și Pașcani cunosc o dezvoltare ascendentă¹, ca și Roman, Bacău și Adjud, situate în jumătatea sudică, fapt demonstrat, între

¹ Orașele au fost tratate la subunitățile Podișului Sucevei, ca și problemele de amănunt ale culoarului de la granița țării pînă la nord de confluența cu Moldova, avînd în vedere afinitățile mai mari cu regiunile limitrofe.

altele, și de creșterea numărului de locuitori (fig. 191).

Municipiul Bacău este cel mai important centru urban din Culoarul Siretului. Situat la confluența Bistriței cu Siretul, a beneficiat de una dintre cele mai favorabile poziții geografice. Dezvoltarea sa a fost impulsionată de varietatea resurselor din cele două mari unități naturale vecine, de deschiderile mari oferite de Siret spre nord și sud, de Bistrița spre nord-vest, ca și de deschiderile secundare spre vest și est, de pe Valea Trebișului și Pîrîul Morii. Aceste deschideri naturale au constituit premisa convergenței favorabile, în care s-au întretăiat, din cele mai vechi timpuri, drumuri comerciale majore care au permis relații îndepărtate spre nord, sud, nord-vest și vest.

Bacău este o așezare veche, menționată, alături de alte așezări, în Privilegiul Liovilui, din 1408, ca punct de vamă însemnat pentru comerțul care se dirija pe Valea Siretului spre Dunărea maritimă și Brașov, dar și ca tîrg pentru schimbul de produse între regiunile complementare imediate. În secolul XV (1447), a devenit și un important centru administrativ al Moldovei, prin ridicarea unei curți domnești, în timpul voievodului Ștefan cel Mare, pentru fiul său Alexandru. După 1500, Bacău apare în tot mai multe documente, fiind menționată și funcția sa administrativă, reședință de ținut, amplificată, după anul 1661, din momentul în care a preluat-o și pe aceea a Tirgului Trotuș. Concomitent, orașul devine o așezare feudală înfloritoare, în care, totuși, prevala comerțul. Nivelul dezvoltării sale urbane era însă scăzut, în concordanță cu ansamblul economiei din această parte a țării. Pînă la jumătatea secolului XIX, a ființat ca tîrg.

La sfîrșitul secolului XIX și la începutul secolului XX, se constată o intensificare a procesului de dezvoltare urbană, odată cu apariția industriei (la început prin unități industriale mici — mori, unități de industrializare a lemnului, tăbăcării, unități textile) și ca urmare a organizării transportului feroviar în lungul Siretului (sectorul Focșani — Roman). Progrese s-au înregistrat în ultimele decenii, prin construirea de întreprinderi industriale și amplificarea celorlalte funcții economice și sociale, ceea ce-l situează în categoria așezărilor urbane cu funcții complexe, cu rol deosebit de important pe plan regional, dar și în complexul național unitar.

În relație directă cu evoluția sa urbană și cu creșterea numărului de locuitori (18 846 de locuitori în 1912, 31 138 în 1930, 127 299 în 1977, 204 495 în 1989) orașul s-a extins teritorial. Vatra veche s-a format pe un promontoriu al terasei de 10—15 m a Bistriței care îngustează albia majoră. Așezarea ocupa inițial un spațiu restrâns, corespunzător actualului centru al orașului. În secolele XVI—XVII, dezvoltarea sa teritorială s-a produs unidirecțional, spre nord mai ales, în lungul axei principale de circulație. În secolul XIX, orașul s-a extins în lungul marilor drumuri: spre sud, în direcția fabricii „Letea”, spre nord, pe drumul către Piatra Neamț și spre vest, către gară. Până la sfârșitul secolului XIX, vatra nu depășea spre nord piriul Trebiș, fiind evitată și partea inundabilă din șesul Bistriței. În prima jumătate a secolului XX (mai ales după anul 1925), vatra s-a extins mult spre vest, pe terasele de 30—40 m și 50—60 m de la vest de calea ferată, ca și spre nord și est pe terasele joase din lunca Bistriței. Prin parcelare dirijată au apărut cartierul de la vest de gară și actualul Parc al Libertății. Prin extindere, orașul a ajuns ca în anul 1930 să înglobeze satele vecine Gherăești (în nord) și Șerbănești (în est). După anul 1945, creșterea teritorială a fost mai intensă, datorită amplificării funcției industriale. A fost dezvoltată zona industrială din nord-vest (Mărgineni), s-a realizat îndesirea clădirilor și creșterea orașului pe verticală. Renovarea urbană a constat în crearea unor cartiere rezidențiale noi și modernizarea unor artere de circulație (Bistrița, Cornișa, Parcul Libertății, Cremenea, Calea Mărășești, Milcov, Republicii, Carpați, Aviatori) și în repartizarea teritorială a noilor întreprinderi industriale (fig. 192).

Funcția industrială reprezintă dominantă profilului economic, populația ocupată în activitatea industrială reprezentând peste 60%. Deși este un oraș cu un profil industrial complex, ramura care arată o anumită specializare este industria construcțiilor de mașini, care deține peste 25% din valoarea producției industriale. Unități reprezentative ale acestei ramuri sînt întreprinderea de mașini și unelte (alezat și frezat), întreprinderea de vane și armături din fontă, Metalurgica (specializată în utilaj petrolier), întreprinderea de șuruburi, întreprinderea de panouri electropneumatice, întreprinderea de avioane. Industria alimentară prezintă, la rîndul ei, un profil divers, ea urmare a exis-

tenței unor unități de mare capacitate (băuturi alcoolice, industrializarea cărnii, morărit și panificație, produse zaharoase, prelucrarea laptelui). Importante sînt, apoi, industria textilă (specializată în fire și țesături din lînă) și a confecțiilor, industria lemnului (combinatul de prelucrare a lemnului, combinatul de celuloză și hîrtie „Letea”, înființat în 1881, întreprinderea de mobilă și fabrica de cherestea), industria pielăriei și încălțămintei (apărută în 1884), industria materialelor de construcții, chimică (combinatul de îngrășăminte azotoase și fosfatice), industria electro-energetică (hidrocentralele Bacău I și Bacău II) și cea poligrafică.

Dezvoltarea funcției industriale a produs modificări însemnate în profilul industrial al orașului. Dacă pînă în 1986 profilul industrial era dominat de industria lemnului și industria ușoară (peste 75% din producție), în prezent s-a ajuns la un echilibru între ramuri, cu o ușoară predominanță a industriei grele.

Bacăul are și o importantă funcție comercială și administrativă, culturală, sanitară și de învățămînt. Ca centru urban reședință de județ are dotări care satisfac necesitățile populației din întreg teritoriul administrativ. Aria sa de influență depășește limitele județului, mai ales spre sud și est, în județele Vrancea și Vaslui. Din aria de influență imediată se constată cei mai puternici curenți de pendulare, cauzati de funcția industrială. Spre oraș se dirijează forța de muncă din comunele Letea Veche, Mărgineni, Hemeiș, Măgura, Buhoci, Nicolae Bălcescu, Faraoni, Luizi Călugăra, Traian, Săucești etc.

Poziția geografică a făcut ca Bacăul să dețină și o importantă funcție de transport. Ca nod feroviar, are mare pondere în traficul de mărfuri și călători atît din culoar, cît și de pe Valea Bistriței și afluentului său Bicaz. Ca nod rutier, este străbătut de șoseaua europeană și concentrează drumuri naționale și județene modernizate, care asigură legături cu Subcarpații, Carpații și Podișul Moldovei, beneficiind, pe lîngă acestea, de transport aerian.

În ceea ce privește zonele funcționale interne, se remarcă deja conturarea acestora în deceniul al optulea și în cel actual, industria fiind repartizată marginal, în timp ce unitățile administrative, culturale, sanitare, de învățămînt sînt concentrate în centru (I. Șandru, C. V. Toma, 1986).




Fig. 192 Municipiul Bacău. A, Evoluția teritorială (Constanța Rusenescu, 1976; I. Sandru, C. Tonia, 1986, cu completări). 1, Vatra târgului în sec. XIV și XV; 2, extinderea pînă la începutul sec. XIX; 3, între 1800 și 1850; 4, între 1850 și 1900; 5, între 1900 și 1945; 6, după 1945; B, Zonele funcționale (Constanța Rusenescu, 1976, cu completări). 1, zonă industrială; 2, de transport și depozite; 3, mixtă (comercială, administrativă, culturală, rezidențială); 4, rezidențială; 5, spațiu verde.

Municipiul Roman, situat la confluența Moldovei cu Siretul, beneficiază de o poziție geografică favorabilă, cu posibilități mari de comunicare cu regiunile limitrofe prin Valea Moldovei și curmăturile Bozieni—Girov, Ruginoasa—Strunga și Valea Ursului.

Romanul este o așezare urbană veche, prima mențiune documentară datînd de la 30 martie 1392, în timpul voievodului Roman I Mușat. În secolul XV, Romanul a fost unul dintre cele mai importante orașe ale Moldovei, îndeplinind funcții însemnate, comerciale și strategice, ca majoritatea așe-

zărilor situate la mari răspîntii de drumuri și la mari vaduri. Încă din timpul voievodului Roman a fost construită o cetate de pămînt și lemn, distrusă prin incendiere, la 1467, de către Matei Corvin, dar refăcută de către Ștefan cel Mare, care construiește și o a doua cetate, la 1483, de piatră, pe malul stîng al Siretului, lângă localitatea Gidinți, cu scopul apărării drumului de acces spre cetatea de scaun a Moldovei, Suceava (C.C. Giurescu, 1967).

Importanța așezării medievale reiese și din aceea că aici a fost înființată o episcopie,




Fig. 193. Municipiul Roman. A, Evoluția teritorială. 1, Vatra pînă în sec. XV (a, nucleul inițial-cetatea și episcopia; b, satul poslușnicilor); 2, întinderea probabilă în sec. XV-XVII; 3, în secolele XVIII-XIX; 4, suburbii (mahalale) apărute în a doua jumătate a sec. XIX; 5, zona construită între 1900 și 1920; 6, între 1920 și 1950; 7, după 1950. B, Zoncle funcționale. 1, zonă industrială; 2, de transporturi și depozite; 3, mixtă (de servicii și rezidențială); 4, rezidențială veche (a, cu dotări edilitare; b, în curs de urbanizare); 5, rezidențială nouă, sistematizată (a, cvartale de blocuri; b, cu locuințe individuale de tip parter); 6, spațiu verde.

în 1408, aproape egală ca grad cu cea din Suceava, orașul fiind, de fapt, capitala Țării de Jos, de unde și denumirea de Tîrgu de Jos. Funcția sa strategică diminuează în secolele XVI-XVIII, dar în schimb și-a amplificat funcția comercială. Activitatea comercială, la care s-a adăugat cea meșteșugărească, s-a dezvoltat odată cu apariția unui număr de sași și armeni, prin intermediul cărora legăturile comerciale s-au extins mult. Încă din secolul XVI, meșteșugarii erau organizați în bresle. În secolele XVII-XIX, viața economică a orașului a fost în regres. Abia spre sfîrșitul secolului XIX a căpătat un impuls, după construirea căii ferate și a unor unități industriale — mori mecanice, fabrici de cărămidă, de zahăr, de uleiuri vegetale. Funcția industrială s-a dezvoltat, totuși, relativ lent, în prima jumătate a secolului XX, comparativ cu ritmul dezvoltării din zilele noastre (D. I. Oancea, 1959).

Nucleul orașului este situat la marginea sudică a podului terasei de confluență,

lingă episcopie, unde a fost și cetatea de pămînt. În secolele XVI-XVII, viața economică activă a favorizat extinderea teritorială spre nord, în lungul terasei și al marelui drum comercial. În secolul XVIII, orașul a crescut mai uniform, dezvoltîndu-se atît spre nord-vest și nord-est, pînă aproape de actualul bulevard al Republicii, cît și spre est, în lungul drumului spre Vaslui. Încă din a doua jumătate a secolului XVIII, orașul a început să „coboare” de pe terasa de confluență pe terasele de luncă ale Siretului și Moldovei, cartiere noi adăugîndu-se fișiei lungi, anterioare, de pe terasă. În secolul XIX, orașul a avut o extindere lentă, dar concomitentă cu indesearea construcțiilor. În acest răstimp a avut loc o creștere mai ales spre nord, în sectorul gării și spre nord-est.

În prima jumătate a secolului XX, în partea de nord-est, pe terasa de luncă, a apărut un cartier nou, cu textură radiar-concentrică, prin care orașul s-a legat de suburbia Nicolae Bălcescu (fig. 193). În deceniile din urmă, părți din cartiere reziden-

țiale au fost sistematizate și modernizate (Anton Pann, Republicii, Nicolae Bălcescu, Smirodava), în sud, est și în partea centrală. Populația orașului a ajuns de la 18 128 în 1912, la 23 823 în 1930, la 51 132 în 1977 și la 80 192 de locuitori în 1992.

Profilul economic este dominat de industrie, care cuprinde aproximativ 64% din personalul muncitor. Industria metalurgică deține 50% din valoarea producției, urmată de industria alimentară 15%, industria construcțiilor de mașini 13%, industria chimică circa 10%, industria materialelor de construcții circa 4% etc.

Ponderea mare a industriei metalurgice ilustrează specializarea Romanului în această ramură a industriei grele și explică atracția puternică pe care o exercită asupra forței de muncă masculine din satele apropiate. Întreprinderea de țevi fără sudură (construită în afara vetrei, spre nord) este cea mai importantă unitate de acest fel a ramurii pe plan național, realizând circa 1/3 din producția țării (material tubular). Această unitate a intrat în funcțiune în anul 1957, iar în prezent are linii de laminoare de 6, 16 și 20 de toli și produce țevi din oțel fără sudură pentru conductele petroliere, țevi speciale din oțel carbon, oțeluri aliate și inoxidabile, țevi pentru construcții.

Industria alimentară are și ea o participare mare în producția totală a orașului, aceasta fiind dată de fabrica de zahăr (cea înființată în anul 1899 a fost reprofilată pe produse din zahăr și ciocolată) construită în anul 1974, de morărit și panificație, lapte și produse lactate și abator.

Ramura construcțiilor de mașini este reprezentată de Întreprinderea mecanică, profilată pe fabricarea strungurilor carusel de 2 500—3 200 mm și a strungurilor cu comandă numerică.

Funcția industrială a fost mărită și diversificată prin apariția unor unități chimice și textile, care contribuie la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă feminine. Industria chimică produce fibre și fire sintetice poliamidice, iar cea textilă tricotaje și confecții. Industria materialelor de construcții are tradiții, fiind specializată în producția de prefabricate de beton, cărămidă, teracotă și plăci ceramice.

Romanul are bine dezvoltate și alte funcții, care servesc și populația rurală din ariile sale de influență, extinse spre Podișul Central Moldovenesc și spre Subcarpați. Astfel, în transporturi are rol de nod feroviar, cu

ponderi apreciable în traficul general de mărfuri și călători, concentrând și importante căi de comunicații și trafic rutier.

În structura internă sînt deja puse în evidență: zona industrială principală localizată în partea de nord și nord-vest, în apropierea căii ferate; zona comercială alungită pe direcția NNW—SSE, la care se adaugă cîteva nuclee comerciale secundare; zona administrativă și culturală situată la est de cea comercială; zona rezidențială, ocupînd suprafețele cele mai mari din vatră, extinsă în sud și est, pe terasele de luncă ale Siretului și Moldovei, acolo unde s-au ridicat noile cartiere de locuit.

Orașul Adjud este situat în extremitatea sudică a culoarului. Poziția geografică inițială (unde este astăzi satul Adjudu Vechi) nu i-a fost favorabilă, fiind inundat la toate viiturile Siretului, ceea ce a determinat mutarea pe vatra satului Adjudu Nou, la 4 km aval, în anul 1795. Deși așezare veche, menționată în scris la 1433, ca punct de vamă în comerțul cu Transilvania (prin pasul Oituz) și cu Muntenia, totuși evoluția sa a fost extrem de lentă. Înviorarea vieții economice a constituit-o introducerea sa în rețeaua feroviară națională (1870—1872) și transformarea în nod feroviar (1884), ceea ce a stimulat apariția unor mici unități industriale din ramurile alimentară (vinificație), prelucrarea lemnului, materiale de construcții, confecții. Funcția industrială a fost dezvoltată prin construirea unor obiective de capacitate mare — combinatul de celuloză și hirtie și fabrica de beton celular autoclavizat — orașul fiind astăzi un centru industrial și de servicii. În aceste condiții populația a ajuns în 1992 la 20 229 de locuitori.

Culoarul Siretului are și importante valențe turistice, evidențiindu-se prin prezența tuturor componentelor potențialului turistic — fond turistic (natural și antropic), dotări tehnico-edilitare și infrastructură — predominînd tipurile de turism itinerant și de tranzit (pe căi ferate și șosele naționale și internaționale) și structurale, în special etnografic — folcloric și al muzeelor și monumentelor (C. Swizewski, D. I. Oancea, 1978).

Considerat în ansamblul său, cu tot ceea ce are caracteristic, general sau particular, Culoarul Siretului, format de una dintre cele mai însemnate artere hidrografice ale țării, rămîne o regiune geografică de prim ordin, cu rol deosebit în complexul național unitar al României.

BIBLIOGRAFIE

- Alinescu, Cecilia, Paşa, Natalia (1915), *Vechile drumuri moldoveneşti*, An. de geogr. şi antropogeogr. 1914—1915 Bucureşti.
- Andrei, V. (1934), *Depresiunea Girovului*, An. lic. „Petru Rareş”, Piatra Neamţ.
- Andrişoiu, N., Ciocolu, I. (1968), *Bilanşul radiativ în cîteva puncte ale teritoriului R. S. România*, Cul. lucr. I. M., 1968, Bucureşti.
- Andronic, A. (1965), *Oraşe moldoveneşti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti*, Romanoslavica, IX.
- Apăvăloaiei, M. (1965), *Contribuţii la studiul geografic al aşezărilor rurale din Moldova*, ASUCI—GG, XI.
- (1973), *Caracterizarea geografico-economică a agriculturii judeţului Neamţ*, ASUCI—GG, XIX.
- Apăvăloaiei, M., Chiriac, D., Lupu, N. (1974), *Aşezările rurale cu industrie din Moldova*, ASUCI—GG, XX.
- Ardelean, V. (1973), *Aspecte agroclimatice din Cîmpia Aradului*, Lucr. şt., seria geogr., Timişoara.
- Ardelean, V., Herşcovici, O. (1965), *Cîmpia Aradului, aspecte de geografie fizică şi economică*, Lucr. şt. cadrelor did., Inst. Ped. Timişoara.
- Atanasiu, I., Macarovici, N. (1950), *Les sédiments miocènes de la partie septentrionale de la Moldavie (départ. de Dorohoi, de Botoşani et de Iaşi)*, ACG, XXIII.
- Athanasu, S. (1907), *Esquisse géologique des régions pétrolifères des Carpates du district de Bacău*, Congr. Intern. du Pétrole, III Sess., Guide 4.
- (1913), *Cercetări geologice în regiunea carpatică şi subcarpatică din Moldova de Sud*, Rap. activ. Inst. Geol. Rom. în 1908—1909, Bucureşti.
- (1915), *Resturile de mamifere cuaternare de la Măluşteni (Covurlui)*, AIGR, VI.
- Badea, L. (1960), *Depresiunea Jibelea (caracterizare geomorfologică)*, Probl. geogr., VII.
- (1963), *Depresiunea subcarpatică dintre Bistriţa Vileii şi Olt*, Probl. geogr., IX.
- (1965), *Observaţii geomorfologice pe marginea nordică a Depresiunii Subcarpatice dintre Bistriţa Vileii şi Gilort*, SCGGG—Geogr., XII, 1.
- (1966), *Asupra platformelor de eroziune din Subcarpaţii Getici*, SCGGG—Geogr., XIII, 1.
- (1967 a), *Subcarpaţii dintre Cerna Olteşului şi Gilort. Studiu de geomorfologie*, Edit. Academiei, Bucureşti.
- (1967 b), *Les terrasses des Subcarpates gétiques*, RRGG—Géogr., 11, 2.
- (1967 c), *Terasele Buzăului din zona subcarpatică şi mişcările neotectonice*, SCGGG—Geogr., XIV, 1.
- (1968), *La limite extérieure des Carpates*, RRGG—Géogr., 12, 1—2.
- Badea, L. (1970), *Terasele fluviatile din Oltenia*, SCGGG—Geogr., XVII, 1.
- (1971), *Valea Jiului*, Edit. ştiinţ., Bucureşti.
- (1972), *Depresiunea Hurez*, SCGGG—Geogr., XIX, 2.
- (1973), *Piemontul Getic (Concluzii la un studiu de geomorfologie regională)*, în vol. *Piemonturile*, Centrul multipl. Univ. Buc.
- (1974), *Particularităţile geografice ale Subcarpaţilor de la vest de Olt şi posibilităţile de valorificare turistică*, în vol. *Valorificarea economică şi turistică a Carpaţilor Meridionali* (Culegere de stud. şi comun. ştiinţ.), Rîmniceu. Vîlcea.
- (1981), *Consideraţii geomorfologice asupra văii subcarpatice a Oltului*, Trav. Stat. „Stejarul”, géol.-géogr., 7 (1979).
- (1983), *Defileul Coziei şi valea subcarpatică a Oltului (suprafeţe de nivelare şi terase)*, SCGGG—Geogr., XXX.
- (1985), *Simetrii în caracterele arhitectonice ale Subcarpaţilor*, Terra, XVII (XXXVII), 3.
- Badea, L., Bălţeanu, D. (1977), *Terasele din valea subcarpatică a Buzăului*, SCGGG—Geogr., XXIV, 2.
- (1978), *Influences néotectoniques et lithologiques dans les Subcarpates Gétiques à l'ouest de l'Olt*, St. geom. carp.-bale., XII.
- (1982), *La mobilité tectonique et les processus géomorphologiques actuels des Subcarpates de la Roumanie*, Cuad. investig. geogr., VIII, 1—2, Logroño.
- Badea, L., Dinu, Mihaela (1974), *Depresiunile de contact din estul Podişului Mehedinţean*, SCGGG—Geogr., XXI, 2.
- Badea, L., Ghenovici, Alexandra (1974), *Judeşul Dolj*, Edit. Academiei, Bucureşti.
- Badea, L., Niculescu, Gh. (1964), *Harta morfostructurală a Subcarpaţilor dintre Slănişul Buzăului şi Cricovul Sărat*, SCGGG—Geogr., XI.
- Badea, L., Niculescu, Gh., Roşu, Al. (1964), *Les mouvements néotectoniques pléistocènes et le modèle fluvial des Subcarpates entre le Danube et le Buzău*, RRGG—Géogr., 3.
- Badea, L., Niculescu, Gh., Sencu, V. (1976), *Harta geomorfologică, scară 1 : 1 000 000, în Atlas. Republica Socialistă România, Planşa III—1*, Edit. Academiei, Bucureşti.
- Badea, L., Rusenescu, Constanţa (1970), *Judeşul Vîlcea*, Edit. Academiei, Bucureşti.
- Badea, L., Stăncescu, Cornelia (1960), *Asupra limitei nordice a cîmpiei dintre Jiu şi Colmeana*, Natura, XII, 1.
- Badea, L., Stăncescu, Cornelia, Alexandru, D. (1956), *Observaţii morfologice în bazinul Pogănişului. Depresiunea Brebu*, Probl. geogr., IV.

- Bader, T. (1978), *Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei*, Edit. științifică, București.
- Banu, A. (1946), *Depresiunea Podenilor*, Rev. geogr. rom., II (1975), I-IV
- Barabas, N. (1977), *Noi contribuții la studiul florei și vegetației din bazinul Tazlăului*, St. com., Muz. șt. nat. Bacău, 1976-1977.
- Baranovsky, Niculina (1963), *Particularități geografice în repartitia teritorială a producției industriale și agricole în regiunea Ploiești*, Probl. geogr., IX.
- (1968), *Repartitia teritorială și dinamica populației Piemontului Getic dintre Jiu și Motru în secolul al XIX-lea și al XX-lea*, SCGGG—Geogr., XV, 1.
- (1969), *Trăsături geografice ale satelor din Subcarpații Olteniei dintre Jiu și Motru privite prin prisma sistematizării*, în vol. *Lucr. Simp. geogr. satului*, București, sept. 1967, Inst. geol.-geogr., București.
- Baranovsky, Niculina, Băcănu, I. Bugă, Dr., Rusenescu, Constanța (1975), *Les types fonctionnels d'établissements ruraux dans les Subcarpathes comprises entre les rivières Motru et Putna*, RRGGG—Géogr., 19, 2.
- Baranovsky, Niculina, Neamu, Gh. (1971), *Județul Gorj*, Edit. Academiei, București.
- Barbu, N. (1974), *Raporturi pedogeomorfologice în Cîmpia Moldovei* ASUCI—Geogr., XX.
- Barbu, N., Ionesi L., Ionesi Bica (1964), *Masivul Ciungilor—caracterizare geologo-geomorfologică*, ASUCI, sect. II, X.
- Barco, Aurelia, Nedelcu, Eugen (1974), *Județul Argeș*, Edit. Academiei, București.
- Basarabeanu, N., Bugă, Dr., Erdeli, G. (1979), *Degradările de teren din vatra satelor jud. Mehedinți, cu privire specială asupra așezărilor din bazinele Topolnicei, Băhnei și Coșuștei*, AUB—Geogr., XXVIII.
- Băcănu, I. (1971), *Considerații geistorice*, în vol. *Piemontul Getic*, Edit. Academiei, București.
- Băcănu, I., Gherce, I. (1969), *Harta așezărilor omenești atestate în decursul mileniului al doilea în Banatul românesc—constatări și interpretări geografice*, SCGGG—Geogr., XVI, 2.
- Băcănu, V. (1968), *Cîmpia Moldovei—studiu geomorfologic*, Edit. Academiei, București.
- (1973), *Evoluția văilor din Podișul Moldovenesc*, în vol. *Realizări în geografia României* Edit. științifică, București.
- Băcănu, V., Martiniuc, C. (1970), *Cercetări geomorfologice asupra părții de sud a interfluvului Moldova—Siret*, ASUCI—Geogr., XVI.
- Băcănu, V., Barbu, N., Pantazică, Maria, Ungureanu, Al., Chiriac, D. (1980), *Podișul Moldovei. Natură, om, economie*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Bălțeanu, D. (1976), *Two case studies of mudflows in the Buzău Subcarpathians*, Geogr. Annaler, 59 A, Stockholm.
- (1983), *Experimentul de teren în geomorfologie. Aplicații la Subcarpații Buzăului*, Edit. Academiei, București.
- Bălțeanu, D., Taloesen Iuliana, Dinu, Mihaela, Sandu, Maria (1976), *Efectele morfologice ale precipitațiilor din iulie 1975 în unele bazine hidrografice mici aferente Vîlsanului*, SCGGG—Geogr., XXIII.
- Băncilă, I. (1958), *Geologia Carpaților Orientali*, Edit. științifică, București.
- Băncilă, I., Hristescu, E. (1963), *Linia externă și linia pericarpatică dintre valea Sucevei și valea Trotușului (Carpații Orientali)*, Asoc. Geol. Carpato-Balc., Congr. V, III, București.
- Bărbulescu, C. (1957), *Studiul paștilor naturale de deal dintre Argeș și Dimbovița*, An. lucr. șt. Inst. Agr. N. Bălcescu, București.
- * Băzâc, Gh. (1983), *Influența reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei României*, Edit. Academiei, București.
- * Belozarov, V. (1975), *Elemente de climatologie aplicată*, Centrul de multipl. Univ. „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca.
- Berciu, D. (1939), *Arheologia preistorică a Olteniei*, Arhivele Olteniei, Craiova.
- (1967), *Buridava dacică la Oenița*, Magazin istoric, I, 6.
- Berindei, I. (1968), *Contribuții la stabilirea genezei teraselor inferioare din depresiunile-golf ale Munților Apuseni*, SCGGG—Geogr., XV, 2.
- (1969), *Procesele actuale din Depresiunea Crișului Negru. Porniturile de teren (I)*, Lucr. șt., Seria A, Inst. ped. Oradea, 3.
- (1973), *Evoluția paleogeografică a depresiunilor-golf din vestul României*, în vol. *Realizări în geografia României, Culegere de studii*, Edit. științifică, București.
- (1977), *Țara Beiușului* în vol. *Cîmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului*, Col. *Cercetări în geografia României*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Berindei, I., Dumitrașcu, S. (1969), *Contribuții la stabilirea genezei Cîmpiei Crișurilor și a luncilor din depresiunile-golf. Formarea luncii Crișului Negru*, Lucr. șt., Seria A, Inst. ped. Oradea.
- Berindei, I., Iacob, Ersilia (1961), *Contribuții la studiul morfologic al Depresiunii Gurăușului*, SUBB—GG, II, 1.
- Birurescu, I. (1981), *Distribuția subspeciilor de gorun în pădurile dealurilor subcarpatice joase din Oltenia*, Rev. păd., 96, 3.
- Bizerea, M. (1962), *Precizarea geografică a numelui orașului Timișoara*, Natura—Geogr.-geol., XIV, 1.
- Bizerea, M., Ardelean, V. (1970), *Contribuții la studiul geografic al orașului Arad*, Studii de geografie a Panatului, 1, Timișoara.
- Blaj, C. (1958), *Aspecte urbane ale orașului Buhuși*, ASUCI—GG, sect. II, IV, 1.
- Bleahu, M., Decu, V., Negrea, Șt., Pleșa, C., Povară, I., Viehmann, I. (1976), *Peșteri din România*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Bobinger, Franz (1935-1936), *Robert Bergrave, un voyageur anglais dans les pays roumains du temps de Vasile Lupu*, AAR, Ser. III, XVII, 3.
- Boblnac, B. (1972), *Cu privire la ecologia entomofaunei în condițiile Olteniei (II)*, St. cerc., Com. de Cult., Tg. Jiu.
- (1973), *Cu privire la ecologia entomofaunei în condițiile Olteniei*, St. cerc., Com. de Cult. Rm. Vilcea.
- Bogdan, A. (1966), *Cercetări paleohidrografice asupra văii Someșului*, SCGGG—Geogr., XIII, 1.
- Bogdan, Octavia, Mihai, Elena, Teodoreanu, Elena, Neamu, Gh. (1971), *Rolul reliefului în crearea și amplificarea inversiunilor termice pe teritoriul R. S. România*, Hidrotehnica, 16, 1.
- Bogdan, Octavia, Mihai, Elena, Teodoreanu, Elena (1974), *Clima Carpaților și Subcarpaților de Curbură dintre văile Teleajenului și Slănicul Buzăului*, Lucr. șt. Staț. geogr. Pătrîlagele, Inst. geogr. București.
- Bogdan, Octavia, Mihai, Elena (1981), *Intensité des pluies dans la région des Subcarpathes du Buzău*, RRGGG—Géogr., 25, 1.
- Bojoi, I. (1973), *Problema formării defileului Cuediului de la Piatra Neamț, în legătură cu un fenomen de despletire a Bistriței*, Lucr. Staț. „Stejarul”, Geol.-Geogr., 1972-1973.

- Bojoi, I., Ichim, Ioniță. (1974), *Județul Neamț*, Edit. Academiei, București.
- Bordei—Ion, Ecaterina (1983), *Rolul lanțului alpinocarpatic în evoluția ciclonilor mediteraneeni*, Edit. Academiei, București.
- Bordei—Ion, N. (1972), *Problèmes de la circulation de l'air dans la zone des Carpates de Courbure*, în vol. *Lucr. celei de-a V-a Conferințe de meteorologie a Carpaților* (1971), I. M. II., București.
- (1988), *Fenome meteorologice induse de configurația Carpaților în Cîmpia Română*, Edit. Academiei, București.
- Borza, Al., Călinescu, R., Celan, Maria, Pașcovschi, S., Paucă, Ana, Pop, E., Pușcaru—Soroceanu, Evdochia (1960), *Vegetația*, în *Monografia geografică a R. P. Române*, I, Edit. Academiei, București.
- Botez, C., Urnă, D., Saizu, I. (1977), *Epopeea feroviară românească*, Edit. sport-turism, București.
- Bratosin, N., Predel, Fl. (1964), *Caracterizarea morfologică și fizico-chimică a principalelor tipuri de soluri din regiunea Piatra Neamț*, Dds. șed. CG, I/II.
- Brătescu, C., Mihăilescu, V., Tufescu, V., Rădulescu, N. Al. (1943) *Unitatea și funcțiunile pământului și poporului românesc*, SRRG, București.
- Brânduș, C. (1981), *Subcarpații Tazlăului. Studiu geomorfologic*, Edit. Academiei, București.
- Brânduș, C., Brânduș, Filipina (1973), *Forme de relief carstic în Depresiunea Tazlăului*, St. cercet. șt.—geol.-geogr. Inst. ped. Bacău.
- Brânduș, C., Petreus, I., Ungureanu, Al. (1971), *Contribuția la studiul geomorfologic al văii Tazlăului Mare*, Lucr. Stat. șt. „Stejarul”, 4, Piatra Neamț.
- Brudiu, M. (1974), *Paleoliticul superior și epipaleoliticul din Moldova*, Inst. arheol., Bibl. arheol., Seria complementară, 2, București.
- Bucur, N. (1954), *Serile pedologice din depresiunea Ozana—Topolnița*, St. cerc. șt., Academia R. P. R., Fil. Iași, V, 3—4.
- Bucur, N., Barbu, N. (1961), *Complexul fizico-geografic din regiunea masivelor deluroase Copalău—Cozancea—Guranda*, ASUCI, VII, 1.
- Bugă, Dr. (1967), *Populația orașelor Munteniei și Olteniei în ultima sută de ani*, Rev. statist., XVI, 11.
- (1968), *Populația Olteniei în secolele XIX și XX*, Rev. statist., XVII, 6.
- (1969 a), *Dezvoltarea așezărilor omenești din Subcarpații și Piemontul Getic dintre Jiu și Gilort în raport cu mediul geografic*, în vol. *Lucr. simp. geogr. satului*, București, sept. 1967, Inst. geol.-geogr., București.
- (1969 b), *Repartiția geografică a așezărilor omenești dintre Carpați și Dunăre (Țara Românească) la jumătatea secolului al XIX-lea*, Com. geogr., SSG, VII.
- (1969 c), *Considerații geografice privind vatra și moșia așezărilor rurale din Oltenia*, Com. geogr., SSG, IX.
- (1971), *Mișcarea migratorie a populației în orașele dintre Carpați și Dunăre*, în vol. *Lucr. celui de al III-lea coloc. naț. geogr. pop. și așez.*, 1970, Iași, Univ. Iași.
- (1975), *Sensul termenului „plai” la populația satelor subcarpatice*, în vol. *Lucr. simpoz. de toponimie*, București, iunie 1972, Inst. geogr., București.
- Bugă, Dr., Alexandrescu, Valeria, Vlad, Sorina (1982), *Structurile urbane și centrele de convergență umană din Oltenia subcarpatică*, Terra, XIV (XXXIV), 2.
- Bugă, Dr., Iacob, Gh., Ianoș, I. (1982), *Relația om-mediul în Subcarpații Olteniei dintre Ol și Jiu*, în vol. *Geografia Gorjului*, Tirgu Jiu.
- Bugă, Dr., Ionescu, Angela (1971), *Orașele Piemontului Getic*, Rev. statist., XX, 12.
- Bugă, Dr., Zăvoianu, I. (1974), *Județul Dimbovița*, Edit. Academiei București.
- Burai, A. (1980), *Dezvoltarea orașului medieval—Satu Mare*, St. comun., IV, Satu Mare.
- Burduja, C. (1948), *Contribution à la connaissance de la flore de la Dépression de Cracău, District de Neamț (avec quelques remarques géobotaniques)*, ASUI, XXXI.
- (1957), *Material dendrologic și observații geobotanice referitoare la pădurile din Moldova*, St. cerc. șt., Fil. Iași, Academia R. P. Române, VIII, 1.
- (1972), *Flora și vegetația pădurilor din masivul Ghindăoani—Tupilași*, jud. Neamț, St. și com., Muzeul Piatra Neamț, II.
- Burduja, C., Barbu, N. (1955), *Contribuții la fitogeografia Colinelor Tutovei*, Probl. geogr., II.
- Burduja, C., Mihai, Gh., Sirbu, I. (1973), *Flora și vegetația Masivului Mărgineni (jud. Neamț)*, Lucr. stat. „Stejarul”, Ecologie terestră și genetică (1972—1973), Pîngărași.
- Burloiu, G. (1981), *Ocolul domnesc al Bacăului (secolele XV—XVIII)*, Carplea, XIII.
- Buta, I., Sorocovschi, V. (1971), *Influența factorilor fizico-geografici asupra proceselor scurgerii în Cîmpia joasă a Someșului inferior*, SUBB—GG, XVI, 1.
- Buta, I., Anițan, I., Buz, V., Simu, M., Iacob, E., Hedeșiu, I. (1976), *Probleme legate de apele subterane din Cîmpia Someșului (bazinul Homorodului)*, SUBB—GG, XXI.
- Buta, I., Anițan, I., Iacob, E., Simu, M., Buz, V., Hedeșiu, I. (1977), *Caracteristicile cantitative ale apelor subterane din Cîmpia Someșului inferior (bazinul Homorodului)*, SUBB—GG, XXII, 1.
- Buzdugan, C. (1968), *Descoperiri arheologice în Depresiunea Onești*, Carplea, I.
- Caloianu, N., Sultana, Viorica, Vasile, I. (1983), *Componente geografice în modernizarea așezărilor din Valea Oltului între Băbeni și Slatina*, Terra, XV (XXXV), 1.
- Canțemir, D. (ed. 1973), *Descrierea Moldovei*, Edit. Academiei, București.
- Căpitanu, V., Ursachi, V. (1971), *Ghidul monumentelor din județele Bacău și Neamț*, Com. de Cult. Bacău.
- Cebuc, Al., Mocanu, C. (1967), *Din istoria transporturilor de călători în România*, Edit. științ., București.
- Chiriac, D. (1971), *Cîteva aspecte geografico-economice referitoare la evoluția populației și veteilor așezărilor rurale din Moldova (secolele XIX—XX)*, ASUCI—GG, XVII.
- Chișu, C., Peahă, M. (1965), *Repartiția solurilor din regiunea Platformei Cîndești și a Muscelor dintre Argeș și Dimbovița*, Dds. șed. CG, LI (1963—1964).
- Cihodaru, C. (1960), *Constituirea statului feudal moldovenesc și lupta pentru realizarea independenței lui*, St. și cerc. șt., Istorie, Fil. Iași, Academia R. P. Române, XI.
- (1961), *Cîteva constatări în legătură cu proprietatea feudală din Moldova în a doua jumătate a sec. al XV-lea*, St. și cerc. șt., Istorie, Fil. Iași, Academia R. P. Române, XII, 1.
- Cioacă, A. (1985), *Considerații asupra reliefului structural din Subcarpații Vrancei*, SCGGG—Geogr., XXXII.
- Ciocirdel, R., Esca, Al. (1966), *Încercare de sinteză a datelor cu privire la mișcările verticale recente ale scoarței terestre în România*, SCGGG—Geofiz., IV, 1.
- Ciocirlan, V. (1969), *Asociații vegetale noi din bazinul subcarpatic al Slănicului de Buzău*, SCB—Bot., 21, 6.
- (1972), *Reflecția influențelor sudice și estice în flora și vegetația de la Curbura Carpaților*, Com. de Bot., SSB, XIII.
- Ciupagea D., Paucă M., Ichim Tr. (1970), *Geologia Depresiunii Transilvaniei*, Edit. Academiei, București.
- Clurea, D. (1965), *Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (secolele XIV—XVIII)*, An. Inst. Ist. Arh. Iași, II.

- Clirtea, St., Marțian, N. (1962), *Cercetări pedologice în sectorul Călimănești-Băbeni-Bistrița-Armășești* — Vaideeni, Dds. șed. CG, XLVII (1959-1960).
- Clrju, Mariana (1973), *Asociații vegetale din cursul superior al Amaradiiei, Studii cercet., Râmnicu Vâlcea*.
- Clenciu, V. (1972), *Evoluția așezărilor omenești din bazinul Tazlăului în secolele XIV-XX*, St. cerc. șt., Inst. Ped. Bacău-Șt. Naturii.
- (1973), *Contribuții la studiul populației din bazinul Tazlăului*, St. cerc. științ., Inst. Pedag. Bacău-Geol.-Geogr.
- Cobălcescu, Gr. (1883 a), *Studii geologice și paleontologice asupra unor țărâniuri terțiare din unele părți ale României*, Mem. geol. ale Școlii Milit., Iași.
- (1883 b), *Formațiune saliferă sau Secunda Formațiune Mediterană*, Mem. geol. ale Școlii Milit., Iași.
- Codarcea, Al. (1940), *Vues nouvelles sur la tectonique du Banat méridional et le plateau de Mehedinți*, AIGR, XX.
- Colescu, L. (1944), *Analiza rezultatelor recensământului general al populației României din 1899*, București.
- Conca, I. (1932 a), *Așezările omenești în depresiunea subcarpatică din Oltenia*, BSRRG, I (1931).
- (1932 b), *Studiul geografic al castanilor din Oltenia*, BSRRG, I (1931).
- (1933), *Cercetări geografice în diploma Ipanișilor*, BSRRG, LI (1932).
- (1935), *Țara Loviștei*, BSRRG, LIII (1934).
- (1939), *Pe urmele descălecatului din Sud. 1. Satele de ungureni din Oltenia Subcarpatică*, BSRRG, LVIII.
- (1943), *Plaiul și muntele în istoria Olteniei*, în vol. Oltenia, Craiova.
- Conea, Ion., Bugă, Dr. (1969), *Așezări de înălțime în Carpații Meridionali-Așezările din plaiul Bumbesților*, SCGGG-Geogr., XVI, 1.
- Constantinescu, G. P. (1968), *Studiile hidrogeologice pentru alimentarea cu apă potabilă a orașului Craiova*, HGAM, 13, 3.
- Constantinescu-Neamț, Margareta (1940), *Depresiunea Craicului și a Bistriței din punct de vedere antropogeografic*, Piatra Neamț.
- Constantinescu, M. (1949), *Contribuții la studiul porniturilor de teren în regiunea Pucioasa-Dimbovița*, Natura, I, 2.
- Cornea, I., Drăgoescu, I., Popescu, M., Visarion, M., Săndulescu, M., Drăghici, M. (1977), *Harta mișcărilor crustale verticale recente, scara 1:1.000.000*, ICG, București.
- Costăchescu, M. (1931-32), *Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, I-II*, Iași.
- Costea, I., Vinogradov, C., Comșa, E., Bönig, H. (1981), *Studiul microfacial al depozitelor cretacee din Platforma Moldovenească și Depresiunea Birladului*, SCGGG-Geol., XXVI, 2.
- Coteț, P. (1957), *Depresiunea Zărandului, Observații geomorfologice*, Probl. geogr., IV.
- (1969), *Suprafețele geomorfologice de tip piemont, pediment, glacis și studiul lor*, SCGGG-Geogr., XVI, 2.
- (1970), *Depresiunea Oraviței — Observații geomorfologice*, Lucr. științ. ale cadrelor didactice, seria geogr., II, Timișoara.
- (1973), *Geomorfologia României*, Edit. tehnică, București.
- Coteț, P., Grumăzescu, Cornelia (1967), *Harta geomorfologică a Cîmpiei Tisei*, SCGGG-Geogr., XIV, 2.
- Coteț, P., Marliniuc, C. (1960), *Harta geomorfologică a R. P. R., sc. 1:1.500.000*, în *Monografia geografică a R. P. R., I, Geografie fizică* — Anexa I, Edit. Academiei, București.
- Cucu-Popova, Ana (1970), *Vegetația de pe calcarele din Podișul Mehedinți*, SCGGG-Geogr., XIII, 1.
- Cucu-Popova, Ana, Muică-Santa Cristina (1975), *Elemente floristice de interes turistic din nord-vestul județului Gorj, Terra, VII (XXXVII), 1*.
- Cucu-Popova, Ana, Muică, Cristina, Drugescu, C. (1971), *Ecosystème de type subméditerranéen dans les Carpates Méridionales*, RRGGG-Géogr., 20.
- Cucu, V. (1955), *Condițiile naturale și economico-geografice în raionul Tirgu Jiu, regiunea Craiova*, Natura, VII, 2.
- (1963), *Contribuții geografice la studiul așezărilor omenești din regiunea subcarpatică dintre Gilort și Motru*, Com. geogr., SSNG, II.
- * (1970 a), *Orașele României*, Edit. științifică, București.
- (1970 b), *Evoluția numărului populației pe teritoriul României*, Natura — geogr.-geol., II (XXII), 3.
- (1974), *Geografia populației și așezărilor omenești*, Edit. didactică și pedagogică, București.
- * (1977), *Sistemizarea teritoriului și localităților din România, repere geografice*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Cucu, V., Bugă, Dr., Erdeli, G., Alexandrescu, Valeria (1980), *Locul județului Mehedinți în peisajul geografic și în economia R. S. României*, AUB-Geogr., XXIX.
- Dăicoviciu, C., Pascu, Șt., Chereșteșu, V., Morariu, T. (1966), *Din istoria Transilvaniei*, I, Edit. Academiei, București.
- Dăicoviciu, C., Petrovici, E., Ștefan, Gh. (1963), *La formation du peuple roumain et de sa langue*, Edit. de l'Académie Roum., Bucarest.
- David, M. (1921), *O schiță morfologică a Podișului sarmatic din Moldova*, BSRRG, XXXIX (1920).
- (1922), *Cercetări geologice în Podișul Moldovenesc*, AIGR, IX (1915-1920).
- (1932), *Relieful regiunii subcarpatice din districtele Neamț și Bacău*, BSRRG, I (1931).
- (1933), *Secțiuni de geografie fizică — III, Morfologia terestră (relieful)*, Curs. litogr., Univ. Iași.
- (1941), *Relieful Coastei Iașilor și problemele pe care le ridică sub raportul geomorfologie și antropogeografie*, Lucr. Soc. Geogr. „D. Cantemir”, III, Iași.
- Dăvidescu, G. (1968), *Contribuții la studiul climei din depresiunea subcarpatică a Neamțului*, ASUCI-GG, XIV.
- (1969), *Diferențieri termice în depresiunea subcarpatică a Neamțului*, ASUCI-GG, XIV.
- Decou, Anca, Decou, V., Bleahu, M. (1967), *Grottes d'Olténie, explorées de 1959 à 1962*, în *Recherches sur les grottes du Banat et d'Olténie (Roumanie, 1959-1962)*, Edit. CNRS, Paris.
- Diaconu, C. (1971), *Probleme ale scurgerii de aluviuni a râurilor României*, St. hidrol., XXXI.
- Diaconu, I. (1930), *Ținutul Vrancei. Etnografie, folklor, dialectologie*, Inst. de Filolog. și Folklor, București.
- Dihoru, Gh., Negreanu, G. (1969), *Dealurile Tohani, o insulă cu vegetație pontic-balcanică*, SCB-Bot., 21, 3.
- Dimitriev, P. (1973), *Populația Moldovei după materialele recensămintelor din anii 1772-1773, 1774 și 1803*, Edit. Știința, Chișinău.
- Dinu, Mihaela, Cioacă A. (1987), *Morfotectonica Subcarpaților Vîlcii și Vrancei*, Lucr. Sem. „Dimitrie Cantemir”, 7 (1986), Univ. „Al. I. Cuza” Iași.
- Donat, I. (1956), *Așezările omenești din Țara Românească, în sec. XIV-XVI*, Studii, IX, 6.
- Donciu, C. (1969), *Unele caracteristici ale regimului termic al solului și aerului în zona dealurilor subcarpatice meridionale la Valea Călugărească*, HGAM, 14, 11.
- Donisă, I. (1957), *Cîteva observații geomorfologice în bazinul hidrografic al Rîmnei*, Probl. geogr., IV.

- Donisă, I. (1968 a), *Geomorfologia văii Bistriței*, Edit. Academiei, București.
- (1968 b), *Procese de versant din Depresiunea Cracău—Bistrița*, ASUCI—GG, XIV.
- (1968 c), *Terasele din Depresiunea Cracău—Bistrița*, Lucr. Staf. Stejarul, I.
- Donisă, I., Erhan, Elena (1974), *Curs de climatologie a R. S. România*, Centrul multipl., Univ., Al. I. Cuza*, Iași.
- Donisă, I., Hirjoabă, I. (1974), *Problema piemonturilor din Moldova*, ASUCI—Geogr., XX.
- Donisă, I., Poghirc, P. (1968), *Valea Bistriței*, Edit. științifică, București.
- Doniță, N. (1967), *Vegetația submediteraneană din bazinul Dunării de Jos*, SCB—Bot., 19, 3.
- Doniță, N., Leandru, V., Pușcaru—Soroceanu, Evdochia (1960), *Harta geobotanică a Republicii Populare Române*, sc. 1: 500 000, Edit. Academiei, București.
- Doniță, N., Purcelean, Șt. (1975), *Pădurile de steau din R. S. România și gospodărirea lor*, Edit. Ceres, București.
- Doniță, N., Roman, N. (1976), *Vegetația*, planșa VI—2, *Atlas R. S. România*, Edit. Academiei, București.
- Dragomir, S. (1944), *Le Banat Roumain. Esquisse historique*, Centrul de studii și cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu.
- Dragoș, V. (1953), *Cercetări geologice asupra regiunii dintre Topolog și Olt*, Dds. șed. Com. Geol., XXXVII (1949—1950).
- (1955), *Asupra structurii geologice a regiunii dintre riul Topolog și valea Olănești*, Dds. șed. Com. Geol., XXXIX (1951—1952).
- Dragoș, V. (1957), *Deplasările de teren*, Edit. științifică, București.
- Dragu, I. (1962), *Cercetări geobotanice în platforma Colmeana, sectorul cuprins între riurile Topolog, Vedeș și Argeș (reg. Pitești)*, Dds. șed. Com. Geol., XLIII (1955—1956).
- Drăgoi, C., Swizevski, K. (1967), *Contribuții geografico-economice asupra așezărilor rurale din bazinul Trotuș*, ASUCI—GG, XIII.
- Drăgotescu, M. (1974), *Muzele din județul Neamț*, Edit. Meridiane, București.
- Drăgescu, C. (1971), *Contribuții la zoogeografia Podișului Mehedinți*, SCGGG—Geogr., XVIII, 1.
- Dumitrașcu, S. (1968), *Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României, în secolele II—IV e. n. (I)*, Lucr. științ., Inst. ped. Oradea, II.
- Dumitrescu, I., Săndulescu, M., Lăzărescu, V., Mirăuță, O., Pauliuc, S., Georgescu, C. (1962), *Mémoire à la carte tectonique de la Roumanie*, ACG, XXXII.
- Enculescu, P. (1926), *Studiu agrogeologic al vechii insule de stepă de la est de Piatra Neamț*, Dds. șed. IGR, VIII (1919—1920).
- Erdeli, G. (1978), *Orientări noi privind sistematizarea așezărilor rurale în județul Mehedinți*, Studii de geografie, Univ. București.
- (1979), *Considerații geografice asupra așezărilor omenești din Piemontul Strehaia*, AUB—Geogr., XXVIII.
- (1983), *Așezările omenești din Podișul Mehedinți. Aspecte de geografie istorică*, Terra, XV (XXXV), 1.
- Erdeli, G., Căndea, Melinda (1984), *Așezarea rurală — componentă principală a peisajului geografic românesc*, BSSGR, VII (LXXVII).
- Erdeli, G., Căndea, Melinda, Alexandrescu, Valeria (1984), *Habitatul urban din Oltenia. Considerații geografice asupra structurii teritoriale*, Terra, XVI (XXXVI), 2.
- Erhan, Elena (1976), *Unele caracteristici climatice ale orașelor din Moldova*, Simpoz. climatologie urbană și combaterea poluării mediului, Fil. Iași, Acad. Rom.
- (1979), *Clima și microclimatele din zona orașului Iași*, Edit. Junimea, Iași.
- Filipescu, M. G. (1943), *Recherches géologiques sur le nord-ouest d'Oltenie*, Bul. Soc. geol. rom., V (1942).
- (1950), *Îmbătrânirea prematură a rețelei hidrografice din partea sudică a Moldovei dintre Siret și Prut și consecințele acestui fenomen*, Natura, II, 5.
- Florea, N., Conca, Ana, Spirescu, M., Munteanu, I., Asvadurov, H., Stoica, Elena (1971), *Notă explicativă la Harta solurilor R. S. România*, scara 1: 1 000 000, IG, București.
- Florea, N., Munteanu, I., Rapaport, C., Chițu, C., Opris, M., (1968), *Geografia solurilor României*, Edit. științifică, București.
- Florescu, R., Daicoviciu, H., Roșu, L. (1980), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Gavăț, I., Airinei, Șt., Botezatu, R., Socolescu, M., Stoienescu, Sc., Vencov, I. (1963), *Structura geologică profundă a teritoriului R. P. R., după datele actuale geofizice (gravimetrice și magnetice)*, SC Geofiz., I, 1.
- Georgescu, Liliana (1941), *Localizarea și structura industriei românești*, Cartea Românească, București.
- Ghenea, C. (1968), *Studiul depozitelor pliocene dintre valea Prutului și valea Birladului*, STE, seria J, Stratigrafia, 6.
- Ghenea, C., Mihăilă, N., Ghenea, Ana (1963), *Cercetări geologice între v. Topolnicei și v. Desnăului*, STE, Seria E, Hidrogeol., 6.
- Gheorghiu, C. D. (1895), *Dicționarul geografic al județului Neamț*, Soc. Geogr. Rom., București.
- Gherasi, N., Mureșan, M., Lupu, M., Stancu, Iosefina, Savu, H. (1968), *Notă explicativă la harta geologică Deva*, 1: 200 000.
- Gherasim, V., Marin, I. (1972), *Piatra Neamț — monografie*, Consiliul Popular Municipiul Piatra—Neamț.
- Ghibănescu, Gh. (1890—1891), *Tirgul Ocna, studiu istoric*, Arhiva, II.
- (1926), *Vasluiul — studii și documente*, Tip. Viața Românească, Iași.
- Giurescu, C. C. (1957), *Principalele române la începutul secolului XIX. Constatări istorice, economice și statistice pe temeiul hărții ruse din 1825*, Edit. științifică, București.
- (1967), *Tirguri sau orașe și cetăți moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea*, Edit. Academiei, București.
- Giurescu, C. C., Giurescu, D. C. (1971), *Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi*, Edit. Albatros, București.
- (1974), *Istoria românilor, I, Din cele mai vechi timpuri până la înlemnirea statelor românești*, Edit. științ. București.
- Giusecă, D., Colios, Elena, Udrescu, C. (1974), *Fundamentul cristalin al Platformei Moldovenești*, SCGGG—Geol., 19.
- Gostar, N. (1965), *Cetatea dacică de la Piatra Neamț—Bilca Doamnei*, în vol. *Omagiul lui P. Constantinescu—Iași*, Edit. Academiei, București.
- Grigoraș, N. (1961), *Geologia zăcămintelor de petrol și gaze din R. P. R.*, Edit. tehnică, București.
- Grințescu, P. G. (1908), *Flora și distribuția ei în regiunea brađului, fađului și stejarului din jud. Neamț*, Inst. Arte Grafice, București.
- Groholtschi, Profira (1930), *Tirgu Neamț. Monografie*, Piatra Neamț.
- Grossu, Al., Popescu, M. (1975), *Vertebrele din zona montană a Olteniei*, St. cerc., Com. de Cult. Mehedinți, Drobeta Tr. Severin.

- Grozescu, H. (1918), *Geologia regiunii subcarpatice din partea de nord a districtului Bacău*, AIGR, VIII (1914).
- Grumăzescu, H. (1973), *Subcarpații dintre Cîlnău și Șușița*, Studiu geomorfologic, Edit. Academiei, București.
- Grumăzescu, H., Ștefănescu, Ioana (1970), *Județul Vrancea*, Edit. Academiei, București.
- Gugiuman, I. (1940), *Observațiuni asupra citorva cazuri de meandre compuse din România*, BSRRG, LIX.
- Gugiuman, I. (1959), *Depresiunea Huși*, Edit. științifică, București.
- Gugiuman, I., Pleșca, Gh., Erhan, Elena, Stănescu, I. (1960), *Unități și subunități climatice în partea de est a R. P. R.*, ASUCI—Șt. Naturii, VI, 4.
- Gugiuman, I., Petras, Eugenia (1963), *Rolul dinamicii atmosferei și al factorilor geografici în determinarea regimului temperaturii aerului în partea de est a Republicii Populare Române*, ASUCI—GG, IX.
- Hațieganu, Alexandra (1946), *Canalul Bega*, Rev. geogr. IGR, III, IV.
- Hirjoabă, I. (1962), *Contribuții la studiul teraselor din Colinele Tutovei*, ASUCI—GG, VIII.
- (1968), *Relieful colinelor Tutovei*, Edit. Academiei, București.
- Hummel, K. (1927), *Diluvialterrassen in Prahova—Tale bei Cîmpina (Rumänien) und quartäre Vertiefenbildung am Außenrande der Karpaten*, Zentralblatt Min. Geol. Pal. Abt. B. Geol. und Pal., Stuttgart, XI.
- Hurmuzaki, E. (1876—1942), *Documente privilegiate la istoria românilor*, Acad. Rom., București.
- Iacob, Gh. (1965), *Studiul geografiei agriculturii în Cîmpia Someșului*, Com. geogr. SSNG, III, București.
- (1972), *Schimbări în utilizarea terenurilor din depresiunea Tirgu Jiu*, SCGGG—Geogr., XIX, 2.
- (1973), *Utilisation actuelle des terrains dans la plaine de l'Erieu*, RRGGG—Geogr., 17, 2.
- (1983), *Resursele energetice din regiunea de nord-vest a României și valorificarea lor*, SCGGG—Geogr., XXX.
- (1984), *Evoluția utilizării și populării terenurilor nisipoase din nord-vestul României*, ASUCI—GG, XXX.
- Iacob, Gh. (1985), *Considerații geografice asupra evoluției teritoriale a municipiului Satu Mare*, SCGGG—Geogr., XXXII.
- Iacob, Gh., Ianoș I. (1980), *Zona carboniferă Motru—Jiu. Considerații economico-geografice*, Terra, XII (XXXII), 4.
- Ianoș, I., Isbășoiu, C. (1984), *Organizarea spațiului rural perturbat al municipiului Timișoara*, BSSGR, VII (LXXVII).
- Ianoș, I., Simuț, O. D. (1983), *Resurse energetice ale Cîmpiei Banatului*, Terra, XV (XXXV), 4.
- Ilie, I. (1968), *Asupra genezei unor forme endocarstice*, Com. geogr. SSGR, VI.
- (1969), *Modelarea actuală și valorificarea complexă a terenurilor culcătoase din nordul Olteniei*, Com. geogr., SSGR, VII.
- (1970), *On the genesis of poljas in the Mehedinți plateau*, RRGGG—Geogr., 14, 2.
- (1972), *Retrospectivă, actualitate și perspectivă în dezvoltarea turistică a Olteniei nord-vestice*, în vol. *Lucr. celui de-al II-lea Colocviu Național de Geogr. turismului*, Edit. Sport—Turism, București.
- Ionescu, Al. Neamu, Gh. (1973), *Efectele biologice ale poluării și problemele mediului în zona Birsești (Tg. Jiu)*, SCB—Bot., 25, 3.
- Ionescu—Argetoia, I. (1914), *Pliocenul din Oltenia*, AIGR, VIII.
- (1923), *Bazinul pliocenic din Depresiunea Geliciș și legăturile acestuia cu bazinele învecinate*, Dds. șed. IGR, VI (1914—1915).
- Ionesi, Bica (1968), *Stratigrafia depozitelor miocene de platformă dintre valea Siretului și valea Moldovei*, Edit. Academiei, București.
- Ionesi L., (1989), *Geologia României. Unități de platformă și Orogenul Nord-Dobrogean* Tip. Univ. Iași.
- Ionesi, L., Ionesi, B., Barbu, N. (1971), *Orizontarea depozitelor fluvio-deltaice din partea vestică a Podișului Sucevei și semnificația ei geomorfologică*, ASUCI—Geogr., XVII.
- Ionesi, L., Ionesi, Bica (1981), *Date noi asupra Sarmațianului din partea nord-estică a Platformei Moldovenești (regiunea Hudești (Mitoc), Mem. secț. șt. Acad. RSR, ser. IV, IV, 1.*
- Ionesi, L., Băciuanu, V. (1985), *The Hudești conglomerates and their paleogeographical significance*, ASUCI—GG, XXXI.
- Jordan, Magdalena (1975), *Studiul biostratigrafic al Paleozoicului din forajul Bătrînești (Platforma Moldovenească)*, Dds. șed. IGG, LXI/4.
- Jorga, N. (1921), *Istoria Românilor prin călători*, II, București.
- (1937), *Istoria comerțului românesc, Epoca Veche*, Tiparul românesc, București.
- Istocescu, D. (1970), *Stratigrafia depozitelor pliocene din extremitatea vestică a bazinului Crișului Alb*, Dds. șed. Com. Geol., XVI (1968—1969).
- Jeanrenaud, P. (1961), *Contribuții la cunoașterea geologiei Podișului Central Moldovenesc*, ASUCI—Șt. Nat., VII, 2.
- (1966), *Contribuții la cunoașterea geologiei regiunii dintre valea Siretului și valea Birladului*, ASUCI—GG, XII.
- (1971), *Harta geologică a Moldovei centrale dintre Sirel și Prut*, ASUCI—Geol., XVII.
- Joja, T. (1941), *Recherches géologiques dans le bassin du Neamșu et de la Rîșca*, IGR, XXIX.
- (1952 a), *Cîteva observațiuni geologice în zona miocenă dintre capătul de sud-est al Culmii Pleșu și valea Cracăului (Neamș)*, Dds., șed., Com. Geol., XXXIV (1945—46).
- (1952 b), *Cercetări geologice între valea Rîșcei și valea Agapiei*, ACG, XXIV.
- Josan, N. (1968), *Depresiunea Ghepișului*, Lucr. științ., II, Inst. ped., Oradea.
- (1970), *Dealurile Dernei. Aspecte geomorfologice*, Lucr. științ., seria A, Inst. ped., Oradea.
- Lăzărescu, Gh. (1965), *Aspecte economico-geografice din bazinul Beregsăului*, Lucr. șt. ale cadrelor didactice, Inst. Ped. Timișoara.
- Liteanu, E. (1953), *Limita superioară a Terțiarului din aria de dezvoltare a lacului pliocen din Cîmpia Română*, STE, seria E, Hidrogeologie, 2.
- (1960), *Despre problema limitei Cuaternar—Terțiar din Depresiunea Valahă*, STE, Seria E, Hidrogeologie, 5.
- Lupașcu, G., Toderiță, M., Simalesik, F. (1978), *Proprietățile cernoziomurilor levigate din Depresiunea Cracău—Bistrița*, An. Muz. de Șt. Nat. Piatra Neamș, seria Geol.—Geogr., IV.
- Lupu, N. N. (1937), *Contribuții la studiul fizic și antropogeografic al regiunii subcarpatice din Bucovina, cunoscută în literatura geografică sub denumirea de Bazinul Rădăuștilui*, Lucr. Soc. Geogr. „D. Cantemir”, I, Iași.
- Lupu, N. N., Sandru, I., Brânduş, C. (1970), *Terasele rîului Trotus între Uz și Oituz cu privire specială asupra originii defluienței de la Cireșoara*, ASUCI—Geogr., XVI.

- Lupu, N. N., Văcărașu, Iulia (1972), *Resursele umane din zona orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Terra, IV (XXIV)*, 5.
- Lupu, N. N., Văcărașu, Iulia, Brânduș, C. (1972), *Județul Bacău*, Edit. Academiei, București.
- Mac, I., Nuna, Gr. (1964), *Studiul apelor arleziene din regiunea orașului Zalău*, SCGGG—Geogr., XI.
- Macarovici, N. (1953), *Limita estică a Mediteraneanului dintre riurile Suceava și Bistrița*, Dds. șed., Com. Geol., XXXVII (1949–1950).
- (1956), *Asupra faunei Silurianului din fundamentul Podișului Moldovenesc*, ASUCI—Șt. Nat., I, 1.
- (1960), *Contribuții la cunoașterea geologiei Moldovei meridionale*, ASUCI—Șt. Nat., VI, 4.
- (1971), *La faune silurienne du fondement du Plateau Moldave*, ASUCI—Geol., XVII.
- Macarovici, N., Jeanrenaud, P. (1958), *Revue générale du néogène de Plate-forme de la Moldavie*, ASUCI—Șt. Nat., IV, 2.
- Manciulea, Șt. (1932), *Sate și sălașuri din Cîmpia Tisei*, BSRRG, I (1931).
- (1939), *Cîmpia Tisei*, BSRRG, LVII (1938).
- Marcu, Gh. (1962), *Studiul asupra vegetației forestiere dintre Olt și Teleorman*, SCB—BV, XIV, 4.
- (1965), *Studiul ecologic și silvicultural al grînelor dintre Olt și Teleorman*, Edit. Agrosilvică, București.
- Marki, S. (1887), *A Fekete Körös es videke (Cîșul Negru și împrejurimile)*, Oradea.
- Martiniuc, C. (1946), *Date noi geomorfologice asupra regiunii Baia—Suceava*, Rev. Geogr. ICGR, III, I—III.
- (1948 a), *Contributions à la connaissance du Sarmatien entre Sireth et les Carpathes*, Ann. Scient. Univ. Jassy, XXXI.
- (1948 b), *Date noi asupra evoluției paleogeografice a Sarmatianului din partea de V a Podișului Moldovenesc*, Rev. șt. V. Adamachi, XXXIV, 3.
- (1950), *Date geomorfologice în legătură cu Subcarpații românești*, în vol. *Din lucr. ICGR (1947–1950)*, București.
- (1955), *Podișul Moldovenesc*, în vol. *Geografia fizică a R. P. Române*, curs litogr., Univ. București.
- (1956), *Cercetări geomorfologice în regiunea Baia—Suceava*, ASUCI—Șt. Nat., II, 2.
- (1960), *Raionarea geomorfologică a R. P. Române în Monografia geografică a R. P. Române*, I, *Geografia fizică*, Edit. Academiei, București.
- (1964), *Dealuri și coline*, ASUCI—GG, X.
- Martiniuc C., Băcăuanu, V. (1961), *Porniturile de teren și modul cum pot fi prevenite sau stabilizate*, Natura, XIII, 4.
- Martiniuc C., Văcaru, Gh., Drușu, Tr., Diamandescu, M., Agachi, A., Maxim I., Răileanu, E. (1967), *Regionarea fizico-geografică solostă ca metodă de asamblare pedologică (cu aplicații la raionul Birlad) în vederea organizării raționale a agriculturii*, Com. geogr. SSNG, IV.
- Martonne, Emm. de (1902), *La Valachie, Essai de monographie régionale*, Paris.
- (1904 a), *Sur les terrasses des rivières karpatiques en Roumanie*, CR. Acad. de Sc. Paris, CXXXIX și în *Lucrări geografice despre România*, 2, Edit. Academiei, București, 1985.
- (1904 b), *Sur l'évolution de la zone des dépressions subcarpatiques en Roumanie*, C. R. Acad. de Sc. Paris, CXXXIX și în *Lucrări geografice despre România*, 2, Edit. Academiei, București, 1985.
- (1907), *Recherches sur l'évolution morphologique des Alpes de Transylvanie (Karpates Méridionales)*, Rev. de géogr. ann., I (1906–1907), și în *Lucrări geografice despre România*, 1. Edit. Academiei, București, 1981.
- Măhăra, Gh. (1977), *Cîmpia Crișurilor — Studiu fizico-geografic*, în vol. *Cîmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului*, în col. *Cercetări în geografia României*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Mătasă, C. (1943), *Cîmpul lui Dragoș—toponimie veche și actuală din județul Neamț*, Casa Școalelor, București.
- (1965), *Prin Moldova de sub munte*, Edit. UCFS, București.
- Mătase, C., Zamoștean, I., Zamoștean, M. (1961), *Săpăturile de la Piatra Neamț*, Materiale și cercetări arheologice, VII.
- Măties, M. (1974), *Contribuții privind cunoașterea situației actuale a păsărilor răpitoare de zi — Ord. Falconiformes, din jud. Argeș, Nymphaea, II*, Oradea.
- Mehedinți, S. (1927), *Le pays et le peuple roumain. Considérations de géographie physique et de géographie humaine*, Imprimeria Națională, București.
- Meruțiu, V. (1912), *Contribuțiune la studiul masivelor de sare din România*, Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, București.
- Meteș, Șt. (1977), *Emigrări românești din Transilvania în secolele XIII—XX*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Mihai, Gh., Neguș, N. (1981), *Observații preliminare privind evoluția ravenelor formate pe alternanțe de orizonturi permeabile și impermeabile*, SCGGG—Geogr., XXVIII.
- Mihailov, E. A. (1951), *Principalele etape ale dezvoltării depresiunii marginale subcarpatice*, ANRS—GG, V, 6.
- Mihăescu, L. (1973), *Primele mențiuni documentare despre satele dimbovițene în sec. XV—XVI*, Valachica, Muzeul județean Dimbovița, Tirgoviște.
- Mihăilescu, Fl. (1973), *Observații microclimatice în valea Cracăului*, Șt. și cerc. științ. — geol.-geogr., Inst. Pedag., Bacău.
- Mihăilescu, V. (1930), *Podișul înalt din vestul Botoșanilor—regiunile Dealu Mare și Mindrești*, BSRRG, XLVII (1929).
- (1932), *Marile regiuni morfologice ale României*, BSRRG, I (1931).
- (1936), *România (Geografie fizică)*, Edit. Socec, București.
- (1943), *Alunecările de la Strâmbu (județul Dimbovița)*, BSRRG, LXI (1942).
- (1944), *Dobrogea ca parte a pământului carpatic românesc*, Probl. geogr. rom., București.
- (1946), *Piemontul Getic*, Rev. geogr. ICGR, II (1945), I—IV.
- (1957), *Harta regiunilor geomorfologice ale R. P. Române pe baze geografice*, Bul. șt.—GG, Academia R. P. Române, II, 1.
- (1959), *Porniturile de teren de la Pucioasa*, Probl. geogr., VI.
- (1966), *Dealurile și cîmpiile României. Studiu de geografie a reliefului*, Edit. științifică, București.
- (1969), *Geografia fizică a României*, Edit. științifică, București.
- Mirăuță, Elena, Mirăuță, O. (1964), *Structura geologică a molasei miocene dintre valea Bistriței și Țaslău*, Dds. șed. Com. Geol., XLIX/1 (1961–1962), București.

- Mirăuță, Elena (1969), *Structura și stratigrafia miocenului subcarpatic din regiunea Moinești — Tazlău*, Dds., șed. Com. Geol., LIV/3 (1966—1967).
- Mirăuță, O. (1962), *Stilul tectonic al flisului și al molasei subcarpatice în regiunea Piatra Neamț*, D d s. șed. Com. Geol., XLVIII (1960—1961).
- Mitrea, I. (1980), *Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI—IX e. n.*, Carpica, XII.
- Moldovanu, M. (1982), *Contribuții palinologice la orizonarea stratigrafică a depozitelor jurasice din Depresiunea Birlădului*, Lucr. ses. șt., Gr. Cobălcescu" (24—25 oct. 1981), Universitatea Iași.
- Monah, D., Cucos, St. (1985), *Așezările culturii Cucuteni din România*, Edit. Junimea, Iași.
- Morariu, T. (1946), *Cîteva considerațiuni geomorfologice asupra cîrvurilor din Banat*, Rev. geogr., ICGR, II, (1945), I—IV.
- Morariu, T., Mihăilescu, V. (1973), *La notion de piémont en géographie*, în vol. *Piemonturile*, Centr. multipl. Univ. București.
- Morariu, T., Savu, Al. (1959), *Fragmentarea medie a reliefului Republicii Populare Române*, Probl. geogr., VI.
- Motaș, C., Angheliescu, V., (1974), *Cercetări hidrologice în bazinul riului Bistrița (Carpații Orientali)*, I.C.P., Monografia, 2.
- Moțoc, M. (1982), *Ritmii medii de degradare a solului în R. S. România*, Bul. Inf., ASAS, 12, București.
- Mrazec, L. (1986), *Note sur la géologie de la partie S du haut plateau de Mehedinți*, Bull. Soc. Sc. phys. de Bucarest.
- (1901), *Contribution à l'étude de la dépression subcarpatique*, Bull. Soc. Sc. Bucarest, IX (1900), 6.
- (1910), *Despre rocile verzi din conglomeratele terțiare ale Carpaților și Subcarpaților României*, Dds. șed. IGR, II.
- Mrazec, L., Teisseyre, W. (1902 a), *Privire geologică asupra formațiunilor salifere și zăcămintelor de sare în România*, Monit. du Pétrole Roum. III, 43, București.
- (1902 b), *Über oligocäne Klippen am Rande der Karpathen bei Bacău (Moldau)*, Jahrb. d. k. j. geol. R. A., LI, Wien.
- Muică, Cristina, Zăvoianu, I., Muică, N. (1979), *Observații privind starea mediului în împrejurimile stațiunii Pătrîlăgele (Subcarpații Buzăului)*, SCGGG—Geogr., XXVI.
- Muică, N. (1971), *Schimbări ale rețelei hidrografice din regiunea de sub munte dintre Dimbovița și Rîul Doamnei*, SCGGG—Geogr., XVIII, 1.
- Muică, N., Zăvoianu, I., Bogdan, Octavia, Muică, Cristina (1981), *Potențialul natural al mediului din perimetrul Stațiunii de cercetări geografice Pătrîlăgele*, SCGGG—Geogr., XXVIII.
- Munteanu, D. (1965), *Schiță avifaunistică a bazinului montan al Bistriței*, ASUCI—Biol., XI, 1.
- Munteanu—Murgoci, Gh. (1905), *La grande nappe de charriage des Carpathes méridionales (tirage à part de 3 notes intitulées : Contribution à la tectonique des Carpathes méridionales, C. R. Acad. de Sc. Paris, VII, 3 Juillet 1905 ; — Sur l'existence d'une grande nappe de recouvrement dans les Carpathes méridionales, ibid. VII, 31 Juillet 1905 ; — Sur l'âge de la grande nappe de charriage des Carpathes méridionales, ibid. IX, 4 Septembre, 1905) ; publ. și în Bul. Soc. Științe din București, XVII, pp. 47—49 ; 50—52 ; 52—54 ; — (1908), *Terfiarul din Oltenia cu privire la sare, petrol și ape minerale*, AIGR, I (1907). 1.*
- Mutihaș, V., Ionesi, L. (1974), *Geologia României*, Edit. Tehnică, București.
- Neacșu, R., Savu, H. (1962), *Vulcanismul neogen din bazinul Zărand*, Dds. șed. Com. Geol., XLVII (1959—1960).
- Neamțu, Gh. (1968 a), *Clima depresiunii intracolinare Tg. Jiu—Cîmpu Mare*, Com. Geogr., SSNG, V.
- (1968 b), *Mersul temperaturii medii a aerului, lunară, anolimpuală și anuală*, în *Oltenia deluroasă*, Com. Geogr. SSGR, VI.
- (1969), *Distribuția geografică a temperaturilor extreme absolute în Oltenia deluroasă*, SCGGG—Geogr., XVI, 1.
- (1970), *Climat de nuanță submediteraneană în țara noastră*, Terra, II (XXII), 1.
- (1974), *Fenomene climatice în zona subcarpatică de sub Munții Gorjului*, în *Probl. de geogr. a jud. Gorj, Culegere de com. șt. Tirgu Jiu*, Com. de cult. jud. Gorj.
- (1976), *Cîteva aspecte climatice caracteristice stațiunilor balneoclimatice Călimănești—Olănești și Govora*, în vol. *Simpoz. de climatologie urbană și combaterea poluării aerului*, Filiala Iași a Acad. R. S. R.
- (1978), *Unele aspecte ale regimului precipitațiilor în depresiunea Pătrîlăgele*, SCGGG—Geogr., XXV.
- (1983), *Regimul precipitațiilor în Depresiunea Tg. Jiu—Cîmpu Mare*, în vol. *Geografia Gorjului*, Tirgu Jiu, Com. de cult. jud. Gorj.
- Neamțu, Gh., Bogdan, Octavia, Mihai, Elena, Teodoreanu, Elena, (1970) *Harta topoclimatică a R. S. România*, SCGGG—Geogr., XVIII, 2.
- Neamțu Gh., Mihai, Elena, Teodoreanu, Elena (1968), *Unele cazuri de inversiuni termice în depresiunile intracarpatică Petroșani, Brașov și Cîmpulung Moldovenesc*, HGAM, XIII, 5.
- Neacșu, O., Popovici, C. (1969), *Repartiția duratei de strălucire a Soarelui și a radiației globale pe teritoriul R. S. R.*, Cul. lucr. IM., 1967.
- Nedeleu, E. (1974), *Cu privire la semnificația și aria teritorială a termenului geografic popular și a toponimului mușcel — Mușcel în județul Argeș*, SCGGG—Geogr., XXI, 2.
- Nemoianu, P. (1929), *Elementul de băștină în Banat*, Anal. Banatului, II, 2.
- Niculăiaș, A., Niculăiaș, M. (1981), *Zona Fălticeniilor*, Edit. Litera, București.
- Niculescu, Gh. (1955), *Raionarea geomorfologică a raionului administrativ Ploiești*, Rev. Univ. C. I. Parhon, Șt. Nat., 8.
- (1960), *Cîmpia piemontană înaltă a Cricovului Dulce*, Probl. geogr., VII.
- (1963), *Terasele Teleajenului în zona subcarpatică cu privire specială asupra mișcărilor neotectonice cuaternare*, Probl. geogr., IX (1962).
- (1965), *Reconstituirea unui piémont cuaternar în Subcarpații Teleajenului*, SCGGG—Geogr., IX, 1.
- (1971), *Considerații asupra zonei de interferență carpato-subcarpatică în Muntenia*, SCGGG—Geogr., VIII, 2.
- (1974), *Subcarpații dintre Prahova și Buzău — caracterizare geomorfologică*, SCGGG—Geogr., XXI, 1.
- Niculescu, Gh., Dragomirescu, Ș. (1961), *Observații geomorfologice pe valea Doftanei*, Probl. geogr., VIII.
- Niculescu, Gh., Velcea, I. (1973), *Județul Prahova*, Edit. Academiei, București.
- Nițulescu, Marcela, Păduraru, Aneta (1961), *Secarea riurilor în bazinul riului Motru*, St. hidrol., I.

- Oancea, C., Bârsan, A., Deleanu, Angela (1957), *Cercetări pedologice în regiunea Vădari-Novaci—Cîmpul Mare și Tirgu Jiu*, Dds. șed. Com. Geol., XLI (1953—1954).
- Oancea, D. I. (1959), *Contribuții la studiul monografic al orașului Roman*, Probl. geogr., VI.
- Obreja, Al. (1936), *Tîrgurile din Moldova în veacul al XIX. Scurte considerații istorico-geografice*, Arh. Basarabiei, 4, Chișinău.
- (1961), *Date noi asupra teraselor Birladului*, Com. Acad. Rom., XI, 9.
- Olaru, L. (1965), *Analiza polinică a turbei de la Poiana Zvořístea*, ASUCI—GG, XI.
- Olteanu, Fl. (1953), *Faciesurile și tectonica miocenului subcarpatic din regiunea Berzunțu*, Dds. șed. Com. Geol., XXXVII (1949—50).
- (1954), *Depresiunea subcarpatică în regiunile Solonș și Drăgulești (Bacău)*, Dds., șed. Com. Geol., XXXVIII (1950—51).
- (1958), *Depresiunea subcarpatică între văile Ozanei (piriul Neamțului) și Buzăului*, ACG, XXXI.
- Olteanu, Șt. (1959), *Meșesugurile din Moldova în secolul al XVII-lea*, Studii și materiale de istorie medie, III.
- (1983), *Societatea românească la cumpănă de milenii (secolele VIII—XI)*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Olteanu, Șt., Șerban, C. (1969), *Meșesugurile din Țara Românească și Moldova în Evul Mediu*, Edit. Academiei, București.
- Onicescu, N. (1965), *Geologia României*, Edit. tehnică, București.
- Opreanu, S. (1945), *Așezările omenești de tip adunat din Țara Crișurilor și din Banat*, Rev. Geogr., II, I—IV.
- Orghidan, N. (1969), *Văile transversale din România*, Edit. Academiei, București.
- Otzellowitz, H. von (1790), *Brouillon oder Originalaufnahme der fünf moldauischen Distrikten*, Fotocopie, Biblioteca Academiei, București.
- Pană, Ioana (1966), *Studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între Valea Buzău și Valea Bălăneasa*, STE, seria J, Stratigr., I.
- Pantazică, Maria (1974), *Hidrografia Cîmpiei Moldovei*, Edit. Junimea, Iași.
- Pantazică, Maria, Schram, Maria, (1964), *Contribuții la cunoașterea regiunii de îngheț al riurilor din bazinul Birladului*, St. cerc. geogr., Inst. Ped. Bacău.
- Paraschiv, D. (1964), *Evolution paléogéographique du piémont d'Argeș au cours du Pliocène*, RRGGG—Géogr. 3.
- (1965), *Piemontul Cindești*, STE, Seria H, Geol. cuat., 2.
- (1979 a), *Romanian oil and gas fields*, STE, seria A, Geol. Tehn., 13.
- (1979 b), *Platforma Moesică și zăcămintele ei de hidrocarburi*, Edit. Academiei, București.
- Paraschiv, D., Paraschiv, C. (1978), *Zona sisturilor verzi și relațiile cu celelalte unități ale vorlandului Carpaților Orientali din România*, SCGGG—Geol., 23, 1.
- Păscu, Șt. (1971), *Votevodatul Transilvaniei, I*, Edit. Dacia, Cluj.
- (1979), *Votevodatul Transilvaniei, II*, Edit. Dacia, Cluj—Napoca.
- Pascovschi, S., Leandru, V. (1958), *Tipuri de pădure din R. P. Română*, Edit. Agrosilvică, București.
- Patrichi, Silvia (1971), *Potențialul colian în Moldova*, Cul. lucr. I. M., 1968.
- Patrușiu, D., Iordan, M. (1974), *Asupra prezenței pogonoforului Iabellidites cambriensis Ian. și a algei Vendotenia antiqua Gnil. în depozitele detritice presiluriene din Podișul Moldovenesc*, Dds. șed. IG, LX/4.
- Paucă, M. (1942), *Asupra rețelei hidrografice și morfologiei regiunii de la Curbura de sud-est a Carpaților*, Rev. geogr. rom., V, I—II.
- (1954), *Neogenul din bazinele externe ale Munților Apuseni*, ACG, XXVII.
- (1964), *Bazinul neogen al Silvaniei*, ACG, XXXIV (Partea 1-a).
- (1968), *Blocurile structurale ale pământului românesc*, Bul. Geol., Min. Minelor, 2, București.
- Pătruș, I. (1982), *Le silurien de la Plateforme Moldave et sa position dans le cadre géologique régional*, în Lucr. ses. șt. Gr. Cobălcescu—1981, Univ. Iași.
- Pătruș, I., Dăneș Th. (1987), *Le pré-cambrien (vendien) et le cambrien dans la Plate-forme Moldave*, ASUCI, s. II b, XXXIII.
- Păun, M. (1967), *Vegetația raionului Băls, reg. Oltenia*, Com. bot., SSNG, IV.
- Păun, M., Maloș, C., Popescu, M. (1971), *Excursii în munții Olteniei*, Edit. did. ped., București.
- Păun, M., Zaharia, I., Popescu, Gh. (1972), *Pajiștile mezofile de dealuri din zona subcarpatică a Olteniei*, St. cercet. Tirgu Jiu, Com. de Cult. jud. Gorj, Tirgu Jiu.
- Părvan, V. (1923), *Considerații asupra unor nume de riuri daco-scitice*, Acad. Română, Mem. Secț. ist., seria III, I, Cultura națională, București.
- (1926), *Gelica*, Acad. Română, Mem. secț. ist., Seria III, III, 2.
- Petrescu-Burlou, I. (1977), *Subcarpații Buzăului. Relații geografice om-natură*, Edit. Litera, București.
- Poghirc, P. (1962), *Cultura tutunului în Moldova*, ASUCI—GG, VIII.
- (1972), *Satul din Colinele Tufovei*, Edit. științifică, București.
- (1983), *Podișul Birladului. Caracterizare geografică umană și economică*, Centrul multipl., Univ. Iași.
- Poghirc, P., Chiriac, D. (1974), *Rețeaua așezărilor rurale din Moldova după condițiile geografice*, ASUCI—G, XX.
- Poghirc, P., Hlirjoabă, I. (1968), *Considerații geografice cu privire la sistematizarea așezărilor rurale din Moldova*, Natura—Geogr.-geol., XIX, 6.
- Polonic, P., Polonic, G. (1967), *Miocenul subcarpatic dintre valea Sucevei și valea Cracăului*, Dds. șed. IGR, LII, 3 (1964—1965).
- Poni, P. (1921), *Statistica răzeșilor*, Studii și cercetări, V, Academia Română, București.
- Pop, Gr. P. (1970), *Geografia așezărilor din Cîmpia Crișurilor*, Lucr. șt. Inst. ped. Oradea, IV.
- (1971), *Aspecte ale creșterii animalelor în Cîmpia Crișurilor*, Lucr. șt. Inst. ped. Oradea, geogr., V.
- (1972), *Aspecte ale industriei orașului Oradea*, Lucr. șt. Inst. ped. Oradea, geogr., VI.
- (1980), *Probleme privitoare la repartizarea fondului forestier pe teritoriul României*, SCGGG—Geogr., 24, 2.
- (1981 a), *Unele probleme cu privire la repartitia spațiului agricol în zona Munților Apuseni*, Mem. secț. șt., Acad. Rom., seria IV, 2.
- (1981 b), *Probleme privind creșterea animalelor în zona Munților Apuseni (I)*, SUBB—GG, 26, 1.
- Pop, Gr., Rusu, Viorica (1968), *Considerații economico-geografice asupra pisciculturii din Cîmpia Crișurilor*, Lucr. șt. Inst. ped. Oradea, II.
- (1969), *Unele aspecte privind populația orașului Oradea*, Com. geogr., SSGR, VIII.
- Popescu, C. (1972), *Studiul geografic al populației și așezărilor din zona subcarpatică și montană dintre Buzău și Teleajen*, Centrul multipl. Univ. București.
- (1981), *Aprecieri geografice asupra factorilor de mediu, a populației și așezărilor din zona subcarpatică și montană dintre Buzău și Teleajen*, AUB—Geogr., XXX.

- Popescu, D. (1960), *Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1959*, SCIV, XI, 1.
- Popescu, Gr. (1954), *Cercetări geologice în regiunea Govora — R. Vilcea — Olănești (Depresiunea Gelică)*, Dds. șed. Comit. geol., XXXVIII.
- Popescu—Spineni, M. (1978), *România în izvoare geografice și cartografice. Din antichitate până în pragul veacului nostru*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Popescu — Voitești, I. (1909), *Contribuțiuni la studiul geologic și paleontologic al regiunii muscelor dintre riurile Dâmbovița și Olt*, AIGR, II (1908), 3.
- (1935 a), *Privire generală asupra structurii și evoluției morfologice și geologice a județului Gorj*, An. Lic. „Tudor Vladimirescu”, Tirgu Jiu.
- (1935 b), *Evoluția geologico-paleogeografică a pământului românesc*, Rev. Muz. miner.-geol. Univ. Cluj, V, 2.
- Popești-Voitești, I. (1945), *L'âge des conglomérats de Petricica, de Gârșina et Pleșul*, C.R. Acad. Sc. Roum., VII.
- Popescu, M. (1973), *Originea geografică a pășărilor din Parting—Vilcan și Depresiunea Petrosani pe zone de vegetație*, St. cerc., Com. de Cult. jud. Vilcea, Rm. Vilcea.
- (1974), *Cercetări privind migrația păsărilor în condițiile Olteniei*, St. cerc., Com. de Cult. jud. Olt, Slatina.
- Popescu, N. (1966), *Observații geomorfologice asupra depresiunii Ogradena—Bahna*, AUB—GG, XV.
- (1972), *Valea Oltului între Turnu Roșu și Cozia*, *Observații geomorfologice*, BSSRG, II (LXXII).
- Popova—Cucu, Ana (1980), *Vegetația*, în V. Cucu, A. Popova—Cucu, *Județul Mehedinți*, Edit. Academiei, București.
- Popp, N. M. (1930), *Valea Prahovei între Predeal și Florești*, BSRRG, XLVIII.
- (1934), *În jurul unei probleme de microgeografie*, BSRRG, LVII (1933).
- (1936 a), *Clasificări geografice în Subcarpații românești*, BSRRG, LIV (1935).
- (1936 b), *La zone souscarpatique en Munténie (Roumanie)*, C. R. Congr. Intern. Varșovie, 1934, II, sect. II.
- (1938), *Les terrasses de la Munténie centrale*, BSRRG, LVII.
- (1939), *Subcarpații dintre Dimbovița și Prahova. Studiu geomorfologic*, St. cerc. geogr., III, SRRG, București.
- (1940), *Modul de grupare și distribuire al populației în Subcarpații Munteniei în ultimul secol*, Rev. geogr. rom., III, 1.
- (1941), *Cîteva observări asupra Subcarpaților buzoieni*, BSRRG, XLIX (1940).
- (1965), *Dealurile subcarpatice din România. Caracterizare geografică*, Natura—Geogr.-Geol., XVII, 6.
- Popp, N., Iosep, I., Paulencu, D. (1973), *Județul Suceava*, Edit. Academiei, București.
- Posea, Aurora (1977), *Bazinul Crișul Repede*, în vol. *Cîmpia Crișurilor, Crișul Repede, Țara Beiușului, col. Cercetări în geografia României*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Posea, Gr. (1969), *Asupra suprafeșelor și nivelelor morfologice din sud-vestul Transilvaniei*, Lucr. șt. Inst. ped. Oradea, Seria A.
- (1977), *Considerații privind rolul depresiunilor carpatice și colinare și al rețelei de văi și permanența poporului român*, SCGGG—Geogr., XXIV, 1.
- Posea, Gr., Badea L. (1980), *Republica Socialistă România, Harta geomorfologică*, sc. 1 : 400 000, Edit. did. ped., București.
- Posea, Gr., Ielenicz, M. (1971), *Județul Buzău*, Edit. Academiei, București.
- Posea, Gr., Ilie, I., Popescu, N. (1969), *Ipoteze asupra genezei Defileului Durdărei, Terra, I (XXI), 6.*
- Posea, Gr., Popescu, N. (1973), *Piemonturile din România*, în vol. *Piemonturile*, Centrul multipl., Univ. București.
- Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M. (1974), *Relieful României*, Edit. științifică, București.
- Preda, D. (1917), *Geologia regiunii subcarpatice din partea de sud a regiunii Bacău*, AIGR, VII.
- (1943), *Izvoarele minerale ale Olteniei și importanța lor balneară*, în vol. *jubiliar Oltenia*, Ramuri, Craiova.
- Preda, I., Conovici, M., Conovici, N. (1974), *Observații hidrogeologice și geologice tehnice în zona Izverna, jud. Mehedinți*, AUB—St. Nat., XXIII.
- Pricăjan, A. (1985), *Substanțele minerale terapeutice din România*, Edit. științifică și enciclopedică, București.
- Prunescu—Arion, E., Elian, L. (1966), *Principalele biocenoză ale unor riuri din sudul Carpaților*, Hidrobiol., 7.
- Purcelean, Șt. (1960), *Tipurile de păduri din Podișul Central Moldovenesc, Cercetări privind refacerea pădurii Podișului Central Moldovenesc*, Edit. agrosilvică, București.
- Pușcaru—Soroceanu, E., Sănduleac, I., Cimpeanu, L. (1959), *Contribuții la studiul pașistilor naturale din Vrancea*, Anal. ICAR, seria B, XXVII.
- Pușcaru—Soroceanu, Evdochia, Pușcaru, D., Buia, Al., Burduja, C., Csűrös, St., Grîncianu, A., Niedermayer, K., Popescu, P., Răvărut, M., Resmeriță, I., Samoilă, Z., Vaslu, V., Velca, C. (1963), *Pășunile și fîneșele din Republica Populară Română. Studiu geobotanic și agroproductiv*, Edit. Academiei, București.
- Radoslav, D. (1984), *Satu Mare — ghid de oraș*, Edit. Sport-Turism, București.
- Radu, D. (1967), *Păsările din Carpați*, Edit. Academiei, București.
- Rădulescu, N. Al. (1937), *Vrancea — Geografia fizică și umană*, St. cerc. geogr., I, SRRG, București.
- Rădulescu, N., Velcea, I., Petrescu, N. (1968), *Geografia agriculturii României*, Edit. științifică, București.
- Răileanu, Gr., Năstăsescu, S., Boldur, C. (1964), *Sedimentarul paleozoic și mezozoic al domeniului getic din partea sud-vestică a Carpaților Meridionali*, ACG, XXXIV, II.
- Rogojan, Iulia, Țișteanu, D. (1961), *Unele rezultate ale expediției microclimatice din zona Milcoiu*, Probl. geogr., VIII.
- Roman, N. (1962), *Cercetări geobotanice în sectorul Amara—Olt*, Dds. șed., Com. Geol., XLIII (1955—1956).
- (1974), *Flora și vegetația din sudul Podișului Mehedinți*, Edit. Academiei, București.
- Roșu, Al. (1959), *Cîteva observații fizico-geografice în Cîmpia înaltă a Bălăcei*, Probl. geogr., VI.
- (1967), *Subcarpații Olteniei dintre Motru și Gilort, studiu geomorfologic*, Edit. Academiei, București.
- (1973), *Geografia fizică a României*, Edit. did. și ped., București.
- Rusnescu, Constanța (1968), *Zona turistică a județului Vilcea*, Rev. statistică, XXII, 12.
- (1969), *Despre locul geografiei umane în studiile geografice regionale*, SCGGG—Geogr., XVI, 1.
- (1976), *Bacău, planșa IX—6, Principalele orașe (2)*, în *Atlas R. S. România*, Edit. Academiei, București.
- Rusnescu, Constanța, Bugă, Dragoș (1965), *Creșterea și repartizarea teritorială a populației dintre Carpați și Dunăre în secolele XIX—XX*, SCGGG—Geogr., XXI, 1.
- Rustu, Viorica (1971), *Cîmpia de la nord de Barcău, Moment în evoluția funcțională a așezărilor*, Lucr. științifice, seria geografie, Inst. pedagog. Oradea.

- Rusu, Viorica (1972), *Aspecte geografice ale așezărilor din zona depresionară a Crișului Negru*, Lucrări științifice, seria Geografie, Inst. pedag. Oradea.
- Saizu, I., Botez, C. (1970), *Scurt istoric al așezării Bușuși, până la înființarea fabricii de postav, Carpica, III*.
- Sanie, Silviu (1981), *Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei. Secolele II î.e.n. - III e. n.*, Edit. Junimea, Iași.
- Savu, Al. (1958), *Raionarea fizico-geografică a Cimpiei Tisei*, SUBB-GG, III, 1.
- (1965), *Aspecte de relief în Depresiunea Șimleului*, Com. geogr., SSNG, III.
- Săndulescu, M. (1984), *Geotectonica României*, Edit. tehnică, București.
- Săvulescu, Tr. (1940), *Der biogeographische Raum Rumäniens*, Ann. Fac. agr. București, XX.
- Scorpan, C. (1965), *L'ensemble archéologique féodal de Bilca Doamnei, Dacia, IX*.
- Semaca, R. (1938), *Privire în trecutul tirgului Piatra*, București.
- Senec, V. (1968), *Muntele de sare de la Slănic-Prahova*, ON, 12, 2.
- Sficlea, V. (1960), *Pietrșurile de la Bălăbănești și cileva precizări geomorfologice legate de ele*, ASUCI-Șt. Nat., VI, 2.
- (1980), *Podișul Covurlui. Studiu geomorfologic*, în vol. *Masivul Ceahlău, Țara Gurgeului, Depresiunea Dărmănești, Pod. Covurlui*, col. *Cercetări în Geografia României*, Edit. științ. și enciclop., București.
- Sficlea, V., Băican, V. (1969), *Harta densității populației R. S. România la 15 martie 1966*, ASUCI-Geogr., XV.
- Simionescu, I. (1903), *Contribuții la geologia Moldovei dintre Siret și Prut*, Acad. Rom., Publ. fond., „V. Adamachi”, IX.
- (1905), *Contribuțiuni la geologia Moldovei dintre Siret și Prut*, Acad. Rom., Publ. fond., „V. Adamachi”, II, București.
- (1930), *Les vertèbres pliocènes de Mălușteni*, Acad. Rom., Publ. fond., „V. Adamachi”, IX, București.
- (1932), *Les vertèbres pliocènes de Berești*, Bul. Soc. rom. geol., I.
- Simu, T. (1924), *Colonizarea șvabilor în Banat*, Edit. Banatul, Timișoara.
- Simuț, O. D. (1986), *Acumulările de dioxid de carbon din Cimpia Banatului, Terra, XVIII (XXXVIII), 1*.
- Sircu, I. (1953), *Piemontul Poiana Nicorești, St. și cerc. șt.*, Acad. R. P. Române, Fil. Iași, IV, 1-4.
- (1955), *Valea Siretului în sectorul raionului Pașcani și problema seii de la Ruginoasa*, Probl. geogr., II.
- (1956), *Cîteva probleme ce interesează geografia Podișului Moldovenesc*, ASUCI-Șt. Nat., II, 1.
- (1965), *Terrasses fluviales, surfaces d'érosion locale et pseudopénéplaines dans le nord du Plateau Moldave*, ASUCI-GG, XI.
- (1971), *Geografia fizică a României*, Edit. didactică și pedagogică, București.
- Socolescu, M., Alrinci, Șt., Ciocârdel, R., Popescu, M. (1975), *Fizica și structura scoarței terestre din România*, Edit. tehnică, București.
- Spirescu, M. (1957), *Cercetări pedologice în vestul depresiunii subcarpatice oltenice*, Dds. șed., Com. geol., XLI (1953-1954).
- Spirchez, Z., Rămeriță, I., Rațiu, A. (1962), *Împădurirea terenurilor nisipoase din nord-vestul țării*, Edit. Agro-silvică.
- Sprinceană, Sp. (1927), *Climatologia Olteniei*, Bul. met. lunar IMC, Seria II, VII, 2.
- Stahl, Henri H. (1958) (1959) (1965), *Contribuții la studiul satelor devălmășe românești, I, II, III*, Edit. Academiei, București.
- Stan, Chr., Bogdan, Octavia (1971), *Județul Ialomița*, Edit. Academiei, București.
- Stănescu, I., Dobrea, I., Zadorojnii, Georgeta, Popescu, E. (1966), *Condiții sinoptice care au determinat precipitații abundente în bazinul Jiului între anii 1960-1964*, Cul. de lucr. I. M. 1964, București.
- Stănescu, I. (1971), *Aspecte climatice din zona înaltă a masivului Ceahlău*, ASUCI-G, XVII.
- Stănescu, S. (1964), *Rețeaua hidrografică și principalele ei modificări artificiale*, Monografia hidrologică a riurilor din Banat, St. hidr., IX, ISCH, București.
- Stoian, Rodica (1960), *Ciclonele din Mediterana*, MHGA, 5, 3.
- Stoica, Coriolan, Gherasi, I. (1981), *Sarea și sărurile de potasiu și magneziu din România*, Edit. tehnică, București.
- Swizewski, C., Drăgoi, C. (1966), *Gruparea industrială Troluș - considerații geografico-economice*, ASUCI-GG, XII.
- Swizewski, Cazimir, Oancea, D. I. (1978), *La carte des types de tourisme de Roumanie*, RRGGG-Geogr., 22, 2.
- Șandru, I. (1965), *Regiunea subcarpatică Onești-Bacău, Studiul de geografie fizică și economică*, ASUCI-GG, IX, 2.
- (1966), *Tirgu Ocna - considerații de geografie urbană*, ASUCI-GG, XII.
- (1978), *România. Geografie economică*, Edit. didactică pedagogică, București.
- Șandru, I., Toma, C. V. (1986), *Bacău, Studiul de geografie urbană (la 578 de ani de la prima aletare documentară internă)*, I, Bacău.
- Șchiopoiu, Al. (1982), *Dealurile piemontane ale Coșuștei*, Edit. Scrisul Românesc, Craiova.
- Șenchea, Natalia (1941), *Suprafața Șcheia - Ipatele*, Lucr. Soc. Geogr., „D. Cantemir”, I, Iași.
- (1943), *Cercetări geografice în bazinul superior al Birladului*, Lucr. Soc. geogr., „D. Cantemir”, IV.
- Șerbănescu, I. (1957), *Cercetări geobotanice în Oltenia de Vest*, D d s. șed., Com. Geol., XLI (1953-1954).
- Șerbănescu, I., Spirescu, M., Roman, N. (1962), *Vegetația regiunii subcarpatice dintre Dimbovița și Șușița*, Dds. șed., Com. Geol., XVIII (1955-1956).
- Șimanschi, L. (1969), *Curtea și biserica domnească din Piatra Neamț*, Edit. Meridiane, București.
- Șorodec, C. (1960), *Formarea și evoluția ciclonilor mediteraneeni și influența lor asupra timpului în R. P. R.*, Cul. lucr. I. M. 1960.
- Ștefănescu, Ioana (1972), *Subcarpații dintre Șușița-Zăbrău și Buzău. Studiul geografico-economic*, Edit. Academiei, București.
- Ștefănescu, Ioana, Baranovsky, Niculina (1980), *Mărimea medie a așezărilor rurale din R. S. România*, SCGGG-Geogr., XXVII.
- Ștefulescu, Al. (1904), *Gorjul istoric și pitoresc*, Tipografia N. D. Mișcescu, Tirgu Jiu.
- (1906), *Istoria Tirgu Jiului*, Tipografia N. D. Mișcescu, Tirgu Jiu.
- Teodoreanu, Elena, Mihai, Elena (1971), *Inversiuni de temperatură în culoarul Rucăr-Bran*, SCGGG-Geogr., XVIII, 2.
- Teodorescu, M. (1964), *Alimentarea cu apă a orașului Craiova*, HGAM, 9, 3.
- Topor, N. (1964), *Ani ploioși și secetoși în R. P. Română*, I. M. București.
- Toșa-Turdeanu, Ana (1975), *Oltenia, geografie istorică în hărțile secolului XVIII*, Edit. Scrisul Românesc, Craiova.
- Tudoran, P. (1972), *Terasele Crișului Alb*, SUBB-Geogr., XVII, 1.
- (1977), *Relieful vulcanic din culoarul Crișului-Alb*, SUBB-Geogr., XXII, 2.

- Tudoran, P. (1983), *Țara Zarandului — Studiu geocologic*, Edit. Academiei.
- Tufescu, V. (1932), *Iași și orașele din nordul Moldovei*, Chișinău.
- (1933), *Captări actuale între afluenții Prutului și ai Siretului în jud. Dorohoi*, BSRRG, II (1932).
- (1937 a), *Dealul Mare—Hirlău—Observații asupra evoluției reliefului și așezărilor omenești*, BSRRG, LVI.
- (1937 b), *Odăile, o fază recentă de populare a finiturilor stepice de la răsărit de Carpați*, An. Lic. Meșotă, Brașov.
- (1939), *Le cadre cosmologique de Nerej, in Nerej, un village d'une région archaïque*, Inst. recherches soc. de Roum., I, București.
- (1940), *Fundamentul Podișului Moldovenesc*, Rev. geogr. rom., III, 1.
- (1943), *Tirgușoarele din Moldova*, BSRRG, LX (1942).
- (1957), *Zona de subsidență de la Timișoara*, Com. Acad. Rom., VII, 2.
- (1964), *Typologie des glissements de Roumanie*, RRGGG—Geogr., VIII.
- (1966 a), *Subcarpații și depresiunile marginale ale Transilvaniei*, Edit. științifică, București.
- (1966 b), *Modelarea naturală a reliefului și croșura accelerată*, Edit. Academiei, București.
- (1974), *România — natură, om, economie*, Edit. științifică, București.
- Turea, C. (1937), *Curtea domnească din tirgul Pietrei*, An. Liceului „P. Rareș” (1936), Piatra Neamț.
- Tenu, A. (1981), *Zăcămintele de ape hipertermale din nord-vestul României*, Edit. Academiei, București.
- Tepeș, Elena (1968), *Caracterizarea climatologică a bazinului hidrografic Jiu*, HGAM, 13, 6.
- Tintă, A. (1972), *Colonizările habsburgice în Banat 1716—1740*, Edit. Facla, Timișoara.
- Topa, E. (1969), *Călușa monumentelor naturii din Moldova*, Comisia Mon. Nat., Iași.
- Ujvári, I. (1959), *Hidrografia R. P. Române*, Edit. științifică, București.
- (1972), *Geografia apelor României*, Edit. științifică, București.
- Ungureanu, Al. (1978), *Deplasările temporare pentru muncă generate de unele orașe din estul R. S. România*, SCGGG—Geogr., XXV.
- (1980), *Orașele din Moldova — studiu de geografie economică*, Edit. Academiei, București.
- (1984), *Unele particularități ale evoluției populației și așezărilor în Subcarpații Neamțului*, ASUCI—GG, XXX.
- Ungureanu, Gh. (1960), *Documente privitoare la istoria economică a României, seria A (Orașe și tirguri — Moldova)*, II, Dir. Gen. Arh. St., București.
- Urușu, Veselina (1983), *Piemontul Oltefului. Aspecte ale dezvoltării economice*, SCGGG—Geogr., XXX.
- Urziceanu, Diana (1967), *Considerații privind caracterizarea stabilității albiilor râurilor*, HGA, 12, 1.
- Vancea, V. (1969), *Influența factorului uman privind modificarea rețelei hidrografice în bazinul mijlociu și inferior al Crișului Alb.*, Lucr. șt., Seria. A, Inst. ped., Oradea.
- Vălsan, G. (1912), *O fază în popularea țărilor românești*, BSRRG, XXXIII.
- (1916), *Câmpia Română, contribuții de geografie fizică*, BSRRG, XXXVI (1915).
- (1924), *Carpații în România de azi*, Conv. literare, LVI.
- (1940), *Morfologia văii superioare a Prahovei și a regiunilor vecine*, BSRRG, LVIII (1939).
- Velcea, I. (1973), *Le Piémont Gétique. Conclusion géo-économique d'une étude de géographie régionale* în vol. *Piemonturile*, Centr. multipl. Univ. București.
- Velcea, I., Iordan, I., Ștefănescu, I., Iacob, Gh. (1964), *Contribuții la studiul geografic al agriculturii din Subcarpații dintre Șușița și Rimna*, SCGGG—Geogr., XI, 1.
- Velcea, Valeria, Savu Al. (1982), *Geografia Carpaților și Subcarpaților Românești*, Edit. didactică și pedagogică, București.
- Velcea, Valeria, Velcea, I. (1965), *Valcea Prahovei*, Edit. științifică, București.
- Verșescu, Gh. (1971), *Istoria monografică a orașului Piatra Neamț*, Edit. Litera, București.
- Vergez—Tricom, G. (1929), *Regiunile naturale și unitatea Banatului românesc*, în vol. *Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul. 1918—1928*, Edit. Cultura Națională, București.
- Vintilescu, I. (1941), *Contribuții la cunoașterea carstului din Podișul Mehedinți*, Cerc. st. geogr. Univ. București, I, (1937).
- (1946), *Podișul sau plaiul Mehedinților*, Rev. geogr., II, 1.
- Visarion, M., Săndulescu, M. (1979), *Structura subasmen-tului Depresiunii Panonice în România (sectoarele central și sudic)*, SCGGG—Geofiz., 17, 2.
- Vlad, Sorina (1972), *Noi aspecte în geografia viticulturii din județele Oltenei, raporturile cu așezările omenești*, SCGGG—Geogr., XIX, 2.
- Vulpe, Al. (1967), *Necropola Hallstatiană de la Ferigile.*, Monografia arheologică, Edit. Academiei, București.
- Wachner, H. (1931), *Geomorphologische Studien im Flußgebiet des Olt, LIGUC, IV (1928—1929)*.
- Weymüller François (1931), *Les collines subcarpatiques entre le Prahova et le Buzău*, Ann. de Géogr., 228., XL, Paris.
- Zaharia, N., Petrescu—Dimbovița, M., Zaharia, E. (1970), *Așezările din Moldova de la paleolitic până în secolul XVIII*, Edit. Academiei, București.
- * * * (1788—1789) — *Topographische Beschreibung der im Jahren 1788 und 1789 von der K. K. Armee in Besitz genommenen fünf Moldauischen Bezirken*, Copie, Biblioteca Academiei, București.
- * * * (1803), *Condica Liuzilor, Uricarul*, VII—VIII, Iași.
- * * * (1835), *Karta teatra voyny v Evrope, 1828 i 1829 godov*, 1/420 000, Sankt Petersburg.
- * * * (1864), *Harta României Meridionale*, București.
- * * * — *Recensământul general al populației României din decembrie 1899*, Serviciul Statisticii Generale, București.
- * * * (1901—1902), *Ancheta industrială, I*, Serviciul Statisticii Generale, București.
- * * * (1935), *Indicatorul industriei românești*, Ministerul Industriei și Comerțului, București.
- * * * (1938), *Enciclopedia României, II*, București.
- * * * (1938—1941), *Recensământul general al populației României din 29 decembrie, I—X*, Institutul Central de Statistică, București.
- * * * (1939), *Statistica industriei extractive*, Institutul Central de Statistică, București.
- * * * (1951), *Documente privind istoria României, veacul XVI, B. Țara Românească, I (1501—1525)*, Edit. Academiei, București.
- * * * (1953), *Documente privind istoria României, Veacul XIII, XIV și XV (1247—1500)*, B. Țara Românească, Edit. Academiei, București.

- * * (1953), *Documente privind Istoria României, veacul XVI, B. Țara Românească, VI (1591—1600)*, Edit. Academiei, București.
- * * (1957—1975), *Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorică Centrală a Statului, I—V, Arhivele Statului, București.*
- * * (1959—1960), *Recensământul populației din 21 februarie 1956, I—II, DCS, București.*
- * * (1960), *Istoria României, I*, Edit. Academiei, București.
- * * (1960), *Monografia geografică a R. P. R., I*, Edit. Academiei, II, București.
- * * (1960), *Atlasul climatologic al R. P. Române, I. M.*, București.
- * * (1961—1972), *Anuarele meteorologice ale R. P. Române/R. S. România, I.M.H.*, București.
- * * (1962—1966), *Clima Republicii Populare Române/R. S. România, I, II, M. H.*, București.
- * * (1964), *Industria României 1944—1964*, Edit. Academiei, București.
- * * (1965), *Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, I (1247—1500)*, Edit. Academiei, București.
- * * (1968), *Harta geologică a R. S. România, 1 : 200 000, 32, Baia de Aramă, L—34—XXIX.*
- * * (1967) *Geografia văii Dunării românești*, Edit. Academiei, București.
- * * (1969), *Recensământul populației și locuințelor din 15 martie 1966, I—IV, D. C. S.*, București.
- * * (1970), *Recensământul populației și al locuințelor din 15 martie 1966, I, II, D. C. S.*, București.
- * * (1970—1971), *Harta solurilor R. S. România, scara 1 : 500 000, Inst. Geol., Inst. St. Cerc. Pedol.*, București.
- * * (1971), *Riurile României (monografie hidrologică), I. M. H.*, București.
- * * (1971), *Piemontul Getic. Studiu de geografie economică*, Edit. Academiei, București.
- * * (1972—1979), *Atlas. Republica Socialistă România*, Edit. Academiei București.
- * * (1973), *Pajiștile din zona subcarpatică a Olteniei*, Edit. Serisul Române, Craiova.
- * * (1976), *Zonarea producției agricole — județele Neamț, Bacău și Suceava. Comisia Centrală de Zonare a Producției Agricole, București.*
- * * (1976), *Dicționar de istorie veche a României (Paleolitic — sec. X)*, sub redacția D. M. Pippidi, Edit. Științifică și Enciclopedică, București.
- * * (1977), *Județele României Socialiste*, ediția a II-a. Edit. Politică, București.
- * * (1977), *Repartizarea teritorială a industriei*, Edit. Academiei, București.
- * * (1977), *Harta mișcărilor crustale verticale recente din România, Sc. 1 : 1 000 000, I. G. G.*, București.
- * * (1980), *Recensământul populației și al locuințelor din 5 ianuarie 1977, I—II, DCS*, București.
- * * (1980—1981), *Județele Patriei (Argeș, Bacău, Buzău, Dimbovița, Gorj, Ialomița, Neamț, Prahova, Suceava, Timiș, Vrancea)* Edit. Sport-Turism, București.
- * * (1981), *Pădurile României, Studiu monografic*, Edit. Academiei, București.
- * * (1981), *Recensământul populației și locuințelor din 1977, D. C. S.*, București.
- * * (1983), *Geografia României. I, Geografia fizică* (coord. L. Badea, P. Gâstescu, Valeria Velcea), Edit. Academiei, București.
- * * (1983—1986), *Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, D C S*, București.

BCU IAS / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei, Podișul Mehedinți, Subcarpații, Piemontul Getic, Podișul Moldovei (*Geography of Romania, vol. IV, The Pericarpethian regions: The Hills and the plain of Banat and Crișana, The Mehedinți Plateau, The Subcarpathians, The Getic Pietmont, The Moldavian Plateau*). Institutul de geografie București, Editura Academiei, București, 1992, 580 p.

CONTENTS

Contents (Romanian Version)	
PREFACE	
1 THE CARPATHIANS AND THE PERICARPATHIAN REGIONS	
(<i>Lucian Badea</i>)	13
2 THE HILLS AND THE PLAIN OF THE BANAT AND CRIȘANA	
(coordinators: <i>Lucian Badea, Ignatie Berindei</i>)	17
2.1. The geographical unity and variety of the western pericarpathian regions (<i>Ignatie Berindei, Valer Belozarov, Grigor Pop, Petru Tudoran</i>)	17
2.2. The Hills of the Banat and Crișana	21
2.2.1. General characteristics (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozarov, Petru Tudoran</i>)	21
2.2.2. The Silvania-Someș Hills	25
2.2.2.1. General characteristics (<i>Ion Mac</i>)	25
2.2.2.2. The Chioar hills and the Baia Mare Depression (<i>Gheorghe Iacob</i>)	27
2.2.2.3. The hills and the depression of Silvania (<i>Ion Mac, Petre Dan Idu</i>)	39
2.2.3. The Hills of Crișana	49
2.2.3.1. General characteristics (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozarov</i>)	49
2.2.3.2. The Plopiș hills (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	52
2.2.3.3. The Oradea-Borod Corridor (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Petre Dan Idu</i>)	53
2.2.3.4. The hills of Pădurea Craiului (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	56
2.2.3.5. The Crișul Negru Corridor (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop</i>)	58
2.2.3.6. The hills and depressions of the Crișul Alb (<i>Melinda Căndea</i>)	63
2.2.4. The Hills of the Banat (physico-geographical features, Vasile Sencu ; population, settlements, economic activities, <i>Floarea Bordanc</i>)	71
2.2.4.1. General characteristics	71
2.2.4.2. The Lipova hills	78
2.2.4.3. The Lăpugiu and Lugoj hills	81
2.2.4.4. The Pogăniș hills	84
2.2.4.5. The Dognecea hills	86
2.2.4.6. The Oravița hills	87

2.3.	The Plain of the Banat and Crişana	90
2.3.1.	General characteristics (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Valer Belozarov, Gheorghe Măhăra, Petru Tudoran</i>)	90
2.3.2.	The plain of the Someş	99
2.3.2.1.	General characteristics (<i>Gheorghe Iacob, Alexandru Savu</i>)	99
2.3.2.2.	The high plain of the Someş (<i>Gheorghe Iacob</i>)	105
2.3.2.3.	The low plain of the Someş (<i>Gheorghe Iacob</i>)	107
2.3.2.4.	The plain of the Carei (<i>Gheorghe Iacob</i>)	112
2.3.2.5.	The plain of the Ier (<i>Gheorghe Iacob</i>)	116
2.3.3.	The plain of the Criş (<i>Ignatie Berindei, Grigor Pop, Gheorghe Măhăra</i>)	117
2.3.3.1.	General characteristics	117
2.3.3.2.	Regional divisions	127
2.3.4.	The plain of the Banat (physico-geographical features, <i>Vasile Sencu</i> ; population, settlements, economic activities, <i>Ioan Ianoş</i>)	133
2.3.4.1.	General characteristics	133
2.3.4.2.	The plain of the Mureş	137
2.3.4.3.	The plain of the Vinga	146
2.3.4.4.	The plain of the Timiş	147
2.3.4.5.	The plain of the Lugoj	154
2.3.4.6.	The plain of the Birzava	157

3 THE MEHEDINŢI PLATEAU

(coordinator: *Lucian Badea*) 159

3.1.	Geological structure and characteristics of the relief (<i>Nicolae Muică</i>)	159
3.2.	The karstic relief (<i>Nicolae Muică</i>)	165
3.3.	The climate and the waters (<i>Nicolae Muică, Ana Popova-Cucu</i>)	166
3.4.	The soils, vegetable cover and fauna (<i>Nicolae Muică, Ana Popova-Cucu</i>)	167
3.5.	Nature reserves (<i>Ana Popova-Cucu</i>)	171
3.6.	Population and settlements (<i>George Erdeli</i>)	172
3.7.	Economic activities (<i>George Erdeli</i>)	176

4 THE SUBCARPATHIANS

(coordinators: *Lucian Badea, Dragoş Bugă, Ion Zăvoianu*) 179

4.1.	General characteristics	179
4.1.1.	Position and limits (<i>Alexandru Roşu</i>)	179
4.1.2.	Geological structure, genesis and evolution of the relief (<i>Alexandru Roşu</i>)	181
4.1.3.	Orographic aspects and regional divisions (<i>Lucian Badea, Alexandru Roşu</i>)	185
4.1.4.	Climate (<i>Gheorghe Neamu</i>)	190
4.1.5.	Hydrographic network (<i>Ion Zăvoianu</i>)	193
4.1.6.	Vegetation (<i>Cristina Muică</i>)	199
4.1.7.	Fauna (<i>Constantin Drugescu</i>)	203
4.1.8.	Soils (<i>Nicolae Muică</i>)	206
4.1.9.	Population and settlements (<i>Dragoş Bugă, Constanţa Rusculescu</i>)	209
4.1.10.	Agriculture (<i>Ioana Ştefănescu</i>)	217
4.1.11.	Industry (<i>Petre Deică</i>)	222
4.1.12.	Ways of communication (<i>Alexandra Ghenovici</i>)	227
4.1.13.	Tourist potential (<i>Dragoş Bugă</i>)	229

4.2.	Regional units	231
4.2.1.	The Getic Subcarpathian	231
4.2.1.1.	General characteristics (<i>Lucian Badea</i>)	231
4.2.1.1.	The Gorj Subcarpathians (<i>Niculina Baranovsky, Dragoș Bugă</i>)	234
4.2.1.3.	The Vâlcea Subcarpathians (<i>Lucian Badea, Mihaela Dinu, Constanța Rusenescu</i>)	250
4.2.1.4.	The "Muscelele" hillocks of the Argeș (<i>Maria Sandu, Petre Deică</i>)	265
4.2.2.	The curvature Subcarpathians	274
4.2.2.1.	General characteristics (<i>Lucian Badea</i>)	274
4.2.2.2.	The Prahova Subcarpathians (<i>Dragoș Bugă, Niculina Baranovsky, Nicolae Muică</i>)	276
4.2.2.3.	The Buzău Subcarpathians (<i>Dan Bălleanu, Ioana Ștefănescu</i>)	292
4.2.2.4.	The Vrancea Subcarpathians (<i>Adrian Cioacă, Ioana Ștefănescu</i>)	302
4.2.3.	The Moldavian Subcarpathians	316
4.2.3.1.	General characteristics (<i>Ioan Donișă, Alexandru Ungureanu</i>)	316
4.2.3.2.	The Trotuș Subcarpathians (<i>Ioan Donișă, Alexandru Ungureanu, Constantin Brânduș</i>)	324
4.2.3.3.	The Neamț Subcarpathians (<i>Ioan Donișă, Alexandru Ungureanu</i>)	332

5 THE GETIC PIEDMONT

(coordinator: *Dragoș Bugă*) 345

5.1.	Relief. Genesis and general features (<i>Lucian Badea</i>)	345
5.3.	Climate (<i>Gheorghe Neamu</i>)	351
5.3.	Hydrographic network (<i>Ion Zăvoianu</i>)	356
5.4.	Vegetation and fauna (<i>Cristina Muică, Constantin Drugesu</i>)	361
5.5.	Soils (<i>Nicolae Muică</i>)	365
5.6.	Population and settlements (comments of historical geography, population, <i>Cândea Melinda</i>) Rural settlements (<i>Dragoș Bugă, Valeria Alexandrescu</i>); Urban settlements (<i>Dragoș Bugă</i>)	367
5.7.	Industry (<i>Ion Velcea</i>)	377
5.8.	Agriculture (<i>Sorina Vlad</i>)	379
5.9.	Ways of communication (<i>Dragoș Bugă</i>)	381
5.10.	Tourist potential (<i>Dragoș Bugă</i>)	383
5.11.	Regional units	384
5.11.1.	The Motru piedmont (<i>George Erdeli</i>)	384
5.11.2.	The Bălăcița plateau (<i>Dragoș Bugă</i>)	392
5.11.3.	The Jiu hillocks (<i>Dragoș Bugă</i>)	396
5.11.4.	The Jiu corridor (<i>Dragoș Bugă</i>)	397
5.11.5.	The Olteț piedmont (<i>Veselina Urucu</i>)	400
5.11.6.	The Olt corridor (<i>Veselina Urucu</i>)	405
5.11.7.	The Coțmeana piedmont (<i>Ion Velcea</i>)	409
5.11.8.	The Argeș hillocks (<i>Ion Iordan</i>)	414
5.11.9.	The Cîndești piedmont (<i>Ion Iordan</i>)	416

6 THE MOLDAVIAN PLATEAU

(coordinators: *Lucian Badea, Vasile Băcăuanu*) 421

6.1.	General geographical characteristics	421
6.1.1.	Position and limits (<i>Vasile Băcăuanu</i>)	421
6.1.2.	Geological structure and stages of formation of its unity (<i>Liviu Ionesi</i>)	421
6.1.3.	The relief (<i>Vasile Băcăuanu</i>)	426

6.1.4. The climate (<i>Elena Erhan</i>)	428
6.1.5. The hydrographical network (<i>Maria Pantazică</i>)	432
6.1.6. Vegetation and fauna (<i>Nicolae Barbu</i>)	435
6.1.7. Soils (<i>Nicolae Barbu</i>)	439
6.1.8. Population (<i>Veronica Giosu</i>)	441
6.1.9. Settlements (<i>Alexandru Ungureanu</i> , <i>Dumitru Chiriac</i>)	443
6.1.10. Agriculture (<i>Mihai Apăvăloaie</i>)	448
6.1.11. Industry (<i>Alexandru Ungureanu</i>)	451
6.1.12. Ways of communication and transports (<i>Vasile Nimigeanu</i>)	455
6.1.13. Quality of the environment. Protection measures (<i>Irina Ungureanu</i>)	457
6.2. Regional units	459
6.2.1. The Suceava plateau (<i>Eugen Gheorghiu</i> , <i>Nicolae Lupu-Bratiloveanu</i>)	459
6.2.1.1. Physico-geographical characteristics	459
6.2.1.2. Settlements and population	462
6.2.1.3. Economic activities	464
6.2.1.4. The piedmont plateau between the Suceava and the Moldova rivers	467
6.2.1.5. The Dragomirna plateau	474
6.2.1.6. The Fălțiceni plateau	479
6.2.1.7. The Siret height	487
6.2.2. The Moldavian plain (<i>Vasile Băcăuanu</i> , <i>Vasile Nimigeanu</i>)	490
6.2.2.1. Physico-geographical characteristics	490
6.2.2.2. Population and settlements	500
6.2.2.3. Economic activities	502
6.2.2.4. The Plain of the Upper Jijia and of the Bașeu	510
6.2.2.5. The Plain of the Lower Jijia and of the Bahlui	514
6.2.3. The Birlad plateau (<i>Ion Stănescu</i> , <i>Pompiliu Poghire</i>)	520
6.2.3.1. General physico-geographical characteristics	520
6.2.3.2. Population and settlements	524
6.2.3.3. Economic activities	527
6.2.3.4. The Central Moldavian Plateau	531
6.2.3.5. The hillocks of Tutova	536
6.2.3.6. The hills of Fălciu and Elan Depression	540
6.2.3.7. The Covurlui plateau	542
6.2.3.8. The Birlad corridor	545
6.2.4. The Siret corridor (<i>Dimitrie Oancea</i> , <i>Eugen Gheorghiu</i> , <i>Nicolae Lupu-Bratiloveanu</i>)	548

BIBLIOGRAPHY	559
--------------	-----

Geografia României, vol. IV, Regiunile pericarpatice Dealurile și Cîmpia Banatului și Crișanei, Podișul Mehedinți, Subcarpații, Piemontul Getic, Podișul Moldovei (География Румынии, Том IV, Перикарпатские районы. Холмистые и равнинные районы Баната и Кришаны, Мехединтское плато, Подкарпаты. Гетский пьемонт, Молдавское плато), Editura Academiei Române, București, 1992, 580 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
1 КАРПАТЫ И ПЕРИКАРПАТСКИЕ РАЙОНЫ	
(Луциан Бадя)	13
2 ХОЛМИСТЫЕ И РАВНИННЫЕ РАЙОНЫ БАНАТА И КРИШАНЫ	
(координаторы: Луциан Бадя, Игнатие Бериндей)	17
2.1. Единство и географическое разнообразие западных перикарпатских районов (Игнатие Бериндей, Валер Белозеров, Григор Поп, Петре Тудоран)	17
2.2. Холмы Баната и Кришаны	21
2.2.1. Общие характерные черты (Игнатие Бериндей, Григор Поп, Валер Белозеров, Петре Тудоран)	21
2.2.2. Сильвано—Сомешенские холмы	25
2.2.2.1. Общие характерные черты (Ион Мак)	25
2.2.2.2. Холмы Клоар и депрессия Бая Маре (Георге Якоб)	27
2.2.2.3. Холмы и депрессия Сильвании (Ион Мак, Петре Дан Иду)	39
2.2.3. Холмы Кришаны	49
2.2.3.1. Общие характерные черты (Игнатие Бериндей, Григор Поп, Валер Белозеров)	49
2.2.3.2. Холмы Плопиша (Игнатие Бериндей, Григор Поп)	52
2.2.3.3. Кулуар Орадя—Бород (Игнатие Бериндей, Григор Поп)	53
2.2.3.4. Холмы Падуря Краюлуй (Игнатие Бериндей, Григор Поп)	56
2.2.3.5. Кулуар Кришулуй Негру (Игнатие Бериндей, Григор Поп)	58
2.2.3.6. Холмы и котловины Кришулуй Алб (Мелинда Кындя)	63
2.2.4. Холмы Баната (Физико-географические черты, [Василе Сенку]; Население, населенные пункты, хозяйственная деятельность, Флора Бординк)	71
2.2.4.1. Общие характерные черты	71
2.2.4.2. Холмы Липовы	78
2.2.4.3. Холмы Лэпуджа и Лугожа	81
2.2.4.4. Холмы Погонишулуй	84
2.2.4.5. Холмы Догнечей	86
2.2.4.6. Холмы Оравицей	87

3.1.	Равнины Баната и Кришаны	99
2.3.1.	Общие характерные черты (Игнатие Бериндей, Григор Поп, Валер Белозеров, Георге Мэхэра, Петре Тудоран)	90
2.3.2.	Равнина Сомеша	99
2.3.2.1.	Общие характерные черты (Георге Якоб, Александру Сабу)	99
2.3.2.2.	Высокая равнина Сомеша (Георге Якоб)	105
2.3.2.3.	Низкая равнина Сомеша (Георге Якоб)	107
2.3.2.4.	Равнина Каренлор (Георге Якоб)	112
2.3.2.5.	Равнина Иерулуй (Георге Якоб)	116
2.3.3.	Равнина Кришурилор (Игнатие Бериндей, Григор Поп, Георге Мэхэра)	117
2.3.3.1.	Общие характерные черты	117
2.3.3.2.	Региональные единицы	127
2.3.4.	Равнина Баната (Физико-географические черты, Василе Сенку, Население, населенные пункты, хозяйственная деятельность, Иоан Яноши)	133
2.3.4.1.	Общие характерные черты	133
2.3.4.2.	Равнина Муреша	137
2.3.4.3.	Равнина Вингэй	146
2.3.4.4.	Равнина Тимиша	147
2.3.4.5.	Равнина Лугожа	154
2.3.4.6.	Равнина Бырзавы	157

3 МЕХЕДИНСТКОЕ ПЛАТО

(координатор: Лучиан Бадя) 159

3.1.	Геологическое строение и характерные черты рельефа (Николае Муйкэ)	159
3.2.	Карстовый рельеф (Николае Муйкэ)	165
3.3.	Климат и воды (Николае Муйкэ, Ана Попова-Куку)	166
3.4.	Почвы, растительность и фауна (Николае Муйкэ, Ана Попова-Куку)	167
3.5.	Природные резерваты (Ана Попова-Куку)	171
3.6.	Население и населенные пункты (Георге Эрдели)	172
3.7.	Хозяйственная деятельность (Георге Эрдели)	176

4 ПОДКАРПАТЫ

(координаторы: Лучиан Бадя, Драгош Бугэ, Ион Завояну) 179

4.1.	Общие характерные черты	179
4.1.1.	Географическое положение и границы (Александру Рошу)	179
4.1.2.	Геологическое строение, генезис и эволюция рельефа (Александру Рошу)	181
4.1.3.	Орографические аспекты и региональные единицы (Лучиан Бадя, Александру Рошу)	185
4.1.4.	Климат (Георге Няму)	190
4.1.5.	Гидрографическая сеть (Ион Завояну)	193
4.1.6.	Растительность (Кристина Муйкэ)	199
4.1.7.	Фауна (Константин Друбжеску)	203
4.1.8.	Почвы (Николае Муйкэ)	206
4.1.9.	Население и населенные пункты (Драгош Бугэ, Констанца Русенеску)	209
4.1.10.	Сельское хозяйство (Иоана Штефлеску)	217
4.1.11.	Индустрия (Петре Дейкэ)	222
4.1.12.	Пути сообщения (Александра Генович)	227
4.1.13.	Туристический потенциал (Драгош Бугэ)	229

4.2.	Региональные единицы	231
4.2.1.	Гетские подкарпаты	231
4.2.1.1.	Общие характерные черты (<i>Ли Бадя</i>)	231
4.2.1.2.	Подкарпаты Горжулуй (<i>Никол Барановски, Драгош Бугэ</i>)	234
4.2.1.3.	Подкарпаты Былчий (<i>Лучиан Бадя, Михаела Дину, Констанца Русенеску</i>)	250
4.2.1.4.	Мусчелеле Арджешулуй (<i>Податы Арджешулуй</i>) (<i>Мария Санду Петре Дейкэ</i>)	265
4.2.2.	Подкарпаты Карпатской дуги	274
4.2.2.1.	Общие характерные черты (<i>Ли Бадя</i>)	274
4.2.2.2.	Подкарпаты Праховы (<i>Драгош Бугэ, Никулина Барановски, Николае Муйкэ</i>)	276
4.2.2.3.	Подкарпаты Бузэу (<i>Дан Бэлэ Ноана Штефэнеску</i>)	292
4.2.2.4.	Подкарпаты Вранчи (<i>Адрианэ, Ноана Штефэнеску</i>)	302
4.2.3.	Подкарпаты Молдовы	316
4.2.3.1.	Общие характерные черты (<i>Ионисэ, Александру Унеуряну</i>)	316
4.2.3.2.	Подкарпаты Тротуша (<i>Ионисэ, Константин Брындуш</i>)	324
4.2.3.3.	Подкарпаты Нямцулуй (<i>Ионисэ, Александру Унеуряну</i>)	332

5 ГЕТСКИЙ ПЬЕМОНТ

	(координатор: <i>Драгош Бугэ</i>)	345
5.1.	Рельеф (<i>Лучиан Бадя</i>)	345
5.2.	Климат (<i>Георге Няму</i>)	351
5.3.	Гидрографическая сеть (<i>Ион Дину</i>)	356
5.4.	Растительность и фауна (<i>Криса Муйкэ, Константин Друджеску</i>)	361
5.5.	Почвы (<i>Николае Муйкэ</i>)	365
5.6.	Население и населенные пункты: некоторые соображения по исторической географии: Население, <i>Инда Кындя</i> ; Сельские населенные пункты, <i>Драгош Бугэ, Валерия Александреску</i> ; городские населенные пункты, <i>Драгош Бугэ</i>)	367
5.7.	Индустрия (<i>Ион Велча</i>)	377
5.8.	Сельское хозяйство (<i>Сорина Д</i>)	379
5.9.	Пути сообщения (<i>Драгош Бугэ</i>)	381
5.10.	Туристический потенциал (<i>Драгош Бугэ</i>)	383
5.11.	Региональные единицы	384
5.11.1.	Пьемонт Мотрулуй (<i>Георге Эри</i>)	384
5.11.2.	Плато Бэлэчичей (<i>Драгош Бугэ</i>)	392
5.11.3.	Холмы Жнулуй (<i>Драгош Бугэ</i>)	396
5.11.4.	Кулуар Жнулуй (<i>Драгош Бугэ</i>)	397
5.11.5.	Пьемонт Олтецулуй (<i>Васелина Урз</i>)	400
5.11.6.	Кулуар Олтулуй (<i>Васелина Урз</i>)	405
5.11.7.	Пьемонт Котменей (<i>Ион Велча</i>)	409
5.11.8.	Холмы Арджешулуй (<i>Ион Пох</i>)	414
5.11.9.	Пьемонт Кындешти (<i>Ион Порта</i>)	416

6 МОЛДАВСКОЕ ПЛАТО

	(координаторы: <i>Лучиан Бадя, Василе Бэкуану</i>)	421
6.1.	Общие характерные географические черты	421
6.1.1.	Географическое положение и грани (<i>Василе Бэкуану</i>)	421
6.1.2.	Геологическое строение и этапы формирования единицы (<i>Ливия Нокусу</i>)	421

6.1.3.	Рельеф (<u>Василе Бэкуану</u>)	426
6.1.4.	Климат (<u>Елена Ерхан</u>)	428
6.1.5.	Гидрографическая сеть (<u>Мария Пампазикэ</u>)	432
6.1.6.	Растительность и фауна (<u>Николае Бэрбу</u>)	435
6.1.7.	Почвы (<u>Николае Барбу</u>)	439
6.1.8.	Население (<u>Вероника Джосу</u>)	441
6.1.9.	Населенные пункты (<u>Александру Унгуряну</u> , <u>Думитру Кириак</u>)	443
6.1.10.	Сельское хозяйство (<u>Михай Апэзэлоэ</u>)	448
6.1.11.	Индустрия (<u>Александру Унгуряну</u>)	451
6.1.12.	Пути сообщения и транспорт (<u>Василе Нимиджэану</u>)	455
6.1.13.	Качество среды. Мероприятия по охране (<u>Ирина Унгуряну</u>)	457
6.2.	Региональные единицы	459
6.2.1.	Сучавское плато (<u>Еуджесен Георгиу</u> , <u>Николае Лупу-Братиловяну</u>)	459
6.2.1.1.	Физико-географические черты	459
6.2.1.2.	Населенные пункты и население	462
6.2.1.3.	Хозяйственная деятельность	464
6.2.1.4.	Пьемонтское плато междуречья Сучавы и Молдовы	467
6.2.1.5.	Плато Драгомирней	474
6.2.1.6.	Плато Фэлтиченилор	479
6.2.1.7.	Кулмя Сиретулуй (холмы Боур—Дялу Маре)	487
6.2.2.	Молдавская равнина (<u>Василе Бэкуану</u> , <u>Василе Нимиджэану</u>)	490
6.2.2.1.	Физико-географические черты	490
6.2.2.2.	Население и населенные пункты	500
6.2.2.3.	Хозяйственная деятельность	502
6.2.2.4.	Равнина верхней Жижии и Башеулуй	510
6.2.2.5.	Равнина нижней Жижии и Башеулуй	514
6.2.3.	Плато Бырладупуй (<u>Ион Стэнеску</u> , <u>Помпилю Погирк</u>)	520
6.2.3.1.	Физико-географические черты	520
6.2.3.2.	Населенные пункты	524
6.2.3.3.	Хозяйственная деятельность	527
6.2.3.4.	Центрально-Молдавское плато	531
6.2.3.5.	Холмы Тутовей	536
6.2.3.6.	Холмы Фэлчиулуй и котловина Еланулуй	540
6.2.3.7.	Плато Ковурлуюлуй	542
6.2.3.8.	Кулуар Бырладулуй	545
6.2.4.	Кулуар Сиретулуй (<u>Димитрие Оанча</u> , <u>Еуджесен Георгиу</u> , <u>Николае Лупу-Братиловяну</u>)	548
БИБЛИОГРАФИЯ		549

ISBN 973-27-0181-1

ISBN 973-27-0180-3

LEI 258